



52,010/C

DICTIONNAIRE
RAISONNÉ
UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE.
TOME II.

DICTIONNAIRE

FRANCOIS

1728

DE L'ART DE LA MANIERE

DE

DICTIONNAIRE
RAISONNÉ
UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE;
CONTENANT
L'HISTOIRE

DES ANIMAUX, DES VÉGÉTAUX ET DES MINÉRAUX,
Et celle des Corps Célestes, des Météores, & des autres principaux
Phénomènes de la Nature;

AVEC

L'HISTOIRE ET LA DESCRIPTION

DES DROGUES SIMPLES TIRÉES DES TROIS REGNES;

Et le détail de leurs usages dans la Médecine, dans l'Economie domestique &
champêtre, & dans les Arts & Métiers.

*On y a ajouté une Table concordante des Noms Latins, & le renvoi aux objets
mentionnés dans cet Ouvrage.*

Par M. VALMONT DE BOMARE, Démonstrateur d'Histoire Naturelle,
Censeur Royal, Maître en Pharmacie, Honoraire de la Société Economique
de Berne, Membre de l'Académie Impériale d'Allemagne, Affilié des Acadé-
mies Royales des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Rouen, de Caen; des
Sociétés Royales des Sciences de Montpellier, d'Agriculture de Paris, &c.

NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE.

T O M E S E C O N D.



A P A R I S.

CHEZ LACOMBE, Libraire, Quai de Conti.

M. DCC. LXVIII.

Avec Approbation, & Privilege du Roi.

THE JOURNAL OF THE

ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

AND OF THE LONDON MEDICAL SOCIETY

Volume 10, Part 1, 1917

Published by the Royal Society of Medicine

11, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.2

Subscription price, 5s. 6d. per annum in advance

Single copies, 1s. 6d. each

Advertisements, 1s. per line per week

Orders, cheques, and postal orders payable to the Royal Society of Medicine

Printed by the Royal Society of Medicine

11, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.2

Subscription price, 5s. 6d. per annum in advance

Single copies, 1s. 6d. each

Advertisements, 1s. per line per week

Orders, cheques, and postal orders payable to the Royal Society of Medicine

Printed by the Royal Society of Medicine

11, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.2

Subscription price, 5s. 6d. per annum in advance





DICTIONNAIRE

RAISONNÉ

D'HISTOIRE NATURELLE.

D A B

D A I

DABUH ou DABACH : voyez HYÈNE.

DACTYLE ou DACTYLITE. Plusieurs Naturalistes expriment par ce nom, une *Bélemnite*. Voyez ce mot.

Quelques Auteurs ont donné encore ce nom de *Dactyle* à l'Antale, à la Dentale, fossiles, & à tous les Tuyaux cloisonnés ou non concamerés, &c.

DACTYLOBE : voyez à l'article OISEAU.

DAGUET : voyez CERF.

DAILS : voyez à la suite du mot PHOLLADE.

DAIM, *Dama recentiorum*, seu *Cervus palmatus*. L'animal auquel nous donnons le nom de *Daim*, ressemble beaucoup au cerf; mais il est plus petit, & il en diffère sur-tout en ce que ses cornes sont larges & plates par le bout : on a comparé cette partie à la paume de la main, parcequ'elle est entourée de petites andouillères en forme de doigts. La tête de la femelle du daim n'est point ornée de bois.

Quoiqu'aucune espèce ne soit plus voisine d'une autre, que l'espèce du daim l'est de celle du cerf, ces animaux qui se ressemblent à tant d'égards,

dit M. de Buffon , ne vont point ensemble , se fuient , ne se mêlent jamais ; & ne forment par conséquent aucune race intermédiaire.

Les daims paroissent être d'une nature moins robuste & moins agreste que celle du cerf ; ils sont aussi beaucoup moins communs dans les forêts. On les élève dans des parcs , où ils sont , pour ainsi dire , à demi-domestiques. L'Angleterre est l'endroit de l'Europe où il y en a le plus , & où l'on fait le plus de cas de cette venaison. Il y a des daims aux environs de Paris & dans quelques Provinces de France : il y en a en Espagne & en Allemagne ; il y en a aussi en Amérique , qui peut-être y ont été transportés d'Europe. Il semble que ce soit un animal des climats tempérés ; car on n'en trouve point , ou que très rarement , dans les forêts du Nord. Comme le daim est moins sauvage , plus délicat , & , pour ainsi dire , plus domestique que le cerf , il est aussi sujet à un plus grand nombre de variétés.

La tête de tous les daims mue comme celle des cerfs ; mais elle tombe plus tard : ils sont à-peu-près le même tems à la refaire. Les daims raient comme le cerf , dans le tems du rut , mais d'une voix basse & entre-coupée. Ils ne s'excèdent pas autant que le cerf , & ne s'épuisent point par le rut. Ils ne s'écartent pas de leur pays pour aller chercher des femelles ; cependant ils se les disputent & se battent à toute outrance. Ils sont portés à demeurer ensemble : ils se mettent en hardes , & restent presque toujours les uns avec les autres. Dans les parcs , dit M. de Buffon , lorsqu'ils se trouvent en grand nombre , ils forment ordinairement deux troupes qui sont bien distinctes , bien séparées , & qui bientôt deviennent ennemies , parcequ'ils veulent également occuper le même endroit du parc. Chacune de ces troupes a son chef qui marche le premier , & c'est le plus fort & le plus âgé ; les autres suivent , & tous se disposent à combattre pour chasser l'autre troupe. Ces combats sont singuliers par la disposition qui paroît y régner : ils s'attaquent avec ordre , se battent avec courage , se soutiennent les uns les autres , & ne se croient pas vaincus par un seul échec ; car le combat se renouvelle tous les jours , jusqu'à ce que les plus forts chassent les plus foibles & les releguent dans le mauvais pays. Ils aiment les terrains élevés & les collines. La chasse du daim & celle du cerf n'ont entr'elles aucune différence essentielle.

Le daim se nourrit , de même que le cerf , de grains & de bois : comme il broute de plus près que le cerf , le bois coupé par la dent du daim repousse plus difficilement que celui qui l'a été par la dent du cerf. Les daims ruminent : ils recherchent les femelles dès la seconde année de leur vie : ils ne s'attachent pas à la même , comme le chevreuil ; mais ils en changent comme le cerf. Ces animaux s'apprivoisent aisément.

La daine porte huit mois & quelques jours , comme la biche : elle produit de même ordinairement un *faon* , quelquefois deux , & très rarement trois. Ils sont en état d'engendrer & de produire dès l'âge de deux ans , jusqu'à quinze ou seize ans : enfin ils ressemblent au cerf par presque toutes les habitudes naturelles ; & la plus grande différence qu'il y ait entre ces animaux , c'est dans la durée de la vie : voyez CERF.

Les cerfs vivent vingt-cinq à trente ans, & les daims ne vivent qu'environ vingt ans. Comme ils sont plus petits, il y a apparence, dit M. de Buffon, que leur accroissement est encore plus prompt que celui du cerf; car dans tous les animaux, la durée de la vie est proportionnée à celle de l'accroissement, & non pas au tems de la gestation, comme on pourroit le croire, puisqu'ici le tems de la gestation est le même; & que dans d'autres especes, comme celle du *bœuf*, on trouve que, quoique le tems de la gestation soit fort long, la vie n'en est pas moins courte.

Le daim fournit dans le commerce les mêmes marchandises que le cerf. Sa peau est estimée, après qu'elle a été passée en huile chez les Chamoiseurs, ou en mégie. On en fait des gants, des culottes, &c.

DAINTIERS. En Venerie, l'on donne ce nom aux testicules du cerf: *voyez CERF.*

DALE. On appelle ainsi une pierre dure comme celle de liais, débitée par tranches de peu d'épaisseur, & dont on couvre les terrasses, les balcons: on en fait aussi du carreau.

DAME DES SERPENS. Espece de *Boicininga* ou de serpent à sonnettes, dont les couleurs imitent les taffetas flambés: *voyez BOICININGA.*

DANTE: *voyez BEORI.*

DARD, *Jaculatrix* Espece de serpent *acontias* qui se trouve aux Isles de Barlovento dans la nouvelle Espagne. Ses écailles sont jaunes-roussâtres, lozangées & coupées par un cordon qui regne depuis la tête jusqu'au bout de la queue. Toutes les jointures des écailles sont orangées. *V. ACONTIAS.*

DARD ou VANDOISE, *Jaculus*. Petit poisson de rivière, de la longueur d'un hareng, qui va fort vite dans l'eau: il semble qu'il s'y élance comme un dard, d'où lui est venu son nom. Ce poisson est de l'espece des poissons blancs. Il est long de neuf doigts; il a le corps large & le museau pointu; il est couvert d'écailles moyennes & de petites lignes. La nageoire de l'anus est composée de dix arrêtes: sa couleur est entre le brun, le vert & le jaune. Il a l'estomac petit & le foie blanc, où est attaché la bourse du fiel. Il devient fort gras. Sa chair est molle, mais bonne, agréable au goût, & meilleure que celle de tous les autres Muges dans la famille desquels il est. Cette chair est si saine, qu'on dit en proverbe: *Sain comme Dard.*

DATTES, *Dactyli*. Ce sont des fruits oblongs, gros comme le pouce, longs d'un pouce & demi, composés d'une pellicule mince, roussâtre, dont la pulpe ou la chair est jaunâtre, grasse, ferme, bonne à manger, douce, d'un goût vineux & sucré. Cette chair environne un gros noyau allongé, grisâtre, cylindrique, dur & creusé d'un sillon dans sa longueur. Ces fruits naissent en Barbarie & en Espagne; il en croît aussi dans le pays de Salé en Provence, mais qui sont maigres & se corrompent très facilement. Nous donnerons la maniere d'en faire la récolte & leur usage, après avoir décrit l'espece de palmier qui les produit.

Histoire du Palmier Dattier.

Le *Palmier Dattier* est un arbre de la grande espece des *palmiers*. Il pousse une racine qui souvent est simple , & toujours épaisse & ligneuse : elle est environnée vers son colet de menues branches , un peu tortueuses , nues & serpentantes. Le bois & l'écorce de ces premieres branches sont fibrés , flexibles , rousâtres & d'un goût acerbe. Le tronc de l'arbre est gros , droit , cylindrique & sans branches : avec le tems sa hauteur surpasse huit brasses. Il a pour écorce les queues ou chicots des branches feuillées qui restent après qu'on les a coupées , & qui sont placées symétriquement , y en ayant toujours six autour du tronc ; de sorte que les six qui sont au-dessus , répondent à l'endroit des interstices qui se trouvent entre les queues des branches inférieures. Cette espece d'écorce est d'ailleurs épaisse & chargée d'écailles , ce qui facilite pour monter à l'arbre. Quand la superficie du tronc est nue , elle est de couleur fauve. La substance intérieure du tronc est composée de fibres longitudinales , épaisses , ligneuses , cependant légères , étant unies par une matiere fongueuse. Le peu de solidité de ce bois le rend très difficile à travailler. Le jeune palmier dattier a dans le milieu de son tronc , une espece de nerf ligneux : au bout d'un an il contient une moëlle bonne à manger ; avancé en âge , le tronc s'endurcit , il n'y a que le sommet de bon à manger ; plus vieux encore , il n'y a que les boutons du sommet où se trouve cette moëlle molle , blanche , tendre , charnue , cassante , douceâtre & favoureuse. Les Persans & les Arabes en sont fort friands ; mais comme cette moëlle est le germe productif des branches qui doivent naître , &c. l'arbre meurt lorsqu'on la coupe.

Le *palmier dattier* est communément terminé par une seule tête conique , qui est composée au moins de quarante branches feuillées , & de quatre-vingts au plus , placées en rond : les plus anciennes se courbent bientôt en arc vers l'horison , & enfin se fanent. Des aisselles des branches feuillées sortent des grappes branchues qui ont chacune leur enveloppe , & qui portent des fleurs dans le palmier mâle , & des fruits dans le palmier femelle. La côte de la branche feuillée est très grande , longue d'environ trois brasses , verdâtre , lisse , étant jeune , luisante & jaunâtre ; étant vieille , courbée & creusée en gouttiere ; d'une substance fibreuse & analogue à celle du tronc. Cette côte est composée vers son extrémité , de feuilles semblables à celles du roseau : elles durent toujours ; elles sont ailées & en très grand nombre , soutenues sur des especes de queues ligneuses , si fortement attachées à la côte , qu'on ne peut les en arracher qu'avec peine. Ces feuilles sont situées obliquement & alternativement , larges de deux pouces , & longues d'une coudée , fort pointues , d'un verd pâle , & pliées par le milieu , fort dures , seches & pleines de nervures.

Au sommet du *palmier dattier* & à la base des côtes , se trouvent trois ou quatre fortes d'enveloppes à réseau , semblables à de l'étope ou au gros chanvre

chanvre , représentant par leur figure une nasse dont les fils seroient collés & appliqués en croix , & non pas entrelacés. Ces enveloppes plus ou moins larges , & colorées en jaune selon la vétusté de l'arbre , servent à affermir un nombre de branches , & à mettre à couvert des injures extérieures non-seulement les branches feuillées , mais encore principalement celles des jeunes grappes.

Les fleurs du *palmier dattier* naissent encloses dans une autre grosse enveloppe , qu'on appelle *Elaté*. Cette enveloppe s'ouvre quand elle a atteint une certaine grosseur , & elle laisse paroître des fleurs blanches , disposées en grappes. A ces fleurs placées au haut du tronc & aux aisselles des branches feuillées , succèdent sur le même rameau en grappes , appelé *Regime*, cent quatre-vingts à deux cents dattes , dont nous avons déjà parlé , & qui étant mûres , servent de nourriture à un grand nombre de personnes dans les Indes , en Perse , en Syrie , en Afrique , en Egypte & en Judée. Celles qu'on nous envoie ne sont employées que pour la Médecine. *Voyez la maniere de les conserver , à la fin de cet article.*

Culture du Palmier Dattier.

Le palmier qui naît de lui-même des racines d'un autre , commence à donner des fruits après quatre années de transplantation dans un terroir fertile ; dans un terrain stérile , il ne rapporteroit qu'au bout de six à sept ans : mais celui qui vient d'un noyau est bien plus long-tems à donner du fruit.

Voici l'ordre dans lequel les palmiers , soit mâles , soit femelles , produisent leurs différentes fleurs. Vers le mois de Février ces arbres poussent leurs boutons dans les aisselles des branches feuillées ; il en résulte des *spathes* chargées de duvet , qui croissent peu-à-peu , & grossissent au point que le mois suivant elles s'entr'ouvrent dans leur longueur , & laissent paroître une espèce de truffe. Ce corps ainsi dégagé , prend bientôt la figure d'une grappe composée d'un grand nombre de pédicules qui soutiennent de petites fleurs dans les mâles , & des espèces de petites prunes dans le palmier femelle : les fleurs fécondent ces fruits naissans , qui mûrissent dans l'espace de cinq mois. Les palmiers les plus vigoureux portent huit ou dix grappes. La grappe mâle est parsemée d'un grand nombre de petites fleurs oblongues , à trois pétales & à étamines velues. Elle porte deux cents pédicules , dont les plus courts supportent quarante petites fleurs , les moyens soixante , & les plus longs quatre-vingts. Au commencement de Mars les *spathes* se rompent ; les grappes femelles paroissent d'abord ; & peu de jours après elles sont nues , & portent un très grand nombre d'embryons , gros & ronds comme un grain de poivre , luisants & d'un goût acerbe. Dans le mois de Mai ces fruits sont déjà gros comme nos cerises : leur couleur est verte. En Juin leur osselet ou noyau grossit , leur chair devient plus solide , & ils mûrissent dans le mois d'Août , sans que la chair pulpeuse continue d'être adhérente à son noyau.

Le palmier se plaît dans les terrains sablonneux des pays chauds. On le

cultive dans la Grece , dans l'Italie & un peu en France. Lorsqu'on sème des noyaux , il en naît des palmiers mâles & femelles ; mais lorsqu'on plante des racines , les palmiers qui naissent suivent le sexe de leur mere racine. Quand on a planté dans la terre les jeunes pousses de deux ou trois ans , on a soin de les arroser pendant l'été : on extirpe celles qui pullulent autour du palmier , ainsi que tous les insectes qui pourroient nuire à l'arbre. Lorsque les palmiers sont en état de porter des fleurs & des fruits , on prend soin d'en multiplier & accélérer la fécondité. Pour y réussir , on cueille sur la fin de Février , au sommet de l'arbre , les spathes mâles remplies de fleurs fécondantes ; on retire les grappes dont les fleurs ne sont pas encore épanouies ; on partage ces grappes en de petites baguettes fourchues , & on les fixe transversalement sur le milieu des grappes femelles , jusqu'à ce que les jeunes embryons aient acquis de la vigueur , étant couverts de la poussière féminale des petites fleurs mâles. Les grappes femelles peuvent aussi être fécondées sans le secours de l'homme , mais par le moyen de l'air qui transporte la poussière fécondante du palmier mâle sur les palmiers femelles qui n'en sont pas éloignées.

Lorsqu'on observe la constance & l'uniformité de la Nature dans ses productions , & qu'on remarque qu'elle a donné les germes propres à chaque individu , on ne peut se résoudre à croire ce qu'on lit dans un Mémoire lu à l'Académie de Gottingue , que si l'on plante le noyau du *palmier dattier* , de maniere que le côté où il y a une incision profonde soit tourné vers le ciel , il en vient un *palmier femelle* ; mais que quand on a placé en haut la surface unie & qui n'a qu'une légère incision , il en vient un *palmier mâle*. On y lit aussi que le moyen d'avoir des palmiers qui donnent des dattes de très bonne-heure , (lors même qu'ils n'ont que six ou sept pieds ,) c'est d'arroser les noyaux qu'on a semés avec de l'eau salée , ainsi qu'on le pratique au village d'Elche , tandis qu'au village de Murcie , où on ne les arrose qu'avec de l'eau commune , les dattiers n'y portent du fruit que très tard.

Maniere de récolter , de conserver les Dattes , & l'usage qu'on en fait.

Lorsque les dattes sont mûres , on en distingue trois sortes , selon les trois degrés de maturité : la premiere , est de celles qui ne sont mûres qu'à l'extrémité ; la deuxieme , de celles qui sont mûres jusqu'à environ la moitié ; & la troisieme est de celles qui sont entierement mûres. On les récolte souvent en même-tems , parceque trois jours d'intervalle achevent le degré de maturité dans celles qui ne le sont pas ; & comme elles tombent d'elles-mêmes étant mûres , on est obligé , de peur qu'elles ne se meurtrissent en tombant , de les cueillir à la main sur les grands palmiers , ou de secouer les grappes des petits palmiers dans un filet. Cette récolte de dattes se fait en automne , en deux ou trois fois , jusqu'à ce qu'on les ait toutes recueillies dans l'espace de trois mois.

Pour achever de mûrir & sécher ces trois classes de fruits , on les expose

au soleil sur des nattes. Elles deviennent d'abord molles & se changent en pulpe ; enfin elles s'épaississent & se bonifient au point de n'être que peu ou point sujettes à se pourrir. Les dattes étant desséchées, on les met au pressoir pour en tirer le suc mielleux, & on les renferme dans des peaux de chevres, de veaux, de moutons, ou dans de longs paniers faits de feuilles de palmiers sauvages, en forme de sacs ; ces sortes de dattes sont la nourriture la plus ordinaire du peuple du pays : ou bien, après en avoir tiré le suc, on les arrose de nouveau avec le même suc avant que de les renfermer : ou enfin on ne les exprime point, & on les renferme dans des cruches avec une grande quantité de syrop ; celles-ci ne sont destinées que pour les riches : on appelle les dattes, ainsi préparées, *Caryotes*, *Caryotæ*.

Celles qu'on nous envoie dans le commerce, de Syrie & d'Egypte, en Europe, sont en partie séchées sur l'arbre même ; ou plus communément, lorsqu'elles étoient prêtes à mûrir, on les a cueillies, ensuite percées, enfilées, & suspendues pour les faire sécher.

On tire, par expression, de ces dattes récoltées & desséchées en la dernière manière, une sorte de sirop qui tient lieu de beurre, étant gras & doux, & qui sert de sauce & d'assaisonnement dans les alimens. Le peuple du pays se sert effectivement de ce sirop en guise de beurre, pour la pâtisserie, pour assaisonner le riz & la fine farine, lorsqu'on veut se régaler dans les festins & les jours de fêtes. Pour retirer ce suc, les uns mettent une claie d'osier sur une table de pierre ou de bois inclinée, en plein air, & font un creux au plancher, pour y placer un vase de terre, propre à recevoir le sirop. Ensuite ils chargent ces claies d'autant de dattes séches qu'elles en peuvent contenir. Les dattes venant à fermenter & étant pressées par leur propre poids, laissent échapper leur liqueur, qui coule dans le vase de terre. Quelquefois on serre les claies avec des cordes, & on les charge de grosses pierres. On réitère cette opération jusqu'à ce qu'on ait exprimé à-peu-près tout le suc des dattes, lesquelles étant conservées servent, comme nous l'avons dit, à la nourriture du peuple.

Kempfer, *Amœnit. exot. fascicul. v.*, dit que les Basréens & les Arabes, qui ont une grande quantité de palmiers, emploient, en place de pressoir, une chambre à double plancher, & dont les murailles sont tapissées de rameaux. Le plancher supérieur est mobile : ils jettent sur l'inférieur une certaine quantité de dattes, qui sont devenues assez molles en se séchant ; quelquefois aussi ils jettent de l'eau bouillante ; ensuite ils laissent tomber le plancher mobile, qu'ils chargent à volonté. Le sirop, extrait de cette manière, est plus liquide que le précédent ; mais moins fluide que celui des payfans qui habitent les montagnes voisines, où il n'y a que peu ou point de palmiers dattiers : ces payfans achètent le marc des dattes passées au pressoir, & les font bouillir jusqu'à ce qu'elles soient réduites en une bouillie très claire, mais qui est peu agréable & peu nourrissante.

Le bois du tronc du palmier dattier sert en Afrique en place de bois de charpente : on en fait des pieux qui résistent long-tems dans l'eau. Ses feuilles,

ou les branches feuillées, servent à couvrir les cabanes des payfans : ils en font aussi des fagots : ils font des balais avec les grappes, des vases & des plats avec les spathes ou enveloppes, auxquelles ils donnent la figure qu'ils veulent : ils emploient les hampes des grappes à faire des chaussures & d'excellentes cordes pour leur marine.

Nous avons déjà dit que la moëlle du sommet de ce palmier & ses tendres branches feuillées, qui sont en forme de cône, fournissent aussi une nourriture délicate. On prétend que les jeunes grappes mâles & femelles, sont aussi très bonnes ; on peut manger toutes ces parties crues, ou cuites avec la viande de mouton. Les dattes, elles-mêmes, fournissent naturellement & par les préparations de l'art, une diversité de mets fort agréables. Les dattes, comme nous avons dit ci-dessus, étant récentes, sont un aliment salutaire aux Egyptiens, aux Africains, & sur-tout pour ceux qui ne boivent que de l'eau : desséchées, elles sont plus difficiles à digérer. On fait bouillir les noyaux pour les amollir, & ils servent de nourriture aux bœufs que l'on fait reposer. A la Chine, on fait brûler ces osselets, & on les fait souvent entrer dans la composition de l'*encre de la Chine*. En Espagne, on les brûle pour faire une poudre propre à nettoyer les dents : on en fait aussi le faux ivoire brûlé. En Natolie, on est dans l'usage de jeter de l'eau sur les dattes pour les faire fermenter, & en tirer du vin qui peut se changer en vinaigre. Souvent on tire de ce vin par la distillation un esprit ; & comme l'usage des liqueurs spiritueuses est sévèrement défendu par la Religion de Mahomet, on le fait passer sous le nom de *Remede* pour soulager les crudités & les coliques d'estomac : afin de mieux guérir ces maux, les gens riches ajoutent, avant la distillation, de la *squine*, de l'*ambre* & des aromates ; mais le commun du peuple y met de la racine de *réglisse* & de l'*absinthe de Perse*, ou de la petite racine de *vrai-jonc odorant* ou de la *sementine* de Turquie ou de Perse. Le *nectar de dattes*, que boivent les Souverains du Congo, est la liqueur spiritueuse pure des dattes fermentées.

Le palmier renferme ses vertus alimentaires dans la moëlle de son tronc & dans ses fruits ; on trouve encore dans ces derniers une vertu médicinale. L'expérience a appris que les fruits du dattier sont légèrement astringens, & modèrent les cours de ventre ; qu'ils fortifient l'estomac, adoucissent la poitrine & tous les organes du poulmon, même les douleurs des reins & de la vessie ; mais il faut en user modérément. Autrement, elles causent le mal de tête & l'affoiblissement de la vue, produisent des obstructions & la mélancolie.

DATTES DE MER. On donne ce nom quelquefois à des corps mous, que M. Cestoni, habile Pharmacien de Livourne, dit être les véritables fruits de l'*Algue à feuilles étroites des Verriers*. On en trouve la figure dans un Livre intitulé, la *Gallerie de Minerve*.

La *datte de mer*, ainsi appelée des Conchyliologistes, est une coquille bivalve, cylindrique, épaisse & du genre des moules. Ses valves sont de couleur rousse & se joignent exactement. Ce coquillage qui se trouve à Tou-

lon est enfermé dans une pierre très dure , difficile à casser , même à coups de massues , & formant une partie des rochers qui avancent dans la mer. La chair de la datte de mer est exquise.

DATURA. Voyez à l'article POMME ÉPINEUSE.

DAUCUS DE CANDIE, *Daucus Creticus*. Cette plante , qui vient communément sur les endroits pierreux & montagneux , dans l'Isle de Crète , aujourd'hui de Candie & dans les Alpes , a une racine longue , grosse comme le doigt , fibrée & d'un goût de panais. Sa tige est haute d'un pied , cannelée & velue. Ses feuilles sont coronneuses , cendrées & découpées comme celles du fenouil. Les sommets de ses branches soutiennent des ombelles , lanugineuses , blanchâtres , d'une odeur agréable & d'un goût piquant : elles sont composées de petites fleurs en rose , à cinq pétales blancs , dont le calice se change en un fruit formé de deux semences oblongues , cannelées , convexes d'un côté & applaties de l'autre.

On donne aussi le nom de *Daucus* à la carotte sauvage ; autrement appelée *Chirouis* ou *Faux Chervi*. Voyez aux mots CAROTTE , &c.

La semence du daucus de Candie est estimée lithontriptique , hystérique & carminative : elle est la première des quatre semences chaudes mineures , qui sont celles d'*Ami* , d'*Ache* , de *Perfil* & de *Daucus*. On substitue souvent la semence du chirouis à celle du daucus de Candie , qui est l'un des ingrédients de la grande thériaque. Les daucus sont des espèces de panais sauvages. Dans le Levant , on fait un vin de daucus pour résister au venin & pour provoquer les règles.

DAUPHIN. Voyez à la suite du mot BALEINE.

DAUPHIN. On donne encore ce nom à une coquille univalve , qui est du genre des limaçons à bouche ronde. Voyez LIMAÇON DE MER. Les contours de cette coquille sont armés de pointes déchiquetées. Les Astronomes ont donné aussi le nom de *Dauphin* à une constellation de l'hémisphère Boréal : elle est composée de dix étoiles selon Ptolomée & Tycho.

DAURADE. Voyez CETERACH.

DEGEL : on entend par ce mot le relachement du grand froid , cet adoucissement de l'air , qui refout les neiges dans tout un pays ; en un mot la fonte de la glace qui pour lors reprend son premier état de fluide. La glace se fond beaucoup plus lentement qu'elle ne s'est formée ; elle commence à se fondre par la surface : mais au lieu que l'eau se gèle du centre à la circonférence , elle se degèle de la circonférence au centre. Voyez GLACE.

DÉGRAS. Dans le commerce on donne ce nom à l'huile de poisson qui a servi à passer des peaux en chamois. Cette même huile sert ensuite aux Corroyeurs pour passer principalement les cuirs blancs. Voyez le Dictionnaire des Arts & Métiers.

DÉLUGE, *Diluvium*. Ce mot exprime la plus grande alluvion qui ait jamais couvert la terre ; celle qui a dérangé l'harmonie première , ou plutôt la structure de l'ancien monde ; celle qui , par une cause des plus violentes & extraordinaire , a produit les effets les plus terribles , en bouleversant la

terre , soulevant ou applanissant des montagnes , dispersant les habitans des mers , couche par couche sur la terre ; celle enfin qui a semé jusques dans les entrailles du globe terrestre , les monumens étrangers que nous y trouvons , & qui doit être la plus grande , la plus ancienne & la plus générale catastrophe dont il soit mention dans l'histoire , en un mot la plus grande époque de la Chronologie.

M. Walch , dans sa Thèse sur les Déluges des Anciens , dit que la mémoire du Déluge universel s'est conservée chez toutes les nations ; les Grecs , & sur-tout les Egyptiens & les Assyriens en ont eu des opinions différentes. Le même Auteur dit encore qu'il regne une contradiction entre ceux des Grecs qui en ont écrit. Les uns soutiennent qu'il y a eu deux déluges , d'autres font mention de trois , quelques-uns de quatre , & d'autres y en ajoutent encore un cinquième. M. Walch rapporte tous ces déluges différents des Payens à celui de Noë d'où ils prennent leur source , puisque tous les Ecrivains profanes en racontent les mêmes circonstances. Enfin il s'étonne , que tandis que les paroles de Moÿse sont si claires , on puisse disputer du déluge , de l'année , du tems & des autres circonstances. Telle fut cette inondation générale , qu'elle détruisit tout ce qui avoit vie sur la surface de la terre , excepté Noë , sa famille , les poissons & tout ce qui fut renfermé dans l'arche avec Noë. Moÿse nous en donne l'histoire dans la Génése , chap. VI & VII. Les meilleurs Chronologistes la fixent à l'an de la création 1656 , 2293 ans avant J. C. Le déluge a fait & fait encore le plus grand sujet des recherches & des réflexions des Naturalistes , &c. Les points principalement contestés peuvent être réduits à trois. 1°. Son étendue , c'est-à-dire , s'il a été absolument général , ou seulement pour certains pays : 2°. sa cause : 3°. & ses effets. Il nous suffira de dire qu'on a regardé comme une preuve physique de l'universalité du déluge & des grands changemens qu'il a opérés sur toute la surface du monde , cette multitude étonnante de corps marins qui se trouvent répandus , tant sur la surface de la terre que dans l'intérieur même de tous les continens : mais la difficulté est d'expliquer cette dispersion d'une manière conforme à la disposition , à la situation des bancs , des couches & des contrées où on les trouve. M. Pluche , (*Spec. de la Nat. t. 8. p. 93*) en parlant du déluge , convient que les régions du Tigre & de l'Euphrate n'ont point été comprises dans cette terrible submersion , & qu'elles seules en ont été exceptées parmi toutes celles de l'ancien monde , aussi les appelle-t-il le *Berceau du genre humain*. Ce même Auteur prétend encore que les dépouilles de l'Océan parlent à tous les yeux ; que le langage des pétrifications est entendu du peuple le plus grossier ; que ce sont des monumens dûs au plus mémorable de tous les événemens , & que ces reliques du monde ancien sont à côté de l'histoire de Moÿse , ce que sont les médailles à côté de l'Histoire Romaine. Nous aurons occasion de dire en partie notre sentiment sur l'origine des fossiles , à l'article FOSSILES & au mot TERRE , de cet Ouvrage.

DEMI-MÉTAUX , *Semi-Metalla*. On donne ce nom à des substances

pesantes , plus ou moins solides & opaques , qui ont un grand rapport avec les métaux par leur aspect , *facies metallica* , par leur éclat , & par la fusibilité dont ils sont susceptibles , qui se purifient au feu presque tous par sublimation , & qui prennent en se refroidissant une surface convexe ; en un mot qui possèdent les propriétés métalliques , à l'exception de la fixité & de la ductilité. Ainsi toute substance qui a la pesanteur , l'éclat métallique , qui ne peut se purifier sans se sublimer , ou qui se réduit en vapeurs ou en flammes (excepté le cobalt) , & qui n'est point malléable , est un demi-métal.

Ceci étant , les demi-métaux diffèrent essentiellement des minéraux proprement dits , qui ne sont qu'un assemblage de matieres terreuses ou pierreuses , entremêlées de sels , de bitumes & de portions métalliques ochracées , le tout susceptible d'être réduit en pierre , en scories , en verre , & de ne contracter que peu ou point d'union avec les demi-métaux.

Toutes ces propriétés si essentielles pour la distribution des êtres qui composent le regne minéral , nous font connoître six demi-métaux , dont cinq sont solides , & le sixieme est fluide.

Les demi-métaux solides , purifiés par la Nature ou par l'Art (ce qui s'entend de leur état de régule) , sont , l'*arsenic à face métallique* , le *cobalt* , le *bismuth* , l'*antimoine* & le *zinc*.

Le demi-métal fluide , (qu'il soit vierge , ou révivifié du *cinabre*) est le *mercure*.

Les demi-métaux , tels que la Nature les présente ; sont , ainsi que les métaux , rarement dans leur état de pureté ou de régule ; ils sont toujours alliés à d'autres substances métalliques , ou adultérés par des matieres minéralisantes , qui sont le *soufre* & l'*arsenic*. Voyez ces mots & les articles MINES , MINÉRAUX & MÉTAUX.

À l'égard du mercure , les Chymistes sont aussi embarrassés que les Naturalistes , sur le rang qu'il doit tenir parmi les minéraux ; il n'a pas la malléabilité naturelle , ni la fixité , ni la solidité des métaux : le défaut de ces propriétés le rapproche des demi-métaux. Il est , comme eux , susceptible de la plus grande volatilité ; d'un autre côté , il n'est point combustible , il est fluide habituellement : ce n'est que par le mélange qu'on le rend solide , ou par un froid excessif & artificiel qu'il devient malléable ; d'où l'on peut déduire que le mercure est unique de son espece.

On cite tous les jours la description d'un nouveau demi-métal trouvé dans la mine de cobalt de Fœrila en Helsinsie , & dont M. Cronstedt a fait mention sous le nom de *Nickel* dans les Mémoires des Savans de Suede en 1751 , tom. XIII ; & en 1754 , tom. XVI. Voyez NICKEL. Depuis ce tems on a encore fait mention d'un autre nouveau minéral , qui se trouve aux environs de Géra , dans le Voigtland , Province de la Saxe : on l'y voit en forme d'une veine passablement forte & couchée contre une montagne. Personne ne l'a encore défini ni nommé , parceque ses propriétés sont des plus étran-

ges : c'est une matiere fort poudreuse , extrêmement blanche , & presque semblable à de la craie de Briançon , on diroit d'un *guhr d'argent* des plus onctueux au toucher. Voici les principales propriétés qu'on a déjà reconnues à ce minéral : 1°. il est très propre à polir & lustrer l'or & l'argent ; 2°. il ne change pas au feu , & l'on n'a pû le mettre en fusion ; 3°. il est très bon pour nétoyer & adoucir la peau des mains & du visage ; 4°. étant mis dans l'eau , il se divise au point qu'on peut en vernisser des figures de plâtre , qui paroissent ensuite argentées ; 5°. on peut en faire des crayons pour dessiner sur le papier en guise de *molybdane* : ses traits sont doux , moëlleux & luisants , & sur-tout très propres à dessiner des fleurs que l'on veut ensuite enluminer ou peindre ; 6°. on en tire un *magister* infiniment supérieur à celui qu'on tire du bismuth ; 7°. il peut servir aux Facteurs d'orgues pour enduire la futaine de leurs moules ; qui se conserve par-là dans les fontes , & ne brule pas si-tôt qu'à l'ordinaire : ajoutez qu'il donne aux tuyaux d'orgues le poli de l'argent. Ce nouveau minéral ne seroit-il point une molybdane blanche ? Voyez MOLYBDÆNE.

DEMI-RENARD. Nom que les François de l'Amérique donnent au Didelphe ou Philandre. Voyez DIDELPHE.

DÉMOISELLES (*Mouches*). Sous ce nom on comprend , 1°. les demoiselles qui ont été des *Formica-leo* : 2°. ces jolies petites mouches , qui dans leur premier âge ont été des vers à six pieds nommés *petits lions* ou *lions de pucerons* , parcequ'ils se nourrissent principalement de ces insectes , si tranquilles & si peu capables de se défendre contre eux : 3°. les demoiselles plus généralement connues de ceux qui n'ont pas fait une étude particuliere des petits animaux. Comme ces mouches naissent & croissent dans des lieux très différents , & que leur histoire peut intéresser la curiosité & l'instruction du Lecteur , nous ferons des articles séparés de chaque espece de ces animaux , & nous les ferons passer en revue , chacun dans leurs trois états différents ; celui de *ver* , celui de *nymphé* , & celui de *mouche*.

DÉMOISELLES AQUATIQUES , *Libella* , aut *Perla* , aut *Mordella*. C'est l'espece de mouches connue dans presque toute la France , même par les enfants , sous le nom de *Demoiselles* : on prétend qu'elles doivent ce nom à la longueur de leur corps & à leur taille fine ; car l'on ne connoît point de mouches qui aient le corps plus long & plus délié que celui de plusieurs especes de ces demoiselles aquatiques : on y compte ordinairement onze anneaux. M. de Réaumur en distingue trois genres ; savoir , *Demoiselles* à corps court & applati , *Demoiselles* à tête grosse & sphérique , *Demoiselles* à tête petite & large. M. Linnæus les divise en moyennes , petites & grandes demoiselles ; ce qui revient à la distinction de M. de Réaumur. Le Naturaliste du Nord en compte quatre especes dans les moyennes , autant dans les petites , & huit dans les grandes : toutes ont les antennes courtes , la queue fourchue , & la bouche garnie de mâchoires.

Origine

*Origine des Demoiselles aquatiques , leur état de Nymphes , & leur
Métamorphose.*

Cette mouche naît dans l'eau & y prend un accroissement complet. Elle commence par être un ver hexapode ou à six pieds : ce ver est encore jeune & très petit quand il devient *nymphes* ; il a déjà la même proportion dans toutes les parties, qu'il aura étant transformé : ainsi les demoiselles à corps court, viennent des nymphes les plus courtes, &c.

Les nymphes des trois genres de demoiselles aquatiques sont, pour la plupart, d'un verd brun, souvent salies par la boue qui s'est attachée à leur corps : celles de quelques autres especes qui se tiennent dans l'eau claire, montrent des taches blanchâtres ou verdâtres très joliment distribuées. M. de Réaumur leur a trouvé à toutes, une tête, un col, un corselet, un corps composé de dix à onze anneaux, & six jambes attachées au corselet : ces nymphes vivent dans l'eau, y nagent avec leurs jambes, & la respirent. M. Poupert croit avoir remarqué, qu'en cet état elles tiennent beaucoup de la nature des vrais poissons, & qu'elles sont pourvues d'ouies.

Chaque espece de nymphe porte un masque dont la forme est différente : l'une porte un casque, l'autre un masque applati, & la troisième un masque plat & effilé. Toutes ces nymphes vivent dix à onze mois sous l'eau, avant que d'être en état de se transformer en demoiselles. Les tems les plus favorables à leur métamorphose & à leur accroissement, sont depuis le mois d'Avril jusques & compris celui d'Octobre : c'est hors de l'eau que doit s'accomplir la grande opération, qui fait passer l'insecte de l'état de poisson à celui d'habitant de l'air. Après être resté au bord de l'eau d'où il est sorti, pendant le tems nécessaire pour se bien sécher, il se met en marche, & cherche un lieu où sa transformation puisse se faire commodément : souvent la nymphe se détermine pour une plante sur laquelle elle grimpe. Après l'avoir parcourue, elle se fixe, la tête en haut, soit contre la tige, soit contre une branche, ou contre une feuille ; quelquefois elle s'attache contre un brin de bois sec. La métamorphose de cette nymphe en demoiselle, est la même que celle des autres nymphes en mouches, soit à deux ou à quatre aîles : c'est aussi la même que celle des chrysalides en papillons.

Les demoiselles aquatiques ont quatre aîles très transparentes, semblables à la gaze la plus fine & la plus éclatante, ou à du talc ouvragé. Cette espece de petite étoffe est argentée ou dorée dans les unes, ornée de taches colorées dans d'autres : ces aîles sont moins grandes que celles des demoiselles terrestres ; cependant les demoiselles aquatiques volent beaucoup plus, & avec plus de grace : on diroit qu'elles planent comme un oiseau ; en un mot elles ne sont pas obligées de lever leurs aîles aussi haut, ni de les faire descendre aussi bas que les demoiselles terrestres, dont le vol est lourd, & semble n'avancer qu'au moyen de grands battements d'aîles.

DEMOISELLE DU FORMICA-LEO, *Libella gracilis*. Mouche qui a été *Formica-leo*, & qui est d'un genre différent de celui des demoiselles qui aiment à voler le long des rivières. Quoiqu'elle ait des aîles plus longues & plus larges que son corps, son vol a quelque chose de pesant, & le cede beaucoup en agilité au vol des demoiselles les plus communes. Mais avant de parler de cette jolie mouche, considérons-la au berceau & avec son masque, c'est-à-dire, dans l'état de *formica-leo*.

Description du Fourmi-lion ou Formica-leo.

Il n'y a guère plus de soixante ans qu'on a observé cet insecte, & les particularités qui l'ont rendu célèbre. Le nom de *formica-leo* (Lion des fourmis) qui lui a été donné d'abord par les François, a été généralement adopté; & ce nom lui convient d'autant mieux, que malgré la ruse dont cet animal se sert pour détruire les insectes, il paroît se plaisir davantage à attraper des fourmis : il en est le lion & l'ennemi redoutable.

Le fourmi-lion, qu'il ne faut pas confondre avec le *formica-vulpes*, voyez ce mot, est un ver hexapode, & de ceux qui doivent se transformer en une mouche à quatre aîles. Il est de la longueur d'un cloporte commun, mais plus large : sa tête est assez longue, & son corps arrondi en s'allongeant vers la queue; sa couleur est d'une espèce de gris sale marqueté de points noirs; les six jambes qui soutiennent le corps, l'élèvent peu. On remarque trois parties distinctes dans la longueur de cet animal; le corps, le corselet & la tête. Le corps est la partie la plus considérable : on y compte onze petits anneaux membraneux : avec la loupe, on y apperçoit un nombre de poils noirs & courts, & des houppes disposées en fils qui sont les organes de la respiration de l'insecte. Son corselet est court & étroit : la première paire de jambes y est attachée, les deux autres paires le sont aux deux premiers anneaux du corps : au-dessus de sa tête est une espèce de col, dont la position la lui fait remuer en tous sens. Sa tête diffère du commun des insectes; elle est plate & plus large à son bout extérieur que par-tout ailleurs. M. de Réaumur y a remarqué deux bouches ou trompes placées aux deux extrémités en manière de cornes : elles sont destinées à pomper le suc du corps des insectes dont le *formica-leo* se nourrit. Ces trompes, lisses en apparence, sont écailleuses, mobiles, dures, longues de deux lignes, & peuvent aller à la rencontre l'une de l'autre, comme sont les dents de chenilles & de plusieurs autres insectes. Le *formica-leo* a vers la base de ses cornes, deux petits yeux noirs, très vifs, qui lui font appercevoir le moindre objet. Les autres animaux ont reçu des aîles ou du moins des pieds pour s'avancer sur leur proie : celui-ci ne fait que fuir ou marcher à reculons par petites secousses; il ne court point après sa proie; il mourroit plutôt de faim que de faire un pas vers elle, il faut que sa proie vienne le trouver : il a le secret de la faire tomber dans une embuscade qu'il lui dresse; c'est l'unique moyen qui lui ait été donné pour vivre : c'est toute sa science, mais elle lui suffit.

*Description de la fosse du Formica-leo , & Ruses de cet insecte pour
se nourrir.*

Lorsque le Formica-leo veut attraper les insectes , il se place ordinairement sous le pied d'une vieille muraille , pour être à couvert de la pluie , dans des terrains secs & composés de grains fins. Quelquefois il fait ses trous sous un arbre planté dans un sol aride & grainelé ; alors le pied de l'arbre lui sert de mur , & la pluie ne peut renverser son ouvrage : il est essentiel que le terrain soit un sable sec & mobile pour obéir à ses efforts. Quand il veut creuser la fosse où il prend son gibier , il commence par courber son derrière qui est en pointe , & il l'enfonce comme un soc de charrue en labourant le sable à reculons : c'est ainsi qu'il trace , à plusieurs reprises & à petites secousses , un sillon circulaire , dont le diamètre se trouve toujours égal à la profondeur qu'il veut donner à sa fosse. Sur le bord de ce dernier sillon , il en creuse un second , puis un troisième , & enfin d'autres toujours plus petits que les précédents ; il s'enfonce de plus en plus dans le sable qu'il jette avec ses cornes sur les bords , & même beaucoup plus loin , en marchant toujours en arrière sur une ligne spirale : à mesure qu'il s'enfonce , ses coups de tête réitérés jettent le sable hors du cercle , & en vident peu-à-peu le dedans. Sûr dans ses opérations , il décrit un cercle parfait , & trace une volute sans compas. Il donne à la pente du terrain qu'il creuse , la plus grande roideur qu'il est possible , sans en attirer l'éboulement. Sa fosse ressemble assez bien à un cône renversé , ou plutôt au dedans d'un entonnoir.

Quand le fourmi-lion est nouvellement éclos , la fosse qu'il fait est fort petite ; mais il l'aggrandit en proportion de son accroissement , jusqu'à lui donner plus de deux pouces de diamètre à son ouverture , sur autant de profondeur. Lorsque son ouvrage est fini , il se met en embuscade en se cachant tout en bas sous le sable , de manière que ses deux cornes embrassent justement le point qui termine le fond de l'entonnoir. Le voilà jour & nuit en vedette ; & pour lors malheur au cloporte , au puceron , à la fourmi , & à tout insecte mal-avisé , qui vient roder sur les bords de ce précipice , que le fourmi-lion n'a fait en pente & dans le sable , que pour faire rouler en bas tous ceux qui s'y présenteroient.

C'est principalement sur la fourmi , que le formica-leo fonde sa cuisine : elle n'a point d'ailes pour se tirer de ce trou ; des insectes ailés y périssent aussi par l'adresse du chasseur. Dès qu'il est averti par la chute de quelques grains de sable dans la trémie , qu'il y a une capture à faire , il se retire quelque peu , & ébranle , par son mouvement , le pied du sable qui s'éboule aussi-tôt , & roule jusqu'au fond en entraînant sa proie. Si cette proie est agile , si elle remonte vite , & sur-tout si elle a des ailes , le fourmi-lion fait partir , à diverses reprises , quantité de sable qu'il lance plus haut qu'elle ; c'est une grêle de pierres pour un animal tel qu'un moucheron ou qu'une fourmi. Aveuglé & accablé de la sorte par un déluge de pierres qui pleuvent

de toutes parts, & entraîné par la mobilité du sable qui s'écroule sous ses pieds, l'insecte, quel qu'il soit, tombe entre les deux serres de son ennemi, qui les lui plonge dans le corps; l'attire violemment sous le sable, & en fait son repas en le suçant. Il n'y a que les insectes trop gros, & ceux dont la peau est trop dure pour être percée avec ses cornes qu'il laisse en liberté. Quand il ne reste plus que le cadavre, il se garde bien de le laisser chez lui : un tel aspect pourroit empêcher de nouvelles visites. Pour s'en débarrasser, il l'étend sur ses cornes; & d'un mouvement brusque, il le jette à plus d'un demi-pied du bord de sa fosse. Si sa fosse est un peu dérangée par cette expédition, si elle s'est remplie, & que l'ouverture étant devenue trop grande pour la profondeur, il n'y ait pas assez de pente, il retravaille le tout; il arrondit, creuse, évacue, & enfin se remet à l'affût pour une seconde capture.

Le fourmi-lion fait voir combien la patience & la ruse sont nécessaires dans le métier de Chasseur. Cet animal passe quelquefois les semaines & les mois entiers sans remuer; & ce qui est plus étonnant, sans manger.

Sa sobriété est telle, qu'on en a vu vivre plus de six mois dans une boîte exactement fermée, où il n'y avoit que du sable : néanmoins, pour ne pas être exposés à un jeûne trop rigoureux, ils savent placer leur trou dans des lieux fréquentés par les insectes.

Métamorphose du Formica-leo en Nymphe.

Les *Formica-leo* naissent en été ou en automne, & se transforment une ou deux années après; quelquefois plutôt, d'autrefois plus tard. Quoi qu'il en soit, quand le fourmi-lion est parvenu à un certain âge, & qu'il veut se renouveler pour paroître sous sa dernière forme, alors il ne fait plus de fosse; mais il se met à labourer le sable, & à y tracer une multitude de routes irrégulières; ce qu'il fait apparemment pour se mettre en sueur : après quoi il se cache sous le sable, comme dans son tombeau. La sueur qui lui sort de tout le corps, réunit peut-être tous les grains qu'elle touche; peut-être aussi le fourmi-lion attache-t-il tous ces grains avec un fil gluant, & qu'il s'en forme ainsi une croute qui le couvre de toutes parts. Qu'on se figure une petite boule de cinq ou six lignes de diamètre, sous laquelle l'animal conserve encore la liberté de se mouvoir. Mais il ne se contente pas d'une muraille toute nue qui le morfondroit, il fait un autre usage de son fil, qui est beaucoup plus délié que celui du ver à soie, & qu'il file à-peu-près comme fait l'araignée. Il attache ce fil à un endroit, puis le mène à un autre, & cela en tous sens : ses fils sont croisés & recroisés, & même collés les uns sur les autres. Il tapisse & drappe tout l'intérieur de sa retraite d'une très belle étoffe, qui est comme satinée & de couleur perlée. Dans cet ouvrage, toute la propreté & la commodité sont pour le dedans; il ne paroît au-dehors qu'un peu de sable. On confond le logis du fourmi-lion avec la terre voisine; par-là il se met à couvert de la recherche des oiseaux mal in-

tentionnés. Il gagne à être oublié ; il vit en repos : au-lieu qu'il seroit perdu , si des dehors plus éclatants attiroient les yeux sur lui.

Il demeure enfermé de la sorte six semaines ou deux mois , quelquefois plus : dans ce tems de repos , sa tête est entre ses jambes. Quand il est tems de changer de figure , il se défait de ses yeux , de ses poils , de ses pattes , de ses cornes , & de sa premiere peau. Toute sa dépouille se retire au fond de la boule comme un chiffon. Il reste de lui une nymphe ou une forme de vermisseau , qui a d'autres yeux , d'autres pattes , d'autres entrailles , & quatre aîles membraneuses ; le tout empaqueté sous une pellicule qui paroît n'être autre chose qu'une liqueur desséchée , comme il arrive à tous les papillons , lorsqu'ils se défont de la dépouille de chenille pour devenir chrysalide.

Métamorphose du Formica leo Nymphe , en Mouche ou Demoiselle.

Dans l'état de nymphe ou de vermisseau , l'animal n'a pas plus de trois lignes de long. Il paroît alors avoir , comme nous venons de le dire , quatre aîles membraneuses , six pieds , deux grosses cornes ou antennes molles & creuses , deux yeux noirs & deux tenailles en forme de scie , qui lui servent de dents. Ce vermisseau reste encore quelque tems dans sa petite retraite avant que de paroître sous une nouvelle & dernière forme. Le tems de l'entière métamorphose étant arrivé , les membres du nouvel animal ont acquis la consistance & la vigueur nécessaires : il veut sortir de sa loge ; il déchire la tapisserie de sa chambre , & perce en rond la muraille de sa maison , avec ses dents qui sont toutes semblables à celles des sauterelles : il fait effort ; il élargit l'ouverture ; il passe la moitié du corps ; il sort enfin. Son long corps qui est replié circulairement comme une volute , & qui n'occupe pas plus de trois lignes d'espace , se développe , s'étend , & acquiert en un instant quinze à seize lignes de long. Ses quatre aîles , qui étoient serrées à petits plis , & qui n'occupaient dans l'étui où elles étoient emboîtées , que l'espace de deux lignes , se défroncent , & en deux minutes deviennent plus longues que le corps. Enfin le chétif fourmi-lion devient une grande & belle mouche appelée *Demoiselle* , qui , après avoir été quelque tems immobile & comme étonnée du spectacle de la Nature , secoue ses aîles , & va jouir d'une liberté qu'elle n'avoit pas connue dans l'obscurité de sa vie précédente. Avec les lambeaux de sa premiere nature , elle a quitté en même tems sa pesanteur , sa férocité & ses inclinations sanguinaires. Tout est nouveau en elle : on n'y apperçoit plus que gaieté , qu'agilité , que noblesse & dignité.

Si l'on considère le fourreau membraneux qui n'est plus ni vermisseau vivant , ni destiné à devenir mouche , on reconnoîtra que cet étui est transparent , qu'il y a des cornes ou antennes , des yeux , des dents , des aîles , des pieds , &c. qui étoient les fourreaux de semblables parties de la demoiselle ; on reconnoîtra aussi qu'elle en est sortie par une crevasse qui s'est formée sur son dos proche de la tête.

La demoiselle commence à sortir de sa coque dans les premiers jours de

Juillet. Lorsqu'elle marche, elle porte ses aîles en forme de toit au-dessus du corps, lequel est alors entièrement caché. Son corps est grisâtre : chaque anneau est bordé d'un peu de jaune. Les aîles sont une espèce de gaze presque blanche : on remarque six ou sept petites taches brunes sur chacune des supérieures, & trois ou quatre sur chacune des inférieures.

A en juger par la force de leurs dents & les différens accompagnemens de leur bouche, ces mouches sont autant *graminivores*, qu'elles étoient *carnivores* dans leur premier âge sous la forme de *formica-leo*. Les femelles ont besoin d'être fécondées peu de tems après leur transformation. M. de Réaumur croit que le nombre de leurs œufs est petit ; mais la grosseur en est assez considérable : ils sont cylindriques, un peu courbés ; la coque en est dure & un peu rougeâtre. Les meres pondent ces œufs un à un dans un terrain sablonneux, où, dès que le petit *formica leo* est éclos, il se fait une fosse proportionnée à son corps, & en peu de tems il devient chasseur.

Les mâles sont plus petits que les femelles. Ces *demoiselles* n'ont pas les petits yeux disposés en triangle sur la tête, comme plusieurs mouches & les demoiselles les plus communes.

DEMOISELLE DU LION DES PUCERONS, C'est une très jolie mouche, dont le corps est fort long & semblable à celui des longues mouches, nommées aussi *demoiselles*.

Comme ces mouches viennent de vers métamorphosés & nommés *Lions de Pucerons*, nous croyons devoir commencer par donner l'histoire de ces vers.

Description du Lion des Pucerons.

Le Lion-Puceron est un ver à six jambes, qui est l'ennemi des pucerons, d'où on la appelé *Petit Lion* ou *Lion des Pucerons*. Ce petit animal a des cornes semblables à celles du *formica leo*, avec lesquelles il suce les pucerons. Comme il peut marcher en avant avec assez de vitesse, il va à la chasse : ces caractères le distinguent essentiellement du *formica-leo* qui ne marche qu'à reculons, & qui est un chasseur permanent. Le corps du lion-puceron est allongé & applati. L'endroit où il a plus de largeur est auprès du corselet ; de-là jusqu'au corselet il se rétrécit insensiblement, de façon que le bout du derrière est pointu. Le corselet est court & porte la première paire de jambes ; les deux autres paires partent des deux premiers anneaux du corps. Quand le *Lion-Puceron* marche, il recourbe le bout de son derrière, & s'en sert de manière qu'il lui tient lieu d'une septième jambe : le dessous de son corps est tout ridé & sillonné.

Cette description convient à trois genres de *lions-pucerons* qui diffèrent entr'eux ou par des mamelons, ou par des aigrettes composées de dix à douze poils, ou par les couleurs différentes, soit rouges, soit citrines, ou enfin par les diverses grandeurs. Nous en pourrions dire encore quelque chose à l'article des diverses mouches.

Quand un de ces vers a saisi un puceron, il le suce en un instant. Le *lion-*

puceron est , en naissant , extrêmement petit ; cependant en moins de quinze jours il acquiert à-peu-près toute la grandeur à laquelle il peut parvenir. Lorsqu'un de ces vers peut attraper entre ses cornes un autre ver de son espèce , il le suce aussi impitoyablement que si c'étoit un puceron.

Métamorphose du Lion Puceron en Nymphe.

Au bout de quinze à seize jours de vie , cet animal se prépare à la métamorphose. Il se retire de dessus les feuilles peuplées de pucerons , & va se mettre dans les plis de quelques autres feuilles ; ou bien il se fixe dans quelque autre place qui lui a paru commode. Là il file une boule d'une soie très blanche , dans laquelle il se renferme à la manière des chenilles dans leurs chrysalides. Les tours du fil qui compose cette coque , sont très serrés les uns contre les autres ; & ce fil étant fort par lui-même , le tissu se trouve très solide. Les coques des plus grands de ces insectes , ne sont pas plus grosses qu'un pois. Peu de tems après que cette coque est finie , ce petit lion se transforme en nymphe.

Métamorphose du Lion-Puceron Nymphe , en Demoiselle.

La transformation en nymphe du lion-puceron étant arrivée , cet animal devient , après sa dernière métamorphose , une fort jolie mouche. Cette mouche du lion des pucerons a des ailes plus amples que celles des demoiselles du fourmi-lion ; elle les porte aussi tout autrement. Quand elle est en repos , ces ailes forment alors un toit , au-dessous duquel le corps est logé. Ces ailes sont plus délicates que la gaze même , & l'on peut lire facilement au travers. Ce tissu est d'un verd tendre & éclatant ; quelquefois il paroît avoir une teinte d'or. Le corselet de ces mouches est aussi de ce même verd ; mais ce qu'elles ont de plus brillant , ce sont deux yeux gros & saillans , placés chacun sur un côté de la tête. Ils sont de la couleur du plus beau bronze rouge.

Ces mouches font leurs œufs sur les feuilles du sureau : elles les attachent au moyen d'une matière visqueuse , foyeuse & propre à être filée. On prendroit alors ces feuilles pour être chargées de petits boutons de fleurs , ou pour des plantes parasites. C'est dans ces œufs soutenus en l'air , que se forme l'insecte : il perce par la suite sa coque , & descend sur les feuilles où il trouve des pucerons qui deviennent bientôt sa proie. Un Savant avoit fait graver dans les Ephémérides d'Allemagne , des feuilles de sureau , chargées de ces œufs , qu'il avoit pris pour de petites fleurs très singulières , & dont l'origine lui paroissoit très difficile à expliquer. Feu M. de Réaumur , dont la sagacité ne laissoit rien échapper , dévoila la véritable nature de ces fleurs prétendues.

Remarque sur les Demoiselles.

En général les *Demoiselles* ont une grosse tête en comparaison de leurs corps , & elle ne tient à la poitrine que par un filet fort menu : elles ont

comme les autres mouches & les papillons, des aîles supérieures & des aîles inférieures. Il y a des demoiselles qui, dans leurs moments de tranquillité, les tiennent toutes quatre appliquées les unes contre les autres; d'autres laissent voir leurs quatre aîles, en les tenant un peu écartées les unes des autres, un peu élevées au-dessus du corps.

Les demoiselles, de quelque genre & de quelque espèce que ce soit, n'ont pas plutôt leurs aîles suffisamment affermisses, qu'elles prennent l'essor comme les oiseaux de proie, & pour la même fin. Elles doivent passer une partie de leur vie au milieu des airs : elles y font cent tours & retours pour y découvrir des insectes ailés plus foibles qu'elles, & dont elles s'emparent. Les mâles ont encore un autre objet dans leurs courses; c'est de trouver des femelles auxquelles ils puissent s'unir : leurs amours, & la manière dont ils s'y prennent pour perpétuer leur espèce conjointement avec leurs femelles, méritent d'être connues.

Depuis le printemps jusques vers le milieu de l'automne, on les voit dans les prairies bordées par une rivière ou par un ruisseau; les unes posées sur des plantes, les autres volant en l'air : & parmi ces dernières, on en remarque qui volent par paires singulièrement disposées. Le bout du corps de celle qui est antérieure, est posé sur le col de la postérieure : toutes deux, également amoureuses & animées des mêmes desirs, volent de concert, & elles ont alors le corps étendu en ligne droite. L'antérieure est le mâle, qui, avec les crochets qu'il a au bout du derrière, tient sa femelle saisie par le col, & la conduit en ravisseur où il lui plaît d'aller. Celle-ci paroît se laisser conduire volontiers, puisqu'elle agit ses aîles pour aller en avant, comme elle feroit si elle étoit entièrement libre.

Telle est la manière dont ces insectes commencent à se faire l'amour. Lorsque le mâle tient ainsi sa femelle, il la serre & ne la laisse plus échapper : il n'est pas cependant encore fort avancé. Il lui est impossible de porter sa partie vers celle de sa femelle qu'il tient par l'extrémité de son corps. Tant que la femelle ne se prête point à ses desirs, l'accouplement ne peut se faire : aussi le mâle tient-il quelquefois fort long-tems sa femelle; il l'emporte en l'air suspendue à sa queue, jusqu'à ce qu'enfin celle-ci ou fatiguée, ou mise en action, se rende à ses importunités : pour lors la femelle replie son ventre en dessous, le fait passer entre ses jambes & pardevant sa tête, & porte elle-même l'extrémité de son ventre contre la partie du mâle qui s'accouple avec elle sans lâcher la tête de sa femelle. Pendant cet accouplement, ces insectes sont dans une attitude singulière : ils forment une espèce d'anneau. La tête de la femelle est accrochée par la queue du mâle, tandis que l'extrémité de son ventre qui fait le cercle, est accouplée avec la partie supérieure du ventre de ce même mâle. Ces insectes volent dans cette attitude forcée, & ne se séparent que lorsque l'accouplement est tout-à-fait fini. Ces bizarres accouplemens nous font voir combien la Nature est féconde & inépuisable en inventions pour parvenir à ses fins.

Les parties propres au mâle sont tout autrement placées dans le corps des demoiselles,

demoiselles , que dans celui des autres mouches. M. de Réaumur a reconnu cette partie masculine sous le corps , près de sa jonction avec le corselet , c'est-à-dire aux premiers anneaux.

Les demoiselles sont des insectes fort vifs : les couleurs dont elles sont ornées , servent à distinguer le caractère dominant du sexe. Les plus petites sont ordinairement les mâles : celles qui habitent les prairies & qui s'y font remarquer par leur belle couleur bleue , s'accouplent avec des demoiselles d'un verdâtre doré , & avec d'autres purement grisâtres. Les femelles pondent leurs œufs réunis en grappe ; quelquefois elles les déposent un à un. *Voyez les Mémoires sur les insectes , de M. de Réaumur , Tom. VI.*

DÉMOISELLE DE NUMIDIE, ou **GRUE DE NUMIDIE**. Oiseau ainsi nommé des anciens Naturalistes , de ce qu'il vient de cette Province de l'Afrique , & parcequ'il a certaines allures qui semblent imiter les gestes d'une femme qui affecte de la grace dans son port & dans sa maniere de marcher.

La *Demoiselle de Numidie* est rare. Son plumage est gris & plombé , & comme bleuâtre : elle a sur la tête des plumes élevées en forme de crête , longues d'un pouce & demi : les côtes de cette crête sont noirâtres. On remarque au coin de chaque œil un trait de plumes blanches & déliées , qui passe sous l'appendice , & qui lui forme des éminences ou des especes de grandes oreilles. Le devant de son col a des plumes noires plus déliées encore qui pendent sur l'estomac avec grace ; ses jambes sont couvertes d'écailles ; ses ongles sont noirs & médiocrement crochus : la plante de ses piés est picotée comme du chagrin. On a vu six de ces oiseaux à la Ménagerie de Versailles (l'on y en voit encore) ; ils furent disséqués après leur mort par M. Perrault. Tous ceux qui les y avoient vus vivans , disoient que leurs gestes & leurs fauts avoient quelque rapport à la danse des Bohémiennes , & qu'ils sautoient en suivant les gens qu'ils rencontroient ; de façon qu'ils sembloient plutôt se faire regarder , que se faire donner à manger. On leur donnoit les noms de *Bateleux* , *Danseur* , *Bouffon* , *Parasite* , *Baladin* , *Antropomime* & *Comédien* , à cause de leurs attitudes singulieres , & pour ainsi dire , affectées. Comme cet oiseau imite les gestes qu'il voit faire aux hommes , on prétend que les Chasseurs qui en veulent prendre ; se frottent les yeux en leur présence avec de l'eau qu'ils tirent d'un vase ; & qu'ensuite ils s'éloignent en emportant ce vase , auquel ils en substituent un autre pareil qui est plein de glu : alors la *Demoiselle de Numidie* vient auprès du nouveau vase & se colle les yeux & les pieds avec la glu , en imitant les gestes qu'elle a vu faire aux hommes. *Voyez les Mém. de l'Acad. des Sciences de Paris , tom. 3 , part. 2.*

DÉMOISELLE. Petit poisson épineux ou armé d'aiguillons , qui se trouve aux Indes Orientales. On lui a donné le nom de Demoiselle , à cause des bandes transversales de différentes couleurs , les plus belles & les plus vives , qui ornent sa robe. Dans les uns le ventre est jaune , le dos est orné de bandes rouges , & les côtés le sont de lignes bleues ; dans d'autres de la même

espece , la tête est rouge & la bouche bleue , le corps chargé de taches violettes , quelquefois blanchâtres , mêlées de noir : les aiguillons de ce poisson sortent de la queue & des nageoires.

On donne aussi le nom de *Demoille monstrueuse* au poisson appelé *Marteau*. Voyez ce mot.

DEMOISELLE. Petit poisson de la Côte de Genes & d'Antibes , appelé GIRELLA des Italiens. Voyez DONZELLE.

DENDRITE , *Denderites*. On donne ce nom à des pierres qui portent l'image des végétaux & des animaux.

Tout le monde connoît cette espece de peinture naturelle , ces jeux de la nature dont toutes les variétés ont beaucoup de convenances entr'elles par les ramifications , &c. Elles sont couchées à plat dans l'intérieur d'une fente de pierre , ou formées sur des plans réguliers dans l'endroit de la fracture de la pierre : souvent ces peintures sont aussi correctes que si c'étoit le pinceau du plus habile Artiste qui les eût tracées. Ce sont autant de mignatures naturelles , que M. Pluche a nommées *Dendrophores* , mais que M. Linnæus a mises au rang des pétrifications qui imitent la Peinture. On présume qu'elles ont été formées par des fluides chargés de minéraux , différemment colorés & comprimés entre deux surfaces , de la même manière que le broyeur de couleurs en produit , lorsqu'il enlève à plomb sa molette de dessus la matière broyée. La seule difficulté , est que dans la nature l'écartement ne peut se faire d'une manière uniforme dans les plans immobiles des dendrites ; cependant toutes ces arborisations partent des fentes dont la direction est souvent parallèle entr'elles : souvent ces mêmes fentes , en gardant ce parallélisme , coupent le plan , tantôt obliquement , tantôt à angles droits : ce qui est cause que le moindre coup de marteau fait communément découvrir dans le sein d'une pierre des dendrites disposées en tous sens.

On appelle *pierres herborisées* les dendrites qui représentent des végétaux , & *zoomorphites* celles qui portent l'image des animaux : on en fait des tableaux , avec ou sans pièces de rapport , & qui sont des plus agréables , quand les pierres , qui leur servent de toile , peuvent souffrir le poli.

Aux yeux d'un Physicien , il ne doit pas paroître étonnant qu'un fluide comprimé ait formé , en s'extravaçant & en se desséchant , des figures qui ont un certain rapport soit avec des corps naturels , soit avec des produits de l'art : ce fluide peut représenter des especes de figures humaines sur des pierres accidentellement taillées , sculptées & gravées par la nature. Le hazard & les circonstances locales peuvent occasionner des bizarreries dans la conformation des corps pierreux , de même que dans la cristallisation des sels.

Quant aux noms qu'on donne aux pierres figurées , tout dépend de la fiction & d'une imagination vive qui se plaît dans le merveilleux. Les Amateurs voient sur les belles agates herborisées qui viennent de Moka , des buissons , des terrasses , des côteaux , des vergers , des bocages , des forêts

de plantes épaisses , des vaisseaux : on voit aussi sur quelques morceaux de marbre de Florence , des bustes , des ruines d'architecture , des lointains , des nuages , un ciel , un crépuscule , ou une aurore , &c.

Comme ces sortes de pierres figurées , ou jeux de la Nature , ont de tout tems été recherchées par les Curieux , l'on doit être moins surpris , si tant d'Auteurs Physiciens ont écrit sur les *Dendrites*. Pline , Aldrovande , Kircker , Boccone , Agricola , Ferrante Imperati , ont presque tous prétendu que la formation des arbrustes figurés sur la pierre , est due à certaines exhalaisons d'une matiere minérale colorée ; qui s'est infiltrée dans le sein de la terre , & jusques dans les moindres interstices des pierres. Tel est le sentiment des Anciens & de bien des Modernes. Il seroit ridicule de remonter à l'époque du déluge universel , pour amener des plantes étrangères , dont le dépôt sur les pierres , leur auroit donné ces sortes d'empreintes. Les dendrites , quoique régulières en apparence , different cependant des véritables impressions de plantes , en ce qu'elles paroissent toujours sans racines , sans feuillages reconnoissables , sans fruits , ni graines apparentes : elles représentent presque toutes des parties de peupliers , des ifs , des Picea ou des mélezes. Mais l'illusion cesse lorsqu'on les compare avec les corps naturels ; elles ne sont au fond que des figures , des images , des apparences , des ombres de végétaux. *Voyez* les savantes dissertations sur les dendrites des Docteurs Scheuchzer & Salerne , & de M. l'Abbé de Sauvage. *Voyez* JEUX DE LA NATURE , EMPREINTES & PIERRES FIGURÉES.

DENDROITES. *Dendroites*. On donne ce nom à toute espece de fossile qui est ramifiée , ou qui a des branches comme les arbres ; telle est la *mine d'argent ramifiée* , &c. on les appelle aussi *Dendromorphes*.

DENDROPHORE. *Voyez* DENDRITES.

DENTAIRE , *Dentaria*. Plante qui croît aux lieux montagneux & ombrageux , & dont on connoît quatre especes.

La premiere pousse , de sa racine écailleuse ou dentée & blanchâtre , une tige haute d'un pied , qui porte sur une côte sept feuilles oblongues , pointues , verdâtres & dentelées tout au tour , rudes au toucher : ses fleurs naissent attachées à des pédicules , semblables à celles du Géroffier , blanchâtres & disposées en croix : à chaque fleur succede une silique remplie de semences rondes.

La seconde espece differe de la précédente par sa petitesse & par ses fleurs purpurines : elle porte cinq feuilles.

La troisieme , outre les siliques , pousse entre les aisselles des feuilles certains tubercules écailleux , noirâtres & de mauvais goût : ces tubercules sont de petites racines , qui en se détachant de dessus la plante , tombent dans la terre , & produisent chacune une nouvelle plante dentaire : elle porte sept feuilles.

La quatrieme espece , a des fleurs de couleur herbeuse & d'un goût fort mordicant , elle porte neuf feuilles.

Ce qui fait paroître les racines de la dentaire , articulées , ce sont les

premières feuilles qui sont oblitérées , & dont il ne reste que l'origine des pédicules , sous la forme d'écailles orbiculaires , charnues & imbriquées.

Toutes les dentaires sont carminatives & vulnéraires : on emploie les deux premières intérieurement , & les deux autres extérieurement.

DENTAIRE OROBANCHE, *Dentaria orobanche*. Plante qui croît sous les arbres & aux lieux ombrageux : on en distingue trois espèces.

La première pousse de sa racine tuberculeuse & dentée , une tige haute d'un pied , grosse comme le petit doigt , ronde , fragile , & pulpeuse ; elle n'a point de feuilles , mais il naît à leur place certaines oreillettes membraneuses. Ses fleurs sont en tuyaux , évasées , & d'un pourpre mêlé de blanc : il leur succède des fruits gros comme de moyennes cerises , renfermés à moitié dans un calice velu ou feuillu : chaque fruit contient un nombre de petites semences rondes & noirâtres : toute la plante a un goût aqueux , un peu amer & acerbé.

La seconde espèce est plus petite , & ses fleurs sont moins nombreuses : sa tige est transparente.

La troisième espèce est une plante basse , pleine de suc ; ses fleurs sont petites , un peu semblables à celles de l'orchis : sa racine est rameuse & blanche.

On a vu de grands succès de ces plantes pour les ulcères du poulmon , pour les hernies & la colique.

DENTALE, *Dentalium*. Petit coquillage univalve , non contourné , de l'ordre ou famille des *Tuyaux de mer*. Voyez ce mot. Sa figure est conique ; il est étroit , long , cannelé & courbé , blanc , quelquefois verdâtre par la partie la plus renflée. On le trouve sur les côtes d'Angleterre , & quelquefois sur celles de Normandie. On nomme les dentales fossiles *dentalites*. Quelques Auteurs rangent avec ces corps , les *Lituites* ou Tuyaux cloisonnés. Voyez **ORTHOCERATITES** ; ils y rapportent aussi les *alvéoles* ou *noyaux* de ces fossiles , lesquels sont faits comme des paquets de verres de montre empilés , & formant un cône tronqué , & qui appartiennent à des vermissieux testacés & cloisonnés.

DENTALE, *Dentex*. On donne ce nom à un poisson du genre des Sbares , qui sorti de l'eau , s'agite & palpite toujours ; il vit proche des rivages autour des rochers dans la Méditerranée : il ressemble un peu à la dorade par la figure , les nageoires , les aiguillons , les écailles & la couleur qui tire entre le rouge & le blanc. Ses écailles sont légèrement tachetées : il a quatre dents à chaque mâchoire qui se distinguent parmi les petites. Le dentale de la mer Baltique devient plus grand que celui de la Méditerranée. Ce poisson étant petit est le *synagris* de bien des Auteurs , & quand il est devenu très grand , c'est le *synodon*.

DENT DE CHIEN, *Dens canis*. Plante que l'on cultive quelquefois dans les jardins , & qui croît aux lieux montagneux : on en connoît de deux espèces.

La premiere , pousse de sa racine oblongue , charnue , fibreuse , & faite en dent de chien , deux autres feuilles marbrées & rampantes à terre , semblables à celles du lys des vallées. Il s'élève d'entr'elles un gros pédicule , rouge , portant une belle fleur à six feuilles , recoquillées vers le haut & marbrées , ayant en leur milieu six étamines purpurines : à ces fleurs succede un fruit marbré , arrondi & relevé par trois petits angles , renfermant dans trois loges des semences oblongues & jaunâtres.

La deuxieme espece a des feuilles plus longues & plus étroites , la fleur plus grande , & la racine plus grosse.

On ne se sert que des racines de ces plantes pour amollir & résoudre les tumeurs.

DENT DE LION ou PISSENLIT , *Dens leonis*. C'est une plante basse très commune dans tous les environs de Paris , & que l'on cultive aussi dans les jardins ; elle a une racine laiteuse , de la grosseur du petit doigt ; ses feuilles sont oblongues , médiocrement larges , découpées comme celles de la chicorée sauvage , & couchées sur terre : il s'élève d'entr'elles des pédicules longs d'une palme , ronds , nuds , fistuleux , tendres , un peu velus , rougeâtres , quoiqu'empreints d'un suc laiteux , soutenant en leur sommet une belle fleur composée de demi-fleurons jaunâtres , d'une odeur assez agréable ; à cette fleur succèdent des graines rougeâtres , garnies d'aigrettes , & disposées en rond ; ces semences tombent dans leur maturité , & elles sont emportées par le vent : on appelle *Tête de Moine* la couche chauve , qui reste après la chute de la fleur.

Toutes les parties de cette plante sont ameres , un peu astringentes & remplies d'un suc laiteux : on ne fait usage que de la racine & des feuilles : elles sont estimées , comme les autres chicoracées , vulnéraires , fébrifuges & apéritives , propres dans les obstructions du foie & du mésentere , & dans toutes les especes de jaunisse. Au printemps , on mange aussi les feuilles tendres du pissenlit en salade.

DENTS, *Dentes* : ce sont les os les plus durs & les plus compacts de ceux du corps humain & même des brutes. Toutes les especes de dents de l'une & l'autre mâchoire , ont une figure , une disposition , & un arrangement des plus admirables : elles sont d'autant plus fortes qu'elles approchent plus du centre de mouvement , elles sont placées dans des loges particulieres qu'on nomme alvéoles ; elles y sont affermies par une articulation en forme de cheville , appelée *gomphose*. Il y a trois sortes de dents dans la plupart des animaux & notamment chez l'homme. Celles qui sont dans la partie antérieure de chaque mâchoire , se nomment *incisives* ; elles sont larges , minces & plates , quelques-uns les appellent *dents de primeur* , *primores* , parcequ'elles paroissent les premieres : d'autres les nomment *dents de lait* , *lactei* ; & d'autres *rieuses* , *ridentes* parcequ'elles se montrent les premieres quand on rit. Les *dents canines* qui se trouvent entre les *incisives* & les *molaires* sont celles que le peuple nomment *æilleres* ou *dents de l'œil* , parcequ'une partie du nerf qui fait mouvoir les yeux s'y distribue , & de-là le

danger de les tirer : enfin les *molaires* sont celles qui servent à la mastication. Les premières n'ont qu'une racine, les canines en ont quelquefois deux & les molaies en ont souvent trois & quatre. A mesure que les dents veulent sortir, la gencive devient molle & vermeille. Jusqu'à ce tems la matiere de la dent est visqueuse & molle : voyez à la suite du mot HOMME. Les dents, selon Peyer, sont formées de pelliculés repliés, durcies & jointes ensemble par une mucosité visqueuse. Si l'on examine les dents du cerf, du cheval, du mouton, &c. on trouvera que le sentiment de cet Auteur est bien fondé. M. de la Hire le jeune a observé que le corps de la dent est couvert d'une substance particuliere & blanche, appelée *Email*, entierement différente de celle du reste de la dent, qui est jaune. Cet émail, appelé *Périoste*, *Coëffe* ou *Croute*, par quelques Auteurs, est composé d'une infinité de petites fibres qui s'ossifient par leurs racines, à-peu-près comme sont les ongles ou les cornes. Tout cela se discerne facilement dans une dent cassée. Si par quelqu'accident un petit morceau de cet émail se trouve décapé, enlevé, l'os de la dent restera nud ; mais ne pouvant souffrir l'air, il se cariera : de-là l'imprudence d'user trop l'émail des dents à force de dentrifiques. Les dents ne sont point sensibles par elles-mêmes ; il n'y a que les nerfs qui s'y distribuent : de plus l'émail est la seule partie des dents, qui croît.

Plus on examine la figure des dents dans les différens animaux, & plus on les trouve exactement proportionnées à la nourriture particuliere & aux besoins de chaque individu : ainsi dans les animaux carnassiers, elles sont propres à saisir, à tenir, à déchirer la proie. Dans les animaux qui vivent d'herbages, elles sont propres à ramasser & à briser les végétaux. Il y a des poissons qui ont leurs dents à la langue comme la truite, ou au fond du gozier comme le merlus : d'autres ont trois, quatre, ou cinq rangs de dents à la même mâchoire, comme les chiens de mer. On trouve un tableau frappant de la différence des dents, de leur disposition, &c. en examinant les mâchoires de l'homme, du requin, du crocodile, de la vipere, du tigre, de l'ours, du loup, du lion, du bœuf (le genre des quadrupedes ruminans n'ont point de dents incisives à la mâchoire supérieure), du chameau, du cerf, du cheval, du castor, du lapin, du cochon, du singe, de l'éléphant, de la dorade, &c. Terminons par dire que les dents artificielles se font ordinairement ou avec l'ivoire, ou avec l'os de la jambe d'un bœuf, ou avec les dents de cheval marin. Voyez Os.

DENTS FOSSILES ou PÉTRIFIÉES, *Dentes fossiles*. On donne ce nom à toutes fortes de dents d'animaux, tant quadrupedes que poissons, & qui sont improprement connues sous les noms de *Dent de serpent* ou *Glossopêtre*, *Bufonite* ou *Crapaudine*, & *Ivoire fossile* : voyez ces mots.

DENTELAIRE ou HERBE AU CANCER, *Dentellaria*, aut *Plumbago*. Plante qui croît aux pays chauds de l'Europe ; sa racine est fort fibreuse, & pousse plusieurs riges cannelées, à la hauteur de deux pieds ou environ, ses feuilles sont dentelées & semblables à celles de la conise : ses fleurs, de couleur purpurine & échancrées, se changent chacune en une capsule qui con-

tient une semence pointue comme un grain de seigle & farineuse. Cette plante est estimée propre à guérir les cors des pieds, & les durillons qui se forment proche le fondement en allant à cheval. Rondelet prétend que c'est un puissant caustique ; & personne n'ignore l'histoire de cette fille, qui se trouva écorchée vive pour s'en être frottée dans le dessein de guérir de la galle. On tire avantage de la vertu caustique de la dentelaire, pour guérir les cancers invétérés & censés incurables par leur adhérence à des parties osseuses. On en fait infuser les feuilles dans de l'huile d'olive, dont on oint trois fois par jour les ulcères chancreux, jusqu'à ce que l'escarre noire soit encroutée, pour que le malade ne souffre plus de vives douleurs par cette application ; ce qui va à quinze jours environ. La racine du *plumbago* ou dentelaire d'Afrique, d'Amérique & d'Asie est âcre, cependant un peu sucrée & aromatique ; les Negres & les Indiens en boivent la décoction, pour s'exciter le vomissement & les urines, lorsqu'ils ont été blessés par quelque bête venimeuse. Cette même racine est salivaire, & imprime une couleur plombée aux dents.

DENTELLE DE MER. Nom donné à l'*eschare*. Voyez ce mot à la suite de l'article CORALLINES.

DEPONE. Nom d'un grand & rare serpent du Mexique, orné de taches différemment colorées. Sa tête est extrêmement grande & garnie de mâchoires, armées, tant en haut qu'en bas, de dents longues, tranchantes & affermies dans leurs alvéoles, comme dans le brochet. Parmi ces dents, on en distingue dans la mâchoire supérieure, deux principales, qu'on peut nommer défenses, & que n'ont point les serpents, même plus grands. Ces défenses ne sont point cachées dans un fourreau situé le long de la mâchoire, mais dans le ratelier. Ses yeux sont si gros & si grands, qu'ils lui donnent un aspect horrible. Quoique les écailles de son front soient arrangées avec beaucoup d'art, on remarque avec plus de plaisir encore la grande & double chaîne d'écailles qui tapissent son dos, & dont les bouts sont joints ensemble en manière de bouclier. Les côtés sont ornés & armés tout-à-la-fois d'écailles quadrangulaires ou rhomboïdales, marbrées de vastes taches sphériques ; celles du ventre sont transversales, amples, paillées & relevées d'une moucheture rouffâtre : ces taches ornent également sa queue qui est grêle, longue & pointue. Ces sortes de serpents, sont saisis de frayeur à la vue d'un homme : ils sont attaqués d'une espèce singulière de poux qui se fourrent entre leurs écailles, les mordent, & les désolent.

Ces poux, qui en général sont le fléau des serpents, ont six pieds en avant, cachés sous la tête, & leur derrière est casqué comme une tortue.

DÉPOUILLE DE SERPENT, *Seneçla anguim*. On donne ce nom à la peau que le serpent quitte quand il mue : on la trouve, tantôt entre les pierres, tantôt dans des trous en terre, quelquefois sous des racines d'arbres : on se servoit beaucoup autrefois de cette vieille peau de serpent pour les douleurs des oreilles, des dents, & des yeux : on la faisoit infuser, &

on se gargarisoit ou on étuvoit la partie malade : on étoit aussi dans l'usage de brûler & de réduire en cendre ces peaux , & de cette poudre on s'en frottoit pour guérir la galle. Quelquefois encore les femmes enceintes en portent sur les reins pour empêcher l'avortement , & aux cuisses pour faciliter l'accouchement : tant est grand le préjugé !

DERBIO. *Voyez* GLAUCUS.

DERMESTES. On donne ce nom à un genre d'insectes coléoptères , qui sont des *scarabées dissectionneurs* , & dont le caractère est d'avoir les antennes en forme de massue ; & à feuillets posés transversalement. Les Naturalistes connoissent dix-sept espèces de cet insecte , dont une partie s'attache volontiers pendant l'obscurité aux cadavres , à la viande & au lard , sur les habits , dans les tapisseries , sur les arbres , autour des fenêtres , & dans la fiente du cheval. Presque toutes sont le fléau des peaux desséchées des animaux , soit à poil , ou à plume , ainsi qu'on l'observe dans les Cabinets des Curieux , où l'on garde des animaux empaillés , ou conservés autrement que dans les liqueurs. La plupart des scarabées dissectionneurs , quand on les touche , retirent leurs pieds & la tête , les cachent , & restent comme immobiles. *Voyez* l'article SCARABÉE.

DESMAN. Espèce de rat musqué , particulier à la Laponie & à la Moscovie , différent du rat musqué des Antilles & du Canada. *Voyez* à l'article RAT MUSQUÉ.

DESTRUCTEUR DES CHENILLES. Goëdard donne avec raison ce nom à un ver qui a au-devant de la tête deux pinces , qui étant serrées , forment un anneau , & dont il se sert pour attraper adroitement les chenilles par le ventre , en sorte qu'elles y demeurent attachées.

Ce ver est d'un beau jaune luisant , & est si bien armé , qu'il peut aisément nuire à toutes sortes de chenilles. Quand il a blessé avec ses cornes une chenille , celle-ci se tourmente fort & s'élance de tous côtés , pendant que le ver demeure tout étendu , comme s'il étoit mort : on remarque qu'après que le ver l'a quittée , l'endroit où il l'a pincée , s'enfle aussitôt , ce qui paroît être l'effet d'une sorte de venin qu'il jette.

Le destructeur des chenilles souffre aisément le froid , il se retire dans la terre : si on le jette au feu , il produit une flamme semblable à celle que produit l'huile qui brûle. Ce ver ne vit guères plus de deux jours ; après sa métamorphose , il devient un animal ailé garni de deux crochets , dont il se sert pour percer les œufs des fourmis & des taupes-grillons , dont il est avide. On l'appelle alors *Mange-œufs de Grillons* ; mais ce petit animal , ennemi de presque tous les insectes , tombe à son tour dans les pièges du taupes-grillon qui le dévore.

DÉTROIT. Nom que les Géographes donnent à une mer étroite ou resserrée des deux côtés par les terres , & qui ne laisse qu'un petit passage pour aller d'une mer à une autre , tels sont le Détroit du Sund , celui de Magellan , &c. Le détroit le plus fréquenté est celui de Gibraltar , qui sépare l'Europe de l'Afrique , & joint la Méditerranée avec l'Océan Atlantique.

que. Le détroit qui sépare la France d'avec l'Angleterre s'appelle le *Pas de Calais*. Varenius croit que les *détroits* & les golphes ont été formés pour la plupart par l'irruption de la mer dans les terres. Une des preuves qu'il en apporte, c'est qu'on ne trouve presque point d'îles dans le milieu des grandes mers, & jamais beaucoup d'îles voisines les unes des autres. M. de Buffon, *Hist. Natur. Tom. I*, observe que la direction de la plupart des détroits est d'orient en occident; ce qu'on attribue à un mouvement ou effort général des eaux de la mer dans ce sens. Il y a encore dans la méditerranée, entre la Sicile & la Calabre ultérieure, un détroit connu sous le nom de *Fare de Messine*, *Fretum Siculum*. Ce canal est assez connu par son flux & reflux qui s'y fait de six heures en six heures, avec une extrême rapidité; comme aussi par ses courans, qui allant tantôt dans la mer de Toscane, & tantôt dans la mer de Sicile, ont donné lieu à tout ce que les Anciens ont dit de Scylla & de Carybde. Ce dernier est un tournant d'eau, que les Marelots craignoient beaucoup autrefois, & qu'on affronte aujourd'hui sans péril par le moyen des barques plates. *Voyez MER.*

DÉVORANTE. *Voyez MOUCHE DÉVORANTE.*

DEZ FOSSILES, *Tessera badenses vel fossiles*. On les trouve à quelques pieds de profondeur dans la terre près de Zurzach & de Bade en Suisse. Ces dez sont en tout semblables à ceux dont nous nous servons aujourd'hui; ils sont seulement plus petits; il y en a qui semblent être d'os; d'autres de bois, & d'autres de terre cuite. Scheuchzer & Altman ont démontré que ces dez sont l'ouvrage de l'art, qu'ils servoient autrefois pour jouer, & qu'ils sont marqués pour cela. Le lieu où on les trouve, fait soupçonner qu'il peut y en avoir eu autrefois une fabrique, ou qu'ils y ont servi à l'amusement des Légions Romaines qui ont séjourné dans ces contrées, & qui ne jouoient alors qu'avec des poignées de dez. Ces prétendus dez fossiles ont été tellement recherchés, & deviennent actuellement si rares, que quelques Ouvriers de ces lieux-là les ont contrefaits pour attrapper l'argent des Voyageurs curieux.

DIABLE. Les habitans des Antilles appellent ainsi un oiseau de nuit fort laid à voir. Il a la figure d'un canard, le regard effrayant, le plumage tiqueté de noir & de blanc: il fait, comme les lapins, des trous en terre qui lui servent de nid. Cet oiseau habite les plus hautes montagnes, & n'en descend que pendant la nuit: son cri est lugubre; mais sa chair est très bonne à manger. *Hist. Nat. des Antilles, Tom. II.*

DIABLE DE JAVA ET DE TAVOYEN: *voyez* à l'article LÉZARD ÉCAILLEUX.

DIABLE DE MER. C'est notre macreuse, dont le plumage est tout-à-fait noir, à l'exception d'une tache blanche sur la tête. *Voyez MACREUSE.* On donne aussi le nom de *Diable de mer* au *Pêcheur marin*; *Rana piscatrix*, poisson cartilagineux que Rondelet a nommé *Galanga*: *voyez ce mot.* *Voyez ci-après Diable de mer.*

DIABLE DE MER. Les Pêcheurs des côtes d'Afrique donnent ce nom

à un monstre qu'ils prennent quelquefois, & dont on voit la dépouille dans les Cabinets des Naturalistes. Cet animal, qui a en grand la figure qu'un tétard a en petit, a environ quatre pieds de long & un pied d'épaisseur; son dos est chargé d'une bosse armée de quelques aiguillons semblables à ceux des hérissés; sa tête, qui est plus grosse que le reste du corps, est plate, circulaire, garnie de petites bosses, entre lesquelles on voit deux yeux plus ou moins noirs & gros; sa gueule, qui est extraordinairement fendue, est armée de plusieurs rangs de dents fort aiguës, dont il y en a deux crochues, comme celles du sanglier. La mâchoire supérieure est plus courte que l'inférieure; ce qui est cause que sa bouche est toujours ouverte. Sa langue est large, comme cartilagineuse, & n'est point détachée du palais. La quantité de dents qui se voient aux mâchoires, dans l'arrière-bouche, sur la langue, & au fond de la gorge, ne contribuent pas peu à rendre cette gueule effroyable. Les petites dents qui sont vacillantes, sont courbées du côté de l'intérieur de la bouche. Ses nageoires qui sont très fortes, très étendues, & dont les rayons sont cartilagineux, ont leurs extrémités dentelées ou festonnées. Les nageoires pectorales sont en forme de mains ou de pieds, & la peau en est fort dure & rude. Cet animal a en tout cinq nageoires & une queue assez large; aucune apparence de narines au dehors. Les ouies ou branchies sont, dit Artedi, au nombre de trois de chaque côté. Sa peau est épaisse, onctueuse, sans écailles, brune & marquetée sur le dos, blanche sur le ventre. Le contour de sa mâchoire inférieure est garni d'appendices cutanées, en forme de barbes, qui se trouvent aussi à toute la circonférence du corps. On prétend que ce qui lui a fait donner le nom de *Diable de mer*, ce sont deux cornes noires assez pointues, longues de neuf pouces, qu'il a au-dessus des yeux ou du muffle, & qui se recourbent sur son dos, comme celles du belier. Sa figure hideuse, son regard de côté, sa gueule énorme, tout répond assez à l'idée fantastique que l'on s'est formée de l'être malfaisant, sur-tout quand on lui a retiré les entrailles, & qu'on lui passe une bougie allumée dans le corps; car il paroît alors un monstre des plus effrayans. Sa chair est un poison qui provoque des vomissemens & des défaillances qui causeroient bientôt la mort, si on n'y remédioit par quelque antidote.

On trouve encore une autre sorte de *diable de mer*, dont la chair n'est pas si venimeuse, mais qui n'est pas moins hideux à voir, quoique la figure en soit différente. Les plus grands n'ont gueres qu'un pied de longueur & autant de largeur. Quand ils veulent, ils s'enflent tellement, qu'ils paroissent aussi ronds qu'une boule: ils ont en petit les mêmes yeux & les mêmes dents que l'espèce précédente, avec une seule corne; leur queue est faite comme une rame: ils ont une forte nageoire sur le dos, & une autre sous le ventre. On leur remarque aussi deux fausses pattes ou nageoires sur les côtés; chacune d'elles a huit doigts, munis d'ongles assez piquants. Leur peau est hérissée comme celle du *Requin*, excepté sous le ventre, où elle est tachetée & comme ondulée de noir.

Sur la côte d'Or & sur la côte d'Yvoire, en Afrique, on trouve une espèce

de raie , que les habitans appellent aussi *Diabie de mer*. Ce poisson est long de vingt-cinq pieds , & large de dix-huit , sur trois d'épaisseur : ses côtés sont garnis d'angles faillans , aussi durs que la corne , & dont les coups sont très dangereux. Sa queue est longue comme un fouet , & armée d'une pointe assez redoutable. Le dos est armé de pointes longues de deux pouces , & aiguës comme des clous : sa tête , qui est jointe immédiatement au corps , est garnie de dents plattes & tranchantes. Pour rendre cet animal plus inévitable , la Nature lui a , dit-on , donné quatre yeux : il en a deux près du gosier , qui sont ronds & fort grands ; deux autres sur la tête vers les côtés , mais plus petits. A chaque côté du gosier , il y a trois cornes , de longueur & d'épaisseur différentes : celle du milieu , au côté droit , est longue de trois pieds , sur un pouce & demi de large : celle du milieu , du côté gauche , est plus petite : heureusement que ces cornes sont flexibles , & peuvent nuire difficilement. La peau de cet animal est rude & sèche comme celle du requin. Sa chair est coriace & de mauvais goût : son foie donne de fort bonne huile.

Le diable de la mer Méditerranée , se nomme *Baudroie* : il ressemble beaucoup à la première espèce dont nous avons parlé. Sa gueule énorme est garnie de dents mobiles comme celle du requin. Son gosier ou l'œsophage , en est aussi garni de plus petites : il semble sortir du fond une espèce de bourelet épineux.

Les Pêcheurs des Isles de l'Amérique donnent encore le nom de *Diabie* à un grand poisson plat en forme de grande raie , plus large que long , ayant quelquefois plus de dix pieds d'un aileron à l'autre , & plus de deux pieds d'épaisseur vers le milieu du corps. Ses antennes ou cornes se recourbent en se tortillant comme de grosses cornes de bœuf. La gueule de ce poisson est démesurément ouverte , ayant plus de deux pieds de large : elle n'est point armée de dents ; mais on remarque des membranes très épaisses qui recouvrent les gencives de ce monstre lorsqu'il veut engloutir quelque gros poisson. Il a une espèce de gouvernail sur le dos à la partie postérieure , de laquelle sort une queue très agile , longue de quatre ou cinq pieds , & en forme de fouet. Tout l'animal est couvert d'une peau très forte , rude , grise sur le dos , & blanche sous le ventre : sa chair est indigeste comme celle des grosses raies dont ce poisson paroît être une espèce. Par cette description on voit que le *diabie* des Isles a une ressemblance en partie avec ceux d'Afrique , & en partie avec celui de la Méditerranée : cependant il paroît en différer par quelques parties. Voyez l'article GALANGA.

On trouve dans le Journal de Médecine (Janvier 1765) la description & la figure de deux diables de mer échoués sur le sable dans la rade de Brest en 1764 : l'un d'eux avoit dans son estomac un chien de mer de la longueur du bras , & une anguille de mer. Ce détail fait voir qu'il y a plusieurs espèces de diables de mer , & que la grandeur n'y met pas la seule différence , comme plusieurs le présumant.

DIABLE DES PALETUVIERS. Dans l'Isle de Cayenne on donne ce nom à une espece de corbeau aquatique, dont le plumage est d'un bleu noirâtre.

DIABLOTINS. Oiseaux de la Dominique & de la Guadeloupe, où ils viennent, depuis le mois de Septembre jusqu'en Novembre, s'accoupler, pondre & élever leurs petits : ils sont de la grosseur d'une poule & de la forme d'un canard ordinaire. Leur plumage est noir, mêlé de blanc ; leurs jambes sont courtes ; leurs pieds sont palmés, & cependant armés d'ongles longs & crochus ; leur bec est semblable à celui des oiseaux du genre des corbeaux : ils ont des yeux à fleur de tête, & voient admirablement bien la nuit ; mais ils voient si peu dans le jour, que quand ils sont surpris par la lumière, hors de leur retraite, ils heurtent contre tout ce qu'ils rencontrent, & enfin tombent à terre. Ces animaux sont d'excellents pêcheurs de nuit, & repairent toujours deux à deux, vers les montagnes : ils s'y tiennent dans des trous comme des lapins ; c'est-là qu'ils pondent, couvent & élèvent leurs petits.

Dans le mois de Mars on trouve dans les trous la mere avec ses deux petits, qui sont couverts d'un duvet épais & jaune, tels que celui des oiseaux. Ces petits sont en état de s'envoler vers la fin de Mai : tous reviennent régulièrement en Septembre. Leur chair est noirâtre & un peu huileuse ; d'ailleurs elle est fort nourrissante.

DIAGREDE. Voyez SCAMMONÉE.

DIAMANT, Adamas. C'est la pierre précieuse la plus pure, la plus dure, la plus pesante & la plus diaphane ; étant polie, c'est la plus brillante de toutes les pierreries & de toutes les cristallisations : en un mot, c'est la plus précieuse de toutes les matieres dont les hommes sont convenus de faire la représentation du luxe & de l'opulence.

La couleur du diamant varie à l'infini : il est ordinairement sans couleur ; mais on en trouve de toutes les couleurs & de toutes les nuances de couleur. On doute, quoi qu'en disent les Joailliers, qu'on ait jamais vu des diamants d'un aussi beau rouge que le rubis, d'un aussi beau pourpre que le grenat, d'un aussi bel orangé que l'hyacinthe, d'un aussi beau verd que l'émeraude, & d'un aussi beau bleu que le saphir, &c. Le diamant verd, lorsque sa couleur est d'une bonne teinte, est le plus rare ; il est aussi le plus cher. Le diamant couleur de rose & le bleu sont très estimés, & même le jaune. Les diamants roux ou noirâtres ne sont que trop communs : ces couleurs en diminuent beaucoup le prix.

Le diamant a naturellement dans sa miniere primitive, qui est une matrice sablonneuse & rougeâtre, quelquefois argilleuse & noire, une cristallisation tantôt octaédre, en pointe, & tantôt cubique. Tous les diamants du commerce sont bruts, arrondis & couverts d'une croute grisâtre qu'ils ont acquise par les frottements réitérés en roulant & tombant en cascades avec les torrents. Cette croute obscure & souvent grossiere, laisse à peine

appercevoir quelque transparence dans l'intérieur de la pierre ; de sorte que les meilleurs connoisseurs ne peuvent juger de sa valeur. Lorsqu'il est ainsi encrouté , on l'appelle *Diamant brut*.

On prétend que le diamant peut se diviser par tablettes , à l'aide d'un instrument pointu. Il est vitreux dans ses fractures , & d'une dureté si considérable , qu'on ne le peut user qu'avec la poudre d'*égrisée* , qui provient de l'écorce des autres diamants noirs entiers. Cette pierre précieuse résiste à la lime , & acquiert la propriété de reluire dans l'obscurité , soit en la frottant contre un verre dans les ténèbres , soit en l'exposant quelque tems aux rayons du soleil , soit en la faisant chauffer fortement dans un creuset , ou en la plongeant dans de l'eau chauffée au degré moyen de l'ébullition. Le diamant , comme la plupart des pierres transparentes , a la propriété d'attirer (immédiatement après avoir été frotté) la paille , les plumes , les feuilles d'or , le papier , la soie & les poils ; mais il n'a pas la propriété de résister à la violence de toutes les especes de feu , sans en être altéré. Des expériences faites en dernier lieu à Florence , & dont on trouve le détail dans la nouvelle édition françoise des *Œuvres* de Henckel , in-4°. démontrent que le diamant est altérable au feu solaire , au point d'y disparoître ; tandis que le rubis y résiste & ne fait que s'y amollir.

Le diamant bien examiné n'est peut-être qu'un cristal très pur , qui , pendant sa cristallisation qui s'est opérée avec lenteur , a acquis une figure régulière , une grande dureté , une pesanteur spécifique considérable ; en un mot , une *belle eau* ou transparence : mais il faut la réunion d'un trop grand nombre de circonstances , pour que la Nature nous offre beaucoup de beaux diamants ; c'est pourquoi nous voyons plus de cristaux de roches ou des diamants pleins de défauts , que de diamants parfaits. Les défauts les plus ordinaires du diamant , sont les *points* & les *gendarmes*. On appelle *points* , de petits grains blancs & noirs ou rouges ; & *gendarmes* , des points ou des grains plus grands , en façon de glaces. Ces défauts sont ou naturels , ou artificiels : *naturels* , quand l'éclat interrompu provient de l'arrangement des parties constituantes qui ont été brusquées dans leur coagulation ; *artificiels* , lorsque les diamants reflètent mal , à cause du vuide des gerçures ou étonnements produits par des contre-chocs ou par des couleurs sales. On a encore exprimé ces défauts par différents noms , comme tables , dragoneaux , jardinages. Les corps étrangers y produisent des filandres ou des veines , &c.

Les Lapidaires , dont le talent est de tailler & de polir ces pierres , retranchent au besoin les endroits défectueux , & en font des tablettes ou des pendeloques. La première opération de la taille du diamant , est celle par laquelle on le decroute ; pour cela il faut *opposer le diamant au diamant* , & les frotter les uns contre les autres (c'est ce qu'on appelle *égriser*) : on les mastique chacun au bout d'un petit bâton en forme de manche , pour les tenir & frotter avec plus de facilité ; par ce moyen les diamants mordent l'un sur l'autre , & il s'en détache une poussière que l'on reçoit dans une petite boîte nommée *égrisoir* ; cette poussière sert ensuite à les tailler & à

les polir. Pour leur donner le poli, il faut suivre le fil de la pierre : sans cette précaution on n'y réussiroit pas ; au contraire le diamant s'échaufferoit sans prendre aucun poli, comme il arrive dans ceux qui n'ont pas le fil dirigé uniformément : on les appelle *Diamants de nature*. Les Lapidaires les comparent à des nœuds de bois dont les fibres sont pelotonnées de façon qu'elles se croisent en différents sens. Ils appellent *Diamant rose*, le diamant taillé à facettes par-dessus, & plat par-dessous. Ils nomment *Diamant brillant*, celui qui est taillé à facettes par-dessous comme par-dessus. Pour exécuter cette taille qui produit le plus grand effet, on forme trente-trois faces de différentes figures, & inclinées sous différents angles sur le dessus de la pierre, c'est-à-dire sur la partie qui est hors de l'œuvre : on fait vingt-cinq autres faces sur la partie qui est dans l'œuvre, aussi de différentes figures & inclinées différemment, de sorte que les faces de dessus correspondent à celles du dessous dans des proportions assez justes, pour multiplier les réflexions, & pour donner en même tems quelque apparence de réfraction à certains aspects. C'est par cette mécanique que l'on donne des reflets au diamant, & des rayons de feu qui font une apparence de réfraction, dans laquelle on voit en petit les couleurs du spectre solaire, c'est-à-dire du rouge, du jaune, du bleu, du pourpre, &c. Voyez le *Dictionnaire des Arts & Métiers*, au mot LAPIDAIRE.

Un beau diamant est d'autant plus estimé, qu'il a moins de défauts, qu'il a plus de hauteur & de fond, & que ses reflets éclatants & vifs frappent plus vivement les yeux. Le prix en est souvent arbitraire ; tout dépend de la fantaisie, de la mode & des moyens : cependant on estime leur valeur dans le commerce, par *Karats*. Chaque karat équivaut à quatre grains un peu moins forts que ceux du poids de marc, & chacun de ces grains se divise en demi, en quarts, en huitièmes, en seizièmes, &c. En voici des exemples dans les quatre plus beaux diamants que l'on connoisse. 1°. Celui qui orne le trône du Grand Mogol, pèse deux cents soixante & dix-neuf karats, neuf seizièmes de karat. Tavernier l'a estimé 11.723.278 liv. 2°. Le diamant du Grand Duc de Toscane qui pèse cent trente-neuf karats ; sa valeur est, selon le même Tavernier, de 2.608.335 liv. 3°. Les deux diamants du Roi de France, dont l'un appelé le *Grand Sancy* par corruption de la prononciation du nombre de cent six karats qu'il pèse, ou parce qu'il a appartenu autrefois à quelqu'un de la maison de Harlay de Sancy : ce diamant a coûté 600.000 liv. L'autre diamant qui fait aussi partie des diamants de la Couronne, est le *Pitre*, que M. le Duc d'Orléans acquit pour le Roi pendant sa régence ; il pèse cinq cents quarante-sept grains parfaits : il coûta deux millions & demi ; mais il vaut davantage. On l'a appelé *Pitre* par corruption de *Pits*, qui étoit le nom d'un Gentilhomme Anglois de qui on acheta cette belle pierre. Quand un diamant pèse plusieurs grains ou karats, le tarif du karat cesse, & la différence en est très grande, puisque le karat peut être estimé pour trente-deux grains, & même pour soixante-quatre, &c. Tel est le mérite du diamant, que dans tous les siècles & chez

toutes les Nations policées, il a été regardé comme la plus belle des productions de la Nature dans le regne minéral : il a toujours été le signe le plus en valeur dans le commerce, & l'ornement le plus riche dans la société.

Il semble que la Nature soit avare d'une matière si parfaite & si belle. Jusqu'à ce siècle on ne connoissoit de *mines de diamant* que dans les Indes Orientales; mais on en a trouvé depuis dans le Bresil en Amérique.

Les meilleures mines de diamants & les plus riches, sont dans les Royaumes de Golconde, de Visapour & de Bengale, sur les bords du Gange, dans l'Isle de Borneo.

La mine de Raolconda est dans la Province de Carnatica, à cinq journées de Golconde, & à huit ou neuf de Visapour. Dans ce lieu la terre est sablonneuse, pleine de rochers, & couverte de taillis. Les roches sont séparées par des veines de terre, d'un demi doigt, & quelquefois d'un doigt de largeur; & c'est dans cette terre que l'on trouve les diamants. Les Mineurs tirent cette terre avec des fers crochus; ensuite on la lave dans des sébiles pour en séparer les diamants : on répète cette opération deux ou trois fois, jusqu'à ce qu'on soit assuré qu'il n'en reste plus. L'autre mine, appelée *Gani* en langue du pays, & *Coulour* en langue Persienne, est à sept journées de Golconde du côté du Levant. Il y a souvent jusqu'à soixante mille ouvriers; hommes, femmes & enfants qui exploitent cette mine. Quand on est convenu de l'endroit que l'on veut fouiller, on en applanit un autre aux environs, & on l'entoure de murs de deux pieds de haut, & d'espace en espace on laisse des ouvertures pour écouler les eaux; ensuite on fouille le premier endroit. Les hommes ouvrent la terre; les enfants & les femmes la transportent dans l'endroit entouré de murs. On continue la fouille jusqu'à ce qu'on trouve l'eau : cette eau n'est pas inutile; on s'en sert pour laver la terre qui a été transportée : on la verse par-dessus, & elle s'écoule par les ouvertures qui sont au pied des murs. La terre ayant été lavée deux ou trois fois, on la laisse sécher, & ensuite on la vanne dans des panniers faits exprès : cette opération finie, on bat la terre grossière qui reste pour la vanner de nouveau deux ou trois fois; alors les ouvriers cherchent les diamants à la main. Aujourd'hui les veines de cette mine sont presque épuisées. Les diamants qu'on y trouve sont pour l'ordinaire bien formés, gros, pointus, & d'une belle eau : il y en a aussi de jaunes & d'autres couleurs. Quelques-uns ont une écorce luisante, transparente, & un peu verdâtre, quoique le cœur de la pierre soit d'un beau blanc.

Les mines de Ramiah, de Garem & de Muttampellée, ont une terre jaunâtre; & plusieurs de leurs diamants sont d'une eau bleuâtre. La terre & les diamants des mines de Whootoor, Canjeconcta & Lattawar ressemblent à celles de Coulour ou Curruve; cependant il y a d'assez beaux diamants dans la mine de Lattawar qui ont la forme du gros bout d'une lame de rasoir. Ceux de la mine de Ramulconeta sont très petits, verts, & d'une belle eau. Ceux de la mine de Carnatica sont jaunes-noirâtres, défectueux, & se mettent en morceaux quand on les égrise. Les mines de diamants de

Wasergerrée & de Mannemurg ont jusqu'à cinquante brasses de profondeur dans des rochers. La première couche est d'une pierre dure & blanche, dans laquelle on creuse un puits de six pieds de profondeur pour arriver à une sorte de minerai de fer : on remplit le trou avec du bois, on y met le feu, & on l'entretient dans toute sa force pendant deux ou trois jours ; ensuite on l'éteint avec de l'eau : la pierre étant ainsi artendrie, on creuse & on enlève le minerai qui a quatre pieds d'épaisseur. On rencontre une veine de terre rouge qui s'étend sous le rocher à deux ou trois brasses : on enlève cette terre ; & si on y trouve des diamants, on creuse jusqu'à l'eau : c'est-là le dernier terme du travail. Ces mines exigent beaucoup de dépense. On trouve aussi des diamants dans le minerai ; ils sont gros, la plupart d'une belle eau, mais inégaux & de mauvaise forme.

La mine de Muddemurg si facile à exploiter, surpasse les autres pour la beauté des diamants, qui la plupart pèsent vingt-quatre, vingt-huit & quarante grains. La mine de Melwillée qui fut découverte en 1670, contient beaucoup de diamants d'une belle figure, & qui pèsent depuis soixante jusqu'à quatre-vingt-dix & cent grains, mais leur eau est jaunâtre ; & autant ils ont d'éclat, au sortir de la mine, autant ils s'obscurcissent sur la meule : d'ailleurs ils ont peu de dureté ; aussi ne sont-ils pas recherchés. Dans la mine, ces diamants sont encroutés de sable, & on ne peut les distinguer des graviers qu'après les avoir frottés contre une pierre. On en fait la recherche dans le gravier à la plus grande lumière du soleil.

On ne doute pas que les mines du Royaume de Visapour, sur-tout celle de Gazerpellée, ne renferment des diamans aussi gros & aussi beaux que ceux du Royaume de Golconde ; mais la politique du Roi de Visapour est de ne permettre l'exploitation que des mines où il ne se trouve que de petits diamans : à la vérité il y a moins à gagner ; mais ces mines sont moins dispendieuses & moins risquables que celles de Golconde. De plus ces Rois ne font travailler que certaines mines particulières pour ne pas rendre les diamans trop communs ; & encore se réservent-ils les plus gros : c'est pourquoi il y a en Europe très peu de diamans d'un grand volume. Il y a beaucoup d'autres petites mines de diamans voisines de celles dont il vient d'être fait mention, même à Bisnagar, à Malacca & en Arabie : mais dans toutes ces mines de l'Inde Orientale, les diamans sont cachés dans la terre, de façon qu'on en apperçoit rarement en la creusant ; il faut la tenir à la main.

Il y a dans le Royaume de Bengale, une rivière appelée *Goiel*, où l'on trouve des diamans. Cette mine qui a été découverte avant toutes les autres, porte le nom de *mine de Soumelpour*. On n'y peut travailler que vers la fin de Janvier & le commencement de Février, tems où les grandes pluies sont tombées & les eaux de la rivière éclaircies : alors les Ouvriers ou Habitans voisins remontent la rivière jusqu'aux montagnes d'où elle sort, au nombre d'environ huit mille, de tout sexe & de tout âge. Les eaux sont alors assez basses pour qu'on puisse distinguer & reconnoître la
qualité

qualité du sable au fond de la rivière. Les Ouvriers les plus expérimentés prétendent que les endroits les plus abondans en diamans, sont ceux où l'on voit de ces pierres de foudre appelées *Ceraunias* (c'est une *pyrite*. Voy. *ce mot*). Enfin, quand on a choisi l'endroit où l'on veut travailler, on détourne le cours de l'eau; ensuite on tire le sable jusqu'à deux pieds de profondeur, & on le porte sur le bord de la rivière dans un lieu entouré de murs. On arrose ce sable pour le laver, on le vanne, &c. comme on le fait dans la mine de Coulour. On trouve aussi des diamans dans la rivière de Succadan, dans l'Isle de Borneo. Quoique les Souverains du pays ne veulent pas en laisser sortir de chez eux, & que la plupart de ces habitans soient féroces & cruels, il y a cependant des Portugais qui en achètent, en fraude, des gens qui vont les voler dans la mine, malgré toute la vigilance des surveillans.

Vers le commencement de ce siècle on a trouvé au Brésil des diamans & d'autres pierres précieuses, comme des rubis, des topases, des péridots, &c. Ces pierres du Brésil sont belles; & quoiqu'on les vende assez cher, on craint qu'elles ne baissent de prix, tant la mine est abondante. Les diamans qu'on appelle diamans de Portugal, viennent de la rivière de Melho-verde dans le Brésil. Ceux du Canada ne sont que des cristaux; ainsi que ceux d'Alençon : voyez les articles CRISTAL & CAILLOUX-CRISTAUX.

DICTAME BLANC ou FRAXINELLE, *Fraxinella*. Cette plante vivace vient d'elle-même dans les bois du Languedoc, de la Provence & de l'Italie : elle n'est pas de la famille du *Dictame de Crète*, dont nous parlerons ci-après. Elle se perpétue également par sa racine ou par sa graine.

Le Dictame blanc, ou Fraxinelle, a des racines branchues, fibreuses, de la grosseur du doigt, d'où sortent des tiges rougeâtres qui croissent à la hauteur d'un pied & demi, rondes, velues & remplies de moëlle, garnies de feuilles luisantes, d'un verd clair, fermes, crenelées & de la forme des feuilles de frêne, ce qui a fait donner le nom de *Fraxinelle* à cette plante. Ses fleurs naissent aux sommités des tiges; elles sont belles, grandes, disposées en manière d'épi; composées chacune de cinq feuilles, de couleur purpurine, d'une odeur approchante de celle du bouch, & durables. A cette fleur succede un fruit composé de plusieurs graines, qui contiennent de petites semences pointues, noirâtres & luisantes.

Les extrémités des tiges & les calices des fleurs sont couverts d'une infinité de vésicules pleines d'huile essentielle, comme on peut l'observer facilement à l'aide d'un microscope : elles répandent, dans les jours d'été, le soir & le matin, des vapeurs éthérées, inflammables, & en telle abondance, que si l'on place au pied de cette plante une bougie allumée, il s'élève tout-à-coup une grande flamme qui se répand sur toute la plante. Lorsqu'on distille cette plante dans un état de maturité convenable, elle fournit beaucoup d'esprit recteur (c'est le principe odorant des végétaux), mais qui n'est plus inflammable, à cause de l'humidité de la plante qui distille avec lui.

En Médecine on ne se sert que de la racine mondée de fraxinelle : elle est employée dans les médicamens cordiaux , sudorifiques & hystériques : elle est très utile contre les poisons & les blessures faites avec des armes empoisonnées ; même pour l'épilepsie. Quelquefois cette racine agit comme purgative & même émétique : l'usage doit en être interdit dans les fièvres continues. Dans les pays chauds de l'Europe on tire , des fleurs de la fraxinelle , une eau distillée très odoriférante , dont les Dames Italiennes se servent comme d'un cosmétique également agréable & innocent.

DICTAME ou **DICTAMNE DE CRETE**, *Dictamnus cretica*. Ce dictame si célébré par le Poète Virgile , est une espece d'origan , fort agréable à l'odorat & à la vue , & qui croît en Candie sur le Mont-Ida , d'où on nous l'apporte sec. Cette plante croît aussi d'elle-même dans les fentes des rochers de la Grece. Elle a des racines brunes & fibreuses , des tiges dures & lanugineuses , hautes de neuf pouces , un peu purpurines & rameuses. Les feuilles naissent deux à deux aux nœuds des tiges : elles sont arrondies , longues d'un pouce , verdâtres , & couvertes d'un duvet épais & blanchâtre. Leur odeur est agréable & pénétrante ; mais leur saveur est très âcre. Ses fleurs naissent en été au sommet des branches , dans des épis grêles & écaillés , de couleur violette ou purpurine en de-hors. Chaque fleur est en gueule , portée sur un calice en cornet , cannelé & contenant quatre graines arrondies très menues.

De tous tems les Médecins ont recommandé l'usage des feuilles odorantes de dictame pour provoquer les regles , & pour la sortie du fœtus & de l'arrière-faix. Elles entrent dans la grande thériaque d'Andromaque , dans le mithridate & la confection d'hyacinthe. Ce dictame se trouve quelquefois en Provence , en Italie. Il se multiplie de boutures dans un terrain sec & sablonneux.

Nous connoissons encore une seconde espece de dictame , *Dictamnus montis Sipylis*, *origani foliis*. Ce fut le Chevalier Wheeler qui l'envoya à Oxford après l'avoir trouvée sur le mont Sipyle dans l'Asie mineure , près du Méandre. Cette nouvelle espece de dictame est une très jolie plante qui porte de grands épis de fleurs d'une beauté durable ; ce qui fait qu'elle mérite une place dans les jardins des Curieux. Elle se multiplie & se cultive à tous égards comme la précédente.

DICTAME FAUX, *Pseudo Dictamnus*. Est une plante que l'on cultive dans nos jardins , & qui a un certain rapport avec le vrai dictame de Crète. Sa racine est menue , ligneuse & fibrée : ses tiges sont grêles , nouées , velues , blanchâtres. Ses feuilles lanugineuses ont quelque ressemblance avec celles du dictame vrai. Ses fleurs sont en gueule , verticillées , de couleur purpurine , & découpées par le haut en deux levres : il leur succede des semences oblongues. Toutes les propriétés de cette plante sont les mêmes que celles du vrai dictame ; mais beaucoup inférieures.

DIDELPHE, *Didelphis*. Petit animal quadrupède , grand comme un lapin , naturel au seul Continent du nouveau monde , & sur-tout aux par-

ties méridionales de ce pays ; il est même difficile d'en élever en Europe.

On connoît plusieurs especes de *didelphes* qui ont été décrites par divers Auteurs sous les noms de *Rat du Bresil*, *Opassum*, *Manicou*, *Philandre*, *Rat des bois* de la Louisiane & de Surinam, *Loir sauvage d'Amérique*, & *Sarigue*. Leur caractère, selon M. Briffon, est d'avoir la gueule bien fendue, dix dents incisives à la mâchoire supérieure, huit à l'inférieure, & des dents canines & molaires, très blanches, & dont le nombre varie. A chaque pied, qui est semblable à celui des singes, ils ont cinq doigts onguiculés, & dont le pouce est très distinct, mais sans ongle. Ils s'appuient sur le talon en marchant. Ils ont les oreilles minces comme celles de la chauve-souris, la tête comme celle du Renard, & un museau garni de deux larges narines.

Toutes les especes de *didelphes* ont les pattes de derrière moins bien organisées, ou plus mal faites que les antérieures. Ils s'asseient aisément sur leur cul, & peuvent faire mille singeries avec leurs pattes. Ils grimpent à merveille sur les arbres, & ne se nourrissent souvent que de feuilles, de fruits & d'écorces de certains arbres ; ils sont aussi très friands d'oiseaux auxquels ils font la guerre.

Ces animaux nous font voir une organisation singulière, & différente de celle de tous les autres animaux. On voit dans leurs organes de la génération, plusieurs parties doubles qui sont simples dans les autres animaux. Le gland de la verge du mâle & celui du clitoris de la femelle, sont fourchus & paroissent doubles. Le vagin qui est simple à l'entrée, se partage ensuite en deux canaux. Les femelles ont à la partie inférieure du ventre, un petit sac ou manchon fourré tant en dehors qu'en dedans, dont l'ouverture a environ trois pouces & demi, dans lequel sont renfermées leurs mamelles, & où se retirent leurs petits nouvellement nés. Cette poche naturelle a du mouvement & du jeu. La mécanique de ce mouvement s'exécute par le moyen de plusieurs muscles & de deux os qui n'appartiennent qu'à cette espece d'animal. Ces muscles ferment la poche si exactement, qu'on n'en peut voir l'ouverture qu'en la dilatant de force avec les doigts. Les petits sont conçus dans la matrice intérieure de l'animal, mais ils en sortent étant encore d'une petitesse extrême, pour entrer dans la poche & s'attacher aux mamelles, où ils restent collés pendant le premier âge, & jusqu'à ce qu'ils aient pris assez de force & d'accroissement pour se mouvoir aisément. On peut présumer avec beaucoup de vraisemblance, dit M. de Buffon, que dans ces animaux la matrice n'est pour ainsi dire que le lieu de la conception, de la formation & du premier développement du fœtus, dont l'expulsion étant plus précoce que dans les autres quadrupèdes, l'accroissement s'achève dans la bourse où ils entrent au moment de leur naissance prématurée. Personne, continue M. de Buffon, n'a observé la durée de la gestation de ces animaux, que nous présumons être beaucoup plus courte que dans les autres ; & comme c'est un exemple singulier de la Nature que cette expulsion précoce du fœtus, nous exhortons ceux qui sont à portée de voir des *didel-*

phes vivans dans leur pays natal , de tâcher de favoir combien les femelles portent de tems , & combien de tems encore après la naissance , les petits restent attachés à la mammelle avant que de s'en séparer. Cette observation curieuse par elle-même , pourroit devenir utile en nous indiquant peut-être quelque moyen de conserver la vie aux enfans venus avant le terme.

La conformation de la queue du didelphe est aussi très singulière. Elle n'est couverte de poil qu'à son origine , jusqu'à deux ou trois pouces de longueur : l'extrémité n'offre qu'une peau lisse & écailleuse ; & lorsqu'on saisit l'animal par cet endroit , elle s'entortille aussi-tôt autour du doigt : aussi l'animal se suspend-il assez souvent aux arbres par la queue , la tête vers la terre , & guette-t-il dans cette attitude sa proie sur laquelle il s'élance lorsqu'elle vient à passer. Il est si friand de volaille , qu'il entre hardiment dans les basses-cours & dans les poulaillers. Quelquefois il se balance par la queue comme les *singes à queue prenante*. Le didelphe s'apprivoise très facilement ; mais son odeur désagréable le rend dégoûtant : cette mauvaise odeur réside dans sa peau. Sa chair est une de celles que recherchent le plus les Sauvages. Les femmes des Naturels du pays filent le poil de cet animal , qui est fin sans cependant être lisse : elles en font des jarretières qu'elles teignent ensuite en rouge.

La femelle de cet animal est avantagée d'un sac par la Nature , pour satisfaire , dit M. Gautier , à l'amour extraordinaire qu'elle a pour ses petits , qui naissent nuds & pelés , les yeux clos , & par conséquent dans le besoin d'être secourus. La mere les soigne elle-même , ne les quitte pas , les caresse sans cesse , les nourrit , les met dans sa poche ou dans son manchon pour les réchauffer ; elle les porte par-tout avec elle , sans les exposer à l'air & au froid. Elle les allaite à l'entrée de ce berceau portatif , avec ses mammelons rangés exprès pour la commodité de ces petits marmots , à l'endroit qu'il faut & à leur portée. Lorsque les petits sont assez forts , la mere les fait sortir de tems en tems , sur-tout quand il pleut , pour les laver ; elle les essuie ensuite avec ses pattes , les leche , & les remet promptement dans sa poche : quelquefois elle les expose au soleil quand il fait beau ; & lorsqu'ils ont les yeux ouverts , elle les amuse , elle danse avec eux , les agite , leur apprend à marcher & à faire mille singeries : mais aussi-tôt qu'ils sont assez forts pour chercher leur nourriture , elle feint de les chasser pour les exciter à se passer des soins maternels ; cependant elle les suit de loin & veille à leur conduite : & si par hasard le moindre bruit l'avertit de quelque danger , elle court aux uns & aux autres , les met tous dans sa poche , & les emporte dans un endroit plus sûr & plus tranquille. Elle ne voit aucun mâle jusqu'à ce que la petite famille soit en état de s'approvisionner , de pourvoir à tout , en un mot de se passer entièrement de son secours ; elle ne la quitte qu'après mille caresses & mille gambades.

Les mâles sont des infideles , des libertins , qui courent les champs , & cherchent pendant ce tems-là de bonnes fortunes : cependant comme à femelles égales ils préfèrent celles qu'ils ont épousées les premières , ils dé-

laissent leur conquête passagère , & reviennent à leurs premières femelles dès qu'elles sont débarrassées de toutes les attentions qu'elles donnent à leur petit ménage.

DIERVILLE , *Diervilla*. Petit arbrisseau originaire de l'Acadie en Amérique , & qui ne s'élève dans notre climat qu'à trois pieds de hauteur. Il a beaucoup de ressemblance avec le *Syringa* , par son bois & par sa feuille , dont les dentelures sont cependant plus régulières & bien moins profondes. Il donne au commencement de Juin , de petites fleurs jaunâtres en forme d'entonnoir à pavillon découpé en cinq parties , & terminé par un tuyau qui est articulé avec le pistil. Ces fleurs sont très dispersées sur les branches : elles durent environ quinze jours. Il en paroît quelques-unes sur la fin d'Août , de même durée que les premières. A ces fleurs succède un fruit pyramidal partagé en quatre loges remplies de graines assez menues.

La multiplication de cette plante dispense de tous soins : elle se fait plus qu'on ne veut par le moyen de ses racines traçantes qui produisent à leur extrémité quantité de rejettons ; ce qui fait qu'on ne peut l'assujettir à aucune forme régulière. Quoique la *dierville* se plaise à l'ombre & dans les terres limoneuses & humides , cependant elle donne beaucoup plus de fleurs dans les terrains secs. Le meilleur parti qu'on puisse tirer de cet arbrisseau , c'est de l'employer à garnir des bosquets où il ne craindra point l'ombrage des grands arbres , & où son principal agrément sera de faire une jolie verdure de bonne heure , dès le commencement de Février : les rigueurs de nos hivers ne l'alterent point.

DIGITALE , *Digitalis*. Cette plante , qu'on nomme aussi *Gands de Notre Dame* , croît sans culture aux lieux pierreux & sablonneux , sur les montagnes , ou avec culture dans les jardins des environs de Paris , &c. Sa racine est fibreuse & amère : sa tige est haute de deux à trois pieds , grosse comme le pouce , velue , rougeâtre & creuse : ses feuilles sont en quelque façon semblables à celles du bouillon blanc , d'un goût amer : ses fleurs sont en grand nombre , de couleur purpurine & diversifiée , fort agréables à voir , percées dans le fond , & évasées par l'autre bout , presque semblables à un dé à coudre. A ces fleurs succèdent des fruits oblongs , velus , qui sont des coques divisées chacune en deux loges , remplies de semences menues , un peu anguleuses & roussâtres.

La digitale est émétique. Le peuple de Sommerfet en Angleterre se fait vomir & se cause quelquefois des superpurgations avec la décoction de cette plante , qui est d'ailleurs détersive & laxative. Les fleurs de cette plante bouillies dans le saindoux , font une pommade excellente pour les maladies scrophuleuses. Il y a un ancien proverbe en Italie , qui dit que la digitale guérit toutes les plaies. *Aralda che tutte piaghe s'alda*.

DINDE & DINDON : voyez **COQ-D'INDE** , à l'article **COQ**.

DIPSADE , *Dipsas*. Serpent de la Lybie & de la Syrie , des plus dangereux , & qui , selon Kolbe , a environ trois quarts d'aune de longueur. Il est fort gros au bas de la tête , & cette grosseur va toujours en diminuant

jusqu'à la queue. Son col est assez long : le corps est blanc , moucheté de taches rousses & noires. La queue est très mince.

Les *dipsades* naissent plus abondamment en Afrique & dans l'Arabie que par-tout ailleurs : elles habitent les lieux maritimes , & se retirent toujours dans les terres salées. Ce serpent est très agile quand il s'agit d'attaquer sa proie : sa morsure est si venimeuse , qu'elle enflamme tout-à-coup le sang , & qu'elle cause une soif dévorante à ceux qui en sont attaqués. Lucain , dans sa *Pharsale* , rapporte qu'Aulus Tuscus , l'un des Soldats de Caron , fut mordu d'une dipsade , & qu'il ne put éteindre sa soif brûlante ni avec l'eau , ni avec son propre sang. Tels sont les effets de la morsure de la dipsade : d'abord on paroît comme immobile ou paralytique , le ventre devient enflé , souvent on perd connoissance ; on ne peut rendre l'eau ni par la bouche , ni par les urines , ni par les sueurs : le poil tombe ensuite. Les démangeaisons sont violentes , le ventre se lâche , & le malade termine ses douleurs par la mort qui lui arrive. Il n'y a point d'autre remède que d'appliquer sur-le-champ le feu à la partie blessée & la scarifier , puis employer de puissans vomitifs & sudorifiques , & faire manger abondamment de la viande salée. Si l'on a été mordu au bras ou à la jambe , il faut promptement faire une forte ligature au-dessus de la plaie , pour empêcher le poison de faire du progrès ; ensuite on doit user des moyens prescrits.

DISSEQUEUR ou SCARABÉE DISSEQUEUR : voyez *DERMESTES*.

DODO. Est le Cygne capuchonné : voyez *au mot* CYGNE.

DOGLINGE. Est une espèce de baleine qui ne se rencontre que dans la baie de Qualhoë , dépendante des Isles de Feroë , où l'on fait la pêche des plus belles baleines. voyez *au mot* BALEINE.

Le Doglinge a cela de singulier , que non-seulement sa chair est de mauvais goût , mais encore son lard ; & que si quelqu'un en mangeoit , ce lard pénétreroit à travers les pores de la peau avec l'humeur de la transpiration , & communiqueroit à la chemise une couleur jaune & une odeur fétide. Cette graisse est si pénétrante , qu'elle transude à travers les tonneaux où on la met : aussi les Pêcheurs font peu de cas de cette baleine.

DOGUE. Est un chien de la grande espèce qu'on apprivoise facilement , & dont on se sert pour garder les maisons , ou pour combattre contre les taureaux & autres bêtes. On nomme *Doguins* les Dogues de petite espèce. Voyez ces mots à l'article CHIEN.

DOIGT MARIN ou MANCHE DE COUTEAU : voyez *COUTELIER*.

DOMPTE-VENIN , *Asclepias*. Cette plante , que les Espagnols nomment aussi *Vince-toxicum* , a une racine très fibrée. De la racine il sort plusieurs tiges à la hauteur de deux pieds , rondes , pliantes , nouées , serpennantes , & qui s'attachent quelquefois aux plantes voisines. Ses feuilles naissent opposées deux à deux , & ont à-peu-près la figure de celles du lierre. De l'aisselle des feuilles sortent des pédicules divisés en plusieurs autres , qui portent des fleurs blanchâtres d'une seule pièce , en cloche , & disposées en manière de rosette ; il leur succede un fruit à deux graines membraneu-

ses, oblongues, contenant des semences rousâtres & garnies d'une aigrette, couchées par écailles, & attachées à un placenta, Cette plante croît abondamment dans le Levant, le Canada & aux environs de Paris.

Les racines du dompte-venin sont seules d'usage en Médecine : elles sont d'une saveur amère, un peu âcres, aromatiques, d'une odeur à-peu-près semblable à celle du fenouil. Le suc de cette racine est limpide. Ses propriétés sont sudorifiques & alexipharmiques : elle excite à quelques-uns des nausées & un léger vomissement. Paracelse assure que le vin de dompte-venin chasse par la plante des pieds, les eaux qui sont entre cuir & chair.

On se sert quelquefois extérieurement des feuilles & graines pilées de cette plante pour résoudre & mondifier les ulcères fordides des mammelles. Asclepias fut le premier Médecin qui mit cette plante en usage ; & c'est de-là que lui est venu un de ses noms.

DONZELLE, *Donzella*. Petit poisson de rocher, l'un des plus beaux de la Méditerranée. Il a le dos d'un verd noirâtre ; & sur les côtés, toutes les couleurs variées de l'arc-en-ciel. Son corps est oblong, menu, & gros comme le pouce : ses écailles sont fort fines, ses nageoires épineuses, ses yeux petits, la prunelle noire, l'iris rouge, les dents fort blanches, aiguës & crochues : l'anus est au milieu du ventre : il a deux nageoires au dos & au ventre. On en voit beaucoup sur la côte de Gênes & d'Antibes, où ils nagent en troupes & viennent mordre ceux qui se baignent. On ne les pêche guère qu'à la ligne : la chair en est tendre & courte. Ceux que l'on pêche en pleine mer sont meilleurs que ceux qui se trouvent sur les côtes. Ce poisson est le *Julis* & le *Girella* de Rondelet.

DORADE, *Aurata vulgaris*. Espèce de poisson de mer, nommé ainsi d'une ligne de couleur d'or qui s'étend depuis la tête jusqu'à la queue.

La dorade est très commune dans les Indes Orientales & Occidentales, en Afrique, le long de la Côte d'or, à Madagascar, à la Chine, au Brésil ; il s'en trouve aussi beaucoup dans la Méditerranée. C'est un poisson fort craintif, & à qui le froid est fort contraire. Il devient plus grand qu'une très grosse alose (on nomme les petites *Sauquènes*) : son corps est large & plat ; sa queue, longue, fourchue & large : il est couvert d'écailles moyennes de différentes couleurs. Sorti de l'eau, il a le ventre couleur de lait, les côtés comme argentés, le dos est d'un bleu noirâtre ; mais dans l'eau il est sans contredit le plus beau poisson de la mer : il paroît couvert d'or sur un fond verd azuré. Ses yeux sont gros, rouges & pleins de feu. Ses deux mâchoires se divisent en quatre parties, & sont garnies chacune, indépendamment des dents incisives, canines & petites molaires, d'une grosse molaire, ronde ou oblongue, que l'on enchâsse souvent dans de l'or. On leur donne le nom de *Crapaudine*. Voyez ce mot. Ces tubercules osseux servent au poisson à écraser certains coquillages, tels que la *Telline*, le *Peigne*, &c. Le dos de la dorade est tranchant, & porte une nageoire qui s'étend sur presque toute sa longueur, & qui a vingt-quatre aiguillons, dont les onze

premiers sont fermes & osseux , & les autres flexibles & cartilagineux. Ce poisson est bien meilleur en été qu'en hiver ; aussi n'en voit-on guere que dans cette premiere saison aux marchés de Rome, de Venise , de Gênes, &c. l'on s'en nourrit communément en Languedoc pendant le carême. La chair de ce poisson est blanche , ferme , un peu seche , mais d'un bon goût. La dorade de l'Océan est différente de celle de la Méditerranée.

La dorade est le plus léger de tous les animaux qui nagent. Elle est fort vive & gourmande ; elle mange ceux de son espece. Elle est l'ennemi mortel des poissons volans : elle les chasse en pleine mer avec un tel acharnement , qu'elle se laisse prendre souvent à leur apparence ; car il suffit de lier en croix deux plumes de poule ou de pigeon à l'hameçon qu'on laisse traîner à l'arriere du navire. Lorsqu'elle voit ces plumes qu'elle prend pour un poisson volant , elle engloutit l'hameçon qui est recouvert d'un peu de toile blanche , & se prend ainsi en croyant faire elle-même une excellente capture.

Quelquefois les dorades , que l'on nomme aussi *Breme* ou *Brame de mer* , passent dans les lacs qui s'abouchent aux mers : elles y vivent ; mais leur chair y acquiert un goût bourbeux. Leur foie desséché , pulvérisé & mis dans du vin , est employé pour guérir de la dysenterie.

On prétend que le petit *Poisson d'or* appelé des Chinois *Kin-yu* , est une espece de dorade d'eau douce qu'on nourrit en cette contrée dans de petits étangs très profonds faits pour cet usage , & qui servent d'ornement aux maisons de campagne.

Les plus jolies Dorades Chinoises sont d'un beau rouge , comme tacheté de poudre d'or ou d'essence rouge d'Orient : on en voit aussi d'argentées. On prétend que les premieres sont les mâles , & les dernieres sont les femelles : on observe à celles-ci des taches blanches autour des ouies , & de petites nageoires ; l'une & l'autre sont très vives & actives , elles se plaisent à jouer sur la surface de l'eau ; mais elles ont à craindre la moindre impression de l'air ; qui les fait bientôt périr. A Peking où l'on en élève chez les Grands , on ne leur donne rien à manger pendant l'hiver : elles avalent la matiere gélatineuse des parois du bassin ; elles se nourrissent aussi de petits vers rougeâtres qu'elles trouvent dans les racines des herbes qui croissent au fond des étangs. Souvent on les prend pendant cette saison pour les conserver dans des vases de porcelaine plus profonds que larges , mais sans aucune nourriture. En Europe on leur donne un peu de pâte de froment détrempe , des jaunes d'œufs & des limaçons ; au printems , on les remet dans leurs bassins. Les Grands se plaisent à les élever , à les appeller , & à observer les mouvemens agiles de ces petits poissons , dont la propagation est assez abondante , même excessive , dans la Province de Fokien en Chine , & dans toutes les régions chaudes de cet Empire. On a soin de changer deux fois par semaine l'eau des bassins où l'on tient ce petit poisson , & d'y mettre au fond un pot de terre renversé & percé de trous , afin qu'ils puissent

sont s'y mettre à couvert de la chaleur du soleil : on a soin aussi de jeter des herbes vertes sur la surface du bassin, pour en entretenir la fraîcheur & l'ombre qu'ils recherchent volontiers : on ne doit toucher ce poisson qu'avec le filet, ou une truble faite exprès ; si on le touche avec la main, il meurt ou tombe en langueur. Le bruit d'un orage, du tonnerre ou du canon, & l'odeur de la poix lui est très préjudiciable. Dans le mois de Mai, lorsque ce poisson a déposé son frai, on est attentif à enlever aussitôt celui qui nâge sur l'eau, sans quoi les Dorades le dévoreroient. On le met dans un vase exposé au soleil, jusqu'à ce que la chaleur ait animé les jeunes Dorades, qui paroissent d'abord noires, & qui par degrés deviennent rouges ou blanches, c'est-à-dire, de couleur d'or ou d'argent : ces belles couleurs commencent toujours à paroître par l'extrémité de la queue. Les Chinois font un commerce considérable de ces petits poissons qui sont alors gros comme le petit doigt, mais qui deviennent avec le tems gros comme un hareng. Il y a des Provinces en Chine où l'on ne retire pas le frai de l'étang, mais on y jette des herbes, afin qu'il puisse s'y attacher. Après ce tems, & lorsqu'on s'apperçoit que les mâles cessent de suivre les femelles, on transporte le poisson dans un autre lieu, & le frai doit rester exposé au soleil trois ou quatre jours ; ensuite on en laisse passer quarante ou cinquante, au bout desquels l'eau doit être changée, parceque le frai commence à prendre distinctement la forme du poisson.

La Dorade Chinoise ressemble assez à une petite Brème, sa tête est grosse & assez plate par en haut, toute unie & sans piquans aux ouies ; sa bouche est obtuse, garnie à l'entrée du gozier, & non dans la bouche, de trois fortes dents. Les narines sont remarquables, car elles sont doubles ; ses yeux sont grands, ronds & élevés, le dos est un peu élevé, le ventre renflé, les écailles grandes, tuilées & disposées par bandes ou lignes droites. Ce poisson a huit nâgeoires : savoir, une au dos, deux à la poitrine, autant à la partie antérieure du ventre, autant à la postérieure, la dernière enfin est la queue, & elle est la plus grande de toutes ; elle est en forme de trident, repliée des deux côtés comme la queue d'une poule, & le poisson peut la lever de la même manière que le coq d'Inde leve sa queue, lorsqu'il est irrité : la vessie est double comme dans les ables, les brêmes, & dans tous les poissons du genre des carpes, dont il est une espèce. Le boyau est de la longueur du poisson plié en trois, & couvert de graisse. Les trois dents sont placées précisément à l'endroit de la tête où le boyau commence : savoir, deux aux côtés, & une troisième plus pointue que les autres contre le dos. Les principaux caractères, tant intérieurs qu'extérieurs de ce poisson, sont 1°. trois arrêtes renfermées dans la membrane qui couvre les ouies : 2°. les dents qui se trouvent dans le gozier, & non dans la bouche : 3°. la vessie divisée en deux parties inégales : 4°. l'os nasal, qui dans tout ce genre de poissons, ressemble à un pied de vache : 5°. une double nâgeoire postérieure à côté du ventre : 6°. la nâgeoire de la queue, fendue en trois, ou

en forme de trident : 7°. enfin , une queue dont la nageoire n'est ni horizontale comme dans les cétacées , ni perpendiculaire , comme dans les autres poissons , mais repliée des deux côtés.

La dorade chinoise ou poisson d'or , perd sa belle couleur dans l'esprit-de-vin : elle la conserve un peu mieux , si on veut dessécher peu-à-peu ce poisson. On peut reconnoître très aisément la figure de ce poisson avec ses couleurs naturelles sur la plupart des vases de porcelaines de la Chine.

DORADILLE. Voyez CETERACH.

DORCAS. Il paroît que la chevre que les Arabes appellent *algazel* (gazelle) , est la *dorcas* ou la chevre de Lybie. Voyez GAZELLE.

DORÉE ou POISSON DE S. PIERRE , *Faber* , *sive Gallus marinus*. Ce poisson a depuis un pied jusqu'à seize pouces de longueur : sa forme est plate , & presque d'égale épaisseur dans toute son étendue. Sa tête & le dos sont de couleur brune , ses nageoires noires , & ses côtés dorés. Au milieu du corps il a une tache ronde , large d'un demi pouce. Ses écailles sont presque imperceptibles : on y distingue une ligne tortueuse de la tête à la queue : ses yeux sont grands ; & au-dessus il porte deux aiguillons , dont la pointe est tournée vers la queue : il a sur le dos dix autres aiguillons de grandeur inégale. D'entre deux aiguillons sortent des poils semblables à des foies de cochon , à la racine desquels il y a de petits os qui ressemblent à des cloux à deux têtes , dont l'une est tournée vers la tête , & l'autre vers la queue. Il a , au bas du ventre , une nageoire fournie de cinq aiguillons : le reste du ventre est garni d'os tranchants comme des couteaux. Il a quatre nageoires en-dessus & en-dessous des ouies : sa queue fait sa dernière nageoire : on y compte quinze piquants branchus ; & lorsque le poisson l'étend , son extrémité est circulaire. Sa bouche est fort fendue & ouverte , avec quatre ouies de chaque côté ; ses boyaux sont menus & entortillés les uns dans les autres ; ses œufs sont rouges ; son foie est blanc , sa rate rouge & petite ; la partie basse de son cœur est rouge , mais le haut & le milieu tirent sur le blanc , ce qui est rare dans les poissons. Sa chair est moins dure que celle du turbot , d'un bon suc , facile à cuire & à digérer : elle étoit fort estimée des Anciens.

La dorée vit de cadavres & de tout ce qu'elle trouve dans la mer ; elle est peu timide , & habite volontiers les rochers , ou de l'Océan , ou de la Méditerranée : on la nomme *dorée* à cause de la couleur jaune qu'elle a sur les côtés ; le peuple lui a donné le nom de *Poisson de S. Pierre* , parcequ'il a cru que cet Apôtre avoit pris un tel poisson , par commandement du SAUVEUR , & avoit tiré de sa bouche une piece de monnoie pour payer le tribut , & que l'empreinte de ses doigts avoit formé sur les côtés la tache que l'on y voit.

DORMEUR , *Cephalus* , *sive asellus palustris*. Espece de poisson de couleur grise , qui a la tête large , & dont M. Gautier a donné un dessin coloré dans les planches de son Journal. Ce poisson a une particularité

singulière : il s'assoupit entre deux eaux , à un pouce de profondeur & flotte au gré des vagues avec la plus grande tranquillité du monde ; on le prendroit à la main s'il n'avoit la peau extrêmement gluante , ce qui fait qu'on ne le peut saisir aisément ; ce poisson n'est pas extrêmement délicat.

DORMILLEOUSE. Nom donné à la *Torpille*. Voyez ce mot.

DORONIC, *Doronicum*. Plante fameuse chez les Arabes , chez les Grecs & chez les Botanistes Européens du dernier siècle.

Cette plante , qui croît sur les montagnes en Suisse , proche de Genève , en Autriche , en Styrie , en Provence & en Languedoc , a de petites racines tuberculées , ou comme articulées par des nœuds , représentant , en quelque façon , la figure du scorpion , serpentant obliquement , & légèrement fibrées. De ces racines sortent plusieurs feuilles larges , verdâtres , molles & lanugineuses , comme celles du concombre. Sa tige est haute d'environ un pied , cannelée , chargée de duvet , & partagée en un petit nombre de rameaux , qui portent à leur sommet des fleurs radiées , dont le disque est formé de plusieurs fleurons jaunes , & la couronne de demi-fleurons , appuyés sur des embryons & renfermés dans un calice , échancré jusqu'à la base en plusieurs parties. A ces fleurs succèdent des semences noirâtres , menues & garnies chacune d'une aigrette.

On trouve chez les Droguistes la racine séchée & mondée du *doronic*. Plusieurs Colleges de Médecine l'estiment un poison ; d'autres un contre-poison. Ce qu'il y a de certain , c'est que les animaux à quatre pattes , particulièrement les chiens , meurent inmanquablement sept à huit heures après en avoir mangé. L'illustre Gesner , pour satisfaire le célèbre Mathiole , qui lui disoit , à l'égard des propriétés du doronic , *quid tentare nocebit* ? prit intérieurement deux gros de cette racine : il n'en fut pas incommodé dans le même espace de tems que les animaux dont nous avons parlé ; mais après ce tems , il enfla par-tout le corps , & tomba en foiblesse pendant deux jours : il ne put faire cesser ces symptômes , qu'en prenant un bain d'eau chaude. Cette racine est donc dangereuse , & doit être exclue des cordiaux en Pharmacie. Celle du *doronicum radice dulci* est la moins suspecte.

Les Allemands refuseront de comprendre dans cette censure le *doronic* de leur pays , ou l'*Arnica* de Schroder , puisqu'ils en font un grand usage , & qu'ils s'en trouvent bien. Mais ce doronic est différent du précédent : il ressemble par ses feuilles au plantain velu : sa racine & ses feuilles sont aromatiques , ainsi que ses fleurs qui sont d'un jaune doré. On les fait bouillir ou infuser dans de la bière ou dans du vin , & on l'administre aux personnes qui ont fait des chûtes. Dès qu'on en a fait usage , on ressent de cruelles douleurs ; souvent elle intercepte un peu la respiration ; mais ces symptômes s'apaisent promptement , ou par un flux d'urine , ou par le vomissement , ou par la saignée. La manière brusque d'opérer de cette espèce de doronic , quoique salutaire aux Allemands , fait soupçonner que ce remède pourroit être fâcheux à tout homme d'un autre pays.

DORQUE. C'est l'épaulard. Voyez ce mot.

DORSTENIA : voyez à l'article CONTRA-YERVA.

DOTRALE ou DOTERELLE DES ANGLOIS , *Morinellus Anglorum*. Oiseau que plusieurs Ornithologistes croient être de la même espèce que le *Guignard*, qui est une sorte de *Pluvier* ; voyez ces mots. Parmi les dotrales, les mâles, dit Wilughby, sont plus petits que les femelles ; mais ils se ressemblent si exactement par les couleurs & par le port extérieur, qu'il n'est presque pas possible de les distinguer. Cet oiseau est fort paresseux ; lorsqu'on a tendu des filets pour le prendre, il faut l'y conduire en choquant deux pierres l'une contre l'autre : au premier bruit il semble s'éveiller, il étend une aile & une patte. Les Chasseurs par un préjugé assez ridicule, sont dans l'usage d'imiter alors les mouvemens de cet oiseau, en étendant un bras ou une jambe : mais il n'y a pas lieu de croire que ce jeu rende la chasse plus facile ou plus abondante.

DOUBLE C. C'est un papillon fort connu des Naturalistes, ou sous ce nom, ou sous celui de *Delta*. Ce papillon a quatre pieds, les jambes blanches ; les premières ailes sont en angles, fauves & tachetées de noir ; les secondes ailes sont marquées d'un V blanc : on le trouve sur l'ortie & autres plantes sur lesquelles la chenille de l'ortie se nourrit.

On donne aussi le nom de *double U* à un phalène, ou papillon nocturne, dont les antennes sont blanches & dentelées dans les mâles, & sétacées dans les femelles ; ses élytres sont applaties. La chenille de ce papillon est d'un verd jaunâtre, & se trouve communément dans les jardins.

DOUBLE FEUILLE, *Ophris bifolia*. Plante qui croît le long des vallées humides. Sa tige est haute de quatre à six pouces, ronde, portant en son milieu seulement deux feuilles opposées l'une à l'autre, & semblables à celles du plantain. Les fleurs qui naissent au sommet de la tige, sont, suivant M. de Tournefort, d'un verd blanchâtre, composées chacune de six feuilles, cinq disposées en coëffe dans la partie supérieure, & une sixième qui occupe le bas de la fleur, & qui représente en quelque sorte un corps humain. Le calice de la fleur se change en un fruit relevé de trois côtes, & qui contient des graines semblables à de la sciure de bois. Cette plante est vulnérable, détersive. On distingue une deuxième espèce d'*ophris* qui porte trois feuilles.

DOUBLE MARCHEUR, *Amphisbæna*. On donne ce nom à six espèces principales de Serpens, qui ont été nommées *Serpens à deux têtes*, quoiqu'ils n'en aient qu'une, mais à cause de l'égale grosseur de leurs extrémités. En effet, leur queue est obtuse ; tellement arondie par le bout, & extérieurement si conforme avec la tête, qu'on ne peut à la simple vue discerner, d'une manière distincte, quelle partie est la tête ou la queue ; c'est la même difficulté qu'on rencontre dans les vers de terre.

L'*Amphisbæne* marche en avant & en arrière, comme une écrevisse ou le ver de terre. Il est comme imbécille : il a les ouïes si larges qu'elles lui couvrent, en quelque sorte, les yeux & le rendent presque aveugle : c'est par

sa manière de ramper , tantôt par un bout & tantôt par l'autre , qu'on l'a nommé *double marcheur*. Les segmens des anneaux de cet animal sont semblables à ceux des vers. Sa queue est très forte : il se nourrit de fourmis , de limaçons , & principalement de vers. Quoique M. Linnæus dise que cette sorte de Serpent manquant de dents canines ou molaires , sa morsure ne doit point être dangereuse ; cependant les Portugais disent qu'il mord d'une manière assez vénémeuse , pour causer d'abord une douleur semblable à la piquûre d'une abeille ; ensuite une inflammation semblable à celle que cause la morsure de la vipere , & enfin qu'il en résulte la mort. Les six espèces d'*Amphisbenes* sont :

1°. Celui de Ceylan , qui est couvert de petites écailles rousses , oblongues , jaspées de noir. Les écailles de sa tête sont grandes , faites en forme de cœur , & d'un jaune clair. Ce Serpent a un odorat très fin ; ce qui lui est fort utile pour chercher sa nourriture.

2°. Celui d'Amboine , à peau émaillée , d'un rouge clair-cendré , orné de petites raies blanches & irrégulières. Ses yeux sont très petits & couverts d'une membrane : on remarque cet anneau blanc autour de la tête.

3°. Un autre *Double marcheur* d'Amboine , à écailles rouges. On ne découvre dans sa tête ni yeux ni narines ; mais elle est ornée d'une crête brunâtre , tachetée de blanc.

4°. L'*Amphisbene* , qu'on rencontre par toute la terre , & particulièrement dans la Lybie , dont le corps est en partie jaune , en partie rouge , marqué de blanc ; ses marbrures & sa grosseur varient suivant les divers pays.

5°. Le *Double marcheur* d'Amérique , qui est grêle de corps , long de taille , couvert d'écailles blanchâtres par tout le corps , & qui est orné , par intervalles réguliers , de bandes d'un beau bleu Turquin.

6°. Le *Double marcheur* du Brésil ; qui est d'un rouge de corail : on le nomme *Petola*. Ce Serpent est magnifique : il a le corps couvert d'écailles rhomboïdales , qui sont d'un rouge incarnat ; les angles inférieurs des écailles sont vergetés de taches ponceau. Le ventre est d'un jaune safrané : toutes ces écailles jettent un admirable éclat.

On donne encore le nom d'*Amphisbene* à plusieurs autres Serpens , qui sont effectivement des *Doubles marcheurs* & des Serpens aveugles , *Cæcilia* , & qui ne diffèrent des précédens que par les couleurs. Les anneaux , qui sont autour du corps & de la queue , sont conformés de même. Nous bannissons tout ce que l'enthousiasme a fait dire de merveilleux aux Voyageurs au sujet des *Amphisbenes* : il suffit d'ouvrir les Ouvrages de Ruïsch , de Seba , &c. pour y reconnoître la Fable.

DOUCE AMERE ou VIGNE SAUVAGE , *Dulcamara*. Cette plante , qui croît aux lieux aquatiques , le long des ruisseaux & des fossés , est encore connue sous le nom de VIGNE DE JUDÉE ou de MORELLE-GRIMPANTE , *Solanum scandens*. Sa racine est petite & fibreuse : les branches sont grêles ,

longues de cinq à six pieds , & grimpantes sur les haies ou sur les arbrisseaux. Dans les jeunes branches l'écorce est verte ; dans les vieilles , elle est gersée & cendrée , & d'un goût doux & amer , d'où lui vient son nom de *Dulcamara*. Son bois renferme une moëlle fongueuse & cassante. Ses feuilles sont oblongues , lisses , pointues & rangées alternativement le long des branches ; assez semblables à celles de la Morelle ordinaire , de couleur verte-brune , d'une saveur fade , & d'une odeur narcotique. Ses fleurs sont petites & naissent en bouquet , d'une odeur disgracieuse , mais assez agréables à la vue. Chacune de ces fleurs est une rosette découpée en cinq parties. A ces fleurs succèdent des baies ovales , molles , succulentes , rougeâtres , visqueuses , d'une saveur vineuse , & contenant plusieurs semences applaties & blanchâtres.

Cette plante est diurétique , anodine , dissout le sang extravasé & grumelé dans les viscères , & purge quelquefois violemment par les selles & par les urines qu'elle rend noires. Les Dames de Toscane employoient autrefois le suc des grains de cette plante , pour se farder & pour enlever les taches du visage. *Voyez MORELLE.*

DOUCETTE. Nom que l'on donne , ainsi que celui de *Bourslette* , à la *Mâche* que l'on mange en salade. *Voyez MACHE.*

DOUROU. *Voyez VOADOUROU.*

DOUVE. Est une espèce de Renoncule de prés , qui est mortelle à tous les bestiaux , particulièrement aux moutons qui en mangent. *Voyez à l'article RENONCULE.*

DRACONCULE , *Draconculus*. Poisson épineux de la Méditerranée ; que les Languedociens nomment *Poisson lézard* , à cause de sa ressemblance avec le Lézard de terre. Sa tête est applatie : il rejette l'eau par des trous qui lui servent peut-être de narines. Ses nageoires sont longues & de couleur d'ormêlée d'argent. Sa peau est fine & marquetée de différentes couleurs : son ventre est large , plat & blanc : sa chair est semblable à celle des petits Goujons. La dernière nageoire du dos a cinq pointes faites comme cinq épis d'orge ; mais la piquûre n'en est pas si dangereuse , que celle de l'Araignée de mer.

DRACONCULE : *voyez DRAGONNEAU & CRINONS.*

DRACONITES : *voyez PIERRE DE DRAGON.*

DRAGÉES DE TIVOLI, *Confetti di Tivoli*. En Histoire Naturelle , on donne ce nom à des concrétions poreuses , de la nature des *Stalagmites*. *Voyez ce mot.* Les dragées de Tivoli sont de petits grains arrondis , qu'on trouve dans les antres souterrains par tous pays , & notamment aux environs de Tivoli : ils sont blancs , & paroissent souvent comme vernissés.

DRAGON , *Draco*. Il n'est pas encore bien décidé si cet animal , dont il est fait mention dans toutes les langues Orientales , &c. existe ou non. Les descriptions ridicules , d'ailleurs si peu constantes , qu'en ont fait la plupart

des Auteurs , donnent tout lieu de croire que c'est un être imaginaire. Si nous en croyons certains Ecrivains , le Dragon habite par toute la terre , & la maniere pompeuse avec laquelle il se présente sur le théâtre des animaux , est digne de curiosité ; il est décrit , tantôt comme un animal à figure humaine avec un beau visage , & qui ne se nourrit que de plantes venimeuses : (tel étoit , dit l'Auteur *de naturâ rerum* , cité par Ruifch , l'animal qui séduisit Adam & Eve) ; tantôt on le représente ayant la figure d'un cochon , le corps menu , le bec fort , les dents de sanglier , les yeux aussi brillans qu'une pierre précieuse ; tantôt comme un volatile ornithophage , moitié aigle , & moitié louve , & qui est engendré par l'accouplement de ces deux animaux ; tantôt comme un serpent ennemi de l'éléphant , & capable d'infester par son haleine un très grand athmosphère ; tantôt enfin comme un animal crêté & bigarré , de cent quarante coudées de long , qui ne se couche que sur l'or , & qui tue par sa vue perçante. Voilà une ébauche du merveilleux qu'on lit dans les Auteurs. Il paroît qu'il faut ranger le Dragon sur la ligne de l'*Argus* à cent yeux , de l'*Hydre* à cent têtes , & du *Cerbere* , portier de l'Enfer à cent gueules. Disons cependant qu'on a peut être donné indistinctement le nom de *Dragon* aux animaux monstrueux du genre des serpens , des lézards , des crocodiles , que l'on a trouvés en différens tems , & qui ont paru extraordinaires par leur grandeur ou par leur figure. On ne fait pas à quel degré d'accroissement un reptile peut parvenir ; s'il reste ignoré dans sa caverne pendant un très long-tems , sa figure doit changer avec l'âge , & dans la suite des générations il se trouve assez de difformités & de monstruosités pour faire un dragon d'un animal appartenant à une espece ordinaire. Par conséquent les dragons sont fabuleux , si on les donne comme une espece d'animaux constante dans la nature ; mais il pourroit avoir existé des *Dragons* si on les regarde comme des monstres , ou comme des animaux parvenus à une grandeur extraordinaire pour leur espece.

Laissons de côté toutes ces suppositions , & exposons d'après quelques Historiens ou Voyageurs dignes de foi , ce qu'on entend par *dragons ailés* , & *dragons de mer* , &c.

DRAGON. En Astronomie on donne ce nom à une constellation de l'hémisphère septentrional , composé selon Ptolomée de 31 étoiles. *Voyez Etoiles* à la suite du mot PLANETTE.

DRAGON AILÉ , *Draco volans*. On donne ce nom à une sorte de lézard ailé comme une chauve souris , qui a quatre pieds & qui se cache dans des antres. Nicolas Grimmius en a dessiné un dans les Indes , & il paroît par la description qu'en donne Ray , que c'est un lézard volant ; que cet animal se perche sur les branches des arbres fruitiers , & se nourrit de fourmis , de mouches , de papillons & d'autres plus petits insectes ; mais qu'il ne fait aucun mal , ni aux autres especes d'animaux , ni aux hommes. Il reste à savoir si le lézard volant est le même que le serpent volant. M. Linnaeus croit que le dragon volant de Séba , est le lézard volant d'Afrique.

Selon ce Naturaliste , le dragon volant a sous le gozier deux especes de vessies jaunâtres , & qui s'enflent quand il vole ; ses ailes sont composées de six rayons , fort semblables aux nageoires d'une grosse perche , & éloignés de ses bras ; elles sont attachées à ses cuisses & occupent le côté du bas ventre : il a les pieds garnis de cinq doigts inégaux , & dont les ongles sont aigus & crochus ; la queue de cet animal paroît comme articulée , & moins longue que son corps , elle est couverte d'écaillés carinées , imbricées & en forme d'angle : celles du corps sont obtuses ; sa couleur tire sur le bleu avec des raies noires : son col est chargé de rugosités , & d'une espece de capuchon cartilagineux , qui fait l'office d'une vessie aérienne. En effet l'animal peut l'emplir d'air à volonté , soit pour s'aider à voler , ou pour s'empêcher de trop enfoncer dans l'eau , il peut pareillement en retirer l'air , & se plonger s'il veut au fond de l'eau ; excepté le capuchon , la tête de ce dragon ressemble à celle des lézards. Les trous des oreilles sont ronds & concaves , ceux des narines sont convexes ; on remarque proche des yeux une verrue calleuse , & à côté de la gueule , une crête partagée en quatre : quelques Auteurs prétendent que c'est là le vrai *bastin* .

Quoi qu'il en soit , Séba dit que cet animal vit également dans l'eau & sur la terre , qu'il peut nager & voler , qu'il arrange , ramasse , ou déploie ses ailes , selon les divers besoins : on voit très peu de dragons volants en Europe. Nous n'en avons vu qu'un dans tous nos voyages : c'étoit dans un cabinet de curiosités naturelles en Hollande. Séba donne la description de trois especes différentes , qui se trouvent , dit-il , en Amérique & en Afrique.

DRAGON DE MER , *Araneus piscis*. Cet animal qui est la *Vive des François* , est un poisson de mer à nageoires épineuses , que l'on pêche dans la Méditerranée & dans l'Océan. Celui de la Méditerranée n'est pas plus grand que la paume de la main ; celui de l'Océan a jusqu'à la longueur d'une coudée ,

Ce poisson est long , & serré depuis la tête jusqu'à la queue : le sommet de sa tête va de niveau avec son dos : sa bouche est fort grande ; étant fermée , elle paroît pointue : la mâchoire inférieure est beaucoup plus longue que la supérieure ; il a une infinité de petites dents , tant aux deux mâchoires , qu'au palais & à la langue : ses deux narines sont placées sur le sommet de la tête , & munies d'un petit aiguillon ; ses yeux sont d'un beau verd , situés aussi sur le haut de la tête , assez voisins l'un de l'autre , & couverts d'une membrane : ils paroissent sortir de la tête ; l'iris est de couleur d'or , les orbites sont grands & munis de deux aiguillons : la membrane des ouies est composée de six arrêtes larges : la couleur du dos est plus obscure que celle du ventre qui est blanche : les nageoires du dos sont sillonnées dans toute leur longueur , & tout le corps est marqué de lignes obliques : l'animal a les flancs serrés , le ventre un peu en forme de faux , sa queue est fourchue , mais étant étendue , elle paroît égale. Ce poisson a en tout huit nageoires ,
dont

dont deux au dos , autant à la poitrine & au ventre , une à l'anús & une à la queue.

Toutes ces nâgeoires , quoique cartilagineuses , sont très fortes , pointues comme une alêne , cependant rudes & rameuses depuis le milieu jusqu'au bout. Indépendamment de petits aiguillons que ce poisson porte aux orbites des yeux , il a sur la tête un autre aiguillon fort & pointu.

Ce poisson a communément huit à dix pouces de long , ou la grandeur d'un maquereau ; sa chair est tendre , blanche , ferme , courte , d'un très bon goût , & facile à digérer ; sa peau est dure & sèche. On en pêche beaucoup dans les mois de Juin & de Juillet : lorsqu'il se sent pris , il devient fort agile , & tache de se cacher dans la bourbe.

Les Pêcheurs Hollandois portent au marché une grande quantité de ce poisson ; le peuple de ce pays en fait en partie sa nourriture , & lui donne le nom de *Picterman* , qui signifie *Homme de pierre* : ils donnent aussi ce nom à tous les poissons armés d'aiguillons. Les mêmes Pêcheurs disent qu'une certaine humeur qui sort des arrêtes tranchantes de la première nâgeoire du dos de la vive , est un poison. Cet animal , pour la façon de vivre , & la pointe venimeuse , ressemble assez au scorpion.

On prétend que les Anciens n'ont nommé ce poisson *dragon* , qu'à cause de ses grands & beaux yeux , & de la piquûre de ses aiguillons , qui est très dangereuse , sur tout de ceux qui sont au haut du dos : c'est pourquoi les Pêcheurs & les Poissonniers ne manient le dragon de mer qu'avec précaution ; ainsi que les Cuisiniers ; & on le sert souvent sur les tables la tête coupée. Ces aiguillons sont la seule défense de la Vive contre les Pêcheurs. S'ils en sont piqués , la partie s'enfle , & la tumeur est accompagnée ordinairement d'inflammation , de douleur & de fièvre. Ces aiguillons n'ont pas même perdu tout leur venin , quand l'animal est mort ; & quand par hazard les Cuisiniers en sont piqués , il leur arrive presque les mêmes accidens , que si l'animal eût été vivant. C'est encore d'après cette singulière propriété , qu'il est ordonné par les Reglemens de Police aux Pêcheurs & aux Marchands de poisson de les couper.

Selon Lemery , le remede à ce mal consiste à se servir de matieres âcres & volatiles , &c. comme d'esprit-de-vin , d'un mélange d'oignons & de sel , ou bien de la chair même de la Vive. Selon M. Andry , il faut appliquer sur la blessure le foie écrasé de l'animal même.

DRAGON DE MURAILLE. Les Chinois donnent ce nom à une espèce de lézard qui court sur les murailles ; ils lui ont donné aussi le nom de *Ga de du Palais* , ou de *Dame de la Cour* , parceque l'usage des Empereurs Chinois est de faire oindre le poignet de leurs concubines d'un onguent composé de la chair de cet animal & d'autres ingrédiens. Cette marque , disent-ils , dure tant que leurs concubines ne reçoivent pas les caresses d'un autre homme ; mais aussitôt qu'elles oublient leur devoir , le signe de fidélité disparaît , & leur incontinence est découverte.

DRAGON VÉGÉTAL. Arbre des Indes qui porte le *Sang de dragon*. Voyez ce mot.

DRAGONNEAU ou **DRACONCULE.** Les Médecins donnent ce nom à un petit animal qui a la figure & la tortuosité d'un petit serpent ou d'un petit ver capillaire, cependant long & large, qui se met entre cuir & chair, particulièrement aux jambes & aux muscles du bras. Ceux qui habitent les pays chauds sont fort sujets à être incommodés de cet animal, qui leur paroît sur-tout sous la peau des côtes. On prétend que l'Empereur Henri V est mort de la maladie des *draconcules*. Nous avons parlé du dragonneau à l'article *Crinons* : voyez ce mot.

DRAP D'OR & DRAP ORANGÉ. On donne chacun de ces noms à deux sortes de coquillages univalves, dont le compartiment est ou doré, ou formé de grandes taches & de lignes aurores sur un fond blanc. On apperçoit dans les fascies du drap d'or une nuance bleuâtre. Selon les observations de M. Adanson, il paroît que ce coquillage est *operculé*, & du genre des *Rouleaux*. Voyez ce mot.

DRAPIER. Voyez **MARTINET PÊCHEUR.**

DRAVE, *Draba*. Plante fort commune sur les bords des chemins du Languedoc & des autres pays chauds. On la regarde comme une sorte de *Passerage* : elle est haute d'un pied ; sa tige est ferme, cannelée & rameuse ; ses feuilles sont oblongues, grisâtres & dentées ; ses fleurs sont petites, attachées à des ombelles, & disposées en croix. Il leur succede un fruit formé en petit cœur, rempli de semences menues, rousses & âcres. La racine de cette plante est petite, ligneuse & blanchâtre. La Drave est incisive & carminative.

DRENTE. Nom donné à la *grande grive du Gui*. Voyez ce mot.

DRIFF. La plupart des Alchymistes ont donné ce nom à la fameuse pierre de Butler, si vantée par Van Helmont ; on la nommoit aussi *Periapton salutis magneticum*, & on la regardoit comme propre à attirer le venin : on a poussé le merveilleux jusqu'à prétendre qu'il suffisoit de goûter cette pierre du bout de la langue pour être guéri des maladies les plus terribles : cette pierre étoit, dit-on, composée d'urine humaine, de sel marin & de vitriol cuivreux empâté avec de la colle de poisson. *Woit* (*gazophylacium physico-medicum.*)

DROGUIER. C'est une collection de différentes substances de la Nature, dans les trois règnes, *Minéraux, Végétaux & Animaux*. Le Naturaliste, dans ses excursions philosophiques, ramasse toutes les différentes productions naturelles ; il les étudie pour les distribuer par classes, ordres, genres & espèces ; il présente tous ces trésors exotiques ou indigènes à la Pharmacie, à la Chymie, à la Teinture, à la Peinture, à l'Orfèvrerie, à tous les Arts & à toutes les Sciences. C'est dans le Cabinet du Naturaliste, qu'on voit les échantillons de ce que les hommes peuvent recueillir, échanger, fabriquer & mettre en œuvre, comme aussi de routes les falsifications qu'on

y peut faire ; en un mot , on y trouve la matiere du commerce & de l'industrie. Un Droguier bien composé satisfait aux besoins & à l'agrément de la vie , en instruisant des particularités de chaque pays. Tel est le motif qui engage maintenant les Grands à avoir des Drogiers. M. l'Abbé Pluche dit à ce sujet , que plus les Princes possèdent les détails de ces sortes de collections , plus ils se montrent au fait des intérêts & des travaux de la société qu'ils gouvernent. On appelle *drogue* toutes les épices & autres matieres qui servent à la Médecine & aux Arts. *Voyez* ÉPICERIES.

DROMADAIRE. *Voyez* à l'article CHAMEAU.

DRONTE. Espece d'autruche des Indes Orientales , qui habite ordinairement dans l'Isle Maurice , si renommée par le beau bois d'ébene qui en vient. Cet animal est fort stupide : sa grandeur & sa figure tiennent du coq d'Inde & de l'autruche : sa tête est longue , grosse & difforme , couverte d'une peau en forme de capuchon : ses yeux sont noirs & grands : son bec est très long , gros , robuste , pointu & crochu , de couleur d'un bleu pâle : son col est grand , gros & courbé : le corps gros & rond , couvert de plumes grises , comme celui de l'autruche : ses jambes sont grosses , courtes & jaunâtres : il a quatre doigts & marche lentement : sa chair est grasse , & si nourrissante , que trois ou quatre drontes fussent pour rassasier cent personnes. On trouve communément des pierres dans l'estomac de cet animal.

DRUSE , *Drusen*. Nom Allemand , qui signifie *glande* ; & que les Naturalistes François commencent à adopter pour désigner des groupes ou amas de cristallisations , soit minérales , soit spathiques , &c. qui tapissent les cavités des filons.

Les Mineurs entendent aussi par ce mot , des filons poreux , spongieux & dépourvus de la matiere métallique , qu'ils ont perdue , soit par l'action d'un feu souterrain , soit par des dissolvants , &c. La rencontre de ces *druses* déplaît infiniment aux Mineurs ; ils prétendent qu'elle leur annonce que le filon va devenir moins riche , joint à ce qu'ils s'attendent à trouver peu après un roc vif très difficile à percer : *Voyez* l'article FILONS.

DRYINUS. C'est un serpent d'Amérique & qui se trouve aussi aux environs de Constantinople. Il est ainsi appelé du mot grec *Δρυινος* ; qui signifie *Chêne* , parcequ'il a la couleur de cet arbre , & qu'il se cache dans le creux du chêne. Ce serpent est de la longueur & grosseur d'une médiocre anguille : il a un regard affreux : sa tête est fort joliment marquée : sa gueule est armée de dents pointues : le dessus de son corps est couvert de grandes écailles , qui vont en rond , dont chacune est barrée de raies rouges. Dès que quelque animal ou quelque homme le touche , il jette une certaine liqueur , extrêmement puante , d'une odeur pareille à celle des tanneries. Quand le Dryinus a fait cette évacuation , il est moins dangereux. Il mord ordinairement au talon & au pied : ceux qui en sont mordus deviennent tout défigurés , & meurent en langueur , exhalant de tout leur corps une puanteur insupportable. Le remède à sa morsure est le même que pour celle de la vipere ,

c'est-à-dire, l'usage de l'*alkali volatil*. Le Dryinus se retire aussi dans les prés humides, où il se nourrit d'espèces de sauterelles & de petites grenouilles.

DUB. Sorte de lézard, non venimeux, qui se trouve dans les déserts de la Lybie, en Afrique : il a un pied & demi de longueur & trois pouces de largeur. L'eau le fait mourir. Il fait des œufs semblables à ceux du crapaud. Les Arabes le mangent rôti : sa chair a le goût de la grenouille. Ce lézard est fort dispos, & si fort, que lorsqu'il a la tête dans un trou, quoique sa queue demeure dehors, il est impossible de l'en arracher, quelque effort que l'on fasse ; les Chasseurs, pour l'en retirer, sont obligés d'agrandir ce trou avec un hoyau. Au bout de trois jours qu'on l'a tué, si on le met auprès du feu, les parties de son corps remuent comme si l'animal expiroit.

DUC, *Bubo*. Oiseau de nuit, que Linnæus met à la tête des oiseaux de proie. On distingue plusieurs espèces de *Ducs*, dont le caractère est d'avoir trois doigts en devant & un par derrière ; le dernier est tourné en arrière : la superficie du bec, depuis la base jusqu'à la pointe, est crochue : les narines sont couvertes de plumes qui ont la rudesse du poil : il n'a point autour du bec le *cera* de la plupart des oiseaux de proie.

La première espèce est le *grand Duc* : c'est une sorte de hibou, très fort, le plus grand des oiseaux nocturnes, qui fait beaucoup de dégât parmi les corneilles, & qui l'hiver passe souvent la nuit sur les toits des greniers. Il chasse si adroitement, que, sans faire un bruit sensible ; il assemble en une nuit une proie très considérable, soit d'oiseaux, soit de petites bêtes à quatre pieds. On en distingue de trois sortes, moins par la taille, qui est égale, que par le plumage, dont les couleurs sont assez différentes. Le premier a la tête comme celle d'un chat : son cri semble exprimer un animal souffrant ; c'est pour cette raison qu'en France nous l'appellons *chat-huant*, c'est-à-dire, *chat-plaintif*. Il a des plumes noirâtres, qui s'élèvent de trois doigts au-dessus des oreilles, & en manière de cornes. Le deuxième diffère du précédent par ses jambes, qui sont couvertes de plumes duvetées jusqu'à l'extrémité des doigts, qui sont aussi plus petits : tout le champ de son pennage est fauve. Le troisième a les jambes moins velues, & les serres plus foibles.

Le grand duc ne fait pas seulement sa retraite dans les sombres cavernes des montagnes & des rochers, mais aussi dans les arbres creux, dans les édifices ruinés & dans les mazures abandonnées, sous les toits des grandes maisons, dans des trous de tours & de murailles, enfin dans les lieux peu fréquentés par les hommes : c'est-là où cet animal dépose ses œufs.

La deuxième espèce est le *moyen Duc*, qui est encore un *chat-huant cornu* ou *hibou cornu*. On en distingue aussi de deux sortes ; la première a le champ du pennage plus cendré & plus blanchâtre ; l'autre est plus fauve ; & d'une couleur de rouille plus lavée : leur tête est chamarée & ronde, de même que dans tous les oiseaux qui ne butinent que la nuit : les oreilles sont composées de deux cornes de plume : toute la face, depuis

les sourcils jusqu'aux naseaux, & tout ce qui est autour des yeux & du bec, est orné & environné de petites plumes, déliées comme des poils : cette forte de collet ou de couronne de plumes est ou fauve ou d'un cendré blanchâtre : les yeux sont grands, la prunelle noire, le tour jaune : le bec, d'un brun noirâtre ; mais moins courbé que celui du *hibou* : les plumes du vol sont grandes & jaspées ; celles de la queue ne s'étendent pas beaucoup au-delà du vol : les serres sont longues & robustes, garnies de beaux ongles noirs, aigus & courbés ; les jambes fortes : ceux qui sont jaunes ou fauves, les ont, ainsi que les griffes, couvertes de plumes velues jusqu'au-dessus des serres.

La troisième espèce est le *petit Duc, Scops*. Il est plus petit que le *hibou* & la *huette* : il a le pennage, les cornes, le génie & l'inclination du *grand duc*, dont il ne semble différer que par la petitesse. Le champ du plumage des différentes espèces de *ducs* est orné de taches assez constantes, la couleur du pennage intermédiaire ne l'est pas moins.

On se sert de cette sorte d'oiseau de proie, qui est fort commun en Italie, pour attirer des oiseaux : on le pose sur une perche près de quelque arbre isolé, & voisin d'une fenêtre, d'où l'on tire facilement sur les oiseaux, qui viennent en foule pour faire la guerre à leur ennemi commun.

DUNES. C'est ainsi qu'on nomme des hauteurs détachées les unes des autres, ou petites montagnes de sable, qui se trouvent accumulées le long d'une côte sur le bord de la mer.

DURION, *Durio*. Grand arbre des Indes en Malaca, dont le bois est fort & solide, couvert d'une écorce grisâtre, très rameux & garni de feuilles larges de deux pouces & longues de six doigts, fort dentelées & de couleur rousse : sa fleur est d'un blanc-jaunâtre : les habitans l'appellent *Buaa*. A cette fleur succède des fruits gros comme un melon, couverts d'une écorce ferme, sillonnée comme celle du melon, mais hérissée de forts piquants. Ce fruit est intérieurement divisé en quatre cellules, qui contiennent chacune, dans trois ou quatre autres réceptacles, des amandes ou fruits fort blancs, de la grosseur d'un œuf de poule. Ces fruits paroissent d'abord désagréables au goût à ceux qui n'en ont pas encore mangé, & d'une odeur d'oignons pourris ; mais après s'y être accoutumé, on trouve que le goût en est exquis. Les Indiens appellent cet arbre *Baian*, & son fruit *Duryaoen*. Ils estiment ce fruit apéritif, carminatif & sudorifique. Quand ils craignent d'en avoir trop mangé, ils mâchent du *bétel*, pour prévenir l'indigestion.

DUSCHAL. Espèce de liqueur vineuse dont on use en Perse : elle ressemble à du sirop, & elle en a la consistance : on la fait avec du moût de vin : quelquefois on l'évapore jusqu'à siccité, afin d'en rendre le transport plus facile ; & quand on veut en faire usage, il suffit d'en dissoudre un peu dans de l'eau mêlée avec un peu de vinaigre ; alors on a une boisson qui est, dit-on, très propre à apaiser la soif, & sur-tout très commode dans un pays où l'usage du vin est défendu. *Diction. de Hubner. Voyez l'article VIN, à la suite du mot VIGNE.*

DUTROA ou **DATURA**. Plante dont la graine cause une joie insensée, qui fait perdre la raison & la mémoire. *Voyez* à la suite de l'article **POMME ÉPINEUSE**.

DUVET. On appelle ainsi la plume menue & chaude qui couvre tout le corps de l'oiseau & qui le garantit du froid. Le duvet du gerfaut & celui du canard d'Islande (canard à duvet) portent le nom d'*Earedon* ou d'*Aigledon*. Le duvet d'autruche est de deux espèces : l'un, qui est fin, & se nomme *Poil d'Autruche* ; l'autre, qui est gros, n'est que les petites plumes de cet oiseau que les Plumassiers frisent avec le couteau : *voyez* **AUTRUCHE**. On dit aussi le *duvet* d'une plante : *voyez* à l'article **PLANTE**.

DYTISCUS. On donne ce nom à un genre d'insectes, nommés en françois *Scarabees d'eau*, dont le caractère est d'avoir le plus souvent des antennes sétacées & des pieds propres à nager & sans poils.



E A U

EAU, *Aqua*. C'est un corps sans couleur, transparent, volatil, rarescible, insipide, inodore, qui a la propriété de mouiller tout ce qu'il touche, & qui est ordinairement fluide.

Du moins, telles sont les propriétés de l'eau pure; car nous verrons plus bas, que la Nature nous présente quelquefois de l'eau chargée de matières étrangères qui lui donnent de l'odeur, de la couleur, de la saveur, & que l'eau est quelquefois aussi dans un état de solidité.

Différences des Eaux.

Leurs différences sont d'être froides ou chaudes, simples ou composées, concrètes ou liquides.

Il paroît hors de doute, que l'état le plus naturel de l'eau est d'être froide & fluide, & que ce n'est que par accident qu'elle devient chaude, ou qu'elle se trouve dans un état de solidité.

Dans le premier cas, on l'appelle *Eau thermale*; dans le second, elle prend le nom, ou de *Glace*, ou de *Neige*, ou de *Grêle*. On compte presque autant d'espèces d'eaux, qu'il y a de matières que l'eau peut tenir en dissolution, soit par elle-même, soit au moyen de quelque corps qui serve d'intermède. Sous ce rapport, les eaux sont, ou savonneuses, ou sulphureuses, ou bitumineuses, ou alumineuses, ou vitrioliques, ou muriatiques, ou minérales métalliques, c'est-à-dire, piriteuses, ainsi qu'on le verra par les détails suivans.

Nous suivrons ici la division générale des eaux, qu'on lit dans notre Minéralogie : nous les considérerons comme simples, ou comme composées.

Eaux simples.

Comme *eaux simples*, elles sont réputées ne contenir aucunes substances étrangères à celles qui constituent l'élément aqueux : mais les Chymistes, en les analysant, ont toujours trouvé quelque résidu salin ou terreux, &c. qui fait conclure que la simplicité qu'on leur attribue, est une simplicité purement relative. MM. Boerhave & Marcgrave ont aussi prouvé que l'eau la plus pure en apparence, à l'odeur & à la saveur, donnoit encore, après la distillation la plus scrupuleusement cohobée, des parties hétérogènes. Mr. Hartsoëcker a également observé qu'une eau de fontaine très limpide, exposée à l'air, est remplie d'une infinité d'animaux, avec lesquels ceux de l'air s'accouplent & multiplient prodigieusement en très peu de tems, & deviennent ensuite de petits insectes volants. Vanhelmont rapporte, & c'est un fait très connu à présent, que l'eau la plus pure dont on approvi-

flonne nos navires, éprouve sous la ligne une véritable putréfaction; qu'elle devient rousâtre, ensuite verdâtre, & enfin rouge: que dans ce dernier degré d'altération elle répand une puanteur insupportable, & qu'elle se rétablit ensuite d'elle-même en peu de jours.

Les *eaux simples* sont les plus communes, & ne pèsent que soixante-dix livres par pied cube: elles sont ou aériennes ou terrestres.

Les *eaux de l'air* sont, ou fluides, comme la pluie, ou congelées, comme la neige & la grêle: elles défalèrent peu les animaux; mais elles conviennent merveilleusement à la végétation. La *pluie* tombe en gouttes plus ou moins grosses, & avec plus ou moins de fréquence; elle forme les mares, les citernes & plusieurs lacs: voyez *PLUIE*. Celle de tempête est fort grosse: la pluie fine donne la bruine. Ces eaux, après être tombées sur la terre, coulent dans les ruisseaux, les rivières & dans la mer, d'où elles sont enlevées de nouveau dans l'atmosphère, & donnent en retombant les météores connus sous les noms de *Brouillard* & de *Rosée*: voyez ces mots.

Les *eaux du ciel congelées* sont les moins altérables; mais quoiqu'on les emploie, sans inconvénient, dans les Brasseries, on observe qu'en général elles sont mal saines étant fondues: quantité d'habitans du Tirol & de la Suisse en font une funeste expérience: ils prétendent que c'est l'usage d'une telle eau qui leur donne les goîtres auxquels ils sont sujets; & l'on fait que toutes les eaux de la Suisse ne proviennent, pour la plupart, que des neiges fondues. Parmi les eaux congelées, on compte la *grêle*, la *neige*, & les météores connus sous le nom de *Frimat*, de *Verglas*, de *Givre*, &c. Voyez *chacun de ces mots*.

Les *eaux terrestres* sont celles que l'on rencontre tant à la surface qu'à l'intérieur de notre globe: elles sont ou stagnantes, ou coulantes, ou glacées.

L'*eau coulante* est d'un usage indispensable aux divers besoins & agrémens de la vie: c'est la plus saine, la plus savoureuse aux organes du goût, & la plus propre à appaiser la soif de tous les animaux: elle est plus pesante, plus long-tems à s'échauffer, à se refroidir & à bouillir que l'eau céleste. Parmi ces eaux, l'eau de source est la plus claire & la plus légère; on la nomme aussi *Eau de roche*: on ne lui reconnoît de saveur que celle du sol qu'elle arrose dans son trajet souterrain. C'est elle qui forme les fontaines, les puits, les rivières, &c. Ce sont de semblables eaux qu'on distribue, comme à commandement (d'un seul coup de clef), au buffet, à la cuisine, au bassin du parterre, & aux cuvettes du potager.

Il y a des eaux de sources qui coulent continuellement; & d'autres périodiquement, c'est-à-dire, à certains tems de l'année ou de la journée, &c. Il est vraisemblable que la source primitive de ces dernières eaux est dûe à des fontes de neiges opérées immédiatement après que le soleil a paru sur l'horizon du lieu: d'autres sont périodiques irrégulières, & suivent dans leur écoulement les variations du tems. Voyez *ce que nous en disons à l'article FONTAINE*.

L'*eau de puits* est également une eau souterraine, dont l'origine & les propriétés

propriétés paroissent peu différentes de la précédente : il est certain cependant , qu'elle est plus indigeste , & plus propre à donner , par une sorte d'astriktion , ou une autre propriété équivalente , de l'intensité aux couleurs rouges qu'on imprégne sur la toile , le coton , la futaine & autres étoffes. Les Jardiniers se gardent bien d'en employer l'eau sans l'avoir exposée à l'air , à moins que le puits ne soit peu profond : autrement ils feroient périr les racines des plantes. On verra aux articles FONTAINE & MINES , que les eaux souterraines , dont l'existence est généralement connue , se trouvent à toutes les profondeurs de la terre , où il y a de l'air à respirer ; & que les odeurs suaves , qu'exhalent plusieurs d'entre ces eaux , ne proviennent visiblement que de ce qu'elles ont lavé les montagnes , & baigné les prairies dans le tems des fleurs , avant leur infiltration souterraine. M. Leutmann dit que si on filtre de l'eau de puits au travers d'un papier gris , qu'on laisse ensuite fermenter ou pourrir cette eau , & qu'on la filtre de nouveau , elle sera plus pure que si on la distilloit.

L'eau de riviere , qui tire son origine des fontaines , sources & ruisseaux , est souvent impure , sur-tout près des grandes Villes qu'elle a arrosées , ou immédiatement après des orages : elle s'épure ensuite , & devient propre à appaiser la soif , à préparer nos alimens , à blanchir le linge ; elle dissout mieux le savon , nettoie plus à fond le linge ; elle est plus onctueuse ; enfin elle est préférable à toutes sortes d'eaux pour faire presque toutes les couleurs de la teinture.

Les eaux stagnantes sont sans écoulement , elles sont troubles & grisâtres , d'une odeur vappide , & d'un goût bourbeux : elles déposent beaucoup de limon , & elles se corrompent d'autant plus facilement , qu'elles ont déjà un commencement de putréfaction : telles sont les eaux de vivier , de mare ou de marais & d'étang. Ces eaux se dessèchent aisément en été , & se réduisent en une matiere bourbeuse , excepté celle d'abyssine : le fond des eaux bourbeuses & marécageuses , est toujours orné de buissons & de mousses : il est , en outre , la retraite d'une infinité d'insectes , & se change peu à peu en une excellente terre combustible. Voyez TOURBE.

Les eaux de citerne ne sont qu'une eau de pluie , ou de ravine , ramassée dans des trous ombragés , & aussi larges que profonds. Souvent une large citerne reçoit en un instant toute l'eau qu'un orage passager répand sur les bâtimens & dans les cours : la citerne est une ressource , quand la sécheresse tarit les puits & les ruisseaux : cette eau est fort légère & admirable pour les arrosemens : toutes les parties limoneuses que l'eau a balayées dans les cours forment , au fond de la citerne , un sédiment que le Jardinier préfère à toutes les especes de terreaux : la citerne est en cela une espece de mare. Voyez CITERNE.

Les eaux des lacs sont ou stagnantes , ou en partie coulantes & en partie stagnantes : leur pesanteur & leurs propriétés générales tiennent le milieu entre ces deux especes d'eaux. On remarque souvent des couleurs & des phénomènes extraordinaires dans ces eaux. Voyez l'article LAC.

La *glace* est une eau solide & très poreuse , qui contient beaucoup d'air , & qui a la propriété de réfracter & de réfléchir les rayons de la lumière comme fait un morceau de cristal. Les expériences faites en 1740 , sur la glace , par M. de Mairan , fixent l'augmentation du volume , que l'eau prend en se glaçant , à la quatorzième partie de celui qu'elle avoit , étant fluide. *Voyez le mot GLACE.*

Eaux composées.

On appelle les eaux composées, *Eaux minérales*. Elles sont, ou froides, ou chaudes : ces propriétés leur sont étrangères , & les rendent d'un usage particulier. On ne les rencontre pas par-tout indifféremment : on peut les séparer de leur alliage , soit par l'évaporation ou par la distillation , soit par la filtration ou par la précipitation.

Les *eaux minérales*, froides en été , sont un peu chaudes en hyver , & contiennent alors plus de cet esprit éthéré , que quelques Hydrologistes nomment l'*Ame de l'Eau minérale*.

L'*eau minérale terreuse* est la plus pesante de toutes les eaux , & très propre à former des dépôts , des incrustations & des stalactites ; on l'appelle *Eau pétisante* : telles sont celles d'Arcueil , près Paris ; d'Albert , en Picardie ; de Carlsbad , en Bohême. L'usage de ces eaux est fort suspect pour les personnes sujettes à la gravelle ; & il doit paroître étonnant que le célèbre Hoffman ait regardé celles de Carlsbad comme un lytonpatrique : c'est aux Médecins à prononcer. A l'égard des eaux coulantes qui contiennent des parties sableuses , elles sont pernicieuses pour la fabrique du papier ; elles le font couper dans les replis.

L'*eau minérale ammoniacale* contient un sel urineux & fétide ; elle donne une teinture bleue au cuivre dissous dans l'acide nitreux ; elle purge violemment : il y en a une fontaine près de Francfort sur le Mein.

Les eaux minérales d'*Aïon* sont les plus énergiques entre les eaux purgatives des environs de Londres : elles causent à ceux qui les prennent des douleurs au fondement & dans les intestins : elles sont fort chargées de sels.

L'*eau vitriolique* a un goût astringent : elle s'approprie quelquefois dans la terre une substance argilleuse ; alors elle forme l'eau alumineuse : si elle a rencontré une terre ou pyrite martiale , elle se convertit en une eau ferrugineuse , dont la propriété est de noircir l'infusion de noix de galle & d'autres végétaux astringens , comme aussi de déposer une ochre jaunâtre. Quand l'*eau vitriolique* trouve le moyen d'attaquer du cuivre , elle devient eau cuivreuse ; & alors , lorsqu'on y trempe un morceau de fer , elle abandonne son cuivre , qui se précipite sur le fer avec la couleur rouge qui lui est propre ; cette couleur , qui est l'effet d'un cuivre de cémentation , a fait croire à plusieurs , que la transmutation de ces métaux , l'un en l'autre , étoit constante. On travaille à cette opération pour d'autres vues , dans le Lyonnais , dans l'Irlande , dans la Hongrie , & même dans la Pensilvanie , où l'on a dé-

couvert depuis peu des eaux riches en cuivre : la proportion du vitriol bleu, qu'elles tiennent en dissolution, est d'une once six gros pour pinte, & la source donne sept à huit cents muids de cette eau cimentatoire dans les vingt-quatre heures. Enfin si l'eau vitriolique vient à attaquer du zinc, elle acquiert en même-tems la propriété de colorer en jaune le cuivre : on appelle ces sortes d'eaux, *Eaux cimentatoires*.

L'*Eau muviatique* ou *Eau marine* chargée de sel commun, est la plus abondamment répandue dans la Nature : elle varie en degrés de salûre, en couleur, & en pesanteur dans les différentes contrées de l'Océan : voyez au mot MER : elle pèse ordinairement trois livres par pied cube plus que l'eau simple ordinaire. On trouve en Franche-Comté & dans le Palatinat du Rhin, même en différents autres endroits de l'Europe, des fontaines ou puits, dont l'eau saumâtre est également chargée de sel marin : le sel qu'on en tire est beaucoup plus clair, mais il a moins de faveur. L'espèce de bitume que contient l'eau de la mer la rend amère & impotable : voyez MER.

L'eau *alkaline naturelle* fait effervescence avec tous les acides, & verdir le sirop de violettes : telle est celle de Freyenwald.

L'*Eau qui contient du sel neutre*, telles que sont celles d'Ebshom en Angleterre, & d'Egra en Bohême, ne fait aucune effervescence, soit avec les acides, soit avec les alkalis.

Les *Eaux savonneuses* ou *Eaux sœcites*, ont un œil laiteux, & sont grasses au toucher, comme l'eau lixivielle du savon : on s'en sert en divers lieux d'Angleterre, & même à Acqs, dans le Comté de Foix, pour dégraisser & blanchir les étoffes.

Les *Eaux bitumineuses* sont grasses, volatiles, en partie inflammables, parcequ'elles sont chargées de pétrole : on appelle les sources qui les contiennent, *Fontaines brûlantes*. Il y en a de cette espèce près de Cracovie en Pologne : on en trouve aussi en Suisse, à Tremolac en France, & près d'Edimbourg en Écosse ; leur couleur est fort variée, leur faveur est acide & pénétrante ; elles font mourir tous les animaux qui se trouvent dans les petites rivières où elles se déchargent.

Les *Eaux minérales chaudes*, sont, ou simples, ou composées, plus ou moins colorées, pesantes & limpides : elles ont un degré de chaleur, & contiennent une quantité de matière éthérée, plus ou moins considérable : il s'en trouve cependant dans lesquelles on ne peut reconnoître aucune mixtion, ce qui fait distinguer ces sortes d'*Eaux chaudes*, en *Eaux thermales simples*, & en *Eaux thermales composées*.

Les *Eaux thermales simples* paroissent pures, à l'exception d'une substance éthérée ; elles sont insipides, très légères, & assez spiritueuses pour causer une espèce d'ivresse à ceux qui en boivent quelques verrées : telle est celle de Pfeffer en Suisse. Leur chaleur proviendrait-elle de ce qu'elles coulent sur un lit pierreux, échauffé au-dessous par un lit de matières pyriteuses en décomposition ? Si la pierre, qui sert de sol aux *eaux thermales simples*, est un peu poreuse, il n'en faut pas davantage, pour que les vapeurs des pyrites

y pénètrent & se mêlent à ces eaux , & les rendent un peu vitrioliques , ce seront alors des eaux composées , qui agiront sur l'infusion de noix de galle : **telles sont les eaux de Pise & de quantité d'autres lieux en Italie.**

Les *eaux thermales composées* sont plus pesantes & en bien plus grand nombre que les eaux thermales simples : si elles sont vitriolico-martiales , elles décelent dès leur source les substances minérales ochracées , qui entrent dans leur composition ; ces eaux noircissent beaucoup la teinture de la noix de galle ; telles sont celles de Forges. Si les *eaux thermales* sont sulfureuses , elles auront une odeur de foie de soufre , plus ou moins forte en certains tems de l'année. Leur sédiment , qui est inflammable , forme effectivement , avec le sel de tartre , un *hepar sulphuris*. Ces eaux noircissent l'argent , & ont une couleur de girasol. Le sol , qui sert de lit à de semblables eaux , est toujours plein d'excavations , remplies de belles fleurs de soufre , jaunâtres & inflammables ; elles exhalent en quantité d'endroits des vapeurs nuisibles à la respiration , & on les sent de fort loin ; telles sont les eaux d'Aquazolfà , situées entre Rome & Tivoli.

Une observation importante , & qui est dûe à M. Monnet , nous apprend que presque toutes nos eaux minérales ferrugineuses froides , contiennent du fer le plus pur dans un état de véritable dissolution par lui-même , & sans l'addition d'aucun autre intermede que l'eau même : que cette dissolution faite à froid se colore peu à peu en un pourpre plus ou moins foncé , suivant la quantité de métal qui s'y trouve alors. Si ces eaux minérales viennent à éprouver quelques degrés de chaleur , soit par l'art , soit par la nature , elles se troublent aussitôt , & leur fer se précipite. Les eaux chaudes , c'est-à-dire *thermales* , ne dissolvent & ne peuvent contenir du fer que par l'intervention du vitriol.

La curiosité nous a conduit dans divers lieux où ces sortes d'eaux sourdent. Nous en avons examiné les environs , & nous y avons toujours reconnu , ou des amas de pyrites faciles à se décomposer , ou des terres alumineuses , ou des filons de charbons très sulfureux : nous les avons trouvées communément dans des terrains glaiseux d'une part , poreux & calcaires de l'autre , enfin voisins de montagnes. D'après cette inspection , nous croyons devoir plutôt attribuer les différents degrés de chaleur de ces eaux , à des mélanges de pyrites , qui s'échauffent en se décomposant , qu'à des feux souterrains. L'odeur , le goût & les propriétés qui en résultent , lorsqu'on boit ces eaux minérales , ou quand on s'y baigne , la nature des lieux d'où elles sortent , tout indique la cause de ce phénomène. Les eaux minérales ordinaires peuvent paroître froides à leur issue , & avoir cependant été chaudes dans les souterrains ; tout dépend de la distance qui se trouve entre l'endroit où l'eau a sa source , & celui où réside la cause de la chaleur.

Enfin il y a des eaux colorées de différentes nuances , par diverses matieres qui s'y trouvent accidentellement interposées au moment d'une alluvion un peu considérable , ou d'une éruption souterraine qui s'est faite dans le lieu où elles coulent. Ces eaux imprégnées de corps étrangers qu'elles

entraînent , effrayent beaucoup le peuple , qui croit voir couler du sang , du lait , de l'encre , &c. On sent bien que dans cet état de commotion qui se communique de la terre aux esprits , rien ne doit paroître que sous les idées accessoires les plus terribles , & un rien aide l'imagination à réaliser les chimères les plus extravagantes.

Telle est l'histoire abrégée & particulière des différentes espèces d'eaux les plus remarquables. D'après ces notions préliminaires , il nous reste à considérer l'eau dans ses propriétés générales , dans ce qu'elle peut offrir de plus intéressant , relativement à l'Histoire Naturelle , à la Physique , & aux besoins les plus importants de la vie.

Propriétés générales des Eaux.

On reconnoît toutes les eaux , par leur goût , par leur couleur & leur limpidité , & plus encore par d'autres épreuves inventées à cet effet : les moyens en sont assez différents ; 1°. ou par les sens extérieurs , c'est-à-dire , par la vue , par la faveur , ou par l'odorat ; 2°. par la balance hydrostatique ; 3°. par les épreuves chimiques , dont on voit l'explication dans les Ouvrages des Hydrologistes , dans le Dictionnaire de Chymie , & même dans la Table raisonnée qui se trouve à la fin de la Classe des Eaux , dans la Nouvelle Exposition de notre Regne Minéral. Cette dernière manière de distinguer les eaux est la moins équivoque ; mais il n'en est pas moins vrai que les mélanges qui se trouvent dans cet élément , sont souvent très compliqués & très difficiles à reconnoître.

Une des propriétés physiques de l'eau est de pouvoir augmenter de volume jusqu'à ce qu'elle soit en ébullition : elle peut même être dilatée à un point qui passe l'imagination ; puisqu'une goutte d'eau , exposée à un degré de chaleur un peu plus grande que celle de l'ébullition , occupe , en se convertissant en vapeurs , un espace quatorze mille fois plus grand que celui qu'elle occupoit sous sa forme de liqueur. L'eau n'est point compressible dans son état ordinaire ; mais dans l'état de vapeur , elle devient élastique & compressible. On a fait usage de ce principe dans les pompes à feu , pour épuiser l'eau des mines les plus profondes , & dans plusieurs autres machines ingénieuses. Une partie de la Ville de Londres n'est fournie d'eau que par ce moyen. La plus grande partie de ce qui compose les ballons de fumée , n'est encore que de l'eau en vapeur : c'est sur ce principe que quelques-uns l'ont appliquée à une mécanique fort ingénieuse & curieuse , dont voici l'utilité. On construit , dans la cheminée de la cuisine , une roue , dont les pales sont de toile : la roue est posée horizontalement sur un pivot ; à l'axe de la roue est un pignon à dents , qui , à mesure que les vapeurs du bois en combustion s'élèvent dans la cheminée , fait mouvoir la broche qui y est assujettie par une corde.

La dilatabilité de l'eau produit encore quelquefois des effets plus violents que ceux de la poudre à canon , puisqu'étant enfermée & poussée à une certaine violence de feu , elle brise avec explosion les vaisseaux qui la contien-

ment. L'eau produit encore ce dernier phénomène , lorsqu'elle contient une trop petite quantité de feu , qu'elle perd sa fluidité , & qu'elle se change en glace.

Toutes les especes d'eaux s'échauffent jusqu'au degré d'ébullition : elles ne peuvent outrepasser ce degré , quelque violence de feu qu'on leur fasse éprouver , parcequ'alors elles se dissipent en vapeurs ; cependant elles peuvent bien dans leur expansion , acquérir un degré de chaleur beaucoup plus grand. On fait aussi que dans la machine de Papin l'eau s'échauffe au point de liquéfier le plomb , de ramollir & de dissoudre les os.

La fluidité de l'eau s'accommode à toutes sortes de figures : elle remonte à son niveau dans les siphons qui ne sont pas capillaires. On la voit courir , s'arrêter , s'étendre , se resserrer , s'élancer , & même s'élever à telle hauteur qu'il nous plaît , & permettre qu'un vaisseau la traverse sans obstacle. C'est cette même fluidité ou souplesse de l'eau qui la fait entrer dans les canaux qu'on lui présente , & se répandre dans les jardins , dans les appartements , dans les bassins , & les magasins hydrauliques des Teintureries , des Brasseries , des Tanneries , &c.

On dit qu'elle est poreuse , en ce que d'une part elle transmet la lumière , & que de l'autre elle contient une quantité d'air considérable , qui y est encore sous sa forme d'air élastique : elle est quatorze fois moins pesante que le mercure ; mais elle pèse huit cents quarante fois plus que l'air : elle est plus coulante que l'huile : elle est le dissolvant des sels , &c. Ses parties sont si déliées , qu'elles peuvent pénétrer au travers du bois tendre , du cuir , & d'autres corps où l'air ne peut passer. Tous les bois , de quelque nature qu'ils soient , augmentent de volume & de pesanteur lorsqu'ils sont dans l'eau , propriété dont on applique l'usage pour diviser des pierres d'une grosseur considérable. On a vu des cables mouillés se gonfler aux dépens de leur longueur , & faire rapprocher du point fixe , où ils étoient attachés , des masses prodigieuses. C'est encore en vertu de la fluidité de l'eau , & de la propriété qu'ont toutes les parties de sa surface de se tenir à une égale distance du centre de la terre , qu'elle nous offre un moyen facile pour niveller les terrains.

C'est par sa volatilité & rarescibilité , qu'elle s'élève avec les particules aériennes & ignées dans l'atmosphère , pour y former les *nuées* , les *brouillards* , la *rosée* , la *pluie* , le *givre* , le *verglas* , & tant d'autres *météores* de même nature.

Enfin c'est par une circulation continuelle , que cet élément humecte l'air & la terre , & met celle-ci en état de contribuer à la production des minéraux , à la formation & à l'entretien des fontaines , des lacs , des rivières , & particulièrement à la conservation de la vie des animaux & à la végétation. En effet , quantité de plantes , telles que des citrouilles , des oignons , des plantes légumineuses , & plusieurs autres reçoivent de l'accroissement & mûrissent dans l'eau , tandis qu'elles périroient en terre dans les tems de sécheresse. Voyez l'expérience de Vanhelmont , celle de Boyle , &c.

C'est à l'eau que nous sommes redevables de l'extrême clarté & salubrité de l'air, en ce que tombant de la moyenne région, elle le purge des corps hétérogènes qui y étoient suspendus, & qu'elle entraîne avec elle. Que de phénomènes dignes de nos réflexions, si l'habitude ne les avoit en quelque façon avilis à nos yeux ! c'est elle qui fait jouer les machines propres à moudre, à fouler, à fendre, à forger, à scier, à réduire en bouillie le chiffon dont on fait le papier, à exprimer l'huile des fruits, le sucre de la canne, & à dévider de la soie ; c'est son écoulement qui nous amène à peu de frais des quantités innombrables de trains de bois propres à la construction ou à nos foyers, &c. L'eau est un instrument chymique de l'analyse menstruelle, dont l'application est très étendue : elle a mille usages économiques & diététiques ; elle nous sert à blanchir notre linge, à dégraisser nos étoffes, à nous préparer des bouillons, des gelées, des syrops, des boissons agréables ; elle nous fournit plusieurs remèdes sous une forme commode & salutaire : étant échauffée à vingt-trois ou vingt-quatre degrés, elle est très utile pour l'usage du bain, dont les effets sont de laver & nettoyer les crasses qui bouchent les pores de la peau, arrêtent la transpiration, &c.

Ceux qui n'ont pas appris l'art de nager, se plongent souvent dans l'eau de manière à ne pouvoir s'en retirer facilement ; & quelquefois ils y sont suffoqués, à raison de la trop petite quantité d'air qui se trouve dans l'eau, insuffisante pour maintenir le jeu des poumons (car ce n'est pas la quantité d'eau qu'ils ont avalée qui les fait périr, puisqu'à peine leur en trouve-t-on une pinte dans l'estomac). S'il y a quelque espoir de rendre la vie à un homme qu'on a retiré de l'eau, on doit l'envelopper promptement dans des draps ou dans des couvertures, pour prévenir les ravages que l'air pourroit causer dans les poumons, en y pénétrant trop subitement ; ensuite il faut le porter dans un lit très chaud, & l'y tourmenter ou agiter de cent façons différentes : ce n'est pas sans succès qu'on y joint l'usage des frictions spiritueuses, comme, par exemple, celle de l'esprit-de-vin camphré. Les potions cordiales anti-apoplectiques & tous les médicaments qui peuvent remuer fortement la machine & le genre nerveux, étant administrés, soit par le haut, soit par le bas, sont encore fort utiles dans cette occasion.

EAU DE PIERRERIES. Les Joailliers se servent de ce mot pour exprimer la couleur, la transparence, la pureté & l'éclat des pierres précieuses : ainsi l'on dit cette perle est d'une *belle eau* : voyez PERLE. L'eau de ce diamant est trouble : voyez DIAMANT & l'article PIERRES PRÉCIEUSES.

EBENE. On donne ce nom à une espèce de bois qui vient des Indes : il est très dur & très pesant, & par conséquent susceptible de recevoir un très beau poli ; aussi l'emploie-t-on dans les ouvrages de marqueterie & de mosaïque.

On distingue trois sortes d'*Ebenes* des Indes : savoir, la *noire*, la *rouge* & la *verte*. La noire est la plus estimée, & on en fait d'autant plus de cas, qu'elle est noire comme du *jayet*, sans aubier, & très massive. L'arbre qui donne l'*ébene noire*, croît à Madagascar. Il devient, au rapport de M. Flac-

court qui y a résidé en qualité de Gouverneur , très grand & très gros : son écorce est noire , & ses feuilles sont assez semblables à celles de notre myrthe. Quelques Voyageurs prétendent que les habitants des Isles ont soin d'enterrer leurs arbres aussi-tôt qu'ils sont abattus , pour augmenter leur belle couleur noire. L'écorce de ce bois , infusée dans de l'eau , est bonne , dit-on , contre la pituite & les maux vénériens : si on en jette sur des charbons allumés , elle exhale une odeur agréable. Cette sorte d'ébene est peut-être le *panacoco* des Antilles. Voyez ce mot. Le Pere Plumier parle d'un autre arbre d'ébene noire qu'il a découvert à Saint Domingue , & qu'il appelle *Spartium portulacæ foliis , aculeatum , ebeni materia*.

L'arbre qui donne l'ébene verte est très touffu : c'est le *Bignonia arbor hexaphylla , flore maximo luteo* , de Barrere. Ses fleurs sont grandes & jaunes. Ses feuilles sont unies , d'un beau verd : sous la premiere écorce de l'arbre , on en trouve une seconde , blanche , de l'épaisseur de deux pouces , & qui est l'aubier ; le reste jusqu'au cœur , est d'un verd foncé tirant sur le noir , mêlé quelquefois de veines jaunes. On fait usage de ce bois , non-seulement dans la mosaïque , mais aussi en teinture , parcequ'il donne un très beau verd naissant. Comme l'ébene verte est un bois très gras , il prend aisément le feu. On peut donner à une pierre une couleur brune , en la frottant avec ce bois. C'est de ce bois que les Indiens font les statues de leurs Dieux & les sceptres de leurs Rois. On a remarqué que l'ébene verte mise en terre , ne se conserve pas long-tems. Dans la Guiane l'on fait bouillir sa fleur au défaut de senné , & elle purge avec succès. Ce purgatif donné à tems , réussit en 1755 , pendant l'épidémie qui régnoit à Cayenne : c'étoient des attaques de coqueluche violente , accompagnées de fievres & de maux de tête.

L'ébene jaune n'est qu'une variété de l'ébene verte.

Ces bois d'ébenes noires & vertes se trouvent non-seulement à Madagascar , mais aussi à Sainte-Maurice dans les Antilles , & sur-tout dans l'Isle de Tabago. Les Indiens nomment indifféremment *Hazon-mainthi* , toutes les especes d'ébene.

Quant à l'ébene rouge , appelée aussi *Grenadille* , elle n'est guere connue que de nom.

Les Ebénistes & les Tabletiers ont trouver l'art d'imiter le *bois d'ébene* avec le poirier & d'autres bois durs , qu'ils colorent en noir d'ébene avec une décoction chaude d'encre à écrire. On applique cette couleur sur les bois avec une brosse rude , & on se sert d'un peu de cire chaude pour donner le poli ou plutôt le lustre. Le véritable *bois d'ébene noire* est de tous les bois le plus propre à recevoir le poli , & cependant celui qu'on emploie le moins en marqueterie. On a avec raison donné la préférence aux bois de couleurs , qui , par la variété de leurs veines , semblent présenter des desseins différents , tels que le *bois violet* , le *bois de rose* , &c.

EBENE DE CRETE. On donne ce nom à l'arbrisseau nommé aussi *Barbe de Jupiter*. Voyez ce mot.

EBENE FOSSILE. Ce n'est que du jayet. Voyez JAIS.

EBENIER

EBENIER DES ALPES ou EBENE FAUSSE. Nom donné à l'*Aubours*. Voyez à la suite du mot CÛTISE.

ECAILLE. C'est en général cette substance résistante, & quelquefois fort dure, qui couvre un grand nombre de poissons, & qui peut s'en détacher par pièces. Elle diffère beaucoup pour la forme, la consistance & les autres qualités, suivant les différentes espèces d'animaux, comme on le voit; par exemple, dans la *carpe*, dans l'*huitre* & dans la *tortue*. Voyez, au mot ABLE, ce que l'on peut penser au sujet de la formation des écailles de poisson.

ECAILLE ou GRANDE ECAILLE. On donne ce nom à un poisson de l'Amérique, long de deux pieds, dont le dos est assez rond, le ventre gros & la queue fort large; il est couvert d'écailles argentées, larges de plus d'un pouce. La chair de l'*écaille* est fort blanche, ferme, grasse, délicate & d'un bon goût. On pêche ce poisson au fond des ports & dans les étangs qui communiquent à la mer.

ECARLATE DE GRAINE. Voyez au mot KERMÈS.

ECHALOTTE, *Cepa Ascalonica*. Plante fort cultivée dans les jardins potagers. Sa racine est un assemblage de plusieurs bulbes unies ensemble. Cette racine est grosse comme une aveline, oblongue, & ressemble assez à l'ail pour l'odeur & pour la faveur: elle est portée sur un paquet d'autres racines fibreuses. Ces bulbes poussent des tiges creuses ou des espèces de feuilles longues, fistuleuses, droites, longues & lisses, ayant la même faveur que la bulbe. Ses fleurs naissent en bouquets ou paquets sphériques; chacune d'elles est composée de six feuilles rangées en fleurs de lys: il leur succede des fruits sphériques, remplis de semences arrondies.

La racine bulbeuse est d'un grand usage pour assaisonner les sauces; elle produit d'ailleurs le même effet que les autres genres d'oignons. Voyez ce mot. Elle excite l'appétit & la soif. C'est un bon vermifuge & un alexipharmaque.

Les *Échalottes d'Espagne* ou *Roquemboles* sont des tubercules qui viennent sur les têtes d'une espèce d'ail qu'on cultive en Espagne & dans nos jardins. Voyez AIL. On plante l'échalotte autour des planches d'oignons: sa culture est très facile, ainsi que celle de l'ail, pour peu que le terrain soit convenable. Sur la fin de l'été on arrache de terre les échalottes, & elles se conservent tout l'hiver.

ECHARA ou ESCARE: voyez son article à la suite du mot CORALLINE.

ECHARBON. Nom qu'on donne à la *Chataigne d'eau* qui croît près des rivières, dont la graine est fort dure: elle est épineuse: ses feuilles sont larges. Il y a encore un *Echarbon terrestre* qui est également épineux, & qui croît dans les masures.

ECHELETTE. Nom donné au *Pic de muraille*. Voyez ce mot.

ECHINITES. On donne ce nom à des Oursins fossiles. Il y a autant de variétés dans les échinites que dans les oursins vivans; voyez OURSIN.

ECHINOPE: voyez CHARDON ECHINOPE.

ECHINOPHORE, *Echinophora*. Coquillage univalve du genre des *Conques sphériques*. Voyez **TONNES**.

Il y a des Auteurs qui l'appellent *Buccinite*. Voyez **BUCCIN**.

ECHO. Lieu naturel, & quelquefois artificiel, où le son est réfléchi ou renvoyé par un corps solide, & qui par-là se répète & se renouvelle à l'oreille. Les lieux les plus propres aux échos, sont voûtés; c'est-là que le son se grossit & se réfléchit: s'il y a plusieurs voûtes, l'écho est multiple ou tautologique, c'est-à-dire répète plusieurs fois. Il y a des lieux où ce phénomène présente des singularités sans nombre: tantôt l'écho ne répète que des syllabes, tantôt des mots entiers. Au reste tout ce qui réfléchit le son peut être la cause d'un écho: c'est pour cela que les murailles ou remparts de ville, les forêts, les montagnes, les cavernes, les rochers ou hauteurs élevées de l'autre côté d'une rivière, peuvent produire des échos. Les coups terribles du tonnerre qui gronde, ne sont que des échos répétés qui retentissent dans l'air.

ECLAIR: voyez à l'article **TONNERRE**.

ECLAIRE ou **FELOUGNE**: voyez **CHÉLIDOINE**.

ECLIPSE. Privation passagère, soit réelle, soit apparente, de lumière dans quelqu'un des corps célestes, par l'interposition d'un corps opaque entre le corps céleste & l'œil, ou entre ce même corps & le soleil. Les éclipses de soleil sont dans le premier cas: les éclipses de lune & des satellites sont dans le second; car le soleil est lumineux par lui-même, & les autres planètes ne le sont que par la lumière qu'ils en reçoivent. Les éclipses des étoiles par la lune ou par d'autres planètes, s'appellent proprement *Occultations*. Lorsqu'une planète, comme Venus & Mercure, passe sur le soleil, comme elle n'en couvre qu'une petite partie; cela s'appelle *Passage*. L'on regardoit autrefois les éclipses & les comètes comme la source de grands malheurs; mais aujourd'hui le peuple même est instruit de la cause de ces phénomènes naturels. On sait que les éclipses de lune viennent de ce que cette planète entre dans l'ombre de la terre, & ne peut être éclairée par le soleil durant qu'elle la traverse. Les éclipses de lune sont universelles, & n'arrivent que dans le tems de la pleine lune, parcequ'il n'y a que dans ce tems où la terre soit entre le soleil & la lune. Les éclipses de soleil viennent de l'interposition diamétrale de la lune qui cache aux habitans de la terre une partie du soleil, ou même le soleil tout entier: on pourroit dire aussi que c'est la terre qui est éclipsée. La durée d'une éclipse est le tems entre l'immersion & l'émergence. L'*immersion* dans une éclipse est le moment auquel le disque du soleil ou de la lune commence à se cacher: l'*émergence* est le moment où le corps lumineux éclipsé commence à reparaitre. La théorie des éclipses & la justesse avec laquelle on est parvenu depuis long-tems à les calculer & à les prédire, tout sert à nous convaincre de la certitude des calculs astronomiques, & des efforts dont l'esprit humain est capable.

ECORCE, *Cortex*. L'écorce des arbres est la partie du végétal qui reçoit extérieurement la première les influences de l'atmosphère, si salutaires ou

si pernicieuses à la végétation ; elle est en même tems celle qui reçoit la dernière les effets des productions médullaires qui se font au centre.

Nous avons dit au mot *Arbre* , que l'écorce est composée de trois parties différentes entr'elles , & faciles à distinguer : savoir , 1°. de l'*Epiderme* , 2°. de l'*Ecorce moyenne* , 3°. & du *Liber*.

L'*Epiderme* est la peau extérieure qui enveloppe les couches corticales : c'est une membrane très fine , toujours transparente , communément sans couleur , élastique & un peu poreuse.

L'*Ecorce moyenne* qui se trouve entre l'*Epiderme* & le *Liber* , est composée de fibres ligneuses longitudinales , de vaisseaux propres , & du tissu cellulaire. Ce que l'on appelle ici *fibres ligneuses longitudinales* , sont de très petits vaisseaux creux , dans lesquels coule la sève. Ils sont simples , se colant les uns aux autres sans anastomoses , de manière qu'ils forment un tissu de petits faisceaux en rézeau , dont les mailles sont plus longues que larges. Ces petits faisceaux sont les muscles des végétaux. Les *vaisseaux propres* qu'on pourroit appeller aussi vaisseaux sanguins à cause de leur usage , sont des tubes longitudinaux , droits , colés contre les fibres séveuses , & remplis du suc propre que l'on peut regarder comme le sang de la plante ; tel que le lait dans le figuier & le tithymale , la résine dans les pins & les pistachiers , la gomme dans les jujubiers , le mucilage dans les mauves , &c. Le *tissu cellulaire* est un assemblage de vésicules jointes bout à bout , en chapelet & côte à côte , sans communication sensible , placées entre les mailles des fibres séveuses : voyez le détail de cette organisation , à la suite du mot *ARBRE*.

Le *Liber* est composé de pellicules qui représentent les feuillets d'un livre : elles touchent immédiatement au bois. Le *liber* se détache tous les ans des deux autres parties de l'écorce ; & en s'unissant avec l'*aubier* , il produit sur toute la circonférence de l'arbre , une nouvelle couche qui en augmente le diamètre.

On peut connoître si un arbre que l'on destine à fendre , se divisera droit ou non , soit que cet arbre soit debout ou à terre ; pour cela il suffit de donner un coup de serpe par la base & tirer l'écorce de bas en haut : si elle se détache en ligne droite , l'arbre se fendra de même ; si au contraire l'écorce se leve de biais , le bois se divisera de manière inégale.

Il semble que l'écorce des arbres est la partie où la sève & les principes végétaux abondent davantage. En effet , le sel , l'huile , &c. s'y manifestent par la bonté des cendres de l'écorce , toujours préférables à celles du bois perlard ou écorcé. Ne pourroit-on pas déduire de cette même cause l'effet du *Tan* ou écorce du chêne , qui étant pulvérisé , est si utile pour façonner le cuir , le pénétrer , l'affermir , le rendre souple , l'empêcher de se corrompre , le rendre impénétrable à l'eau , le disposer à se prêter à différentes formes ; en un mot , le rendre propre à notre usage : Voyez l'article *TAN* au mot *CHÊNE*.

Il y a d'autres écorces d'arbres dont on fait un commerce considérable. Il

y en a d'aromatiques , comme est l'écorce du *Cannelier* de Ceylan & celle de *Cascarille* ; de médicinales , comme le *Quinquina* ; de propres à filer , telle qu'est celle du *lin* , du *chanvre* , de l'*ortie* , du *genet* & de certains arbres des indes , sur lesquels on leve de long filamens dont on fait des étoffes mêlées de soie ou de coton. L'écorce intérieure & blanche du *lagette* est composée de douze ou quatorze couches , qui peuvent être séparées en autant de pieces d'étoffes ou de toile. Le *liege* qui sert à conserver quantité de liqueurs précieuse , n'est que l'écorce d'un grand chêne verd des pays méridionaux de l'Europe : c'est en coupant circulairement , ou pour l'ordinaire en incisant quelque peu l'écorce de certains arbres ; qu'on en retire des liqueurs , des gommes & des résines d'un usage fort varié. Le *pin* incisé de cette manière , nous donne la poix , le godron , le brai liquide pour poisser les vaisseaux & les cordages. Le *sapin* , le *melèse* , le *cèdre* , le *cyprès* , le *thérébinthe* , le *lentisque* , &c. nous donnent la thérébentine , le mastic en larmes , l'encens , le sandarac ; d'autres nous donnent le benjoin , le storax , le baume de Judée , celui de copahu , & toutes les différentes résines dont on compose des vernis , des parfums & des remèdes. On trouve tous ces détails répandus dans le corps de cet ouvrage , sous les noms qui leur sont propres.

ÉCORCE DE L'ARBRE QUI PORTE L'ENCENS OU NARCAPHTHE THYMIALMA : voyez au mot OLIBAN.

ÉCORCE DE CARYOCOSTIN OU DE WINTER ; *Cortex sine pari* , au *Cortex Winterianus*. Cette écorce appartient à une espèce de laurier qui croît dans les contrées situées vers le milieu du détroit de Magellan. Clusius , Gaspard Bauhin & Sebald de Weert ont parlé de cet arbre. George Handyside est celui qui en a donné la meilleure description : il a rapporté , au commencement de ce siècle , de sa graine en Angleterre , avec un échantillon de ses feuilles & de ses fleurs sur une petite branche. C'est d'après l'inspection de toutes ces parties de l'arbre , &c. que le Chevalier Hansloane a placé cet arbre dans la classe des *pereclymenuin* , & l'a appelé *Cannelier de Winter*. Voyez à l'article CANELLE BLANCHE.

ÉCORCE DE GEROFLE : voyez CANELLE GEROFLEE.

ÉCORCE SANS PAREILLE : voyez à l'article CANELLE BLANCHE.

ÉCORCHÉE. Nom que l'on donne à un coquillage univalve & operculé , du genre des *Rouleaux*. Voyez ce mot.

ÉCORCHEUR ; voyez LANIER.

ÉCOUFLE. Belon donne ce nom au *Milan Royal* , oiseau de proie , d'autant plus dangereux , qu'il ne fait aucun bruit en volant : voyez MILAN ROYAL.

ÉCOURGEON : voyez ESCOURGEON.

ÉCREVISSE , *Astacus*. Poisson crustacée , d'un genre différent des *Cancres* & des *Crabes*. On en distingue deux espèces principales : savoir , les *Ecrevisses de mer* , qui sont le *Homard* , la *Langouste* , &c. & les *Ecrevisses de rivière* : toutes ont le corps & la queue allongés.

Le HOMMARD (*Astacus gammarus marinus*) est une très grosse écrevisse de mer, dont il y a de deux sortes. L'une a deux gros mordans plus longs & plus larges que la main, & beaucoup plus forts que ceux des crabes : l'autre a seulement deux grands barbillons, longs comme le bras & hérissés de la même sorte que les pieds des crabes. L'un & l'autre croissent à une grandeur extraordinaire : on en trouve quantité dans les Antilles, où les Insulaires les prennent la nuit à la clarté de la lune ou d'un flambeau, dans des lieux pierreux, où la mer, après s'être retirée, laisse de petites fosses pleines d'eau : ils les enfilent avec une fourche de fer ou les coupent en deux.

Les gros hommards sont aussi fort communs dans nos mers, sur nos côtes : leur cuirasse crustacée est semée de taches bleues plus ou moins grandes sur un fond rougeâtre, qui couvre le tissu blanc. Lorsque ces animaux sont cuits, leur cuirasse devient toute rouge. Ils ont devant les yeux deux cornes longues & plus menues que celles de la langouste, & deux autres plus petites : il sort aussi du milieu du front une autre petite corne plate, large & découpée en scie des deux côtés. Le homnard a dix pieds, y compris les deux bras faits en tenailles, dont l'animal se sert comme d'une main. Ses bras sont sans jointure absolue, & ne sont point velus ; mais il en a deux autres plus petits qui le sont : les bouts sont faits comme des becs d'oiseaux ; la partie de dessus est mobile & serrée contre celle de dessous qui est immobile : ces ferres sont dentées en dedans. On remarque qu'un des deux bras est toujours plus gros que l'autre : il n'y a que le premier de chaque côté (les plus proches des grands bras) qui soient fendus par le bout. La queue est couverte de cinq anneaux crustacés ; le bout en est large, & comme garni d'ailes pour nager. Les yeux des hommards sont courts, petits, ce qui est au contraire dans la langouste ; mais leur bouche est également fendue en long. Les dents & la langue, ainsi que l'estomac, le conduit par où descend la nourriture, & les autres parties intérieures, sont comme dans la langouste.

La petite espèce des hommards a la tête & la poitrine plus découpées, mieux arrondies, la corne dentée de la tête fort longue, & mobile à la volonté de l'animal ; les cornes sont flexibles & articulées. Le corps est couvert de tablettes rougeâtres chargées de traits bleus en travers. Cette espèce de homnard est assez rare.

À l'égard de la LANGOUSTE, *Locusta*, on en connoît de plusieurs espèces. Ce crustacée n'a point de sang, non plus que les précédens : sa croute est molle ; ses deux cornes sont longues & garnies d'aiguillons devant les yeux, avec deux autres cornes au-dessus, plus déliées & plus courbes. Son dos est rude & plein d'aiguillons : sa queue est comme celle de l'écrevisse, & elle se dépouille de sa croute, de même que le font tous les crustacés. La langouste diffère des écrevisses en ce qu'elle a deux pieds de chaque côté sans pinces plates, ou qu'elle a au plus une pince à crochet. Elle a cinq nageoires à la queue ; le reste est couvert de tablettes minces. Les langoustes vivent dans les lieux pierreux : elles repairent pendant l'hiver sur le bord des

riyieres , & dans l'été elles se retirent dans les lieux profonds. Elles se battent entr'elles avec leurs cornes. Elles se nourrissent de petits poissons qu'elles trouvent autour d'elles. On appelle aussi la langouste , *Sauterelle de mer* & *Hyppocampe* ; cependant l'*Hyppocampe* est tout différent : voyez ce mot.

L'ÉCREVISSE DE RIVIERE , *Astacus fluviatilis* , est d'une grosseur bien inférieure au homnard. Elle naît dans les rivières ou dans les ruisseaux d'eau bien courante. Le tronc de son corps est rond ; & sa tête finit par une corne assez large , courte & pointue , sous laquelle sont ses yeux. Elle a devant la tête quatre autres cornes , dont deux sont longues & deux courtes , articulées , flexibles & qui se terminent par une pointe velue ou de poil. Ses bras sont fourchus , dentelés & articulés en cinq parties , plus minces près du corps qu'à l'extrémité ; c'est peut-être ce qui les fait casser même lorsque l'animal ne se donne que des mouvemens à l'ordinaire. C'est avec ces bras qu'elle est en état de pincer & de blesser. Les deux premières jambes qui suivent les deux bras , sont également fendues au bout , & de plus , velues. Les deux suivantes sont munies d'un ergot. La bouche est garnie de dents , comme celle des *langoustes* & des *cancres*. La queue lui sert à nager & même à marcher sur terre , mais seulement à reculer. On a observé que les crabes , les homnards , les squilles , &c. qui se portent aussi en arrière au lieu de se porter en avant comme les autres animaux , sont aussi conformés différemment de ceux-ci , en ce que les écailles qui leur tiennent lieu d'os , sont en-dehors au lieu d'être en-dedans ; & que le foie , l'estomac , &c. sont placés au-dessus du cœur , &c. L'écrevisse d'eau douce a , comme les écrevisses de mer , des excroissances de chair où sont logés ses œufs. Sa crouste rougit extérieurement par la cuisson. De l'eau-forte ou seulement de l'eau-de-vie répandue sur cette même écaille , la rend aussi rouge que si elle étoit cuite. La chair de ce crustacée est molle & humide.

Les écrevisses sont très voraces : elles se nourrissent de charognes aquatiques & d'ordures. Une écrevisse de six à sept ans n'est encore , selon les Pêcheurs , qu'une écrevisse de grandeur médiocre. En vieillissant il se forme dans la région de leur estomac , deux espèces de petites pierres , qu'on appelle improprement *Yeux d'Ecrevisses*. Voyez ci-dessous PIERRES D'ÉCREVISSES.

Dans toutes les bonnes tables on fait cas des écrevisses , tant de mer que de rivière , sur-tout des dernières. Leur chair est fort nourrissante , de bon goût , fortifiante , un peu difficile à digérer , notamment celle des écrevisses de mer. L'écrevisse de rivière entre dans des bisques , des coulis , &c. & augmente la quantité alimentaire de ces mets : aussi cette écrevisse fluviatile est-elle regardée comme un médicament alimentaire , qui purifie le sang , qui le fouette , qui le divise , qui dispose les humeurs aux excréments , qui ranime l'oscillation des vaisseaux & le ton des solides : en général elle convient dans les chaleurs de poitrine , & dans les indispositions qui proviennent d'une trop grande âcreté d'humeurs , pourvu qu'on en use

modérément. En un mot , c'est un remede incisif & tonique ; & on l'ordonne à ce titre dans les maladies de la peau , dont le caractère n'est point inflammatoire ni éréthyspélateux , *ab humorum lentâ mucagine* , dit Boërhaave : on l'emploie encore dans les obstructions , dans les bouffissures. On prépare dans tous ces cas , des bouillons atténuans dans lesquels on fait entrer cinq ou six écrevisses éctasées dans un mortier de marbre , même d'avantage , selon l'habitude.

Lorsque les écrevisses , ainsi que les hommards & les crabes , ont perdu une de leurs grosses jambes , il leur en renaît une autre en la même place , mais plus petite : c'est un fait avancé d'après l'expérience , par M. de Réaumur. Il est bon d'observer que ces jambes ne croissent que lorsqu'elles n'ont été rompues que jusqu'à la troisième ou dernière articulation.

Autres especes d'Ecrevisses.

On trouve beaucoup d'écrevisses dans les rivières de l'Amérique , dont les mordans sont plus forts que ceux des nôtres. On y fait également avec ces écrevisses , d'excellentes soupes : celles du Sénégal sont les plus exquises. Il n'en est pas de même de celles des Moluques qui causent la mort , dans l'espace de vingt-quatre heures , à ceux qui en mangent. Ces écrevisses sont terrestres : elles ressemblent un peu aux langoustes ; elles repairent sous certains arbres dont l'ombre ne souffre aucune herbe , & qui causent même des maladies à ceux qui s'y endorment.

Les écrevisses de la Côte d'Or , sont de couleur pourpre : elles font des trous en terre à la manière des taupes. Leur chair est fort délicate. Celles de l'Île de Tabago sont verdâtres & de bon goût.

Génération des Ecrevisses.

Selon L. A. Portius , l'écrevisse de rivière a des œufs plus gros , à proportion , que l'écrevisse de mer. Celle-ci a deux ouvertures par où sortent les œufs , & qui sont situées l'une à droite & l'autre à gauche , à côté de l'endroit où se réunissent les os qui couvrent le ventre , ou plutôt la partie antérieure de l'animal. Cette couverture diffère dans l'écrevisse d'eau douce , en ce qu'elle est composée de plusieurs os qui ont tous ensemble la figure d'un bouclier allongé.

Pour indiquer les caractères par lesquels on peut distinguer une écrevisse mâle d'avec une écrevisse femelle , il faut distinguer le corps de l'animal en trois parties ; savoir , le ventre , la queue & les membres. Le ventre contient tous les viscères & les ovaires dans les femelles ; & dans les mâles , les testicules , les vaisseaux spermatiques , &c. Nous avons déjà dit que la queue est composée de beaucoup de lames dures & osseuses qui s'articulent ensemble , & de beaucoup de muscles. Les membres de l'écrevisse sont de deux espèces ; savoir , les gros & les petits. Les gros ont des pinces , &

s'appellent *Bras* ; les autres se nomment *Jambes* ou *Pattes*. Tous les membres sont plus gros dans les mâles que dans les femelles. C'est par les petits membres , ainsi que par les barbes de la queue , qu'on distingue les mâles d'avec les femelles : celles-ci n'en ont que quatre paires ; les mâles en ont cinq. Les femelles ont à l'extrémité des barbes , de petites fibres auxquelles les œufs sont attachés en Janvier , Février & Mars. Portius dit que dans chacun des bras de la troisième paire , chez toutes les écrevisses , il y a un petit orifice ovale. Les canaux membraneux qui tirent leur origine des ovaires , aboutissent à ces orifices , par lesquels sortent les œufs , après avoir , dit-il , parcouru toute la longueur des canaux membraneux. Les organes de la génération des écrevisses , qui sont doubles tant chez les mâles que chez les femelles , sont formés de manière qu'il est difficile de concevoir un accouplement dans ces animaux. Peut-être le mâle féconde-t-il les œufs pondus par la femelle , en les arrosant de sa semence ; ce qui feroit rentrer les écrevisses dans la classe des poissons proprement dits. La ponte se fait en Novembre & Décembre : voyez *Willis. Tract. de anim. brut. cap. 8.*

Mue des Ecrevisses & autres Crustacées.

La Mue des crustacées n'est pas moins digne de l'attention des Naturalistes , que la reproduction de leurs membres. Par cette mue , ces animaux se dépouillent chaque année , non-seulement de leur écaille , mais aussi de toutes leurs parties cartilagineuses & osseuses : ils sortent de leur écaille , & la laissent entièrement vuide. La mue ne se fait jamais avant le mois de Mai ni après celui de Septembre , sur-tout dans les écrevisses , qui cessent de prendre de la nourriture solide quelques jours avant leur dépouillement : alors si on appuie le doigt sur l'écaille , elle plie ; ce qui prouve qu'elle n'est plus soutenue par les chairs. Quelques momens avant cette mue , l'écrevisse frotte ses jambes les unes contre les autres , se renverse sur le dos , replie & étend sa queue à différentes fois , agite ses cornes , & fait encore d'autres mouvemens pour se détacher de l'écaille qu'elle va quitter. Pour en sortir , elle gonfle son corps , & il se fait entre la première des tables de la queue & la grande écaille du corps , une ouverture qui met le corps de l'écrevisse à découvert : il est d'un brun foncé , tandis que la vieille écaille est d'un brun verdâtre. Après cette rupture , l'animal reste quelque tems en repos ; ensuite il fait différens mouvemens , & gonfle les parties qui sont sous la grande écaille , dont la partie postérieure est bientôt soulevée ; pour l'antérieure , elle ne reste attachée qu'à l'endroit de la bouche : alors il ne faut plus qu'un quart d'heure pour que l'écrevisse soit entièrement dépouillée. Elle tire sa tête en arrière , dégage ses yeux , ses cornes , ses bras , & successivement toutes ses jambes , dont les deux premières paroissent les plus difficiles à dégainer , parceque l'extrémité est beaucoup plus grosse que les autres parties ; mais on conçoit aisément cette opération , quand on fait que chacun des tuyaux écailleux qui forment chaque partie , est de deux
pièces

pieces longitudinales qui s'écartent l'une de l'autre dans le tems de la mue. Enfin l'écrevisse se retire de dessous la grande écaille, & aussi-tôt elle se donne brusquement un mouvement en avant, étend la queue & la dépouille de ses écailles. Cette opération est violente & fait périr beaucoup d'écrevisses : celles qui y résistent restent très foibles pendant quelques jours. Après la mue, leurs jambes sont molles, & l'animal n'est recouvert que d'une membrane, qui en vingt-quatre heures devient une nouvelle écaille presque aussi dure que l'ancienne. Quelques observations ont donné lieu de croire que la matiere qui est nécessaire pour consolider la nouvelle écaille, vient des pierres d'écrevisses, qui ne disparoissent chez l'animal que quand sa mue est passée : voyez ci-dessous PIERRES D'ECREVISSES.

Pierres d'Ecrevisses.

Ce qu'on appelle en Médecine *Yeux d'Ecrevisses*, ne sont point les yeux de cet animal, & n'y ressemblent nullement. Ce sont de petites pierres blanches, rondes, ordinairement applaties, qui se trouvent dans la région de leur estomac. Nous avons dit ci-dessus que les écrevisses muent dans le printemps : non-seulement elles se dépouillent alors de leur enveloppe, mais encore de leur estomac : c'est dans ce tems qu'on trouve les pierres appelées improprement *Yeux d'Ecrevisses*. Ces pierres commencent à se former quand l'ancien estomac se détruit, & sont ensuite enveloppées dans le nouveau, où elles diminuent toujours de grandeur jusqu'à ce qu'enfin elles disparoissent. M. Geofroi croit qu'elles contribuent aussi à nourrir l'animal pendant sa mue. MM. de Réaumur, & Mounsey, Médecin des Armées de l'Impératrice de Russie, ont aussi parlé de cette espece de calcul. Voici comme s'exprime ce dernier Auteur.

Les Pierres faussement appelées *Yeux d'Ecrevisses*, se trouvent dans le corps des animaux de ce nom. Chaque écrevisse en produit deux tous les ans ; savoir, une de chaque côté de la partie antérieure & inférieure de l'estomac. Ces deux pierres prennent leur origine entre les deux membranes de cet organe. Le côté plat ou concave touche la membrane interne qui est mince & transparente, quoique forte & d'une substance cornée. Le côté convexe est constamment vers le dehors : il est couvert des membranes charnues & molles de l'estomac, & leurs fibres laissent des traces sur la surface de la pierre. Elle croît peu-à-peu, & en lames, entre ces deux membranes extérieures.

L'intérieure qui n'est que de la corne, ne sert qu'à résister ; c'est ce qui fait que toutes les pierres sont convexes de ce côté. La premiere écaille qu'on peut observer, & sur laquelle toutes les autres s'appliquent, est placée vers le centre ; & l'on reconnoît très bien les couches qui s'appliquent successivement. Avant que l'on puisse trouver ces pierres dans l'animal, on apperçoit de petites taches circulaires, un peu opaques, & plus blanches que le reste de l'estomac. Ces taches sont à la place que doivent occuper les pierres, vis-

à-vis des substances tenaces & mucilagineuses, appelées *Glandes* par quelques-uns : c'est à tort qu'on croit que ces glandes s'endurcissent peu-à-peu, au point de devenir ce qu'on appelle *yeux d'écrevisses*. M. Mounsey prétend que c'est encore une erreur de croire que les écrevisses se défont de ces pierres lorsqu'elles se dépouillent de leur écaille ; car dans ce tems, dit-il, les pierres percent la tunique interne & cornée de leur estomac. Les trois dents de ce viscere brisent les pierres ; & en peu de jours les liqueurs qui y abondent, les dissolvent : voilà la raison pourquoi l'on trouve tant d'yeux d'écrevisses à moitié consommés. Cet Auteur prétend qu'on trouve peu de pierres dans les rivières que les écrevisses habitent. La plupart des Naturalistes croient aujourd'hui que ces pierres ont été le réservoir de la matière que les écrevisses emploient pour réparer la perte de leurs écailles.

Les pierres dont la teinte est brune, sont celles qui se sont trouvées dans l'estomac de l'écrevisse, au moment qu'elle a été prise. C'est dans les grands fleuves du côté d'Astracan, qu'on trouve les écrevisses qui ont les pierres les plus grandes. Les Pêcheurs n'y prennent, en quelque sorte, ces animaux, qu'à cause de leurs pierres. Pour les tirer de leur estomac, les uns les écrasent avec un pilon de bois ; ils mettent ensuite le tout dans l'eau, & l'on trouve les pierres au fond des baquets : d'autres mettent des écrevisses en tas & les y laissent pourrir ; ensuite, au moyen de l'eau, ils en séparent les pierres, qu'ils vendent quatre ou cinq sols la livre. On auroit peine à croire la quantité prodigieuse qu'on en exporte dans les divers pays, où, malgré la modicité de ce prix, on les contrefait avec des substances argillo-calcaires, blanches & sans odeur : on a l'art d'en former des espèces de pastilles, grosses comme des pois ou de petits boutons, applaties, orbiculaires, concaves d'un côté, convexes de l'autre, faciles à rompre, & qui imitent les pierres d'écrevisses naturelles.

Les pierres d'écrevisses n'ont ni saveur, ni odeur apparentes : ce sont des absorbans terreux qu'on fait prendre pour adoucir les aigres de l'estomac.

Pêche des Ecrevisses.

On pêche l'écrevisse de plusieurs manières. Une des plus simples, c'est d'avoir des baguettes fendues, de mettre dans la fente de l'appas, comme de la tripaille, des grenouilles, &c. de les disperser le long du ruisseau où l'on fait qu'il y a des écrevisses cazernées ; de les y laisser reposer assez long-tems pour que les animaux s'attachent à l'appas ; d'avoir un panier ou une petite truble ; d'aller lever les baguettes légèrement ; de glisser sous l'extrémité opposée, le panier ; & d'enlever le tout ensemble hors de l'eau : à peine l'écrevisse se verra-t-elle hors de l'eau, qu'elle se détachera de l'appas ; mais elle sera reçue dans le panier. D'autres les prennent à la main : ils entrent dans l'eau, ils s'y couchent & étendent leurs bras en tous sens vers les trous où ils supposent les écrevisses cachées : il y en a qui mettent le ruisseau à sec : les écrevisses qui manquent d'eau, sont forcées de sortir de leurs trous

& de se laisser prendre. Un piege qui n'est pas moins sûr, c'est celui qu'on tend à leur voracité : on laisse pourrir un chat mort, un chien, un vieux lievre ; ou bien l'on prend un morceau de cheval mort, on le jette dans l'eau, on l'entoure d'épines, on l'y laisse long-tems ; il attire toutes les écrevisses, que l'on prend en traînant à soi toute la charogne & les épines avec un crochet. Comme elles aiment beaucoup le sel, des sacs qui en auroient été remplis feroient le même effet que la charogne.

ÉCRITURE ARABIQUE ou CHINOISE. On donne ce nom à une coquille bivalve, de la famille des comes, qui a sur les deux valves plusieurs lignes noires, dont la disposition bizarre paroît former des caracteres singuliers. *Voyez* CAME.

ÉCROUELLES. *Voyez* AGROUELLES.

ÉCU DE BRATTENBOURG. Coquillage bivalve, très commun en Scanie, qui a une écaille très concave en dehors, l'autre convexe & turbinée en dehors.

ÉCUELLE D'EAU, *Hydrocotyle vulgaris*. Cette plante, qui croît abondamment dans les marais, a une racine fibreuse, qui pousse plusieurs petites tiges grêles, sarmenteuses, rampantes : ses feuilles sont rondes, creusées, & attachées à de petites queues ; ses fleurs sont petites, blanchâtres, à cinq feuilles, & disposées en rose : il leur succede des fruits composés de deux graines fort applaties & très convexes. Cette plante est âcre au goût : elle est détersive, vulnérable, apéritive.

ÉCUME DE MER ou MERDE DE CORMARIN. On donne ce nom à l'*alcyonium*. *Voyez* ce mot & celui de POLYPIER.

ECUME PRINTANNIERE. C'est une substance assez semblable à de la salive, que l'on remarque au printemps sur la bifurcation des tiges de plusieurs especes de plantes. Cette écume doit son origine à une espece de petite sauterelle, connue sous le nom de *Sauterelle - Puce*. *Voyez* ce mot.

ÉCUREUIL BARBARESQUE. *Voyez* l'article RAT-PALMISTE, où il en est parlé.

ÉCUREUIL DE CANADA, ÉCUREUIL GRIS, ou ÉCUREUIL DE VIRGINIE. Petit animal dont la fourrure est d'usage sous le nom PETIT-GRIS. *Voyez* ce mot.

ÉCUREUIL ÉPILEPTIQUE : c'est le LOIR. *Voyez* ce mot.

ÉCUREUIL-PALMISTE. *Voyez* RAT-PALMISTE;

ÉCUREUIL VOLANT, *Sciurus volans*. Est un petit animal long d'environ cinq pouces, dont les oreilles sont rondes, les yeux grands & noirs : il porte une moustache composée de poils noirs longs d'un pouce & demi : les pieds de devant sont armés de quatre ongles pointus & recourbés ; ses poils sont très épais, très doux au toucher, & d'un gris obscur.

Ce petit quadrupede habite sur les arbres comme l'écureuil, il va de branche en branche ; & lorsqu'il saute pour passer d'un arbre à un autre, ou pour traverser un espace considérable, sa peau qui est lâche & plissée sur

les côtés du corps , se tire au dehors , se bande & s'élargit par la direction contraire des pattes de devant , & de celles de derriere qui s'étendent en arriere dans le mouvement du saut. La peau ainsi tendue & tirée en dehors de plus d'un pouce , augmente d'autant la surface du corps sans en accroître la masse , & retarde par conséquent l'accélération de la chute , en sorte que d'un seul saut l'animal arrive à une assez grande distance. Ainsi , comme l'observe M. de Buffon , ce mouvement n'est point un vol , comme celui des *oiseaux* , ni un voltigement comme celui des *chauve-souris* , qui se font tous deux en frappant l'air par des vibrations réitérées. C'est un simple saut dans lequel tout dépend de la première impulsion , dont le mouvement est seulement prolongé & subsiste plus long-tems , parceque le corps de l'animal présentant une plus grande surface à l'air , éprouve une plus grande résistance , & tombe plus lentement ; mais il ne tomberoit pas certainement de bien haut sans se tuer , parceque le volume qu'il oppose à l'air ne seroit pas capable de le soutenir contre l'accélération de sa chute , si elle duroit trop long-tems. Il nâge comme les autres animaux , sans étendre les prolongemens de sa peau ; & quoique son poil soit mouillé , l'animal se soutient en l'air , comme s'il étoit sec , & il peut voler à sa maniere en sortant de l'eau. On observe dans l'espece de saut que fait ce quadrupede pour passer d'un arbre à un autre , qu'il agite sa queue en lui faisant faire des ondulations de côté , & d'un bout à l'autre.

On voit de ces animaux en Pologne , en Laponie , dans la Finlande , en Virginie , dans la Nouvelle Espagne & en Canada. Ceux qu'on voit à la Louisianne sont de la grosseur d'une souris , & s'élancent , comme il est dit ci-dessus , d'un arbre à un autre jusqu'à vingt-cinq ou trente pieds de distance : ces animaux sont fort jolis ; on peut les apprivoiser : il est cependant bon de leur mettre une petite chaîne ; car aimant la liberté , ils regagneroient promptement les bois. On les nourrit de pain , de fruits , de graines ; ils aiment sur-tout les boutons & les jeunes pousses du *pin* & du *bouleau* : ils ne cherchent point les noix & les amandes comme les écureuils ; ils se font un lit de feuilles , dans lequel ils s'enfouissent , & où ils demeurent tout le jour ; ils n'en sortent que la nuit , & quand la faim les presse. Comme ils ont peu de vivacité , ils deviennent aisément la proie des *martes* & des autres animaux qui grimpent sur les arbres ; aussi l'espece subsistante est-elle en très petit nombre , quoique ces animaux produisent ordinairement trois ou quatre petits. Cependant l'espece en est bien plus commune en Amérique qu'en Europe.

ECUREUIL VULGAIRE ; *Sciurus*. Petit animal quadrupede , connu de tout le monde ; dont la tête & le dos sont de couleur fauve , & le ventre blanc. Ces animaux ont deux dents incisives à chaque mâchoire , ils n'ont point de dents canines ; leurs doigts sont onguiculés ; aussi grimpent-ils , avec la dernière agilité , sur les arbres , même sur ceux dont l'écorce est la plus lisse. Il y a dans divers pays des écureuils de plusieurs autres couleurs , noirs , gris cendrés ; mais il est inutile de les décrire , un seul coup d'œil

jetté dans les Cabinets des Naturalistes en donnera une connoissance bien plus exacte. Au lieu de détailler ces diverses sortes d'écureuils , nous croyons faire plus de plaisir à nos Lecteurs , en peignant l'écureuil , & en décrivant ses mœurs , d'après l'illustre M. de Buffon.

L'écureuil est un joli petit animal , qui n'est qu'à demi sauvage , & qui , par sa gentillesse , par sa docilité , par l'innocence même de ses mœurs , mériterait d'être épargné ; il n'est ni carnassier , ni nuisible , quoiqu'il faisisse quelquefois des oiseaux : sa nourriture ordinaire , sont des fruits , des amandes , des noisettes , du gland , &c. Il est propre , lesté , vif , très alerte , très éveillé , très industrieux ; il a les yeux pleins de feu , la physionomie fine , le corps nerveux , les membres très dispos ; sa jolie figure est rehaussée & parée par une belle queue , en forme de panache , qu'il relève jusques dessus sa tête , & sous laquelle il se met à l'ombre. Le dessous de son corps est garni d'un appareil tout aussi remarquable , & qui annonce de grandes facultés pour l'exercice de la génération.

Il est , pour ainsi dire , moins quadrupède que les autres ; il se tient ordinairement assis , presque debout lorsqu'il veut manger , & se sert de ses pieds de devant , qui sont libres , comme d'une main , pour porter à sa bouche : dans cette attitude le corps est dans une disposition verticale. Au lieu de se cacher sous terre , il est toujours en l'air : il approche des oiseaux par sa légèreté ; il demeure , comme eux , sur la cime des arbres , parcourt les forêts , en sautant de l'un à l'autre , y fait son nid , cueille les graines , boit la rosée , & ne descend à terre que quand les arbres sont agités par la violence des vents. On ne le voit jamais que sur les grands arbres de haute futaie. Il craint l'eau plus que la terre , & l'on assure que lorsqu'il faut la passer , il se sert d'une écorce pour vaisseau , & de sa queue pour voiles & pour gouvernail. Il ne s'engourdit pas , comme le loir , pendant l'hyver , il est en tout tems très éveillé , & pour peu que l'on touche au pied de l'arbre sur lequel il repose , il sort de sa petite bauge , & fuit sur un autre arbre.

Il ramasse des noisettes pendant l'été , en remplit le tronc & les fentes d'un vieux arbre , & a recours en hyver à sa provision ; il les cherche aussi sous la neige , qu'il détourne en grattant. Il a la voix éclatante , & plus perçante encore que celle de la *fouine* : il a de plus un petit grognement de mécontentement , qu'il fait entendre toutes les fois qu'on l'irrite : il est trop léger pour marcher , il va ordinairement par petits sauts , & quelquefois par bonds.

On entend les écureuils , pendant les belles nuits d'été , crier , en courant sur les arbres les uns après les autres : ils semblent craindre l'ardeur du soleil : ils demeurent pendant le jour , à l'abri , dans leur domicile , dont ils sortent le soir pour s'exercer , jouer , faire l'amour & manger : ce domicile est chaud , propre & impénétrable à la pluie. C'est ordinairement sur l'enfourchure d'une branche qu'ils s'établissent ; ils commencent par transporter des buchettes , qu'ils mêlent , qu'ils entrelassent avec de la mousse ; ils la ferment ensuite , ils la foulent , & donnent assez de capacité & de solidité à leur

ouvrage , pour y être à l'aise & en sûreté avec leurs petits : il n'y a qu'une ouverture par le haut , juste , étroite , & qui suffit à peine pour passer. Au dessus de l'ouverture , est une espece de couvert en cône , qui met le tout à l'abri , & fait que la pluie découle par les côtés , & ne pénètre pas.

Ces animaux entrent en amour au printems , & mettent bas au mois de Mai ou au commencement de Juin ; ils produisent ordinairement trois ou quatre petits : ils muent au sortir de l'hiver : ils sont propres , se peignent & se polissent avec leurs mains & leurs dents : ils n'ont aucune mauvaise odeur ; leur chair est assez bonne à manger : le poil de leur queue sert à faire des pinceaux ; mais leur peau n'est pas une fort bonne fourrure.

On lit , dans l'Encyclopédie , que les Auteurs font mention d'autres écureuils étrangers ; mais il reste à savoir , s'ils sont de la même espece que l'écureuil ordinaire , ou si c'est improprement qu'on leur a donné le nom d'*Ecureuil*. Pour s'en assurer , il faudroit avoir des descriptions exactes de ces animaux. L'abus des noms n'est que trop fréquent dans l'Histoire Naturelle ; on en a un exemple frappant moins dans l'écureuil gris de Virginie , que l'on dit être aussi gros qu'un lapin , que dans le *coquallin* : voyez ce mot ; & dans l'*écureuil volant* , qui nous a paru être si ressemblant à de certains rats , qu'on seroit tenté de croire que ceux qui l'ont nommé *Ecureuil* , n'avoient jamais vu ni écureuils , ni loirs , ni lérôts.

ECUSSON , ou FRAGMENS D'ECHINITE , *Echinodermatum fragmenta*. On donne ce nom à des pieces quarrées ou orbiculaires , dont l'assemblage , en très grand nombre , compose la coquille de l'*oursin* : voyez ce mot.

Communément les écussons sont des parties pétrifiées du ventre de l'échinite spatagoïde : on en trouve aussi de crenelés ou dentelés , & qui appartiennent à l'*oursin* , appelé *Echinomérite* par quelques Auteurs ; d'autres échancrés au bord , comme les futures du crâne , & qui proviennent de l'*oursin* discoïde. On ne peut guere avoir une idée nette de tout ceci , qu'en lisant le mot OURSIN.

EDERDON ou EDREDON. Voyez au mot CANARD A DUVET.

EDOLIO. Oiseau qu'on voit au Cap de Bonne-Espérance , & qui ressemble parfaitement au coucou. On le rencontre toujours dans des buissons épais , ou sur de hauts arbres. Dès qu'il fait beau , il crie d'un ton lamentable *Edolio* , *Edolio* : il articule cette petite chanson aussi distinctement qu'un homme peut le faire ; c'est de-là que lui est venu son nom.

EELPOUT. Voyez LOTTE.

EFFLORESCENCE. Nous désignons par ce mot , la matiere en flocons , qui se forme à la superficie de certains corps qui se décomposent , comme on l'observe sur le cobalt , sur les pyrites sulfureuses , martiales & cuivreuses : quelquefois la matiere est poudreuse , ainsi qu'il arrive aux sels qui perdent leur eau de cristallisation ; tels sont les aluns , les vitriols , &c. L'arsenic exposé à l'air , devient également farineux. Voyez les articles PYRITES , VITRIOL , COBALT , ARSENIC & ALUN.

EFFRAYE. Espece d'oiseau de nuit, autrement appelé *Frefaye*. Voyez ce mot.

EGAGROPILE, *Ægagro-pileus*. On donne ce nom à des pelotes ou boules sphériques de poil, qu'on trouve dans les intestins, & plus souvent dans la panse, qui est le premier des quatre estomacs de plusieurs quadrupedes ruminants, tels que le bœuf, le veau, la vache, le mouton, la chevre, le chamois, le bouc, &c. Ces boules sont formées de l'assemblage des poils que ces animaux détachent & avalent en se léchant, ce qu'ils font très communément, sur-tout dans le tems qu'ils sont en repos : leur salive colle ces poils les uns sur les autres ; le mouvement inutile, que leur estomac fait pour digérer ces poils, leur fait prendre, avec le tems, la forme sphérique qu'on remarque dans l'éragropile. Ces boules sont quelquefois velues en dehors comme en dedans, & d'autres fois unies, comme enduites ou enveloppées d'une croûte brunâtre, dure, luisante & semblable à du cuir ; mais celles-ci sont formées depuis long-tems, & l'on en voit qui ont jusqu'à quatre & cinq pouces de diametre.

On trouve souvent dans le ventricule de l'ysard ou chamois une pelotte grosse comme un œuf de poule, ovale, un peu applatie, très légère & revêtue d'une écorce dure, noirâtre & luisante ; l'intérieur est composé d'herbes mâchées en pelotons, faisant parties de celles que l'animal avoit avalées pour sa nourriture. On l'appelle *Bezoard d'Allemagne* ; mais on ne lui reconnoît aucune des vertus si vantées, soit pour les hémorrhagies, soit pour les vertiges. En effet, ordonner des masses de poil non digérables, c'est tomber dans le ridicule de Velschius qui a composé un livre des propriétés de l'*Egagropile*. Voyez l'article RUMINANTS.

EGLANTIER & EGLANTINE. Voyez ROSIER SAUVAGE à l'article ROSIER.

EGLEDUN ou EGLEDON, est le *canard à duvet* ou à *plumes molles*, dont il est parlé dans la suite de l'article CANARD. Voyez ce mot.

EGLEFIN ou EGREFIN, *Eglefinus*. On donne ce nom à une espece de *Morue* ou *Merlu*. Voyez ces mots.

EGRISÉE. Les Lapidaires donnent ce nom à la poudre de diamants noirs, dont on se sert pour user les bords des autres diamants, & pour en adoucir les inégalités des facettes.

EGUILLETTE. Nom qu'on donne en Bretagne à l'*Orphie*. Voyez ce mot. Goëdard le donne aussi à la *Chenille de ronce*.

EIDER. Voyez CANARD A. DUVET.

EISENMAN ou EISENRAM ou EYSENGLANTZ. C'est un minéral ferrugineux, qui accompagne quelquefois les mines d'étain, qui leur sert d'enveloppe, de cadre, ou en décele des filons assez riches. L'eisenram est regardé par tous les Minéralogistes du Nord, comme une mine de fer réfractaire, arsenicale, vorace & stérile en métal : elle est remplie de mica, ou écailleuse, grisâtre, & devient rouge à mesure qu'on en détache des parties avec la lime. Voyez l'article FER. On donne encore le nom d'*Eisenram* à de

l'or de lavage, qui, dans la séparation qu'on fait, par la scébile, des parties sabloneuses & limoneuses avec lesquelles on le trouve mêlé, s'est attaché à de petits grains bruns ou noirâtres de fer, attirable à l'aimant. *Voyez* aussi l'article WOLFRAM.

ELAN ou ELLEND, en latin *Alce*. Animal du genre des cerfs, & que l'on regarde comme l'Alcée des Anciens.

L'Élan est un animal quadrupède ruminant & cornu, sauvage, grand comme un cheval, & habitant les pays Septentrionaux. On en trouve en Moscovie, en Lithuanie, en Pologne, en Suede, en Laponie & en Canada; plus rarement dans ces quatre derniers pays; mais sur-tout en Prusse. Il a plus de cinq pieds & demi depuis le bout du museau jusqu'au commencement de la queue, qui n'a que deux pouces de longueur: sa tête est fort grosse, ses yeux sont étincellants, ses levres sont grandes, grosses & détachées des gencives, ses dents sont médiocres, ses oreilles ressemblent assez à celles de l'âne pour la largeur & pour la longueur, son ventre est ample comme celui de la vache, sa queue est fort petite, ses jambes sont longues & menues, ses pieds noirâtres, & ses ongles fendus comme ceux du bœuf: son poil, d'un jaune obscur, mêlé d'un gris cendré, approche assez, pour la couleur, de celui du *chameau*; cependant on dit que la couleur varie suivant les saisons de l'année, qu'il est plus pâle en été qu'en hiver, au contraire de ce que nous voyons arriver aux *daims* & aux autres animaux. Ce poil a jusqu'à trois pouces de longueur; lorsqu'on le coupe, & qu'on l'examine au microscope, il paroît spongieux en dedans comme le jonc. Comme ce poil est élastique, il est propre à faire des matelats & à garnir des selles. Il faut que les jambes de ce quadrupède soient extrêmement fortes & roides, puisque d'un coup de pied il terrasse l'animal ou le Chasseur qui ose l'approcher. Il a les jambes si fermes qu'il court sur la glace & sur les rochers avec une extrême vitesse sans tomber, ce qui lui donne le moyen de se sauver des loups qui ne peuvent l'y suivre. Si l'on peut croire que cet animal soit sujet à l'épilepsie, on ne croira cependant pas que lorsqu'il est attaqué de l'accès de ce mal, il s'en guérit en portant son pied gauche jusque dans son oreille, & que la corne de ce pied, nommée *ungula alces*, est un remède infailible pour l'épilepsie, sur-tout lorsqu'on dit que le simple attouchement de cet ongle, porté en bague ou en amulette, guérit de cette funeste maladie: s'il pouvoit être de quelque utilité, ce seroit rapé & mis dans quelque infusion, à cause du sel volatil qu'il contient.

Il n'y a que l'élan mâle qui porte des cornes: elles sont très grandes, fort pesantes, cylindriques à leur origine, ensuite elles s'élargissent beaucoup & forment une table plate qui a sur ses bords plusieurs prolongements en forme de doigts; elles excèdent assez communément la largeur de deux palmes, tandis qu'elles égalent à peine la longueur de deux pieds. On a vu des cornes d'élan munies de dix-huit à vingt cornichons, si amples & si espacés, que deux hommes pouvoient s'y asseoir à la fois. L'élan met bas ses cornes tous les ans, aux mois de Février & de Mars; la démangeaison qu'il y sent, l'engage

gage à se frotter la tête contre les arbres pour s'en débarrasser. Il lui en croît de nouvelles, qui, lorsqu'elles sont encore tendres & cartilagineuses, sont revêtues d'une peau molle & lanugineuse qui les garantit du froid jusqu'à ce qu'elles aient acquis une dureté convenable : au mois d'Août, sa tête se trouve ornée d'un nouveau bois.

Dans la dissection anatomique de cet animal, on a observé que la glande pinéale est d'une grandeur extraordinaire, puisqu'elle a plus de trois lignes de long, ainsi que celle du *dromadaire*. Cette observation est favorable à ceux qui attribuent à la différente conformation des organes du cerveau, les diverses opérations des sens intérieurs ; car on remarque que les *lions*, les *ours*, & les autres bêtes courageuses & cruelles, ont cette partie si petite, qu'elle est presque imperceptible, au lieu qu'elle est fort grande à ceux qui sont timides, comme est l'élan. On a remarqué aussi que l'organe de l'odorat est très gros & fort étendu dans cet animal, ce qui rend raison de la finesse de son odorat.

L'élan aime les lieux ombrageux & humides ; il se nourrit de feuilles, d'écorces d'arbres, de mousses. Ces animaux pour l'ordinaire vont en troupes, ils sont aussi habiles à nager que le cerf. Le mâle ne se bat point pour la femelle au tems du rut, qui arrive vers la fin d'Août ; dans ce tems il pousse un cri semblable à celui du cerf, & bat fréquemment la terre avec les pieds de devant ; son bois & ses pieds sont ses armes défensives. La femelle met bas vers la mi-Mai, & ne fait qu'un faon ou deux : ces faons suivent leurs meres pendant deux ou trois ans, & ils leur sont si attachés, qu'ils se feroient plutôt tuer que de les abandonner. En prenant ces faons tous jeunes, on peut les apprivoiser : on leur fait téter des vaches, qui les souffrent volontiers.

L'élan, comme animal peureux & timide, se retire dans les profondes solitudes des bois les plus épais. On les prend de diverses manières, soit avec des baliveaux assujettis avec des cordes, qui, en faisant l'effet de ressort, lorsque l'animal vient à passer, serrent une corde qui le saisit à la gorge & l'étrangle ; soit en le chassant avec des chiens dans des filets, ou en le faisant tomber dans des fossés. Lorsque cet animal a été blessé, si le Chasseur ne se sauve au plus vite, l'élan en fureur revient sur lui, & comme il a beaucoup de force, le foule sous ses pieds, ou l'éleve sur ses cornes, & vient souvent à bout de le tuer.

Cet animal se plaît dans les sapinieres ; on le prend facilement dans les neiges où il s'enfonce. On en envoie en France la peau passée en huile : on la vend improprement sous le nom de *Buffle*. Voyez *ce mot*. Les plus grandes peaux s'appellent *chapons*. On en fait des baudriers, des ceinturons, des gants, &c. On dit que la peau d'élan est propre à faire des cuirasses, parce qu'elle est très épaisse & très dure, & presque impénétrable aux coups de feu. On en fait encore usage dans plusieurs arts & métiers.

Il paroît que l'animal connu dans l'Amérique septentrionale sous le nom d'*Orignac*, est une espèce d'élan. Tout ce que Denys, dans son Histoire Naturelle, en rapporte, s'accorde avec ce que nous avons dit de l'élan : il

prétend que la chair de cet animal sent un peu la venaison , & est aussi agréable à manger que celle du cerf. L'orignac a pour ennemi , dans ce pays , le *Renard* & le *Quincajou*. Voyez ces mots.

Quoique l'élan soit un animal des pays septentrionaux , on en trouve cependant aussi en Afrique ; mais qui sont plus gros que ceux d'Europe : on en voit dans certains cantons de la Cordelière , & dans le voisinage de Quito : on en rencontre aussi quelques-uns à la Chine.

ELECTRUM. On donne ce nom au *Succin*. Voyez ce mot.

ELEMENTS. Les Anciens , comme tout le monde fait , admettoient quatre *Eléments* ou corps primitifs , dont ils supposoient les autres formés. L'*Air* , le *Feu* , l'*Eau* , la *Terre* : voyez ces mots. La Chymie moderne se rapproche beaucoup de ce sentiment.

ELEOMELI. C'est un baume fort huileux , plus épais que le miel & doux au goût , qui coule du tronc d'un arbre à Palmyre , contrée de la Syrie : on le tire aussi des bourgeons oléagineux de cet arbre : voilà tout ce qu'on fait de l'origine de l'*éléomeli*. Cette drogue prise dans l'eau évacue par les selles les humeurs crues & bilieuses ; les malades qui s'en servent sont attaqués d'engourdissement & perdent leurs forces , mais ces symptômes ne sont point à craindre. *Dioscoride* & *Chambers*.

ELEMI. Voyez RÉSINE ÉLÉMI.

ELEPHANT , *Elephas*. Le plus grand des quadrupèdes , comme la *ba-leïne* est le plus grand des poissons , & l'*autruche* le plus grand des oiseaux. L'éléphant est un des plus singuliers , d'entre les quadrupèdes , pour la conformation de plusieurs parties du corps. En considérant cet animal , relativement à l'idée que nous avons de la justesse des proportions , il semble mal proportionné , à cause de son corps gros & court , de ses jambes roides & mal formées , de ses pieds ronds & tortus , de sa grosse tête , de ses petits yeux & de ses grandes oreilles : on pourroit dire aussi que l'habit dont il est couvert est encore plus mal taillé & plus mal fait. Sa trompe , ses défenses , ses pieds le rendent aussi extraordinaire que la grandeur de sa taille. La description de ces parties & l'histoire de leurs usages , ne donneront pas moins d'admiration , que leur aspect cause de surprise.

Rien de plus vrai & en même tems de plus vif que le tableau que l'illustre M. de Buffon fait de cet animal. Chaque être dans la Nature a , dit-il , son prix réel & sa valeur relative ; si l'on veut juger au juste de l'un & de l'autre dans l'éléphant , il faut lui accorder au moins , l'intelligence du *castor* , l'adresse du *singe* , le sentiment du *chien* , & y ajouter ensuite les avantages particuliers , uniques , de la force , de la grandeur , & de la longue durée de la vie. Il ne faut pas oublier ses armes ou ses défenses , avec lesquelles il peut percer & vaincre le lion. Il faut se représenter que sous ses pas il ébranle la terre ; que de sa main (c'est le nom que donne à sa trompe notre éloquent Ecrivain) il arrache les arbres ; que d'un coup de son corps , il fait brèche dans un mur ; que terrible par la force , il est encore invincible par la seule résistance de sa masse , par l'épaisseur du cuir qui la couvre ; qu'il peut porter

sur son dos une tour armée en guerre, & chargée de plusieurs hommes; que seul il fait mouvoir des machines, & transporte des fardeaux que six chevaux ne pourroient remuer; qu'à cette force prodigieuse il joint encore le courage, la prudence, le sang-froid, l'obéissance exacte; qu'il conserve de la modération dans ses passions les plus vives; qu'il est plus constant qu'impétueux en amour (car Pline nous apprend que le mâle reste constamment attaché à sa femelle, & qu'on ne les voit point se battre entr'eux pour posséder une femelle, comme on le voit chez certains animaux); que dans sa colere il ne méconnoît pas ses amis; qu'il n'attaque jamais que ceux qui l'ont offensé; qu'il se souvient des bienfaits aussi long-tems que des injures; que n'ayant nul goût pour la chair & ne se nourrissant que de végétaux, il n'est pas né l'ennemi des autres animaux; qu'enfin il est aimé de tous, puisqu'ils le respectent & n'ont nulle raison de le craindre.

Les pays chauds de l'Afrique & de l'Asie sont les lieux où naissent les éléphants: ceux des Indes sont beaucoup plus grands, & par conséquent plus forts que ceux de l'Afrique. C'est sous ces climats brûlants que se trouvent toujours les plus grands animaux, ainsi qu'on l'a observé. Les éléphants de Ceylan, sans être les plus grands, sont estimés les meilleurs, parcequ'ils sont les plus courageux & les plus dociles.

On ne trouve point présentement d'éléphants sauvages dans toute la partie de l'Afrique, qui est en-deçà du Mont Atlas; il y en a même peu au-delà de ces montagnes jusqu'au fleuve du Sénégal; mais il s'en trouve beaucoup au Sénégal même, en Guinée, au Congo, à la Côte des Dents, aux Pays d'Ante, d'Acra, de Benin, & dans toutes les autres terres du Sud de l'Afrique, jusqu'à celles qui sont terminées par le Cap de Bonne-Espérance, à l'exception de quelques Provinces très peuplées; car les éléphants ont abandonné les endroits trop fréquentés par les hommes. On trouve aussi ces animaux en Abyssinie, en Ethiopie, en Négritie, sur les Côtes Orientales de l'Afrique; & dans l'intérieur des terres de toute cette partie du monde. Il y en a aussi dans les grandes Isles de l'Inde & de l'Afrique, comme à Madagascar, à Java, & jusqu'aux Philippines. Il paroît même, par le témoignage de tous les Voyageurs, qu'il se trouve beaucoup plus d'éléphants en Afrique qu'en Asie, quoique cependant ce dernier climat paroisse être naturellement leur patrie. La raison à laquelle on peut attribuer cette différence de nombre dans l'espece, selon M. de Buffon, c'est que les Nègres qui n'ont pas eu l'art de soumettre les éléphants comme le font les Asiatiques, n'ont pas l'avantage de ces peuples pour les attaquer à force ouverte, avec des éléphants privés; comme on le peut voir à l'article de la chasse de l'éléphant: les Nègres ne peuvent les prendre que par des embûches dans des fosses qu'ils recouvrent de broussailles.

Quoique les climats tempérés soient peu propres à l'éléphant, on en a cependant vu un vivre, dans la Ménagerie du Roi de France, pendant treize ans. Cet éléphant étoit du Royaume de Congo; il fut envoyé au Roi en 1668, par le Roi de Portugal. Cet animal, qui n'étoit alors âgé que de

quatre ans, avoit déjà six pieds & demi de hauteur, à prendre depuis la terre jusqu'au-dessus du dos. Pendant les treize années qu'il vécut, il ne crut que d'un pied : on peut présumer que ce fut le changement de pays & de la nourriture qui retarda son accroissement à ce point. Lorsque MM. de l'Académie Royale des Sciences en firent la description, il n'avoit que sept pieds & demi de hauteur; son corps avoit douze pieds & demi de tour; sa longueur étoit presque égale à sa hauteur. Cet animal étoit petit en comparaison de ceux que l'on voit en Asie, & qui ont, dit-on, jusqu'à treize, quatorze ou quinze pieds, & même plus, de hauteur.

Lorsque l'éléphant est revêtu de sa chair & de sa peau, les jambes de derrière paroissent plus courtes que celles de devant, parcequ'elles sont moins dégagées de la masse du corps : ces jambes ressemblent plus à celles de l'homme qu'à celles de la plupart des quadrupèdes, en ce que le talon pose à terre, & que le pied est fort court : la plante de leurs pieds est garnie d'une corne en forme de semelle, qui est dure, solide, & épaisse d'un pouce : il y a lieu de croire que cette partie varie de forme dans les divers individus. La force des jambes de l'éléphant est proportionnée à sa lourde masse; aussi on dit qu'il va fort vite, & que de son pas il atteint aisément un homme qui court. Il nâgé très bien, tant à cause du grand volume d'eau, que sa masse déplace, que parcequ'il est sujet à avoir le ventre enflé par des veines qui le lui rendent fort gros. Quelques Auteurs ont dit, que le peu de souplesse des jambes, empêchoit l'éléphant de se relever lorsqu'il étoit couché. On a appris de ceux qui ont gouverné celui de la Ménagerie, que les huit premières années qu'il y a vécu, il se couchoit & se relevoit avec beaucoup de facilité, & que les cinq dernières années il ne se couchoit plus pour dormir, mais qu'il s'appuyoit contre le mur de sa loge; en sorte que si il arrivoit qu'il se couchât, lorsqu'il étoit malade, il falloit percer le plancher d'au-dessus, pour le relever avec des engins. Mais vraisemblablement, cet animal, dans son climat & dans son état naturel, n'auroit pas perdu si promptement la souplesse de ses jambes; & l'on peut regarder comme incertain, ce que plusieurs Auteurs ont avancé, que pour se rendre maître d'un éléphant, on observe l'arbre sur lequel il s'appuie pour dormir pendant la nuit; qu'on le scie presque tout-à-fait pendant son absence, & que lorsque ce pesant animal vient à s'appuyer contre l'arbre pour prendre son repos, il tombe sans pouvoir se relever; du moins pourroit-on penser que cette méthode ne peut servir au plus que pour prendre les vieux éléphants.

L'organe le plus admirable & le plus particulier à l'éléphant, est sa trompe dans laquelle on remarque des mouvemens & des usages qui ne se trouvent point dans les autres animaux; sa structure est tout-à-fait singulière.

Cette trompe est très longue, & l'animal l'allonge & la raccourcit à volonté. Cette partie, qui à proprement parler n'est que son nez, est charnue, nerveuse, creuse comme un tuyau, extrêmement flexible dans tous les sens, l'extrémité de cette trompe s'élargit comme le haut d'un vase, & fait un

rebord dont la partie de dessous est plus épaisse que les côtés ; ce rebord s'allonge par le dessus , & forme alors comme le bout d'un doigt. Au fond de cette espece de petite tasse , on apperçoit deux trous , qui sont les narines : c'est par le moyen de ce rebord qui est à l'extrémité de la trompe ou de cette espece de doigt , que l'éléphant fait tout ce que l'on peut faire avec la main , jusqu'au point que celui de la Ménagerie dénouoit les cordes qui l'attachoient ; qu'il prenoit avec adresse les choses les plus petites , & qu'il les rompoit.

Lorsque cet animal applique les bords de l'extrémité de sa trompe sur quelques corps , & qu'il retire en même tems son haleine , ce corps reste collé contre la trompe , & en suit les divers mouvements ; c'est ainsi que l'éléphant enleve des choses fort pesantes , & même jusqu'à un poids de deux cents livres : c'est encore dans cette trompe que réside , pour ainsi dire , tout le sens du toucher de cet animal : ce sens est aussi délicat , aussi distinct dans cette espece de main , que dans celle de l'homme.

L'éléphant a le col trop court pour pouvoir baisser sa tête jusqu'à terre , & brouter l'herbe avec la bouche , ou boire facilement : lorsqu'il a soif , il trempe le bout de sa trompe dans l'eau , & en aspirant , il en remplit toute la cavité ; ensuite il la recourbe en dessous pour la porter dans sa bouche , & l'enfonce jusques dans le gozier au-delà de l'épiglotte. L'eau poussée par la simple expiration , descend dans l'œsophage ; & par cette admirable prévoyance de la Nature , il n'entre point d'eau dans le larynx , ce qui seroit arrivé nécessairement sans cela. Quand l'éléphant veut manger , il arrache l'herbe avec sa trompe , & en fait des paquets qu'il porte dans sa bouche. Tout cela peut faire penser que le petit éléphant tete avec sa trompe , & qu'il la recourbe ensuite dans sa bouche pour avaler le lait. Cette trompe lui sert non-seulement de main , mais encore d'un bras très nerveux ; car on dit qu'il s'en sert pour arracher les arbres médiocres , & briser les branches d'arbres lorsqu'il veut se faire un passage dans les forêts. Il fait jaillir au loin & dirige à son gré l'eau dont il a rempli sa trompe : on dit qu'elle peut en contenir plusieurs seaux.

La tête de l'éléphant a quelque chose de monstrueux : elle supporte deux oreilles très longues , très larges & très épaisses , disposées à-peu-près comme celles de l'homme ; elle est recouverte d'une peau fort épaisse. Le crâne est aussi très fort , sur-tout à l'endroit du front , où il a jusqu'à sept pouces d'épaisseur , ce qui supplée aux sutures qui lui deviennent inutiles pour l'usage établi par la sage Nature , d'empêcher que les fractures ne s'étendent trop loin. Il est certain que cette épaisseur extraordinaire des os du crâne de cet animal , les empêche d'être sujets à des fractures qui lui soient aussi dangereuses , qu'elles le sont aux autres animaux , à qui la moindre fêlure des os du crâne peut être mortelle. C'est apparemment cette épaisseur qui fait que les fleches peuvent percer la tête de l'éléphant assez avant sans le blesser dangereusement , & même sans en faire sortir du sang : mais au milieu du derriere de la tête , le crâne n'a pas l'épaisseur d'une demi-ligne ;

cependant cet endroit du cerveau est celui dont la blessure est la plus mortelle, ne pouvant être si légèrement blessé, que l'animal ne meure dans le même instant. Aussi lorsqu'il arrive que l'éléphant entre en fureur, le conducteur, pour sauver sa vie, n'a d'autre ressource que celle de le tuer : pour cet effet, il lui enfonce un clou à l'endroit du crâne dont nous venons de parler, dans la fosse qui est située entre deux petites éminences. Vraisemblablement il est rare que l'éléphant entre dans de semblables fureurs, cet animal étant d'un naturel doux & docile. Il est digne de remarque que le cerveau de ce monstrueux animal est extraordinairement petit.

La bouche de l'éléphant est la partie la plus basse de sa tête, & semble plutôt être jointe à sa poitrine qu'à sa tête; elle n'est armée que de huit dents, quatre à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure. Comme sa trompe & ses huit dents seroient une trop foible défense, la Nature lui en a encore donné deux autres, qui sortent de la mâchoire supérieure, & qui sont très fortes. Elles sont longues de quelques pieds, & un peu recourbées en haut : l'animal s'en sert pour attaquer & se défendre vivement contre ses ennemis. La femelle est armée de défenses de même que le mâle, ainsi qu'on l'a vu dans l'éléphant femelle de Versailles. Ces défenses n'ont pas tombé pendant treize années que cet animal a vécu à la Ménagerie; ce qui doit faire croire qu'elles ne sont pas sujettes à tomber comme le bois du cerf. Elles sont creuses dans leur naissance, & environ jusqu'à la moitié de leur longueur, & même plus; le reste jusqu'à la pointe est solide : leur substance est ce qu'on nomme l'*ivoire*, & approche plus de la nature de la corne, que de celle des dents; car elle s'amollit au feu, ce qui n'arrive pas à celle des dents. Ces défenses sont si fortes, que l'éléphant de la Ménagerie les avoit employées à faire deux trous dans les deux faces d'un pilier de pierre qui sortoit du mur de sa loge. Lorsqu'il vouloit dormir, il faisoit entrer ses défenses dans ces trous, & cela lui servoit de point d'appui.

L'éléphant a des yeux très petits : ses paupières sont garnies de poils, ce qui lui est particulier avec l'*homme*, le *singe*, l'*autruche* & le *grand vautour*. Les yeux de l'éléphant, quoique petits relativement au volume de son corps, sont, dit M. de Buffon, brillants & spirituels; & ce qui les distingue de ceux de tous les autres animaux, c'est l'expression pathétique du sentiment, la conduite presque réfléchie de tous leurs mouvements : il les tourne lentement & avec douceur vers son maître; il a pour lui le regard de l'amitié; celui de l'attention lorsqu'il parle, le coup d'œil de l'intelligence quand il l'a écouté, celui de la pénétration lorsqu'il veut le prévenir; il semble réfléchir, délibérer, penser & ne se déterminer qu'après avoir examiné & regardé à plusieurs fois, & sans précipitation, sans passion, les signes auxquels il doit obéir. Son corps est couvert d'une peau toute composée de rides, ce qui la fait paroître fort vilaine, d'autant plus qu'elle est garnie, en quelques endroits seulement; de soie semblable à celle du sanglier. On en observe sur-tout à la partie convexe de la trompe, aux paupières, & à la queue qui en est garnie en toute sa longueur, & terminée par une houe, dont les

poils sont assez longs , semblables en quelque sorte à de la corne , & de la grosseur d'un gros fil de fer. Les Indiens attribuent à ces poils de grandes vertus qui ne sont qu'imaginaires : les Africains , tant hommes que femmes , s'en servent dans leurs parures. Les queues d'éléphant sont si recherchées , qu'elles se vendent quelquefois deux ou trois Esclaves : les Negres exposent même souvent leur vie pour tâcher de la couper à l'animal vivant ; car alors la superstition lui attribue de bien plus grandes vertus.

Nourriture de l'éléphant , & ses ennemis.

Ces animaux , qui sont très commodes & très utiles pour les services qu'ils rendent , & dont nous parlerons plus bas , sont couteux à nourrir ; aussi la largeur de leurs intestins surpasse-t-elle de beaucoup la proportion qu'ils ont coutume d'avoir avec le reste du corps dans les animaux qui ne ruminent pas comme celui-ci. Un éléphant consomme plus en huit jours , que ne consommeroient trente Negres. Fr. Pierre de Laval rapporte dans ses voyages , qu'un éléphant mange jusqu'à cent livres de ris par jour. La nourriture du petit éléphant de la Ménagerie , sans y comprendre ce qui lui étoit donné par ceux qui le visitoient , consistoit tous les jours en quatre-vingts livres de pain , douze pintes de vin , & deux seaux de potage où il entroit quatre ou cinq livres de pain ; au-lieu du potage , on lui donnoit de deux jours l'un , deux seaux de ris cuit dans l'eau. Il avoit aussi tous les jours une gerbe de bled pour s'amuser : car après avoir mangé les grains des épis , il faisoit des poignées de paille , dont il chassoit les mouches , & prenoit plaisir à la rompre par petits morceaux , ce qu'il faisoit fort adroitement avec le bout de sa trompe ; il mangeoit aussi de l'herbe dans les promenades qu'on lui faisoit faire tous les jours.

Plus ces animaux s'éloignent de leur climat naturel , plus il est nécessaire , pour les conserver , de leur donner une nourriture chaude qui puisse entretenir leur chaleur naturelle. Thevenot , dans ses voyages , dit même qu'à Delhy , non-seulement on leur fait manger de la viande , mais qu'on leur fait boire de l'eau-de-vie , & qu'on leur donne une pâte de farine , de sucre & de beurre.

Les éléphants sauvages vivent d'herbes , de fruits , & même de branches d'arbres , dont ils mangent du bois assez gros. Dans les mois d'Août & de Septembre , ils viennent dans les champs de bled ou de mil , où ils font encore plus de dégâts par les grains qu'ils foulent aux pieds , que par ceux qu'ils consomment. Les Africains , pour garder leurs champs , allument de côtés & d'autres , des feux dont l'éclat les épouvante. Ces terribles mangeurs peuvent cependant très bien rester jusqu'à sept à huit jours sans boire ni manger. Leur boisson est de l'eau , qu'ils ont soin de troubler avant que de la boire , ainsi que le fait le *chameau* : on remarque la même chose dans les *oies* , les *ducs* , & autres oiseaux qui avalent de petites pierres , & mêlent fort souvent du sable & du gravier avec l'eau qu'ils boivent.

Il convient d'observer aussi que les éléphants sauvages vivent ordinairement en société dans les forêts & les vastes solitudes ; ils ne s'écartent guere des autres , afin de se porter du secours dans l'occasion : aussi les chasseurs n'osent-ils attaquer que ceux qui s'égarent ou qui traînent après les autres ; car pour assaillir la troupe entière , il faudroit une petite armée , encore perdrait-on beaucoup de monde avant de parvenir à les vaincre. Lorsque les éléphants font des marches périlleuses , c'est-à-dire , lorsqu'ils vont paître sur des terres cultivées , ils vont tous de compagnie ; le plus fort & le plus âgé marche en tête , conduit la troupe ; le second en âge & en force fait l'arrière-garde ; les plus foibles sont dans le milieu de la troupe , & les mères portent leurs petits qu'elles embrassent avec leurs trompes.

Ces colosses sauvages entrent quelquefois dans des champs de tabac , qu'ils ravagent. Si la plante est encore jeune & beaucoup aqueuse , elle ne leur fait point de mal ; mais si elle est mûre ou proche de sa maturité , elle les enivre & leur fait faire des postures très plaisantes. Quand , par malheur pour eux , la dose en est un peu trop forte , ils s'endorment , & alors les Negres se vengent aisément du dommage qu'ils ont reçu de leurs pieds & de leur trompe. La fiente de ces animaux ne vaut rien pour engraisser les terres ; parcequ'elle produit quantité de racines , d'herbes , & quelquefois de tabac.

La raison en est , que comme la digestion ne se fait jamais parfaitement bien dans leur vaste estomac , les graines sont rendues quelquefois aussi peu altérées qu'elles l'étoient avant d'avoir été avalées.

Les éléphants sont très fréquents sur la Côte d'or , où ils font beaucoup de tort aux arbres fruitiers & aux *bananiers*.

Quoique l'éléphant soit supérieur à tous les autres quadrupèdes par la masse , qu'il ait dans sa trompe & dans ses longues & vigoureuses défenses , des armes terribles , il est cependant attaqué & vaincu par d'autres animaux féroces , dont quelques-uns ont la force jointe à la légèreté des mouvements. Ses ennemis sont le *tigre* , le *lion* , les *serpents* , le *rhinoceros* , sur-tout l'homme qui emploie divers moyens pour l'attraper , le réduire en esclavage , ou le faire mourir pour lui enlever ses défenses d'ivoire.

Le rhinoceros se sert de la corne qu'il porte au-dessus du nez , pour tâcher de percer le ventre de l'éléphant. Quoique le lion soit pour l'éléphant un ennemi des plus dangereux , étant armé de griffes terribles , & de dents acérées & vigoureuses , on dit qu'il est encore moins redoutable pour lui que le tigre , parceque celui-ci , à la faveur de son agilité prodigieuse , l'attaque , pour ainsi dire , de tous les côtés en même tems. Lorsque le tigre peut parvenir à saisir la trompe , il la déchire , ou la presse si fort , qu'il étouffe quelquefois l'éléphant : les blessures qu'il y fait sont telles , que la trompe devient inutile à l'animal , & qu'il périt de faim.

L'éléphant est encore fort exposé aux insultes des plus vils insectes : les mouches l'incommodent & le piquent dans les endroits où sa peau est gercée ; c'est pourquoi il fronce sa peau & écrase tous les insectes qui se trouvent dans les gerçures. Il a soin de jeter avec sa trompe de la poussière sur son

son corps , & de se rouler sur la terre en sortant du bain ; car il ne manque pas de se baigner souvent , soit pour faire tomber la croute que la poussière a formé sur sa peau , soit pour ramollir son épiderme qui est sujet à se dessécher : aussi , pour prévenir ce desséchement , frotte-t-on d'huile la peau de ceux que l'on tient en esclavage.

Mœurs & instinct de l'éléphant.

L'éléphant a beaucoup d'instinct & de docilité : on dit qu'il est susceptible d'attachement , d'affection & de reconnaissance , jusqu'à sécher de douleur lorsqu'il a perdu son gouverneur. On l'apprivoise si aisément , & on le soumet à tant d'exercices différents , que l'on est surpris qu'une bête aussi lourde prenne si facilement les habitudes qu'on lui donne.

On lit dans l'Histoire Naturelle de M. de Buffon , que l'on se sert de l'éléphant pour le transport de l'artillerie sur les montagnes ; & c'est-là que l'intelligence de cet animal se fait le mieux sentir. Voici comme il s'y prend : pendant que les bœufs attelés à la pièce de canon , font effort pour la traîner en haut , l'éléphant pousse la culasse avec son front , & à chaque effort qu'il fait , il soutient l'affut avec son genou qu'il place à la roue. Il semble qu'il comprenne ce qu'on lui dit : veut-on lui faire faire quelque corvée pénible , s'il y répugne , le *Cornac* (c'est ainsi qu'on appelle son conducteur) promet de lui donner de l'*arac* (voyez ce mot) ou quelque chose qu'il aime ; alors l'animal se prête à tout ; mais il est dangereux de lui manquer de parole , plus d'un *Cornac* en a été la victime. Il s'est passé à ce sujet , dans le Décan , un trait qui mérite d'être rapporté , & qui , tout incroyable qu'il paroît , est exactement vrai. Un éléphant venoit de se venger de son *Cornac* en le tuant : sa femme , témoin de ce spectacle , prit ses deux enfants & les jeta aux pieds de l'animal encore tout furieux , en lui disant ; *puisque tu as tué mon mari , ôtes-moi aussi la vie , ainsi qu'à mes enfants*. L'éléphant s'arrêta tout court ; radouci , & comme s'il eût été touché de regret , il prit avec sa trompe , le plus grand de ces deux enfants , le mit sur son col , l'adopta pour son *Cornac* , & n'en voulut point souffrir d'autres.

Ces animaux ne s'irritent que lorsqu'on les offense ; alors ils dressent les oreilles , & sur-tout la trompe dont ils se servent pour renverser les hommes ou les jeter au loin , arracher des arbres , & soulever tout ce qui leur fait obstacle. Lorsqu'ils ont terrassé un homme , & que leur fureur est grande , ils l'entraînent , à l'aide de leur trompe , contre leurs pieds de devant ; & marchent dessus , ou le massacrent en le frappant & le perçant avec leurs défenses. L'éléphant obéit exactement aux volontés de son maître : s'il lui commande de faire peur à quelqu'un , il s'avance sur lui comme s'il vouloit le mettre en pièce ; mais lorsqu'il est tout prêt , il s'arrête tout court sans lui faire le moindre mal. Le Prince du Mogol en a qui servent de bourreaux pour exécuter les criminels ; si leur conducteur leur commande de dépêcher

promptement ces misérables , ils les mettent en pièces en un moment avec leurs pieds ; & au contraire s'il leur commande de les faire languir , ils leur rompent les os les uns après les autres , & leur font souffrir un supplice aussi cruel que celui de la roue. Suivant le rapport de ceux qui gouvernoient l'éléphant de la Ménagerie , il sembloit connoître quand on se moquoit de lui , & s'en souvenir aussi pour s'en venger quand il en trouvoit l'occasion. Un homme l'ayant trompé en faisant semblant de lui jeter quelque chose dans la gueule , il lui donna un coup de sa trompe qui lui rompit deux côtes , il le foulâ aux pieds , lui cassa une jambe , & voulut lui enfoncer ses défenses dans le ventre ; mais heureusement elles entrèrent dans la terre aux deux côtés de la cuisse qui ne fut point blessée. Un peintre voulant le dessiner en une attitude extraordinaire , qui étoit de tenir sa trompe levée & sa gueule ouverte , le valet du Peintre , pour le faire demeurer en cet état , lui jettoit des fruits dans la gueule , & le plus souvent n'en faisoit que le geste : à la fin l'éléphant en fut indigné ; & comme s'il eût connu que l'envie que le Peintre avoit de le dessiner , étoit la cause de cette importunité , au-lieu de s'en prendre au valet , il s'adressa au maître , & lui jeta par sa trompe une quantité d'eau , dont il gâta le papier sur lequel il dessinoit. La fureur de ces animaux est très dangereuse ; mais comme ils craignent beaucoup le feu , on arrête cette fureur en leur jettant des pièces d'artifices enflammées.

Tous les éléphants privés ont d'abord été sauvages ; car l'éléphant ne s'accouple point & n'engendre point dans l'état de domesticité , quoiqu'il ressent de tems en tems les plus vives atteintes de l'effervescence amoureuse , qui le font entrer en fureur ; mais ne pouvant se satisfaire sans témoin , il devient insensé , violent , & on a besoin des chaînes les plus fortes & d'entraves de toutes espèces , pour arrêter ses mouvements & briser sa colère. On sépare alors les éléphants mâles d'avec les femelles , pour éviter de donner sujet à ces accès de fureur. L'éléphant diffère donc de tous les animaux domestiques que l'homme traite ou manie comme des êtres sans volonté , dit M. de Buffon ; il n'est pas du nombre de ces esclaves nés que nous propageons , mutilons , ou multiplions pour notre utilité : ici l'individu seul est esclave , l'espèce demeure indépendante & refuse constamment d'accroître au profit du tyran.

Il y a beaucoup d'incertitude sur le tems de la portée de la femelle de l'éléphant , & sur la durée du tems qu'elle allaite son petit ; on soupçonne qu'elle n'en produit qu'un seul tous les deux ou trois ans. Il y a aussi beaucoup de diversité de sentimens sur la manière dont se fait leur accouplement. On prétend que la femelle amasse des feuilles avec sa trompe , en fait une sorte de lit , s'y couche sur le dos quand elle veut recevoir le mâle , & l'appelle par des cris ; que leur accouplement ne se fait que dans les lieux écartés & les plus solitaires. La durée de la vie de ces animaux n'est guère mieux connue : quelques-uns disent qu'ils vivent jusqu'à cent vingt & même deux cents ans. Si l'on connoissoit bien la durée de leur accroissement , on

pourroit juger de la durée de leur âge ; puisque , suivant l'observation de M. de Buffon , la longueur de la vie est proportionnelle à la durée de l'accroissement.

Une observation remarquable & assurée par l'examen , c'est que l'orifice extérieur de la matrice n'est point dans la femelle de l'éléphant , au même endroit où elle se voit aux autres animaux. Dans l'éléphant , elle est située au milieu du ventre près du nombril : elle étoit placée dans l'éléphant de la Ménagerie que l'on a disséqué , à l'extrémité d'un conduit qui formoit une éminence depuis l'anus jusqu'à l'ouverture placée près du nombril : ce conduit qui avoit deux pieds & demi de long , enfermoit un clitoris de la même longueur ; en sorte qu'il paroïssoit remplir entierement ce conduit , ainsi que le fait la verge des mâles de la plupart des brutes : cette structure avoit même toujours fait croire , avant la dissection , que cet éléphant étoit un mâle. Les mamelles dans la femelle de l'éléphant , sont au nombre de deux , & placées à la poitrine comme aux femmes.

On feroit une longue histoire de l'éléphant , si on rapportoit tout ce qu'on a dit de son instinct , & tous les détails du cérémonial établi chez différens peuples qui ont beaucoup de vénération pour cet animal. On verroit que l'amour du merveilleux a fait croire que l'éléphant a des vertus & des vices , qu'il est chaste & modeste , orgueilleux , &c. Des nations entières ont fait des guerres longues & cruelles , & des milliers d'hommes se sont égorgés pour la conquête de l'*éléphant blanc* , qui n'est qu'une variété accessoire de la nature. Cent Officiers soignent un éléphant de cette couleur à Siam ; il est servi en vaisselle d'or , promené sous un dais , logé dans un pavillon magnifique , dont les lambris sont dorés. Plusieurs Rois de l'Orient préfèrent à tout autre titre , celui de *Possesseur de l'éléphant blanc*. Le cas que les Indiens font de l'éléphant blanc est fondé sur l'idée qu'ils ont de la métempsychose , ils pensent que ces sortes d'éléphants sont les mânes vivants des Empereurs de l'Inde ; ils sont persuadés qu'un corps aussi majestueux que celui de cet animal ne peut être animé que par l'ame d'un grand homme , ou d'un Roi. Plusieurs Voyageurs disent qu'en Orient on dresse des éléphants à avoir pour le Prince la vénération due à la Majesté Royale ; aussi-tôt qu'ils l'aperçoivent , ils fléchissent les genoux pour l'adorer à la manière des Orientaux , & se relevent un moment après.

On a observé que les éléphants qui vivent dans les plaines , dans les pays gras , & sur le bord du Niger , qui est fort fréquenté par les hommes , sont plus doux , plus aisés à apprivoiser , que ceux qui vivent dans les montagnes & dans les deserts de l'Afrique : parceque ceux-ci vivant toujours au milieu des bêtes féroces qui cherchent à les surprendre pour les dévorer , en deviennent eux-mêmes plus sauvages & plus féroces.

Usage que l'on fait des Elephants.

Les Princes Indiens font consister en partie leur grandeur à nourrir beau-

coup d'éléphants , ce qui leur est d'une grande dépense ; on dit que l'Empereur du Mogol en a plusieurs milliers. Le Roi de Madari , le Seigneur de Narsingue & de Bisnagar , le Roi des Naires & celui de Manful en ont plusieurs centaines , qu'ils distinguent en trois classes : 1°. les plus grands sont pour le service immédiat du Prince ; leur harnois sont d'une magnificence qui étonne , on les couvre de draps travaillés en or & couverts de perles , leurs dents sont ornées d'or très fin & d'argent , & quelquefois on les couvre de diamans : 2°. ceux d'une taille moyenne sont pour la guerre : 3°. les petits sont pour l'usage & le service ordinaire.

Ces animaux rendent des services proportionnés à leur force. Ils portent toutes sortes de fardeaux d'un poids énorme , jusqu'à de petites pieces de canon sur leur affut. En Perse & aux Indes , les femmes de qualité & les grands Seigneurs voyagent sur ces animaux : on dispose sur leur dos de larges pavillons richement ornés , dans lesquels plusieurs personnes peuvent se coucher ou s'asseoir.

On leur fait aussi porter des tours dans lesquelles on place plusieurs hommes armés pour la guerre. Ces tours , au moins dans certains endroits , sont longues & larges comme un grand lit , & placées en travers sur le dos de l'éléphant ; elles peuvent contenir six ou sept personnes assises à la manière des Lévantins. Tout le monde fait que les Orientaux furent les premiers à mener de ces animaux en troupe aux combats. Ils rompoient les rangs , épouvantoient les chevaux , écrafoient les hommes sous leurs pieds , & il étoit difficile de les blesser. On les avoit même dressés à saisir les hommes avec leurs trompes , & à les jeter dans la tour qu'ils portoient ; cette tour contenoit des soldats qui faisoient pleuvoir des javelots de toutes parts. Lorsqu'on menoit l'éléphant au combat , on attachoit à l'extrémité de sa trompe une chaîne ou un sabre nud , dont il se servoit fort adroitement contre les ennemis. Dans les pays où notre canon & nos arts meurtriers ne sont qu'imparfaitement connus , on combat encore avec des éléphants.

On trouva à la fin le moyen de leur résister , ou à l'aide du feu qui les épouvante , ou avec des armes en forme de faulx , dont on leur coupoit la trompe , & de longues piques qu'on leur enfonçoit sous la queue à l'endroit où la peau est moins épaisse ; enfin on leur opposa d'autres éléphants. On vit alors les animaux les plus terribles prendre part dans les querelles des hommes , & s'entredétruire pour les défendre ou pour les vanger.

Les Romains en ayant pris sur leurs ennemis en décorèrent leurs triomphes , & en attelerent à leurs chars. César se fit éclairer par quarante éléphants qui portoient devant lui des flambeaux à la guerre. On en exposa quelquefois dans le cirque , où l'on vit des éléphants vaincus quelquefois par un seul homme : exemple frappant de la supériorité de l'adresse sur la force !

La charge du plus fort éléphant est de plus de trois mille livres ; lorsqu'on le presse , il peut faire en un jour le chemin de six journées ; il peut courir

au galop. Lorsqu'on est poursuivi par cet animal , on ne peut l'éviter qu'en faisant des détours , parcequ'il n'est pas aussi prompt à se retourner de côté, qu'à marcher en avant.

Pour conduire l'éléphant , on se met sur son col , on tient à la main une grosse verge de fer très pointue par un bout , & terminée à l'autre par un crochet pointu. On se sert de la pointe au lieu d'éperon , & le crochet supplée à la bride : car le conducteur ainsi placé , pique l'animal aux oreilles & au museau , pour diriger sa marche. Communément il le pique au front , & cette piquure lui entretient une plaie toujours ouverte. Ces animaux ont le pied très sûr , & ne bronchent presque jamais : on dit que les Romains en avoient dressé à marcher sur la corde. Comme le volume des poumons & des intestins de l'éléphant est énorme , cet animal se soutient très bien sur l'eau , comme nous l'avons dit , & y nage à merveille ; aussi s'en sert-on utilement pour le passage des rivières : outre deux pieces de canon de trois ou quatre livres de balles dont on le charge dans ces occasions , on lui met encore sur le corps une infinité d'équipages , indépendamment de quantité de personnes qui s'attachent à ses oreilles & à sa queue pour passer l'eau ; lorsqu'il est ainsi chargé il nage entre deux eaux , & on ne lui voit que la trompe qu'il tient élevée pour respirer.

Chasse de l'Eléphant.

La chasse de l'éléphant se fait différemment dans les divers pays , & suivant la puissance & les facultés de ceux qui leur font la guerre ; car au lieu de construire , comme les Rois de l'Asie , des murailles , des terrasses , ou de faire des pallissades , des parcs ou de vastes enceintes , les pauvres Nègres se contentent de creuser sur leur passage des fosses assez profondes pour qu'ils ne puissent en sortir lorsqu'ils y sont une fois tombés.

Les Princes Orientaux font ordinairement leurs chasses avec pompe ; ils y emploient tant de monde , qu'on diroit que le Prince part à la tête de ses troupes pour aller livrer bataille. Voici le tableau d'une des chasses aux éléphants , du Roi de Siam. On commence par attirer le plus grand nombre d'éléphants sauvage qu'il est possible dans un parc spacieux , environné par de gros pieux qui laissent de grandes ouvertures de distances en distances : on les y fait venir par le moyen d'une femelle , que l'on fait crier ; les mâles répondent à ces cris par des hurlemens effroyables , & s'approchent aussi-tôt des femelles qu'ils suivent : d'autres fois on les épouvante par le son des trompettes , des tambours , & sur-tout par des feux que l'on distribue en divers endroits de la forêt , pour les faire fuir dans le parc.

Lorsqu'ils y sont arrivés on fait autour une enceinte d'éléphants de guerre , pour empêcher que les éléphants sauvages ne franchissent les pallissades ; ensuite on mène dans le parc à peu près autant d'éléphants privés des plus forts , qu'il y a d'éléphants sauvages : les premiers sont montés chacun par deux Chasseurs , qui portent de grosses cordes à nœuds coulants , dont les

bouts sont attachés à l'éléphant. Les *Cornacs* ou Conducteurs de chacun de ces éléphants, les font courir contre un éléphant sauvage, qui fuit aussitôt, & se présente aux ouvertures du parc pour en sortir, mais il est repoussé par les éléphants de guerre qui forment l'enceinte du dehors. Pendant qu'ils marchent ainsi dans le parc, les Chasseurs jettent leurs nœuds si à propos dans les endroits où l'éléphant doit mettre le pied, qu'en peu de tems tous les éléphants sauvages sont attachés. A l'instant on met aux côtés de chacun d'eux deux éléphants domestiques, un de chaque côté, & on les attache avec eux; un troisième marche devant & tire l'éléphant sauvage par une corde; un quatrième le suit, & le fait marcher à grands coups de tête qu'il lui donne par derrière. On conduit ainsi les Éléphants sauvages chacun à une espece de remise où on les attache à un gros pilier qui tourne comme un cabestan de navire: on les laisse là pour leur donner le tems d'appaîser leur fureur: là ils jettent des cris terribles, & font encore des efforts étonnants pour se dégager, mais c'est en vain: alors on tache de les calmer & de les adoucir, en leur jettant des seaux d'eau sur le corps, & en leur versant de l'huile sur leurs oreilles, & au bout de peu de jours, ils deviennent doux & sont bien apprivoisés.

Au Pégu on emploie plus d'art pour cette chasse, mais moins de monde. On attire de même les éléphants sauvages par le moyen de femelles dressées au manège, & dont les parties de la génération sont frottées d'une huile fort odoriférante, que les mâles sentent de loin: elles attirent ceux-ci dans un parc environné de gros & forts pieux plantés à telle distance l'un de l'autre, qu'un homme peut passer entre deux, mais non pas un éléphant, excepté à l'entrée du parc. Lorsque les éléphants sauvages y sont entrés, on ferme la grande ouverture par une herse; les éléphants femelles que suivent les éléphants sauvages, entrent dans les écuries qu'on leur a ménagées, & à l'instant on baisse la coulisse des portes. Les éléphants sauvages se voyant seuls enfermés dans ce parc, entrent en fureur, poursuivent les hommes qui s'y trouvent pour faire les manœuvres nécessaires; mais ceux-ci échappent entre les pieux. Ces animaux en fureur jettent des cris, gémissent, font des efforts contre les pieux pendant deux ou trois heures; enfin les forces leur manquent, la sueur tombe de toutes les parties de leur corps: ils laissent pendre leur trompe à terre. Lorsqu'ils sont dans cet état, on fait rentrer les femelles dans le parc; aussitôt les éléphants sauvages commencent à les suivre: celles-ci entrent dans d'autres écuries, les éléphants les y suivent, y entrent, & ils s'y trouvent pris tous seuls, parceque les femelles sortent par une autre porte. Ils sont quatre ou cinq jours sans boire ni manger; mais au bout de ce tems, ils s'accoutument à leur esclavage.

A un quart de lieue de Louvo, il y a une espece d'amphithéâtre dont la figure est un grand carré-long, entouré de hautes murailles terrassées, sur lesquelles se placent les spectateurs; le long de ces murailles en dedans, regne une palissade de gros piliers fichés en terre à deux pieds l'un de l'autre; il y a une grande ouverture du côté de la campagne: on procède à cette

chasse de la même manière qu'on le fait dans les vastes parcs dont nous avons parlé.

A Patane, Royaume dépendant de celui de Siam, on mène seulement un fort éléphant privé dans les bois : dès que l'éléphant sauvage l'aperçoit, il vient l'attaquer. Ces deux éléphants croisent leurs trompes, s'efforçant de se renverser l'un l'autre : pendant que la trompe de l'éléphant sauvage est embarrassée, on lui lie les jambes de devant & on s'en empare, parcequ'il n'ose plus remuer ayant peur de tomber.

Le P. Labat dit plaisamment, qu'il ne fait si les éléphants d'Afrique sont plus bêtes que ceux des autres pays, ou si les Negres ont moins d'esprit & d'adresse que les Indiens ; toujours est-il certain que les Negres ne se sont pas encore avisés d'appriivoiser ces animaux & d'en faire aucun usage. Ils les attrapent dans des fosses profondes recouvertes seulement de branches avec un peu de terre, & là ils les tuent à coup de fleches. D'autres vont vingt-cinq ou trente ensemble, & osent les attaquer : le plus hardi d'entr'eux se glisse auprès de l'éléphant, lui donne un coup de sagaie & se sauve vers l'endroit où ses camarades sont cachés ; ceux-ci lui portent de nouveaux coups dans les endroits les plus foibles : tandis qu'il en veut poursuivre un, les autres le frappent de nouveau ; il périt enfin sous leurs coups. Ceci suppose une grande adresse qui est naturelle à l'homme sauvage. Les Negres font commerce avec les Européens de défenses d'éléphants : ils font des boucliers avec sa peau ; ils aiment sa chair & la trouvent excellente, sur-tout lorsqu'elle a acquis beaucoup de fumet.

Les grandes défenses dont nous avons parlé, sont ce qu'on nomme l'*ivoire* dont on fait usage en Médecine, mais sur-tout dans les Arts. C'est particulièrement à Dieppe qu'on en fait les ouvrages les plus jolis en sculpture & en marqueterie. L'ivoire, pour l'usage intérieur, a à-peu près les mêmes propriétés que la corne de cerf. La majeure partie de l'ivoire qui se voit dans le commerce, se tire des Côtes d'Afrique. L'ivoire de Ceylan est le plus estimé, parcequ'il est moins sujet à jaunir. La facilité que l'ivoire a à se fendre, le rend très difficile à travailler ; c'est pourquoi plusieurs personnes ont cherché le moyen de remédier à cet inconvénient, en donnant à cette substance des préparations qui l'amollissent. Plusieurs de ces préparations ont assez bien réussi pour faire espérer un succès plus heureux.

On tire de l'ivoire, ainsi que de la corne de cerf, en les faisant brûler dans des vaisseaux clos, une poudre d'un très beau noir, qui est d'usage dans la peinture, & qu'on nomme *Noir d'ivoire* : c'est l'*ivoire brûlé* des boutiques. Il est à remarquer que plus les matières dont on fait les noirs sont blanches, plus les noirs qui en proviennent sont beaux & hauts en couleur. Le noir liquide d'Angleterre si renommé, n'est autre chose qu'une espèce d'encre faite avec la poudre d'ivoire brûlé, étendue dans de la bière chargée de gomme arabique, d'un peu de sucre candi, & de cire vierge : on fait fondre & bouillir le tout ensemble pendant quelques minutes ; & on en

noircit le cuir des bottines & des fouliers qui paroissent alors comme enduits d'un beau vernis noir.

On doit à M. Daubenton plusieurs observations très importantes & très curieuses sur la nature de l'ivoire : voyez IVOIRE.

ELITRE : voyez ce mot à l'article INSECTE.

ELKE ou ELEND : voyez ELAN.

ELLEBORE NOIR & BLANC : voyez HELLEBORE.

ELLEBORINE, *Helleborine latifolia montana*. Plante dont les feuilles semblent ne différer d'avec celles de l'ellébore blanc, qu'en ce qu'elles sont plus petites. Ses tiges croissent à la hauteur d'un pied & demi : elles sont rondes & farineuses. Ses fleurs sont composées chacune de six feuilles inégales, blanches & purpurines, & dont le calice devient un fruit triangulaire & rempli de semences semblables à de la sciure de bois. L'elleborine croît aux lieux montagneux & ombrageux. Elle est apéritive.

EMBAUMEMENT. Composition balsamique qui sert à conserver les cadavres. Il y en a de différentes especes : voyez à l'article MOMIE.

EMBERIZA. Nom que l'on donne à l'*Ortolan jaune* & au *Traquet blanc*.

EMBRYON. C'est le nom que l'on donne au fœtus, ou plutôt à l'animalcule dont l'accroissement commence dans la matrice. Quelques Auteurs n'emploient le terme d'*embryon* que pour exprimer les rudimens du corps d'un animal, renfermés dans un œuf, dont le placenta n'a pas encore jeté des racines, pour l'implanter dans la matrice : voyez à l'article HOMME. Dès Auteurs Botanistes donnent aussi le nom d'embryon au haut du pistil où est le fruit : voyez à l'article PLANTE, le mot ETAMINE, &c.

ÉMÉ ou ÉMEU : voyez CASOAR.

EMERAUDE, *Smaragdus*. Est une pierre précieuse, diaphane, resplendissante, d'une couleur verte, plus ou moins foncée : & plus ou moins amie de l'œil pendant le jour ; car aux lumieres elle paroît noire. Sa cristallisation naturelle est d'une figure indéterminée, tantôt cylindrique ou cubique, tantôt prismatique triangulaire ou quadrangulaire : elle est plus communément en canons, dont les côtés sont inégaux & les angles obtus. Elle a pour matrice, ou le quartz, ou le cristal, ou le spath fusible, colorés en verd. On donne à ces matrices pierreuses & verdâtres, le nom de *Prase* ou de *Mere d'Emeraude* : elles sont trop tendres, trop gercées, & trop inégalement colorées, pour qu'on en fasse cas.

L'émeraude tient le cinquieme rang dans les pierres précieuses, eu égard à la dureté : la lime a un peu de prise sur elle ; cependant elle reçoit un poli vif & des plus éclatants. L'émeraude résiste long-tems au feu ordinaire, sans que sa couleur, que l'on soupçonne être due au fer & au cuivre, s'altère : néanmoins un feu violent & continu en dégage la couleur sous la forme d'une vapeur verdâtre & bleuâtre ; alors la pierre reste sans couleur, & se détruit souvent dans l'action du feu. Si on se contente de chauffer l'émeraude fortement dans le feu, jusqu'à rougir, elle y deviendra bleue, ensuite phosphorique

phosphorique dans l'obscurité : mais elle ne garde cette couleur & sa propriété noctiluque qu'autant qu'elle est pénétrée par le feu , puisqu'en se refroidissant elle reprend sa première couleur naturelle.

L'émeraude d'un verd avivé , d'une belle eau , bien rayonnante & la plus dure , est regardée par les Joaillers comme *Orientale* & de *vieille roche*. Les Arabes appellent cette émeraude *Zamarut* ; les Persans , les Indiens , *Pachse* : on en trouve de grosses comme le pouce dans les Indes Orientales & près de la ville d'Asuan en Egypte ; mais elles sont très rares.

On donne le nom d'*Emeraude Occidentale* à celle dont la couleur est plus délayée , c'est-à-dire d'un verd clair & agréable à la vue. Elles rayonnent moins que les Orientales : elles viennent du Pérou & de Carthagene , dans la vallée de Manta , dépendante de Porto-Viéjo , d'où on en apporta une quantité prodigieuse lors de la conquête de ces pays par les Espagnols , & parmi lesquelles on en trouva beaucoup qui étoient Orientales. Depuis que la mine de Manta est épuisée ou perdue , on a trouvé d'autres mines d'émeraudes en Amérique ; elles sont situées dans la vallée de Tunca ou Tomana , assez près de la nouvelle Carthage , & entre les montagnes de Grenade & de Popayan : c'est de-là qu'on en transporte à Carthagene une si grande quantité tous les ans.

Les *émeraudes bâtarde*s sont très tendres , nullement rayonnantes , & très peu estimées. On en trouve dont la couleur verte est mêlée de jaune légèrement bruni ; alors on nomme cette émeraude *Peridot*. Polie à facettes , elle produit communément les mêmes phénomènes que la *Tourmaline* : voyez ce mot.

La plupart des émeraudes que l'on trouve chez les Droguistes , comme faisant partie des cinq fragments précieux pour l'usage médicinal , ne sont que des fluors , des spaths fusibles , verdâtres , que l'on rencontre dans le Bourbonnois & dans l'Auvergne. Ces fausses émeraudes ne sont ni plus ni moins salutaires au corps humain que les émeraudes fines : l'une & l'autre ne sont que des verres naturels qui ne sont pas rares , & même en très gros morceaux. C'étoit vraisemblablement un spath fusible émeraude , qu'un Roi de Babylone présenta au Roi d'Egypte sous le nom d'*émeraude* : elle étoit longue de quatre coudées & large de trois. Tel pouvoit être encore ce fameux obélisque d'Egypte , composé de quatre émeraudes , qui avoit quarante coudées de haut , quatre de large en quelques endroits , & deux dans d'autres. Il est impossible qu'il y ait jamais eu des émeraudes de cette grandeur.

Les émeraudes fines ont une valeur peu constante dans le commerce des Diamantaires ; tout dépend de la grandeur & épaisseur de la pierre , de son beau verd de prairie , exempt de taches ou onglets. Les Anciens distinguoient douze sortes d'émeraudes par les intensités des couleurs ; & ils avoient tant d'estime pour cette pierre , qu'il étoit expressément défendu de rien graver dessus. Les trois plus belles espèces étoient la *Scythienne* , la *Bac-trienne* & l'*Egyptienne*. On l'a appelée par la suite *Pierre de Domitien* & de

Néron. Celles d'entre les émeraudes qui étoient entièrement opaques & d'une grosseur énorme, n'étoient que des jaspes verts, & rarement des cristaux; en un mot des émeraudes bâtarde ou fausses, comme il est dit ci-dessus.

Plusieurs Historiens, entr'autres Garcilasso de la Vega, font mention de la *Déesse Emeraude*. Cet Auteur dit que les peuples de la vallée de Manta au Pérou, adoroient une émeraude grosse comme un œuf d'Autruche: on la montrait les jours de grandes Fêtes; & les Indiens accouroient de toutes parts pour voir leur Déesse, & pour lui offrir des émeraudes. Les Prêtres & les Caciques donnoient à entendre que la Déesse-Emeraude étoit bien aise qu'on lui présentât ses filles; & par ce moyen ils en amassèrent une grande quantité. Les Espagnols, dans le tems de la conquête du Pérou, trouverent toutes les filles de la Déesse; mais les Indiens cachèrent si bien la mere, qu'on n'a jamais pu savoir où elle étoit. D. Alvarado & ses compagnons briserent la plus grande partie des émeraudes sur des enclumes, parcequ'ils croyoient que si elles étoient fines elles ne devoient pas se casser.

EMERIL, *Smyris*. Est la plus dure, la plus ingrate, la plus stérile mine de fer, & l'une des plus réfractaires & des plus voraces: voyez sa description à l'article de FER.

EMERILLON, ASALON. On donne ce nom au plus petit des oiseaux de proie: il est passager, le plus léger & le plus vite de tous les oiseaux de chasse. Il est de la grosseur d'un merle. Sa tête & le dessous de son corps sont bigarrés, & de même couleur que le faucon: le bec & les serres sont noirs. Il a le tour du bec, celui des yeux, les jambes & les pattes fort jaunes. Cet oiseau est vif, hardi: c'est un plaisir de voir son courage à la poursuite des oiseaux qu'il attaque pour en faire sa proie. Il tue les perdrix en les frappant de son bec sur la tête, & son coup est fait en un instant. Cet oiseau est toujours en action: c'est le seul des oiseaux de proie dont on ait peine à distinguer le mâle d'avec la femelle, étant de même grosseur. L'émerillon est un des oiseaux qu'il étoit défendu aux Juifs de manger.

Les habitans des Isles Antilles ont un émerillon qu'ils nomment *Gri-gri* à cause du cri qu'il fait & qui exprime ces deux syllabes. Il est plus petit que le nôtre, & ne fait la chasse qu'aux petits lézards & aux sauterelles qui sont sur les arbres, quelquefois aux petits poulets nouvellement éclos.

EMERUS ou SECURIDACA: voyez à la fin de l'article SÉNÉ.

EMEU ou ÉMÉ: voyez CASOAR.

EMGALO. Espèce de cochon sauvage & extraordinaire de la Basse Ethiopie, qui a deux terribles défenses dans la gueule. Les Portugais font un cas singulier de la rapure de ses dents: ils en mettent dans leurs bouillons pour les rendre alexipharmques ou fébrifuges. Dapper dit, que quand cet animal se sent malade, il lime ses dents contre une pierre, & qu'il leche aussitôt cette rapure pour se guérir. L'Emgalo ne seroit-il pas le BABI-ROUSSA. Voyez ce mot.

EMISOLE, *Galeus lavis*. Espèce de chien de mer dont les mâchoires ne

font point garnies de dents , mais seulement âpres & rudes. Pour les ouïes, la figure & les nâgeoires , &c. il ressemble assez au *chien de mer* appelé *Aguillat*. L'émisole n'a cependant point d'aiguillons. Son museau est plus long , plus large ; mais l'ouverture de la bouche plus étroite que chez l'aguillat. Il a des trous au-devant de la bouche , à la place des narrines , & d'autres plus petits derrière les yeux. Sa queue est composée de trois nâgeoires. On en trouve une description anatomique dans les Actes de Copenhague. *T. IV. p. 282.*

EMITES. Pierre tendre & blanche dont les Anciens ont parlé. C'est une *Alabastrite* : voyez ce mot.

EMOUCHET ou MOUCHET. Oiseau de proie qui est le *Tiercelet* ou mâle de l'*Epervier* , qui ne vaut rien en Fauconnerie : voyez au mot *EPERVIER*.

EMPAKASSE ou IMPANGUEZZE. C'est le nom qu'on donne dans les pays de Congo & d'Angola , à des especes de vaches sauvages dont la couleur du poil est ou rouge , ou noire , ou cendrée. On prétend que cet animal rugit comme le lion , & qu'il ressemble un peu au buffle pour la figure & les mœurs. Il est d'une légèreté extrême à la course. La chasse en est très dangereuse ; car s'il se sent blessé , il fait face au chasseur , l'attaque furieusement , & le tue s'il ne trouve un arbre pour asyle. Cet animal a toujours de l'inimitié pour les chasseurs ; car s'il en surprend quelqu'un , il le frappe de son museau , parcequ'il ne peut se servir de ses cornes ; il le foule aux pieds , & ne le quitte que mort ou mourant. Lorsque cet animal n'est point attaqué , il regarde les passans non armés , d'un œil fixe , mais sans leur nuire. L'empakasse a les cornes & les oreilles d'une longueur excessive , les cornes un peu semblables à celles du bouc , unies , luisantes , & tirant sur le noir. Les Negres en font quantité de petits ustensiles & de parures , même des instrumens de musique. On transporte en Portugal la peau de ces animaux , & de-là dans les Pays-Bas où l'on en fait des corselets & des plastrons : les habitans s'en servent pour leurs excellentes targettes , mais ils n'ont point l'art de les préparer.

Des Voyageurs attestent qu'une vache ordinaire meurt à l'instant , si elle pâit dans le même pâturage qu'un empakasse , ou même qu'un buffle ; d'où l'on pourroit conclure que l'haleine de ces animaux est un poison pour les autres bestiaux. La femelle de l'empakasse est l'impanguezze des Naturalistes : l'un & l'autre se tiennent compagnie fidelement. Leur chair , quoique grossiere & glaireuse , est cependant nourrissante : les Esclaves en mangent volontiers & la trouvent de bon goût : après l'avoir coupée en pieces , ils la font sécher au soleil. La moëlle qui se tire de leurs os est , dit-on , un remede infailible pour les humeurs froides & les tranchées.

EMPALANGA. Animal quadrupede & cornu du pays de Benguela , dont le corps tient de la mule , & la tête du bœuf sauvage : ses cornes sont larges & tortueuses. On juge de l'âge de cet animal par le nombre des entrelaçures des cornes. L'empalanga n'habite que les forêts ; mais on l'a retiré

des mains de la Nature pour le civiliser & l'affervir au joug du labourage & d'autres services également importants. On mange sa chair. La peau de son col est d'un fort bon usage pour les semelles de souliers. Ne pourroit-on pas soupçonner que l'*empalanga*, l'*empakasse* & l'*impanguezze* sont des variétés du *bison* : voyez ce mot.

EMPEREUR, *Gladius*. Est un grand poisson sans dents ; dont le museau est fait en épée ou en couteau. Il a huit ouies de chaque côté ; le corps rond. Il est connu dans l'Archipel & dans la mer d'Afrique. Les uns l'appellent *Epée*, d'autres *Espadon* : voyez ces mots à la suite de l'article BA-LEINE.

EMPEREUR, *Imperator*. Quelques Insectologues donnent ce nom à une espèce de papillons des jardins dont la couleur des ailes est admirable. Il a quatre pieds, des ailes rondes & dentelées, de couleur tirant sur le roux tacheté de noir, & dessus des lignes argentées avec des lignes noirâtres qui traversent.

EMPEREUR. Est un serpent de Guadalafare dans le Mexique, très connu des Naturalistes. L'habillement de cet animal est éclatant & magnifique. Ses écailles blanchâtres sont délicatement taillées & relevées d'une belle marbrure de taches noires qui représentent comme des armoiries ; toutes ses autres écailles sont ornées de points noirâtres ou d'espèces de nuages de différentes couleurs. Sa tête ne le cède point en coloris & en magnificence aux autres parties du corps. Sa gueule est toute garnie de dents pointues. Les écailles du ventre sont légèrement tiquetées de taches & de points noirs. Sa queue finit en une pointe très fine & dure. Ses testicules sont très remarquables dans la planche où Seba le représente.

L'Auteur du *Dictionnaire des Animaux* dit que les Mexicains appellent aussi ce reptile, *Devin* ou *Serpent qui présage les choses à venir*. Ils prétendent que lorsqu'ils sont menacés de tempêtes, de grandes maladies, de pestes & d'autres pareils malheurs, ce serpent les annonce par des sifflemens singuliers qui font assembler plusieurs autres espèces de serpens. Quand les Payfans entendent les cris aigus & dissonans de ces reptiles, ils en sont extrêmement allarmés, s'attendant à toutes sortes de malheurs. Ils rendent par crainte un culte & des honneurs à ces serpens, comme doués d'un génie prophétique par lequel ils peuvent avertir à tems les hommes des maux futurs.

EMPREINTES. Les Lithologues donnent ce nom à des pierres qui portent l'empreinte distincte de végétaux ou d'animaux, soit en tout soit en partie. On en compte de plusieurs espèces dans l'un & l'autre regne.

Le regne animal présente des empreintes de madrepores, d'insectes, de coquilles de toutes espèces, de crustacées, de poissons, d'amphibies, d'oiseaux, de quadrupèdes, même d'hommes & d'espèces de zoophytes.

On reconnoît dans les empreintes végétales, des capillaires, des mousses, des chiendents, des bruyères, des tuyaux de plantes, des feuilles d'arbres, des graines, des siliques & épis. Les Lithographes instruits décident, au

premier coup d'œil , la différence qu'il y a entre l'origine des dendrites & celle des empreintes : ils suivent, dans la distribution des variétés qui se trouvent dans les empreintes dont nous venons de parler , le même ordre que les Botanistes ont établi dans les classes des plantes vivantes.

Que le déluge universel , ou quelque éboulement particulier des terres soient la cause primordiale de ce phénomène , il n'en est pas moins permis de croire , que des parties végétales ou animales ont été ou imprimées sur de la pierre encore molle , ou enfermées accidentellement dans des terres argilleuses d'abord dissoutes , mais qui se sont ensuite endurcies par le laps du tems , à la manière des ardoises. Ces pierres encore molles , ont reçu facilement l'empreinte parfaite , & en creux , de la plante ou de quelque une de ses parties , & qui ordinairement s'est détruite ensuite ; & comme elles ont laissé vuide l'espace qu'elles occupoient , on en peut encore discerner l'espece sur ces pierres , aux traits évidens & relatifs , tant de la structure que de la grandeur naturelle de la plante.

Toutes les empreintes végétales , & presque toutes les animales se trouvent dans de l'ardoise voisine des charbonnières. Celles que nous trouvons en Europe sont à des profondeurs très considérables , & sont , pour l'ordinaire , exotiques , c'est-à-dire , qu'elles ont leur analogue en Asie ou en Amérique. C'est ainsi que M. de Jussieu a trouvé dans la carrière schisteuse de S. Chaumont en Lyonnois , l'empreinte du fruit de l'*Arbre triste* : voyez ce mot.

Dans notre Litholisation publique de 1758 , nous avons trouvé , dans un des lits glaiseux de la carrière de Fontarabie près de Paris , une Lonchite étrangère qui étoit en nature & très bien conservée , à la couleur près. Nous avons encore trouvé dans une des charbonnières de Bretagne , à plus de trois cents & sept cents pieds de profondeur , l'empreinte de la *Fougere arbrisseau* qui végète en Chine & en Amérique. Nous conservons ces morceaux rares dans notre Cabinet.

La régularité de presque toutes les empreintes comparées avec leurs analogues vivans , fait présumer que ces plantes ont dû nâger dans une eau limoneuse , fort épaisse , dont la terre s'est précipitée dessus & en a pris l'empreinte. Une autre singularité , c'est que les empreintes qui se trouvent à peu de profondeur , portent communément des marques du pays où elles se trouvent : voyez DENDRITES, JEUX DE LA NATURE & PIERRES FIGURÉES.

EMPYRÉE. Nom que l'on donne quelquefois à la partie la plus élevée des Cieux. M. Derham a cru que les taches qu'on apperçoit dans certaines constellations , sont des trous du Firmament à travers lesquels on voit l'empyrée ; mais cette idée est aussi extraordinaire que bizarre : voyez ÉTOILES à la suite du mot PLANETTES, CIEL, CONSTELLATION & FIRMAMENT.

ENCARDITES, *Encardia*. Des Naturalistes donnent ce nom à des coquilles fossiles , bivalves & qui congénèrent ou aux cœurs appelés *Boucardites* , ou à des noyaux de *Multivalves fossiles* & congénères aux oursins.

ENCENS : voyez OLIBAN.

ENCENS BLANC & MARBRÉ : voyez PIN & SAPIN.

ENCENS D'EAU : voyez PERSIL DE MARAIS.

ENCENS DES INDES ou DE MOKA. C'est l'encens en masses & mal-propre.

ENCENS DE THURINGE. Nom donné à la résine que fournissent les pins de Thuringe, & sur-tout du territoire de Saxe qui abonde en forêts de ces sortes d'arbres. Les fourmis sauvages en retirent de petits grumeaux qu'elles enfouissent dans la terre quelquefois jusqu'à quatre pieds de profondeur : là cette poix se réduit en masse ; on la tire ensuite de terre par gros morceaux, & c'est ce qu'on appelle *Encens de Thuringe*.

ENCEPHALOIDE. *Encephalites*. On donne ce nom à des *Astroïtes* ou à des *Coralloïdes*, en forme de champignon ondulé, approchant du *Cerveau de Neptune* : voyez MÉANDRITES.

ENCHOIX : voyez ANCHOIS.

ENCOUBERT. C'est le Tatou à six bandes : voyez à l'article ARMADILLE.

ENCRINITES : voyez PALMIER MARIN.

ENCRINUS : voyez LILIUM LAPIDEUM, & l'article PALMIER MARIN.

ENDIVE. voyez au mot CHICORÉE.

ENFANT : voyez à la suite de l'article HOMME.

ENFANT EN MAILLOT. Des Conchyliologistes donnent ce nom à une espèce de coquillage de la classe des *univalves* & de la famille des *vis*. Voyez *Vis*.

ENFLE-BŒUF. Est un nom donné par les Bergers à un Proscarabée du genre des cantharides, dont les ailes sont renfermées dans des éruis de couleur d'or. Cet insecte est plus long que la cantharide : ses jambes sont aussi plus longues & plus grosses. Ses yeux sont fort enfoncés. Il sort de son front deux longues cornes. Sa tête est petite & armée de dents en forme de tenailles, avec lesquelles il fait des morsures cruelles.

L'enfle-bœuf est carnassier : il se nourrit de chenilles, de lézards, de vers & autres insectes. Il tue l'araignée, & ne se nourrit point, dit-on, des animaux & des insectes qu'il trouve morts. Il mange ce qu'il tue, & emporte le reste de sa proie dans les endroits où il se retire. Son odeur est très insupportable. On dit que son poison est si subtil, que tout ce qu'il touche devient empoisonné. Aussi-tôt que les bœufs ou autres animaux en ont mangé, ils enflent, il leur survient une suppression d'urine, & ils périssent, parceque ces insectes contiennent des parties capables de causer des ulcérations.

ENGRI. Animal de la Basse Ethyopie, & qu'on croit être une sorte de *Tigre* : voyez ce mot.

Le quadrupède dont il s'agit est d'autant plus particulier, qu'il n'attaque jamais les hommes blancs ; & l'on remarque que dans l'instant où il rencontre un Nègre avec un Européen, il se jette seulement sur l'Ethyopien : c'est pourquoi le Roi de Congo, pour dépeupler son pays de cette sorte d'animaux féroces, met leur vie à prix, & fait récompenser celui de ses sujets

qui , en apportant la peau d'un engri , donne par-là une preuve qu'il l'a tué. Les Ethyopiens disent que la chair de ce quadrupede est un poison si subtil , qu'on tombe en phrénésie dès qu'on en a mangé.

ENHYDRE , *Enhydrus*. On donne ce nom à un Géode rempli d'eau : voyez GÉODE.

Si sa forme a quelque ressemblance avec les testicules, on l'appelle *Enorchyte*. Son nom change suivant le nombre de ces pierres figurées : sont-elles groupées deux ensemble , c'est un *Diorchyte* ; lorsqu'elle en a trois , on dit *Triorchyte* , &c. On en trouve beaucoup en Angleterre.

ENKAFATRAHE. Selon Hubner , *Diâion. Univ.* c'est le nom d'un arbre qui se trouve dans l'Isle de Madagascar , dont le bois est verdâtre & rempli de veines. On dit qu'il répand une odeur fort agréable , semblable à celle de la rose ; & qu'en l'écrasant sur une pierre avec de l'eau , & appliquant extérieurement ce mélange sur la région du cœur ou sur la poitrine , c'est un remède souverain contre les foiblesses & palpitations.

ENSADE. C'est une espèce de *Figuier* de la Basse Ethyopie , & de plusieurs parties des Indes Orientales , dont les rameaux se courbant jusqu'à terre , y prennent racine , & poussent d'autres troncs dont il se forme ainsi des forêts entières. On fait des étoffes de son écorce.

ENTOMOLITHES , *Entomolithi*. Sous ce nom on montre dans les Cabinets des Curieux , des pierres schisteuses , dans lesquelles on remarque diverses parties d'animaux pétrifiés ; tels que des *Scarabées* , des *Mouches* : on nomme *Astacolites* , les Cancres & Ecrevisses , &c. qui sont pétrifiés de même.

ENTRAILLES. Nom donné aux intestins ou boyaux. Quelquefois ce mot se prend dans un sens plus général , pour tous les viscères , toutes les parties renfermées dans le corps de l'homme ou d'une bête.

ENTROQUES : voyez PALMIER MARIN.

ENULE CAMPANE : voyez AUNÉE.

EOUSE ou YEUSE , ou CHÊNE VERD : voyez ces deux derniers mots.

EPAGNEUL. Est un petit chien de chasse & de chambre , dont le poil est longuet , de différentes couleurs , qui a la queue épaisse & touffue. On s'en sert pour la chasse de la caille & de la perdrix. Il force le lapin dans les broussailles : quelquefois il ride & suit la bête sans crier. Il chasse le nez bas. Et comme les meilleurs viennent d'Espagne , il paroît que leur nom est une corruption du nom du lieu de leur origine : voyez l'article CHIEN.

EPAULARD ou DORQUE , *Orca*. C'est une espèce de dauphin , mais vingt fois plus gros , & qui sert utilement le pêcheur de la baleine , en ce qu'il la mord , la fait mugir horriblement , & la fait fuir sur les côtes. L'épaulard a quatre dents très tranchantes & grandes : voyez l'article BALEINE.

EPAULÉE. Nom donné à une telline cambrée : voyez TELLINE.

EPEAUTRE : voyez FROMENT LOCAR.

EPEE DE MER : voyez , au mot BALEINE , l'article ESPADON.

EPEICHE ou CUL-ROUGE : voyez à l'article PICVERD.

EPERLAN , *Epelanus*. Ce petit poisson est ainsi nommé par sa blancheur, qui ressemble à celle des perles. Il a beaucoup de rapport avec les petits merlans ; mais il est en tout semblable à l'able , excepté par les nageoires dont les racines sont rouges comme celles du gardon. L'éperlan prend naissance dans la mer , & remonte ensuite dans les rivières , particulièrement dans la Seine. Il a une ligne au milieu & le long des côtés , qui va jusqu'à la queue , faite en espece d'arc : il est long de quatre pouces , sur un de grosseur ou environ. Sa chair est molle , tendre , exquise au goût , & sentant la violette. Elle se digere bien , mais nourrit peu : elle convient à tout âge & à toutes sortes de tempérament. L'éperlan multiplie beaucoup : étant dépouillé de ses écailles perlées , on lui voit sur le corps différentes couleurs , semblables à celles de l'arc-en-ciel. Les plus estimés se prennent depuis la fin de l'été jusqu'à Pâques vers Caudebec. On le pêche à la nasse ou aux grands filets : quelquefois on pratique des batardeaux pour détourner de petits ruisseaux qu'il suit volontiers , & où on le prend facilement. On envoie à Paris ces poissons arrangés & liés sur de petits papiers plats.

Il y a aussi un *Eperlan de mer* , dont le corps est plus épais & plus court. Il n'est bon qu'au sortir de la mer ; sans quoi il est nuisible à la santé.

EPERON, Nom qu'on donne à un coquillage univalve de la famille des *Limaçons à bouche ronde*. Il est régulièrement chargé de pointes aiguës.

EPERVIER ou EPREVIER , *Sparverius*. C'est un oiseau carnivore , de la longueur d'un pied : celle des ailes étendues est de deux pieds. Il a la tête ronde , le bec court & gros , crochu , d'un bleu noirâtre. Le bec supérieur a un appendice angulaire des deux côtés des narines. Sa langue est noire , les yeux cavés & d'une grandeur médiocre , l'iris jaune , le col longuet , le plumage supérieur d'un brun sombre marqueté de taches tirant plus sur le noir. La poitrine & les flancs un peu jaunâtres , tiquetés de brun. Les ailes s'étendent jusqu'au milieu de la queue. Les cuisses sont fortes & charnues comme celles des autres oiseaux de proie. Les jambes menues , longues , jaunâtres & de niveau avec la queue : les doigts en sont longs , armés de griffes courbées & noires.

L'épervier vit d'oiseaux , & marque peu de goût pour les cerfs volans & autres insectes ; mais il est friand de lapins , de rats & de grenouilles. Il est hardi , intrépide , vole bien les faisans , les perdrix , les cailles , & dans quelques endroits , le merle , l'étourneau , la grive , la pie & le geai. Les Oïseleurs les attrapent quelquefois dans leurs filets , en prenant d'autres oiseaux à la glu. Les meilleurs éperviers nous viennent d'Esclavonie. Ceux d'entre ces oiseaux qui sont niais , ou ont été pris dans le nid , ou n'ont pas encore mué , ou n'ont point élevé de petits ; mais ceux qui ont toujours été à eux , sont très rusés , comme nous le dirons dans un moment.

Le mâle de l'épervier se nomme *Mouchet* ou *Emouchet* : il est à-peu-près de la grandeur du pigeon. Il a le bec , les narines , le croc angulaire , la langue & l'iris comme la femelle. Le plumage est un peu plus sombre , traversé de

de taches rougeâtres & ondées. Ses cuisses, ses jambes & ses serres, sont de même que dans l'épervier.

L'épervier fait son nid sur les rochers & les arbres les plus élevés. Il pond cinq œufs blancs, mouchetés, vers la pointe qui est obtuse, d'un cercle de taches purpurines.

La mue de cette espèce d'oiseaux est au commencement du printems. On les met dans une chambre en liberté & en leur particulier; pour cela il faut qu'il y ait deux cages; l'une au levant, l'autre au couchant: dans le milieu de la chambre sont plusieurs perches, au haut desquelles on attache de la viande de mouton, de poule, ou de vieux pigeons: on leur en donne deux fois par jour; mais une fois seulement lorsqu'on veut les faire voler le lendemain, afin de les affamer un peu, & qu'ils poursuivent mieux leur proie. L'épervier quitte facilement son maître, pour peu qu'on le contredise; & quelquefois lorsqu'il n'a pu prendre l'oiseau, il s'envole, va se percher sur un arbre, & ne veut plus revenir.

L'épervier étant jeune, est d'une chair tendre & assez bonne à manger. Quelques Médecins en recommandent l'usage contre l'épilepsie: ses serres rapées & réduites en poudre, sont anti-dysentériques. On prétend que ses excréments hâtent & facilitent l'accouchement, & que sa graisse a la vertu de remédier aux vices de la peau.

Il n'y a point d'oiseaux plus commun en Egypte que l'épervier: les Anciens de cette Contrée lui rendoient des honneurs divins.

EPERVIER MARIN: voyez Fou.

EPERVIERS. On donne ce nom à des *Papillons bourdonneurs* qui se tiennent au-dessus des fleurs, c'est-à-dire dans l'air, & sans presque changer de place, pendant que leur trompe allongée en suce la liqueur miellée.

EPÉTIT. Nom donné à une espèce de Hallier qui croît dans les savanes naturelles du pays de Cayenne. Les Indiens l'emploient à frotter jusqu'au sang le nez des chiens qu'ils destinent à la chasse, pour leur insinuer dans les plaies la vertu qu'ils supposent à cette plante. Ils lui donnent encore une autre qualité dont la plupart des Créoles ne doutent pas; c'est celle de se faire aimer quand on en porte sur soi: c'est ce qui a donné lieu au proverbe; *on lui a donné de l'épétit*, quand on parle de quelqu'un bien amoureux. Cette dernière vertu est, dit-on, commune à quelques *Lianes*: voyez ce mot. *Mais Rust. de Cayenne.*

EPHEMERE, *Musca ephemera*. Les Naturalistes ont donné ce nom à plusieurs espèces de *mouches* dont la vie est d'une très courte durée; & peut être que le mot d'*éphémère* n'exprime pas assez la courte durée qui a été prescrite à la vie de quelques unes. Il y en a qui ne doivent pas voir luire le soleil, qui ne naissent en été qu'après qu'il est couché, & qui périssent avant qu'il se leve. On pourroit même dire que celles-ci jouissent d'une vie très longue en comparaison d'autres éphémères, puisqu'il y en a qui vivent à peine une heure ou une demi-heure; mais aussi il y en a quelques espèces qui vivent plusieurs jours. Au reste, que leur importe? elles fournissent leur carrière.

On distingue un grand nombre d'espèces de mouches éphémères, qui diffèrent entr'elles, suivant les pays où elles naissent, par la grandeur, la couleur de leurs aîles, &c. mais elles ont des ressemblances générales par le peu de durée de leur vie, & par leurs aîles qui ont la forme de celles des papillons : ces aîles ne diffèrent de celles des papillons, que parcequ'elles sont minces, transparentes, & qu'elles sont point couvertes d'écailles.

Les éphémères ont quatre aîles, très joliment tissues, dont deux sont placées en dessus, deux en-dessous. Les aîles supérieures sont de beaucoup plus grandes que les inférieures : ces dernières sont même si petites dans quelques espèces, qu'à peine peut-on les appercevoir. Lorsque ces mouches sont en repos, elles portent leurs quatre aîles sur le dos, appliquées les unes contre les autres, & perpendiculairement au plan de leur position, comme les portent la plupart des papillons diurnes. Le corps de ces mouches est allongé, composé de dix anneaux : il sort du dernier une queue beaucoup plus longue que l'animal, & formé par deux ou trois filets extrêmement fragiles. Ces mouches se tiennent à volonté sur les eaux, à l'aide des trois branches de cette queue, qu'elles savent étendre si adroitement, que les autres parties du corps paroissent hors de l'eau sans se mouiller.

Ces insectes, avant de paroître ainsi sous l'état de mouche, vivent dans l'eau pendant une, deux ou trois années sous la forme de ver, & ensuite de nymphe : voyez le mot NYMPHE. Si on les considère dans ces différens états, leur vie est longue relativement à la vie ordinaire des insectes. Il n'y a de différence entre le ver & la nymphe, qu'en ce que celle-ci a de plus que le ver, des fourreaux d'aîles sur le corselet. L'un & l'autre ont six jambes écailleuses attachées au corselet. Leur tête est un peu triangulaire & applatie ; leur bouche est garnie de dents ; leur partie postérieure est garnie, ainsi que dans leur état de mouches, de trois filets qui sont bordés chacun des deux côtés de franges de poil, & qui vraisemblablement sont d'usage à cet insecte lorsqu'il nâge. Lorsqu'on examine ces insectes avec attention, on observe le long de leurs corps de chaque côté, des sortes de petites houppes qui ont un mouvement fort rapide : elles varient de forme dans les différentes espèces ; il y en a qui ressemblent à des rames de galère. Ces parties sont, suivant l'exact examen qu'en a fait M. de Réaumur, les ouies qui servent à la respiration de cet insecte, qui est par-là en quelque sorte une espèce de poisson.

Ces insectes qui doivent se transformer en mouches, ne nâgent que très rarement dans l'eau ; mais comme cet élément leur est absolument nécessaire, ils se creusent de petits trous dans les terres de consistance glaiseuse, qui se trouvent sur les bords des rivières. Lorsque les eaux de la Marne & de la Seine viennent à baisser, on voit sur les bords de ces rivières, jusqu'à deux ou trois pieds au-dessus du niveau de l'eau, la terre toute criblée de petits trous, dont l'ouverture peut avoir deux à trois lignes de diamètre. Ces trous sont vuides ; les insectes les ont abandonnés lorsqu'ils se sont vus à sec, & ont été creuser plus bas dans la terre baignée par l'eau. Ces trous

qui servent d'habitation à ces insectes , sont dirigés horizontalement : ils ont deux ouvertures placées l'une à côté de l'autre , de sorte que la cavité du trou est semblable à celle d'un tuyau coudé : l'insecte entre par une ouverture , & sort par l'autre ; il proportionne la capacité de ce tuyau à ses différens états d'accroissement. La transformation de ces nymphes en mouches se fait avec la plus grande facilité ; quelquefois elles emportent encore leurs dépouilles de nymphes qui leur tient à la queue.

Dans chaque pays les mouches éphémères paroissent tous les ans avec une sorte de régularité ; ce n'est aussi que pendant un certain nombre de jours consécutifs , qu'elles remplissent l'air aux environs des rivières : enfin ce n'est qu'à une certaine heure de chaque jour , que les premières commencent à sortir de l'eau pour devenir habitantes de l'air. Cette heure n'est pas la même pour les éphémères de différentes especes : celles du Rhin , de la Meuse , &c. commencent à voler deux heures environ avant le coucher du soleil. Les plus diligentes de celles de la Seine & de la Marne ne s'élèvent en l'air que lorsque le soleil est prêt à se coucher : ce n'est qu'après qu'il l'est , que le gros de ces mouches forme des nuées. Elles se répandent par-tout en un instant ; elles folâtroient sur la surface des eaux : si l'on tient une lumière , elles s'y portent de toutes parts ; elles décrivent des cercles tout autour & en tous sens. Ne plaignons donc pas l'éphémère : contente du destin que lui a fait la Nature , elle joue sur le bord de son tombeau.

Ce n'est guere que vers la S. Jean que paroissent des nuées d'éphémères dans des pays plus froids que le nôtre ; & c'est vers la mi-Août que ces nuées se montrent aux environs de Paris. Les Pêcheurs savent , par expérience , le tems où les éphémères doivent paroître sur une rivière. Plus de chaud ou plus de froid , les eaux plus hautes ou plus basses , & d'autres circonstances peuvent rendre une année plus avancée ou plus tardive en mouches éphémères.

Ces mouches qui éclosent toutes à-peu-près dans le même moment , n'ont presque un instant à vivre ; mais cet instant suffit pour remplir la fin à laquelle elles sont destinées , c'est-à-dire pour perpétuer leur espece. A peine les femelles sont-elles nées , qu'elles sont prêtes à pondre , & qu'elles pondent en effet. Quelques Naturalistes pensent que le mâle féconde les œufs , comme le poisson , à l'instant de la ponte ; mais M. de Réaumur croit que les mâles s'accouplent avec les femelles.

Ces accouplemens , il est vrai , peuvent difficilement être apperçus par l'Observateur ; car , comme la vie de ces mouches est la plus courte de celle des animaux connus , leur accouplement est vraisemblablement le plus court de tous , & beaucoup plus court même que celui des oiseaux qui dure si peu. C'est à l'eau de la rivière que la plupart des mouches éphémères confient leurs œufs ; d'autres les laissent attachés aux corps sur lesquels il leur arrive de se poser ou de tomber , tant elles paroissent pressées du besoin de s'en débarrasser.

Il n'y a point de femelle d'insecte qui mette au jour un aussi grand nombre

d'œufs, que celui qu'y met une mouche éphémère. En un instant on voit sortir de sa partie postérieure une multitude d'œufs disposés en manière de grappe, dont les grains se touchent. Chaque grappe contient plus de trois cents cinquante œufs; ainsi en un instant la mouche éphémère pond sept à huit cents œufs. Ces grappes d'œufs ne sont pas plutôt sorties du corps de la femelle, qu'elles tombent au fond de l'eau. Les œufs qui échappent à la voracité des poissons, donnent naissance à de petits vers, qui vont se mettre en sûreté sur les bords de la rivière, dans les trous qu'ils se pratiquent.

Les mouches éphémères sont en si grande abondance dans de certaines années, que dès que leur instant de vie est passé, on les voit tomber comme les flocons de la neige la plus abondante: la surface de l'eau en est couverte: la terre en est toute jonchée sur le bord des rivières où elles s'ammoncellent & forment une couche d'une épaisseur considérable. Les Pêcheurs regardent les éphémères comme une manne qui sert de nourriture aux poissons, *esca volatilis & riparia*; & ils prétendent que cette manne ne tombe que pendant trois jours. En effet, ces insectes ne paroissent que pendant trois jours de suite en grande abondance; & ce spectacle singulier ne dure chaque jour que l'espace d'une demi-heure.

Les mouches éphémères qui ont une vie de plusieurs jours, présentent une particularité qui ne s'observe dans aucune mouche des autres espèces, ni même dans aucune espèce d'insecte ailé; c'est qu'étant dans leur état de mouches, elles ont encore à se défaire d'une dépouille. C'est pourquoi on voit ces mouches cramponnées contre une muraille ou contre un arbre: elles restent quelquefois plus de vingt-quatre heures dans cette position, en attendant qu'elles puissent quitter leur vêtement.

On a donné aussi le nom d'*Ephémère* à une plante que Tournefort a désignée ainsi dans ses Institutions de Botanique, *Ephemerum Virginianum flore ceruleo majori*. 367.

EPICES ou EPICERIES. On entend par ce mot les substances végétales & orientales, ou d'un autre pays étranger, plus ou moins douées d'odeur & de saveur, & dont tous les peuples aujourd'hui font usage dans leurs divers alimens: il convient d'en citer en exemple quelques-unes. Les *racines* nous donnent le gingembre. Les *écorces*, la canelle & la cascarille. Les *bois*, celui d'anis, de rose & d'aspalat. Les *tiges*, l'orcanette, le schœnanthe & le calamus aromatique. Les *feuilles*, le thé, le dictame & le laurier. Les *fleurs*, le safran du Levant, les balaustes & la fleur d'orange. Les *fruits*, le citron, la bergamotte, les dattes, les poivres, le cacao, les pistaches, la muscade, le gérofle & le café. Les *graines* ou *semences*, les différentes espèces d'anis, le fenouil, le cumin, la graine d'Avignon, le daucus, le carvi, l'ambrette, &c. *Voyez chacun de ces mots.*

De tout tems l'épicerie a été la plus belle branche du commerce; & en se conciliant le trafic de la droguerie, elle est devenue la plus immense & la plus importante partie du négoce. A peine eût-on renouvelé la navigation par l'invention de la boussole, que l'étude de l'Histoire Naturelle & celle de

la véritable Physique , réveillèrent l'industrie du commerce. Dès le quatorzième siècle , les Négociants de tout le Midi de l'Europe envoyèrent en Afrique & dans toutes les Echelles du Levant ; on en rapporta le coton , l'opium , le riz & les noix de galle. Les Vénitiens , jaloux des entreprises des Marchands de toute la grande hanse ou association qui s'étoit formée pour le commerce de la mer Baltique & de tout le Nord ; les Vénitiens , dis-je , trafiquèrent fort heureusement à Alexandrie & au Caire , les marchandises que les Arabes & les Egyptiens alloient chercher aux Indes & dans tout l'Orient par la mer Rouge. On se ressouvient toujours du profit qu'ils firent alors sur le coton , sur la soie , sur l'or , sur les poivres , sur les perles , sur les pierres , & sur toutes les drogues de l'Asie. Ils étoient les seuls distributeurs des épiceries ; & dans toutes les tables on ne connoissoit rien de plus exquis que ces productions de l'Inde & des Moluques. Le sucre n'étoit point encore connu en Europe ; les seules épiceries faisoient le principal ornement des grandes fêtes : on ne connoissoit rien de plus propre à être présenté avec bienfaisance aux Juges , après la décision d'un procès ; de-là est venu le nom d'*Epices du Palais* , *Sportula aut Species*.

Dans les festins de nûces , l'épouse en distribuoit à toute l'assemblée ; & les Universités , dans leurs réjouissances , s'étoient conformées à cet usage. Les Hollandois savent très bien que le débit de cette marchandise n'a jamais baissé ; mais les François savent mieux qu'aucunes Nations , jusqu'où l'art des Cuisiniers en a porté l'usage.

On appelle *Quatre épices* , un mélange aromatique & réduit en poudre , lequel est composé essentiellement de gérofle , de muscade , de poivre noir & de canelle ou de gingembre : aujourd'hui on y ajoute de l'anis , de la coriandre , du macis , du piment de la Jamaïque ; quelquefois aussi des herbes aromatiques , comme thym , marjolaine & laurier. Lorsqu'on y joint des morilles , des mousserons & des culs d'artichauts , alors ce composé prend le nom d'*Epices royales* , & ne sert que pour assaisonner les mets les plus exquis.

ÉPI D'EAU , *Potamogeton*. Plante qui croît dans les marais , les étangs , proche des fontaines , des rivières & de tous les lieux humides. Cette plante aquatique a des racines grosses , rondes , nouées , blanches , rampantes , garnies de fibres déliées qui s'étendent beaucoup sous les eaux : elle pousse plusieurs tiges longues , grêles , également nouées & rameuses. Ses feuilles qui naissent dans l'eau , sont longues & étroites ; mais quand la plante a crû suffisamment pour surpasser l'eau , elles deviennent larges comme celles du plantain : elles sont presque ovales , nerveuses , luisantes , & d'un verd pâle , attachées à de longues queues. Il s'élève d'entre ses feuilles des pédicules qui soutiennent des épis de fleurs purpurines à quatre feuilles , & disposées en croix. A ces fleurs succèdent des capsules ramassées quatre à quatre , en manière de tête. Ces capsules sont oblongues , assez grandes , dures , rougeâtres , & remplies d'une graine blanche.

Cette plante prise en décoction , est astringente & rafraîchissante. Elle

convient extérieurement pour les dartres & les autres démangeaisons de la peau.

EPI-FLEURI. *Voyez* STACHYS.

EPINARS, *Spinacia*. Plante potagere très en usage dans nos cuisines. Sa racine est simple, menue, blanche & fibreuse. Ses tiges croissent à la hauteur d'environ un pied : elles sont rondes, fistuleuses & rameuses. Ses feuilles sont larges, pointues, découpées, anguleuses, tendres, d'un verd obscur, succulentes, & attachées à de longues queues. Les tiges sont revêtues depuis leur milieu jusqu'en haut, de fleurs à étamines, de couleur herbeuse ou purpurine : il ne leur succede aucun fruit ni semences. Les fruits naissent en des endroits séparés, & ils deviennent des capsules ovales, épineuses, qui renferment chacune une semence presque arrondie.

Les épinars cuits à l'eau sont un aliment peu nourrissant & de facile digestion : ils peuvent procurer ou entretenir la liberté du ventre. Ils sont très utiles dans le cas où l'on interdit l'usage des viandes, notamment quand on commence à manger après des indigestions de viandes ou de poisson, dans les diarrhées qui les suivent, & en général dans les dévoiements accompagnés de rapports nidoreux, dans cette disposition des premières voies, qui donne aux sucs digestifs la disposition *alkalescente* dont parle Boerhaave. On peut dire plus généralement encore, que l'épinars est un aliment assez sain, & à-peu-près indifférent pour le plus grand nombre de sujets.

Les épinars se multiplient de graine que l'on sème à la mi-Août sur une planche bien labourée, & dans des rigoles ou rayons profonds de deux doigts, tirés au cordeau, éloignés d'un pied l'un de l'autre, & couverts de terre : on a soin de les sarcler & de les arroser. On en récolte à la mi-Octobre, en Carême & au commencement de Mai, selon le tems de la saison.

L'épinars sauvage est le *Bonhenri*. Dans le pays de Cayenne, les Créoles donnent le nom d'*Epinars* au *Phytolacca Americana minori fructu* de Barrère, parcequ'ils mangent les feuilles de cette plante dans le potage & en guise d'épinars, après en avoir ôté le premier bouillon qui en est noirci. Cette plante, ou plutôt cet arbruste, est naturel au pays, & croît sans culture après les premières pluies. Il est d'une grande ressource aux Nègres : les Blancs en mangent aussi les feuilles avec plaisir.

EPINE : *voyez* son article dans le tableau alphabétique, &c. à la suite du mot PLANTE. On trouvera la description de l'*Epine du dos* à l'article SQUELETTE, inséré à la suite du mot Os.

EPINE BLANCHE : *voyez* au mot NÉFLIER.

EPINE BLANCHE SAUVAGE : *voyez* CHARDON COMMUN.

EPINE DE BOUC. C'est l'arbrisseau d'où découle la gomme adraganthe : *voyez* BARBE DE RENARD.

EPINE JAUNE, *Scolymus*. Plante qui a beaucoup de rapport avec le chardon à fleur dorée. L'épine jaune qui croît communément dans les pays chauds, en Italie & en Languedoc, a une racine longue & grosse comme le pouce, tendre, jaunâtre, empreinte d'un suc laiteux, assez agréable au

goût , & dont les cochons sont fort friands. La tige est haute d'un pied & demi , velue & rameuse. Ses feuilles qui sortent les premières de la racine , sont longues , larges , sinueuses , éparées à terre , épineuses , & d'un verd marbré de blanc. Les feuilles des tiges & des rameaux sont plus courtes , plus découpées , & les épines en sont plus roides. Sa fleur est un bouquet à demi-fleurons jaunes-dorés & séparés. A cette fleur succede une tête composée de plusieurs semences larges , plates & pailleuses , enveloppées par le calice. La racine de l'épine jaune est apéritive ; & convient , dit Lemery , pour arrêter la semence.

EPINETTE ou SAPINETTE DU CANADA. C'est l'espece de sapin d'où découle le *Baume du Canada*. Voyez ce mot & celui de SAPIN.

EPINE-VINETTE ou VINETIER , *Berberis*. Arbrisseau épineux qui vient communément dans les jardins , où il sert de haies , aux environs de Paris : on en trouve aussi dans les lieux incultes , au bord des bois & dans les buissons. Cet arbrisseau est assez haut. Ses racines sont jaunâtres , branchues , fibreuses & rampantes. Ses jets ou surgeons sont longs de trois coudées , branchus , épineux , jaunes & gluants en dedans : l'écorce en est blanche , mince & lisse. Ses feuilles sont petites , oblongues , crenelées tout au tour , & entourées d'aiguillons mols , d'un verd gai , lisses , & d'un goût acide. Les fleurs ont une odeur forte : elles sont disposées en petites grappes , & composées chacune de plusieurs petites feuilles jaunes , rangées en rose. La fleur de l'épine-vinette a une singularité remarquable , & qui mérite d'être mise au nombre des phénomènes végétaux : lorsqu'on touche avec un stilet le pédicule de ses étamines , elles se replient du côté du pistil : il n'est pas rare qu'elles entraînent avec elles les pétales , & que la fleur se referme. Lorsque ces fleurs sont passées , le pistil se change en un fruit cylindrique , mol , long de quatre lignes , qui devient rouge en mûrissant , & qui est rempli d'une sorte de pulpe acide , assez agréable , & d'un ou de deux noyaux oblongs.

La racine , les fruits & les graines du vinétier sont d'usage en Médecine : le suc des fruits colore en rouge le papier bleu. La racine est amère : les fruits sont rafraîchissants & astringents ; ils temperent le bouillonnement des humeurs , apaisent le flux du ventre bilieux , arrêtent les dyssenteries , fortifient l'estomac , & excitent l'appétit. On les mange seuls , lorsqu'ils sont mûrs , ou confits avec le sucre. On en fait en Pharmacie un syrop , une gélée , un rob ou raisiné , qui sont comptés parmi les cordiaux.

Les Médecins Egyptiens sont usés de ces fruits en décoction , dans les fièvres malignes & pestilentiellles , & particulièrement contre les diarrhées : ils y mêlent un peu de graine de fenouil , pour empêcher qu'ils ne nuisent à l'estomac. En Europe on fait boire , en place du jus de limon , le suc acide des baies du berberis , étendu dans l'eau pour appaiser l'acrimonie alkaline des fièvres chaudes & putrides. Les pepins ou les graines sont des astringents convenables pour les fleurs blanches. La décoction de l'écorce des racines est bonne pour la jaunisse. Les Teinturiers emploient aussi cette même écorce , macérée dans la lessive , pour teindre certaines étoffes en jaune : on s'en sert

aussi pour donner du lustre aux cuirs corroyés. Enfin ces piqures des épines du vinétier ont toujours passé pour dangereuses & difficiles à guérir.

On cultive aujourd'hui dans les jardins, un vinétier qui a été apporté du Canada, & qui diffère du précédent par la grandeur de ses feuilles, & la grosseur de ses fruits.

Les fruits de ces deux vinétiers se trouvent quelquefois manquer de pepins apparents. Le mot *berberis* est Arabe. Le *vinétier de Candie* a l'écorce raboteuse & grisâtre. Son bois est jaune, ainsi que sa racine, dont on peut faire la plus belle teinture. Les Curieux cultivent encore un *vinétier à fruit blanc*, mais ce n'est qu'une variété qui, à la vérité, est fort rare. Le *vinétier du Levant* produit un fruit noir.

Le plant de notre vinétier est fort utile à la campagne, parcequ'il sert de sujet pour greffer les arbres fruitiers. Il se plaît dans les lieux frais.

EPINOCHÉ, *Pisces aculeatus*. Petit poisson sans écailles, qui se pêche dans les lacs & dans les rivières, & dont on distingue de deux sortes; la grande & la petite espèce: la grande est armée de trois aiguillons sur le dos, & de trois au ventre, qui se tiennent & qui ressemblent à la feuille d'épinars, ce qui l'a fait appeler aussi *poisson épinarde*. Ces aiguillons sont pointus & forts: l'animal les dresse quand il a peur, ou quand il s'agit de se défendre contre les autres poissons. Ce poisson n'a qu'une seule nageoire sur le dos, & deux lances osseuses de figure triangulaire, à la place des nageoires du ventre. L'épinoche est un poisson si abondant en certaines contrées, que quand on pêche les étangs, on en laisse une grande quantité aux pauvres gens, qui s'en nourrissent.

La seconde espèce d'épinoche a dix aiguillons sur le dos, dirigés alternativement à droite & à gauche: elle descend la rivière du Nar, en Ombrie, pour entrer dans le Tibre.

EPITHYM, EPY-LAVANDE, EPY-MARUBE. Sont des *plantes parasytes*. Voyez ce mot & celui de CUSCUTE.

EPONGE DEGLANTIER ou BEDEGUAR. Voyez à l'article ROSIER SAUVAGE.

EPONGE DE MER. Voyez à l'article CORALLINE.

EPONGE PYROTECHNIQUE. On donne ce nom à l'*amadou* fait avec certains grands champignons qui croissent autour des vieux arbres.

EPONGE DE RIVIERE ou PLANTE-EPONGE, *Spongia Fluvialis*. L'éponge de rivière, dont M. de Réaumur nous a donné la description dans les Mémoires de l'Académie, nous avoit paru être formée par des polypes d'eau douce; mais M. de Jussieu, cet excellent Observateur de la Nature, nous a assuré que, quelque examen qu'il ait fait pour y en découvrir, il n'en a jamais apperçu.

Cette plante, dit M. de Réaumur, qui ne paroît pas avoir de racine, a pour base une espèce de plaque très large, dont elle tapisse les corps sur lesquels elle croît, à-peu-près de même que certaines espèces de mousse. Cette plaque tient fortement à ces corps; elle y est collée par le moyen d'un mucilage,

mucilage , dont toute cette plante est remplie ; il s'élève de cette plaque des branches disposées à-peu-près de même que celles du corail ; ces branches ont la longueur de deux , trois ou quatre pouces , & deux ou trois lignes de diametre ; elles sont comme inégales & raboteuses.

M. de Réaumur a trouvé cette plante dans la Seine attachée à une des pierres des piles du pont-neuf , à plusieurs pouces de profondeur sous l'eau. Pour l'ordinaire elle pousse ses branches suivant la ligne horizontale , c'est-à-dire , en suivant la surface de l'eau , mais quelquefois on la voit placée perpendiculairement au plan des pierres auxquelles elle est attachée.

La couleur de l'éponge de riviere , quand on la tire de l'eau , est d'un verd pâle tirant sur le jaune sale. M. de Réaumur a néanmoins remarqué au commencement de Juillet , que l'extrémité de toutes les branches étoit d'un blanc jaunâtre plus pâle que le citron , parceque cette plante étoit apparemment en fève & croissoit pour lors.

Lorsque cette éponge est sèche , elle est très fragile ; examinée à la vue simple , elle paroît comme chagrinée , & montre quelques trous ou pores assez grands , disposés sans arrangement & parfaitement ressemblans aux trous des éponges de mer ; mais lorsqu'on la regarde avec une loupe , on la trouve percée d'une infinité de petits trous remplis de mucilage , & dont les bords sont ornés d'une multitude de petits poils presque imperceptibles. Lorsqu'on se frotte la peau avec cette plante , il s'y fait une rougeur assez remarquable sans élévation sensible , accompagnée d'une cuisson à-peu-près semblable à l'ardeur qu'on ressent au bout d'une heure , lorsqu'on a touché à des feuilles d'ortie , & que l'on a été assez patient pour ne se point gratter. Cette démangeaison cuisante a duré près de dix-huit heures à l'Observateur curieux , d'après lequel nous parlons. Il pense que cet effet peut venir de ce que les petits poils , qui bordent extérieurement les pores de cette plante , entrent dans la peau.

Si l'on remet cette éponge sèche dans l'eau , elle reprend à peu de chose près son premier volume & sa premiere mollesse. On peut ensuite exprimer l'eau dont elle est remplie , comme des autres éponges ; mais si on la presse trop , elle se brise. Enfin , lorsqu'après avoir été plusieurs fois remise dans l'eau & séchée , on la laisse sécher en dernier lieu , elle prend une couleur cendrée , & perd l'odeur de poisson qu'elle avoit d'abord , & qui lui est naturelle.

EPURGE ou CATAPUCE. *Voyez TITHYMALE.*

ERABLE, *Acer.* C'est un genre d'arbres , dont il y a un grand nombre d'especes , qui offrent beaucoup de variétés pour l'embellissement des jardins , la verdure de leurs feuillages faisant autant de différentes nuances qu'il y a d'especes d'érables. Il est peu d'arbres qui rassemblent autant de variété , d'agrément & d'utilité que ceux-ci ; qui croissent avec plus de vitesse & d'uniformité ; qui s'accommodent mieux des plus mauvaises expositions , qui exigent moins de soins & de culture ; qui résistent mieux à toutes les intempéries des saisons , & que l'on puisse multiplier avec plus de

facilité. Plusieurs de ces especes d'érables croissent naturellement en Europe, quelques-unes dans le Levant, & le plus grand nombre dans l'Amérique.

Ces arbres fleurissent en Avril, & portent des fleurs en roses de peu d'éclat, auxquelles succèdent des fruits composés de deux ou trois capsules, qui sont terminées par un feuillet membraneux : on trouve dans chacune de ces capsules une semence ovale. Une des marques caractéristiques des érables, est d'avoir, pour la plupart, les feuilles découpées plus ou moins profondément, & plus ou moins grandes, mais qui sont toutes posées deux à deux sur les branches.

Toutes les especes d'érables que l'on connoît, semblent faites pour la température de notre climat : elles y réussissent à souhait ; elles s'y soutiennent contre quantité d'obstacles qui arrêtent beaucoup d'autres arbres, & remplissent tout ce qu'on peut en attendre. On peut distinguer les différentes especes d'érables en grands & petits : les grands érables forment de belles tiges bien droites, ils ont l'écorce unie, la feuille fort grande : les petits érables ont le bois plus menu, la feuille plus petite, & sont d'autant plus propres à former ou à regarnir des palissades, qu'ils ont le mérite singulier de croître à l'ombre & sous les autres arbres.

Nous allons présenter, dans cet article, un tableau des diverses especes d'érables les plus connus, & dont on retire le plus d'avantage.

ERABLE BLANC DE MONTAGNE OU SYCOMORE, *Acer montanum candidum*. Le sycomore devient en peu de tems un grand & gros arbre ; il se garnit d'un feuillage épais, qui donne beaucoup d'ombre & de fraîcheur ; sa tige s'élève droite, son écorce est unie, roussâtre ; sa feuille large, lisse, découpée en cinq parties principales, d'un verd brun en-dessus & blanchâtre en-dessous ; ses fleurs, qui sont d'une couleur herbacée, viennent en grappes longues & pendantes.

Cet arbre a été autrefois fort à la mode pour faire des avenues & des salles dans les parcs ; mais on l'a presque abandonné parcequ'il se dépouille de très bonne heure, & que ses feuilles sont sujettes à être dévorées par les insectes : un de ses défauts, est d'avoir les feuilles d'une verdure trop foncée, & sur-tout lorsque l'arbre commence à pousser, ce qui est entierement opposé au verd tendre & naissant de presque tous les arbres ; mais il y auroit peut-être de l'art à profiter même de ce contraste de verdure.

Cet arbre a des qualités qui rachètent amplement ces petits défauts ; il se multiplie de toute maniere avec la plus grande facilité, même par le moyen de la greffe sur les autres érables ; il est d'un tempérament si robuste, qu'il s'accommode à toutes sortes de terrains ; il se soutient contre les grandes chaleurs, & les longues sécheresses, même dans les Provinces méridionales de ce Royaume, où l'on n'a pas eu de meilleure ressource, que de recourir au sycomore, pour remplacer, avec succès, différentes autres especes d'arbres qui avoient péri successivement dans une partie du Cours de la Ville d'Aix en Provence. Un avantage très grand & particulier à cet arbre,

c'est qu'il résiste parfaitement à la violence & à la continuité des vents ; enforte , qu'on doit l'employer par préférence , lorsqu'on veut garantir quelques bâtimens ou quelques plantations de l'impétuosité des vents.

Le sycomore , est , au rapport de M. Miller , celui , de tous les arbres , qui est le moins affecté par les vapeurs de la mer : il résiste aux hivers les plus rigoureux , même dans sa première jeunesse , & il soutient le froid excessif du Canada , où cet arbre est fort commun , & dont on tire par incision une seve dont on fait de bon sucre , que l'on nomme *Sucre d'Erable*, comme on en retire aussi d'une autre espece d'érable , que l'on nomme le *Petit Erable plane* ou l'*Erable à sucre*. Nous expliquerons , à l'article de cette espece d'érables , les circonstances qu'il faut choisir & la maniere dont on doit s'y prendre pour retirer le sucre de ces arbres.

C'est ordinairement dans les pays de montagne que croît naturellement le sycomore : on le trouve dans quelques forêts de l'Europe & de l'Amérique Septentrionale ; comme cet arbre croît au mieux dans les terrains les plus secs & les plus arides , son bois est sec , léger , sonore , brillant : aussi les Luthiers s'en servent-ils avantageusement , pour faire leurs instrumens. C'est le meilleur de tous les bois blancs , il n'est point sujet à se tourmenter , à se déjetter , ni à se fendre ; qualités que les Ebénistes , les Armuriers , les Sculpteurs , les Tourneurs , les Menuisiers & autres , recherchent pour la fabrique de plusieurs petits ouvrages.

L'*Erable Sycomore panaché* n'est qu'une variété de l'espece dont nous venons de parler ; elle n'en differe que par ses feuilles bigarées de jaune & de verd , qui font un agrément singulier : cette variété de couleur , qui n'est qu'un accident occasionné par la foiblesse ou la maladie de l'arbre , ou par la mauvaise qualité du terrain , ne se soutient , dans la plupart des autres arbres panachés , qu'en les multipliant par la greffe ou en couchant leurs branches , & nullement en semant leurs graines , attendu que les plantes , qui en naissent , rentrent dans leur état naturel ; mais dans l'espece des sycomores panachés , on peut multiplier cette variété , même par la graine , qui , lorsqu'on la sème , produit des plants qui sont presque tous panachés.

ERABLE PLANE OU A FEUILLES DE PLATANE. Cet arbre pousse une belle tige droite , & peut se distinguer du sycomore par son écorce , qui est blanchâtre sur le vieux bois ; par les boutons rougeâtres pendant l'hiver ; par ses feuilles plates , minces , assez semblables à celles du platane , quoique d'un verd un peu moins tendre , & qui ne sont point blanches en dessous ; par ses fleurs jaunes disposées en bouquet. Le sycomore , au contraire , a l'écorce roussâtre ; les boutons jaunes en hiver ; la feuille plus épaisse , plus brune ; les fleurs d'un petit jaune verdâtre moins apparent.

L'érable plane , est , après le platane , un des plus beaux arbres que l'on puisse employer pour l'ornement des jardins : il n'a point les petits défauts du sycomore ; car sa verdure tendre & agréable se soutient avec égalité pendant toutes les saisons , & ses feuilles ne sont jamais attaquées par les insectes : il a de plus toutes les bonnes qualités du sycomore , avec lequel il a

tant d'analogie , qu'on peut lui appliquer tout ce que nous avons dit plus haut du sycomore : cet érable plane donne un ombrage plus épais, & il croît même plus vite que le sycomore. On a vu des plants de cet arbre , venus de semence dans un terrain sec , s'élever jusqu'à douze pieds en trois ans. Les Anglois donnent à cet arbre le nom d'*Erable de Norvege*, parceque vraisemblablement il leur est venu de ce pays-là , où il est très commun.

L'*Erable plane panaché* n'est qu'une variété de l'espece dont nous venons de parler : il n'est pas encore certain que la graine de cette espece , étant semée , donne des plants qui conservent la variété des couleurs de la plante comme le fait la graine du sycomore panaché.

PETIT ERABLE PLANE OU ERABLE A SUCRE , *Acer Virginianum*. Cet arbre est de moyenne grandeur , il croît naturellement en Virginie , où il est fort commun ; on l'y nomme l'*Erable à sucre* : la feuille de cet arbre a assez de ressemblance avec celle de l'érable plane ordinaire , mais elle est plus grande , plus mince , & d'un verd plus pâle , tenant du jaunâtre en-dessus , & un peu bleuâtre en-dessous , il a aussi un accroissement bien plus lent. Cet arbre , ainsi qu'on le lit dans l'Encyclopédie , est encore fort rare en France ; cependant nous en avons vu plusieurs plants dans les jardins de M. de Buffon à Montbard en Bourgogne , qui , quoiqu'âgés de dix ans , n'ont encore donné ni fleurs , ni graine. Cet arbre est très robuste , il soutient très bien les grandes chaleurs & les grandes sécheresses , il prend plus d'accroissement dans les terrains secs & élevés , que dans les bonnes terres de vallée.

On retire par incision , dans la Virginie & au Canada , du petit érable plane , dont nous parlerons , & du sycomore , une liqueur fluide & limpide comme l'eau la mieux filtrée , qui laisse dans la bouche un petit goût sucré fort agréable : la première se nomme *Sucre de plaine* ; & la seconde *Sucre d'érable*. L'eau d'érable est plus sucrée que celle de plaine ; mais le sucre que l'on retire de l'eau de plaine , en la concentrant par évaporation , est plus agréable que celui d'érable. L'une & l'autre espece d'eau est fort sucrée : on n'a jamais remarqué qu'elle ait incommodé ceux qui en ont bu , même étant en sueur : elle passe très promptement par les urines.

On retire la liqueur sucrée de ces deux especes d'érables , en faisant une incision ovale vers le bas de l'arbre : il faut que cette incision pénètre dans le bois , jusqu'à la profondeur de deux ou trois pouces , parceque ce sont les fibres ligneuses , & non les fibres corticales , qui fournissent cette liqueur sucrée. Dès que les arbres entrent en sève , que leur écorce commence à se détacher du bois , c'est-à-dire , vers le mois de Mai , la sève ne coule presque plus , ou celle qui découle a un goût d'herbe désagréable , & on ne peut parvenir à l'amener à l'état de sucre : les habitants en font alors une espece de sirop capillaire. C'est depuis la mi-Mars jusqu'à la mi Mai , que ces arbres donnent cette liqueur sucrée en plus grande abondance : on fiche au-dessous de la plaie , un tuyau de bois mince qui reçoit la sève , & la conduit dans un vase que l'on met au pied de l'arbre. Lorsque les circonstances sont favorables , c'est-à-dire , après le dégel , la liqueur coule si abondamment ,

qu'elle forme un filet de la grosseur d'un tuyau de plume , & qu'elle remplit une mesure de pinte de Paris dans un quart d'heure. Les vieux arbres donnent moins de liqueur que les jeunes ; mais elle est plus sucrée.

Il est essentiel , lorsqu'on veut conserver les arbres , de ne leur faire qu'une seule entaille ; car si on en fait quatre ou cinq , dans la vue d'en tirer une plus grande quantité de liqueur , alors les arbres dépérissent , & les années suivantes on en tire bien moins de liqueur. Pour amener cette liqueur à l'état de sucre , on la fait évaporer par l'action du feu , jusqu'à ce qu'elle ait acquis la consistance d'un sirop épais , & on la verse ensuite dans des moules de terre ou d'écorce de bouleau : en se refroidissant le sirop se durcit , & l'on obtient des pains ou des tablettes d'un sucre roux & presque transparent , qui est assez agréable , si l'on a su saisir le degré de cuisson convenable ; car le sucre d'érable trop cuit a un goût de mélasse ou de gros sirop de sucre , qui est peu gracieux. Deux cents livres de cette liqueur sucrée , produisent ordinairement dix livres de sucre. Quelques habitants de ces pays sophistiquent le sucre d'érable avec un peu de farine de froment , qui lui communique plus de blancheur ; mais ce sucre alors a une odeur moins agréable , & une saveur moins douce.

Le sucre d'érable , pour être bon , doit être dur , d'une couleur rousse , un peu transparent , d'une odeur suave , & fort doux sur la langue : on l'emploie au Canada pour le même usage que celui des cannes à sucre. On estime que l'on fait tous les ans au Canada douze à quinze milliers pesant de ce sucre.

Jusqu'à présent on n'a point encore retiré en France de liqueur sucrée de l'érable : on peut remarquer seulement sur les feuilles du sycomore , & sur celles du petit érable , une humidité visqueuse très sucrée , qui n'est que le sucre extravasé de ces arbres , qui se condense sur les feuilles.

Il croît en Virginie une espèce d'érable , dont les feuilles sont d'un verd brillant en dessus , & argentin en dessous ; aussi l'a-t-on nommé *Erable blanc*. Dès le mois de Janvier , dans les hivers peu rigoureux , il commence à donner des fleurs rouges , qui font un aspect très agréable dans une semblable saison : on leur voit succéder les fruits qui , ayant la même couleur , font durer le même agrément. Il ne se plaît que dans une bonne terre.

Il croît aussi à la Virginie une autre espèce d'érable , dont les feuilles diffèrent , pour la forme , de celles des autres érables , & ont quelque rapport avec les feuilles du frêne , ce qui la fait nommer *Erable à feuilles de frêne*. Cet arbre a un très beau feuillage d'un verd tendre : il réussit & croît très vite dans toutes sortes de terrains. On devrait s'attacher à le multiplier , à cause de l'utilité que l'on pourroit retirer de son bois.

On voit en Italie , le long des chemins , une espèce d'érable à feuilles rondes , que l'on nomme *Opale* , dont le feuillage est très beau , & qui mériterait d'être multiplié.

L'ERABLE COMMUN OU LE PETIT ERABLE , est d'une ressource infinie pour suppléer à la charmille , par tout où elle refuse de venir , & pour rem-

placer les vuides, où tout autre plant péric. De toutes les especes d'érable, celui de Candie est le plus petit.

Lorsqu'on veut semer des graines d'érable, comme les mulots en font fort friands, & en détruisent beaucoup, le mieux est de les stratifier (c'est-à-dire, les mettre alternativement couches par couches), avec de la terre légèrement humide, ou avec du sable, pour ne les semer qu'au printems pêle-mêle avec ce sable; elles leveront alors très promptement, sur-tout si on ne les a pas mises trop avant dans la terre.

On donne le nom de *Brouffin d'érable* (*Molluscum*) à une excroissance onduée & tachetée fort agréablement, qui vient pour l'ordinaire sur l'érable. Cette substance étoit d'un grand prix chez les Romains. On s'en sert encore aujourd'hui pour faire des cassettes, des tablettes, & quelques autres ouvrages.

ERGOT ou BLÉ CORNU : voyez à l'article. SEIGLE.

ERGOT. Nom que l'on donne vulgairement à une sorte de corne molle, ou aux tumeurs sans poil que portent entre les jambes, &c. les chevaux & quelques animaux à pied fourchu. On appelle encore *Ergot*, les éperons du coq.

ERISYMMUM : voyez VÉLAR.

ERMINE : voyez HERMINE.

ERS : voyez à l'article OROBE.

ESCALIER. Nom donné par quelques-uns à un coquillage univalve de la famille des vis, & qui, lorsqu'il est d'une certaine grandeur, est très recherché & très précieux : on l'appelle aussi *Scalata* : voyez ce mot. Le Golfe Adriatique en produit beaucoup de petits.

ESCARBOT, *Scarabeus*. Insecte volant & coléoptère, c'est-à-dire, dont les ailes sont renfermées dans des étuis. Quelques Naturalistes donnent le nom d'*escarbot* à tous les scarabées; ce nom paroît plus particulièrement affecté à l'insecte que nous nommons *Fouille-merde* ou *Scarabée pilulaire*, *Scarabeus pilularis*, ainsi qu'à celui qu'on nomme *Scarabée onctueux* ou *Proscarabée*, *Proscarabeus*, deux especes d'insectes qui sont de quelqu'usage dans la Médecine. M. Linnæus a étendu beaucoup la classe des escarbots qu'il distingue de celle des scarabées. Voyez SCARABÉES.

L'ESCARBOT COMMUN, connu vulgairement sous le nom de *Fouille-merde*, *Fodi merda*, a le corps large, épais, de couleur noire, luisante, mêlée d'une teinte de bleu. Sa tête qui est bombée en dessus, soutient deux antennes, dont les extrémités sont divisées par plusieurs filets. La bouche de l'insecte est garnie de deux mâchoires rabattues & parsemées d'un duvet ranné. Les jambes sont antérieurement dentelées en maniere de scie, structure appropriée à l'usage dont elles sont à l'insecte; car il s'en sert pour former des pilules ou boules de fiente, dans lesquelles il dépose ses œufs, qui y éclosent à l'aide de cette douce chaleur du fumier dont ils sont enveloppés. Il paroît que cet insecte prend un soin particulier de cette boule, & qu'il la transporte par-tout avec lui.

Le fouille-merde , ainsi que la plupart des escarbots , est vraiment nyctalope , c'est-à-dire qu'il voit plus clair de nuit que de jour : le soleil ou le grand jour l'éblouit. C'est toujours dans les fientes de vache ou de cheval que l'on trouve ces insectes ; cependant on croira avec peine ce que disent quelques Auteurs, que cet insecte déteste les roses, & que la seule odeur de ces fleurs le fait mourir.

On distingue plusieurs autres especes de fouille-merde , qui different de celui dont nous venons de parler , par leur petitesse , & quelques autres accidens. Comme ces insectes contiennent beaucoup d'huile & de sel volatil , on les met dans de l'huile de lin : & on les laisse infuser au soleil. Cette huile acquiert une vertu résolutive , adoucissante & fortifiante : on l'emploie avec succès en liniment , en y trempant du coton pour résoudre les hémorroïdes , & pour en appaiser les douleurs.

L'ESCARBOT OU SCARABÉE ONCTUEUX OU PROSCARABÉE, est le plus grand des escarbots : il est gros comme le doigt , & a quelquefois un pouce & demi de longueur. En général , il est tout noir & molasse ; sa tête & son col sont d'un pourpre foncé ou violet. On apperçoit autour du corps plusieurs cercles nuancés de bleu , de verd & de jaune.

On nomme cet insecte *Scarabée onctueux* , parcequ'il suinte de toutes les jointures de ses jambes , une liqueur grasse , onctueuse , de couleur jaune , qui teint les mains , & qui est d'une assez bonne odeur. C'est ordinairement vers le mois de Mai , rarement plus tard , que l'on trouve ces insectes dans les bois , le long des chemins , ou dans les prés humides : ils se nourrissent de vers , mais principalement de feuilles de violettes & d'herbes tendres. Cet insecte fut adoré autrefois par les Egyptiens.

La liqueur qui suinte de cet escarbot , est pleine d'huile & de sel volatil. On dit que cette liqueur onctueuse est un bon topique pour les plaies : on la fait entrer dans les emplâtres contre les bubons & les charbons pestilentiels. L'huile par infusion , faite avec ces insectes , est estimée bonne contre la piquure des scorpions.

Entre les insectes que M. Linnæus place dans la classe des escarbots , les plus curieux à connoître , sont le *Nasicorne* ou *Escarbot-Licorne* qui a une corne qui se courbe en arc sur les épaules ; l'*Escarbot-mouche* qui bat des aîles avec une vitesse incroyable ; les *Escarbots verds & dorés* qui sont des especes de cantharides ; les *Escarbots-sauterelles* qui , après avoir ramassé ensemble leur tête & leur poitrine , font un saut en allongeant le corps ; & l'*Escarbot joueur de lyre* , ainsi nommé , parcequ'il rend un son semblable à celui de la lyre , par le mouvement de sa tête qu'il frotte contre son ventre. Ces escarbots , ainsi que tous les autres , avant que de paroître dans cet état , ont été dans celui de ver , & ont subi d'autres métamorphoses , ainsi qu'on peut le voir au mot SCARABÉE.

Parmi les escarbots étrangers , un des plus singuliers , est l'*Escarbot-éléphant* , *Scarabeus elephas*. Espece de grand scarabée que l'on rencontre à Moka , à Surinam , sur la riviere de Ronoch , & dans la Province de la Guiane

dans l'Amérique Méridionale. Cet insecte est large de deux pouces un quart, long de trois pouces, indépendamment de sa trompe qui a plus d'un pouce de longueur. Son corps est noir, ses antennes, ou plutôt les cornes, sont immobiles; mais sa trompe est fort mobile. On distingue encore une éminence au-dessus de la tête de l'animal.

ESCARBOUCLE ou PIERRE DE CHARBON ARDENT, *Carbunculus*. Les Anciens ont donné ce nom à presque toutes les pierres précieuses, transparentes & rouges: aujourd'hui on entend par *escarboucle* le vrai *rubis*: voy. *ce mot*.

ESCARE: voyez son article au mot CORALLINE.

ESCARGOT. Nom que l'on donne au limaçon terrestre: voyez LIMAÇON.

ESCOURGEON. Est l'orge d'automne dont l'épi a quatre côtés, au-lieu que l'orge ordinaire n'en a que deux: on l'appelle *orge quarré*, *orge de prime*.

On recueille ce grain dès le mois de Juin, & c'est un secours pour les pauvres gens; ils en vivent en attendant que la moisson leur fournisse leur provision pour l'hiver. L'escourgeon se peut couper en verd, & repousser deux & trois fois: les chevaux en aiment également le verd & le grain: voyez l'article ORGE.

ESCULAPE. Les Zoologistes donnent par excellence ce nom à un serpent joufflu & à grosses babines, qui ne cause point la mort, & qui ne fait même aucun mal, à moins qu'il ne soit irrité; car alors il mord un peu. Ce serpent naît dans l'Isle de Caprée, & dans presque toutes les parties du monde habité. En Italie il est si familier, qu'on en trouve dans les lits, & qu'il vit volontiers avec les hommes.

M. Linnæus en cite un qui est long d'environ un pied & demi, & de la grosseur d'un doigt. Sa queue n'a de longueur que la sixième partie de son corps. On lui compte quarante-deux écailles qui sont égales en grandeur.

Séba fait mention de sept especes d'esculapes de diverses couleurs magnifiques, & qui se trouvent ou au Brésil, ou à Panama, & en d'autres pays de l'Amérique. Leur gueule est armée de dents pointues & un peu crochues: aussi dès que ce serpent a une fois un morceau dans la gueule, il le pousse aisément dans son gozier; mais il ne sauroit ensuite le rejeter à cause de ses dents en crochets: ce qui fait qu'avant de prendre son repas qui consiste ordinairement en rats champêtres, en loirs & en oiseaux, il ne manque pas de les flairer, se donnant garde de porter à sa gueule ce qu'il ne juge pas pouvoir avaler commodément.

ESPADON ou EMPEREUR: voyez au mot BALEINE.

ESPARGOUTE ou ESPARGOULE. Voyez SPERJULE.

ESPARSETTE. Voyez SAIN-FOIN.

ESPATULE. Voyez GLAYEUL PUANT.

ESPATULE. M. Barrere dit qu'on a donné ce nom à une espece de héron blanc qui se trouve dans l'Isle de Cayenne, & dont le bec est semblable en quelque sorte à l'espatule dont les Apoticares se servent pour remuer leurs drogues. Les plumes de cet oiseau changent de couleur en vieillissant: elles deviennent

deviennent tantôt jaunes & tantôt rouges; changement qui s'observe dans le plumage de plusieurs autres oiseaux de l'Amérique.

ESQUAQUE ou ESCAYE. *Voyez* le mot ANGE.

ESQUINE. *Voyez* SQUINE.

ESSAIM. *Voyez* au mot ABEILLE.

ESSENCE D'ORIENT. *Voyez* à l'article ABLE.

ESTRAGON, *Dracunculus esculentus*. Plante qu'on cultive dans tous les jardins potagers. Sa racine est longue, branchue & vivace : elle pousse tous les ans de nouvelles branches ou tiges, de la hauteur de deux ou trois pieds, dures, grêles, un peu anguleuses, rameuses. Ses premières feuilles sont découpées; celles qui leur succèdent sont longues, étroites, & semblables à celles du lin ou de l'hyssope, d'un verd obscur, luisantes, d'une saveur âcre, aromatique, mêlée d'une douceur agréable, approchant de celle de l'anis. Ses fleurs sont rangées à l'extrémité des rameaux, comme dans l'aurore ordinaire; mais elles sont si petites, qu'à peine peut-on les voir : elles sont jaunes, composées de plusieurs fleurons tubulés, partagés en étoile, formant ensemble de petits bouquets. A ces fleurs succèdent de petits fruits arrondis & écailleux, qui contiennent des semences nues & sans aigrette. On multiplie l'estragon de graines & de plants enracinés : on le plante au mois de Mars, & on l'espace de quelques pouces.

Toute cette plante a une grande acrimonie. Elle est employée dans les salades, pendant qu'elle est encore jeune & tendre; car non-seulement cet assaisonnement relève le goût de la salade, mais il peut encore devenir fort utile pour l'estomac, & concourir efficacement avec le sel, le poivre & le vinaigre, à corriger la fadeur & l'inertie des plantes aqueuses & insipides, telles que la laitue & plusieurs autres plantes qui se mangent en salade. Elle est puissamment incisive, apéritive & digestive; elle donne de l'appétit, dissipe les vents, excite les règles & la salive. En France on fait un vinaigre d'estragon fort en usage en Cuisine & en Pharmacie. En Angleterre, son eau distillée est la plus estimée de toutes pour empêcher la contagion de la peste.

ESTURGEON ou ETURGEON, en latin *Accipenser seu Sturio*. Poisson de la classe des cartilagineux, c'est-à-dire, de ceux dont les nageoires sont soutenues par des cartilages, & qui, au lieu d'os, ont des cartilages dans leur intérieur.

Dans le genre des esturgeons, il y a sur-tout deux espèces intéressantes à connoître, par l'utilité qu'on en retire. La première est l'esturgeon ordinaire ou commun, si estimé pour son bon goût; & l'autre espèce est le grand esturgeon, dont la chair n'est pas bien bonne à manger, mais dont on retire la colle de poisson qui est d'un si grand usage dans les arts : aussi ce poisson est-il nommé par quelques Auteurs, *Piscis ichtyocolle*, l'ichtyocolle.

Les marques caractéristiques du genre des Esturgeons, sont d'avoir un trou de chaque côté de la tête, que quelques Auteurs regardent comme les

ouies , d'autres comme les narrines ; une bouche située au-dessous en forme de tuyau & sans dents ; un corps oblong muni ordinairement de sept nageoires.

L'esturgeon ordinaire , & dont on fait tant de cas , a le corps long ; mais en même tems d'une forme pentagone ou à cinq angles , qui sont formés par autant de rangs d'écaillés. Les écaillés de chaque rang ont toutes en général à leur sommet , une épine courte , forte , recourbée en arriere. Sa tête est de médiocre grosseur , hérissée aussi de petites pointes ou de petits tubercules. Ses yeux sont petits , son iris argenté : le museau est long , large , finissant en pointe ; la bouche est dépourvue de dents , faite comme une sorte de tuyau qui peut s'avancer jusqu'à un certain point , puis se retirer. Comme cet animal n'a point de mâchoires , il paroît clairement qu'il ne se nourrit qu'en suçant , & qu'il fait sa plus grande nourriture d'insectes de mer , ainsi qu'on l'a observé par l'examen qu'on a fait de ce qui se trouvoit dans son estomac. La queue de ce poisson est semblable à celle des chiens de mer , fourchue de maniere que la partie supérieure avec le corps même aminci , s'avance loin au-delà de l'inférieure.

On dit que tant que l'esturgeon reste dans la mer , il n'y devient pas bien gros , & que sa chair alors n'est pas bien bonne ; mais que lorsqu'il remonte dans les fleuves d'eau douce , il y devient aussi grand qu'un poisson cétacée. Ce poisson se rencontre fréquemment dans les grands fleuves , tels que le *Nil* , le *Don* , le *Danube* & le *Pô* ; on le pêche aussi dans les grandes rivières. Ceux qu'on pêche dans la Loire , ont quelquefois jusqu'à trois aulnes de longueur. On en présenta un à François I , qui étoit long de dix-huit pieds. On en pêche quelquefois dans l'Elbe qui pesent jusqu'à deux cens livres.

Les esturgeons sont d'un très grand revenu par-tout , mais singulièrement sur le Pont-Euxin ; car en sortant de la mer , ils entrent en très grande quantité dans le *Palus Meotide* , où l'on en pêche beaucoup à l'embouchure du Don. Les esturgeons ne peuvent se pêcher à l'hameçon ; on ne les prend qu'au filet , parceque ces poissons se nourrissent plutôt en suçant qu'en dévorant. On ne leur trouve jamais dans l'estomac de nourriture grossière ; ce qui a fait dire proverbialement en Allemand , *sobre ou frugal comme un esturgeon*. On prétend que ce poisson cherche sa vie sous l'eau en fouillant la terre avec son museau.

L'esturgeon est d'une force considérable dans l'eau , & non sur la terre. Quand il a le ventre appuyé , il renverse d'un coup de queue l'homme le plus robuste , pour peu qu'il le touche , & même il peut casser de très fortes perches. Si les Pêcheurs ne prenoient point leurs précautions , ils risqueroient quelquefois d'avoir les jambes cassées ; aussi pour l'empêcher de donner des coups de queue , ils tâchent de lui attacher de court la queue avec la tête , en forme de demi cercle.

La pêche de ce poisson commence en Février dans la rivière de la Garonne

du côté de Bordeaux , & dure jusqu'en Juillet ou Août , & même un peu plus tard , suivant la saison. Quand les Pêcheurs s'apperçoivent qu'il y a des esturgeons de pris , ils les retirent , & les attachent à des bateaux , en leur passant des cordes qui traversent les ouies & la gueule du poisson. Ils peuvent les conserver ainsi vivans pendant plusieurs jours , jusqu'à ce qu'ils en aient assez pour les mener à Bordeaux , où ce poisson est si commun , que tout le monde en mange. La chair de son dos a , dit-on , le goût du veau , & celle de son ventre , celui du cochon. Aussi sa chair est-elle regardée par quelques Médecins , comme de très difficile digestion , & comme n'étant propre qu'aux estomacs robustes. Les laitances de ce poisson sont de la plus grande délicatesse. Comme il se rencontre dans les mêmes endroits que le saumon , les Pêcheurs le nomment le *Conducteur des Saumons*.

Les Pêcheurs qui vont à la pêche de l'esturgeon sur le Palus Méotide à l'embouchure du Don , en tirent un double profit. Aussitôt qu'ils ont pêché des esturgeons , ils les salent , les suspendent à des perches pour les faire sécher au soleil , & vont vendre cette marchandise en Grece , où on nomme ces poissons ainsi salés *Moronna* , & lorsqu'ils sont frais , *Xirichi*. On transporte aussi de cette chair salée en Italie , où elle prend le nom de *Spinalia*. Cette saline est aussi commune en Grece , que chez nous le *hareng* , & en Italie la *thonine*.

On donne le nom de *Caviar* aux œufs de l'esturgeon , que l'on prépare aussitôt après la pêche , en les lavant bien dans du vin blanc , & en ôtant certains ligamens dans lesquels ils sont entremêlés , & la pellicule qui les enveloppe : on les fait un peu sécher , on les met ensuite avec du sel dans un vaisseau percé de petits trous : on les y écrase avec la main ; lorsque toute l'humidité superflue est bien dissipée , ce caviar ressemble pour la couleur & pour la consistance , au savon verd de Hambourg ; on le met dans des barriques , & on l'envoie en divers lieux éloignés de la mer , où l'on trouve cette denrée excellente. Le caviar forme une branche considérable du commerce des Hollandois. On en porte sur-tout beaucoup aux Moscovites , qui en font grand usage dans leurs trois carêmes qu'ils observent très scrupuleusement. Il n'y a qu'une seule espece d'esturgeon dont on puisse faire le caviar. Les Russes nomment cette espece de fromage *Caviari-Sckari* ; ils y mêlent souvent du poivre & de l'oignon. Les Italiens font venir une grande quantité de ce mets ; ils le regardent aussi comme un manger fort délicat : mais on prétend qu'ils est très mal sain & fiévreux.

En Hollande on coupe les esturgeons par morceaux qu'on garde dans des barils après les avoir confits dans le sel & la saumure. On fait grand cas en Angleterre de la chair d'esturgeon confite de cette maniere. On fait encore avec les vessies blanches qui s'étendent le long du dos de ce poisson , une espece d'ichthyocolle ou de colle de poisson grise , jaunâtre , que les Droguistes vendent en feuilles , sans être roulées. Elle est plus difficile à dissoudre que celle dont nous allons parler ; mais quand elle est dissoute , elle a les mêmes propriétés.

Le GRAND ESTURGEON ou l'ICHTYOCOLLE, *Ichtyocolle piscis*, a la peau douce, blanche, sans épines ni écailles, & pour épine du dos, un cartilage percé comme avec une tarière d'un grand trou, vuide depuis la tête jusqu'à la queue : on en voit qui pèsent depuis deux cens jusqu'à quatre cens livres, & qui ont jusqu'à vingt-quatre pieds de longueur.

Ce poisson passe tous les ans de la Mer dans le Danube, où l'on en prend une grande quantité ; mais principalement en Valachie vers les embouchures de ce fleuve. Cette émigration se fait depuis l'automne jusqu'au mois de Janvier ; le plus fort de la pêche est en Novembre & Octobre. Il s'en débite communément tous les vendredis à Vienne en Autriche, jusqu'à soixante, & même cent. Ces poissons nagent toujours en bande, & accourent au son des trompettes, ce qui donne aux Pêcheurs la facilité de les envelopper dans leurs filets, & de les amener à bord. Le grand esturgeon est si timide, que le plus petit poisson le fait fuir. Ce poisson se trouve encore communément dans les mers de Moscovie. On l'appelle *Belluge*.

Colle de Poisson.

La chair du grand Esturgeon est douceâtre, gluante ; & ne devient supportable à manger, que lorsqu'elle a été salée. Ce qu'il fournit de plus utile, soit pour la Médecine, soit pour les Arts, c'est l'*ichtyocolle*, autrement nommée *colle de poisson*, qui n'est, à proprement parler, qu'une gelée de poisson extraite par le moyen de l'eau chaude. On prend la peau, les entrailles, l'estomac, les nageoires, la queue, les parties nerveuses, & la vessie d'air de ce poisson ; on les réduit en bouillie, dans de l'eau bouillante ; on étend cette bouillie mucilagineuse en petits feuillets, afin qu'en séchant, elle se réduise en forme de parchemin ; quand elle est presque sèche, on la roule ordinairement en cordons ; c'est alors ce qu'on nomme *colle de poisson*. La meilleure est en petits cordons, blancheâtre, claire, transparente, sans odeur, & sans saveur. Celle qui est en gros cordons, est sujette à être remplie d'une colle jaune, de mauvaise odeur. Il faut conserver cette substance dans un lieu sec, car elle s'humecte à l'air. Toute la colle de poisson que nous voyons en France, nous est fournie par les Hollandois, qui la vont chercher au Port d'Archangel, où l'on en prépare beaucoup.

Comme la colle de poisson possède une qualité dessicative, incarnative, anodine, & un peu émolliente, on l'emploie avec succès dans les ulcérations de la gorge & des poulmons, & dans la dysenterie : on l'emploie aussi dans les emplâtres agglutinatives.

La colle de poisson est d'usage pour donner du lustre aux rubans de soie, pour blanchir les gazes, pour contrefaire les perles fines, & pour plusieurs autres pratiques des arts. On la fait fondre avec du sucre, & on la recuit en une espèce de colle jaune & transparente qu'on laisse fondre dans la bouche pour coller le papier. Les Dessinateurs se servent de la colle de poisson ainsi préparée sous le nom de *colle à bouche* ; les Limonadiers se servent de

colle de poisson pour éclaircir le café. Les Marchands de Vin la font dissoudre dans du vin , & s'en servent pour éclaircir le vin ; on jette ce mélange dans le tonneau , il se forme sur la surface de la liqueur une eau qui en se précipitant peu à peu jusqu'au fond , entraîne avec elle toutes les parties grossières ; en sorte que l'on peut dire que c'est le filtre qui passe à travers la liqueur , & non la liqueur à travers le filtre. Il y a encore une autre *colle de poisson* qu'on tire de Hollande & d'Angleterre en petits livres : mais on prétend que ce n'est que le rebut & la partie la moins pure de la colle de poisson de Moscovie. Pour rendre la *colle de poisson* très forte , on l'amincit à coups de marteau , on la coupe en petits morceaux , & on la met digérer dans de l'eau-de-vie sur le feu. Souvent on l'emploie avec succès en guise de colle forte ordinaire.

ESULE GRANDE ET PETITE : voyez TITHYMALE.

ETAIN , *Stannum*. Est l'un des métaux imparfaits & le plus mou après le plomb. Sa couleur est blanche & brillante , il est facile à ternir , mais il ne se rouille pas : il est peu ductile , & quand on le courbe en différens sens , il produit une espèce de cri : il est plus tenace & plus élastique que le plomb , & peu sonore par lui-même. Plus ce métal est pur & moins il pèse , c'est le plus léger de tous les métaux ; mais étant dans l'état de *minerai* , sa pesanteur spécifique l'emporte sur celle de tous les métaux minéralisés. L'étain d'Angleterre est le plus pesant , & celui qui contient la plus grande quantité d'arsenic.

L'étain possède beaucoup de propriétés , qui le rapprochent du plomb ; il se fond promptement , & à une chaleur modérée ; mais à un certain degré de feu , il se calcine , & finit par se changer , à l'aide d'un fondant , en un verre laiteux , opalin , comme le font aussi les os calcinés , si on les jette dans du verre tenu en fusion. Un atôme de ce métal en vapeur , rend une grande quantité d'or , aigre & cassant , de la même manière que le fer devient aigre dans la forge des Serruriers , pour peu qu'on en approche du cuivre de trop près. L'étain s'amalgame très bien avec les demi-métaux & le plomb : excepté ce dernier métal , il leur enlève à tous la ductilité & la malléabilité ; si on met du fer dans de l'étain fondu , ils contractent une sorte d'alliage ; mais si l'on met de l'étain dans du fer fondu , ils se convertissent aussitôt l'un & l'autre en petits globules qui crevent , & font explosion comme des grenades.

On lit dans notre *Minéralogie* plusieurs détails circonstanciés sur ce métal , qui seroient déplacés ici , nous y renvoyons nos Lecteurs : nous dirons seulement que l'étain a ses mines particulières ; qu'il naît ordinairement dans les endroits sabloneux des montagnes à filons ou à couches , & en masses plus ou moins considérables , ainsi qu'on l'observe en Allemagne , en Bohême , en Suede & en Pologne , en Angleterre & aux Indes.

Ces filons ne sont quelquefois que légèrement couverts de terre , & viennent même souvent aboutir & se montrer à nud à la surface. Dans les

mines de Devonshire & de Cornouailles , la direction des filons d'étain est ordinairement de l'Occident à l'Orient , quoique dans d'autres parties d'Angleterre les filons aillent ordinairement du Nord au Sud ; pour lors constamment ces filons s'enfoncent vers le Nord perpendiculairement de trois pieds sur huit de cours. Les Mineurs ont remarqué que les côtés latéraux des filons de la mine de Devonshire ne sont jamais perpendiculaires , mais toujours un peu inclinés. Il y a en Saxe , dans le District d'Altemberg , une mine d'étain en masse qui peut être regardée comme un prodige dans la minéralogie. Cette mine a environ vingt toises de circonférence , & fournit de la mine d'étain depuis la surface de la terre jusqu'à cent cinquante toises de profondeur perpendiculaire.

L'étain est minéralisé , ou par le soufre , ou par la pyrite blanche arsénicale ou allié au fer : on n'en voit que peu ou point de pur.

La mine d'étain la plus ordinaire , est celle de Cornouailles & celle de Devonshire , qui sont cristallisées , en polyedres irréguliers , & dont la couleur est noirâtre. Ces minerais sont striés intérieurement , ou grainus , ou poreux.

Les cristaux d'étain proprement dits , sont une mine d'étain , dont la figure extérieure est à pans indéterminés , le tissu intérieur est feuilleté , de couleurs & transparences différentes : ils deviennent rouges à la comminution , & donnent à la fonte soixante-dix livres ou environ par quintal.

Les grenats d'étain sont quelquefois d'un beau rouge , assez durs pour couper le verre , & ressemblent entièrement à ceux dont on fait des bijoux. Ce que l'on nomme *Sable d'étain* , est une mine de transport , formée des débris des précédentes mines , & que des tourans d'eau ont détachée de ces minieres , & déposée ensuite dans l'endroit où des Pailloteurs la retirent par le lavage avec la fébille , ou avec des rateaux à dents de fer. Telle est celle d'Eybenstock en Saxe. On appelle *Mundick* une mine d'étain trop pauvre ou trop adultérée pour valoir la peine de l'exploitation : voyez MUNDICK.

Toutes les mines d'étain sont enveloppées ou dans de la roche de corne cristallisée , ou englobées dans des *fluors* de spath fusible , ou interposées dans de la mine arsenicale , réfractaire & rapace , qui est le *Wolfram* : voyez *ce mot* ; rarement dans la *Molybdène*. La sur-enveloppe de cette mine est communément schisteuse , ferrugineuse & sableuse. Il est bon d'observer que les mines d'étain sont toujours difficiles à traiter , à cause des substances auxquelles elles sont alliées. Quand on a trouvé une mine d'étain , on y pratique d'abord des puits , des galeries , des percemens : lorsqu'il s'agit d'ébranler & de détacher le métal de sa miniere , il faut mettre le feu dans le souterrain , afin d'y produire des gerçures , par lesquelles la sonde , les leviers , les pics puissent avoir prise ; ensuite on extrait le métal de sa mine , par le triage , la torréfaction , puis le pilage , le lavage & la fonte dans un fourneau de reverbere.

La mine étant purifiée & séchée (mais avant la fusion) se nomme *Pierre d'étain*. La partie supérieure de la masse d'étain fondu est si molle , si peu ductile , que pour la travailler (dit M. Geofroi , *Mat. Med. vol. 1 , p. 487.*) on est obligé d'y allier trois livres de cuivre , par quintal d'étain de fonte. On met deux livres de cuivre ou cinq livres de plomb dans la partie du milieu ; & dans la couche inférieure , on met dix-huit livres de plomb. Il y a cependant des mines d'étain , dont la nature est telle , qu'il ne faut que peu d'alliage pour le rendre sonore & malléable.

On distingue , dans le commerce , trois différentes sortes d'étain ; savoir , 1^o. l'*étain plané* ou de *marais* : il est assez pur , mais point sonore , & trop liant ; on lui donne encore les noms d'*Etain d'Angleterre* , *Etain cristallin* & à la *rose*. On le travaille au marteau sur une platine de cuivre placée sur une enclume avec un ou deux cuirs de castor entre l'enclume & la platine.

2^o. L'*étain commun* , qui se trouve chez tous les Potiers d'étain : c'est un alliage d'étain plané , de plomb , & quelquefois de cuivre jaune.

3^o. L'*étain sonnant* , ou *étain fin* , qui est un mélange d'étain plané , de bismuth , de cuivre rouge & de zinc : il est le plus éclatant , le plus sonore , le plus facile à ouvrager : on y ajoute , au besoin , du régule d'étain , pour en augmenter la dureté. Pour rendre cet alliage encore plus sonore , on le bat fortement à coups de marteau : c'est ce qu'on appelle *écrouir l'étain*.

Le mélange de l'étain doit être annoncé par la marque qu'on est obligé d'y apposer : l'étain mélangé avec un tiers de plomb , doit porter deux marques ou contrôles ; s'il est composé de cinq parties contre une de plomb , il doit avoir trois marques ; enfin s'il contient trois livres d'alliage de plomb par quintal , il faut qu'il ait quatre contrôles.

L'étain de Siam , de la Chine , du Japon , & d'autres pays de l'Inde Orientale , viennent en lingots , formés en maniere de pyramides tronquées , avec un rebord : c'est ce que les Marchands appellent *Etain en chapeau* , ou *Etain de Malac*. On les désigne encore différemment dans le commerce : on appelle *Etain à l'agneau* , celui qui est contre-marqué des Armes de la Ville de Rouen ; & *Etain de brique* , celui qui provient d'Allemagne , & à qui on a donné cette marque à Hambourg. Ainsi l'étain purifié se trouve dans le commerce , ou en lingots , ou en saumons , ou en lames qu'on nomme *Verges* , & en cubes appelés *Chapeaux* : on fait l'essai de l'étain pour en connoître la qualité & le titre , le jettant tout fondu dans une lingotiere de craie : plus le lingot est léger , & meilleur ou plus fin l'étain doit être , &c.

L'étain entre dans la composition des miroirs métalliques , du bronze & des cloches. L'expérience a appris à l'altérer différemment , pour en former toutes sortes de vaiselles & d'ustensiles de ménage : on s'en sert pour étamer le cuivre , & pour la fabrique des tuyaux d'orgues. On en fait , par une legere calcination , une chaux grise , qui est la *potée d'étain* , si propre

aux Diamantaires , & à d'autres Ouvriers pour polir leurs ouvrages : il entre dans la composition des émaux , dans celle de la soudure pour les métaux mous , & dans la couverte de la fayence. On peut battre l'étain en feuilles minces , & les charger de mercure ; par ce moyen , elles acquerront la propriété (étant appliquées derrière une glace) de peindre ou de réfléchir les objets , ainsi qu'on en connoît l'effet dans un miroir. Ces feuilles non amalgmées , mais peintes ou vernies d'un côté , sont connues sous le nom d'*Appeau* : on en met aux torches de cire , pour faire des armoiries de deuil : on s'en sert aussi pour faux-argenter les décorations d'artifice & de théâtre, pour orner les cartouches , &c. dans les Fêtes publiques & dans les Pompes funébres , ou pour faire de l'avanturine blanche , ou pour blanchir le fer. La dissolution de raclures d'étain , par l'eau régale , a la propriété de donner beaucoup d'éclat aux couleurs rouges : aussi les Teinturiers s'en servent-ils pour faire la belle écarlate , &c. Il donne une couleur pourpre à la dissolution de l'or. Les Potiers d'Etain vendent à différens Artisans une sorte de bas étain qu'ils appellent *Claire Soudure* ou *Claire Etoffe* : cet étain participe de moitié son poids de plomb. Il n'est pas permis aux Potiers d'Etain de l'employer, sinon à faire des moules pour la fabrique des chandelles. On en fait aussi quantité de petits ouvrages , que les Merciers appellent du *Bimblot*. Voyez l'article BIMBLOTIER dans le *Dictionnaire des Arts & Métiers*.

ETAIN-DE-GLACE. Voyez BISMUTH.

ETALON. Est un cheval entier , choisi & destiné à l'accouplement , & dont on veut faire race. Voyez HARAS , au mot CHEVAL.

ETANG , *Stagnum*. Nom donné à un amas d'eaux dormantes : c'est une espèce de réservoir plus petit qu'un lac : qui reçoit de l'eau sans en dégorger , sinon à l'instant des grandes alluvions ; il est plus grand , plus profond & moins sujet à se dessécher que les *mares*. On y nourrit du poisson : aussi les Anciens Latins ont-ils nommé l'étang *piscina*. On empoissonne les étangs dans le mois de Mai , & on les pêche ordinairement en Mars : un des plus considérables étangs de ce Royaume est celui de Villers dans le Berry , qui a cinq ou six lieux de circuit. On voit dans la Chine quantité d'étangs faits & ménagés avec industrie , pour fournir de l'eau de pluie pendant la sécheresse de l'été aux habitans qui sont trop loin des rivières , où dont le terroir n'est pas propre à creuser des puits. Voyez CITERNE : il y a aussi des étangs salés , tel est celui de l'Isle Maguelone en Languedoc , où l'on travaille à la cristallisation du sel marin,

ETERNELLE ou BOUTON BLANC. Nom donné à l'immortelle blanche. Voyez à l'article IMMORTELLE.

ETITES , *Ætita*. Ce sont des pierres , pour l'ordinaire ferrugineuses , au-dedans desquelles il y a une cavité qui est tantôt vuide & tantôt pleine. La figure extérieure de ces pierres est peu constante : elle est ou ronde , ou ovale , ou triangulaire , ou quarrée , &c.

On a prétendu , mal-à-propos , que ces pierres se trouvoient dans les nids des aigles , d'où leur est venu le nom de *pierres d'aigles*. C'est avec aussi peu de

de fondement , que le peuple attribue encore à ces fortes de pierres , les vertus admirables que les anciens Naturalistes prétendoient y avoir reconnues.

Les Étites sont composées de plusieurs couches , d'un rouge brun , olivâtre , & qu'on peut séparer aisément. Il est évident qu'elles ont été formées d'une matière d'abord molle , qui s'est agglutinée peu - à - peu , & a laissé une cavité en dedans. Ces couches enveloppent un noyau limoneux ou ochreux qu'elles portent dans leur centre , & qui s'y est conservé depuis la formation de l'étite. Ce noyau est ou fixe ou mobile : on l'appelle *callimus*.

On trouve l'Étite dans bien des mines de fer de la France , même dans la chaîne des montagnes d'Alais en Languedoc. La plus grande quantité se rencontre près de Terrané , village situé sur le bord du Nil , & dans la grande Mer du Desert , que les Arabes appellent *Bahar-labaama* , c'est-à-dire , *Lac desséché* ou *Mer sans eau* : elles sont bigarrées , graveleuses , de couleur cendrée ou jaunâtre & brunissent avec le tems. Il y en a depuis la grosseur d'un œuf d'autruche jusqu'à celle d'une aveline : il n'est pas rare de les trouver groupées en grande quantité.

Le noyau ou *callimus* des étites , étant communément argilleux & venant à se dessécher , cesse d'occuper toute la cavité , & produit un certain bruit quand on vient à agiter brusquement la pierre d'aigle. Les Arabes ont nommé l'étite *Maské* , c'est-à-dire , pierre sonnante. La concavité est un caractère plus essentiel au Géode qu'à la pierre d'aigle *Voyez* GÉODE.

On rencontre quelquefois , dans les environs d'Alençon , près des mines de fer , des étites brillantes , noirâtres & très pesantes , susceptibles d'efflorescence : on les doit regarder comme une sorte de pyrite vitriolique , caverneuse. *Voyez* l'article PYRITE.

ETOILE. *Stella avis*. Oiseau de la Côte d'Or , en Afrique : il a la grosseur d'un merle : son plumage est très agréablement diversifié par trois couleurs ; savoir , le blanc , le jaune & le noir : ses pieds sont jaunâtres , on y compte trois doigts ; les ongles sont noirs & très courts : son bec est assez long , courbé & noirâtre par le bout , le dessous en est blanchâtre ; sa voix est très forte , & ressemble au rugissement. Si les Negres l'entendent crier du côté gauche dans leurs voyages , ils retournent aussi-tôt sur leurs pas , tant ils regardent comme sinistre le cri de cet oiseau.

ETOILE FLAMBOYANTE : nom que l'on a donné quelquefois aux Comètes , à cause de la queue ou chevelure lumineuse dont elles sont presque toujours accompagnées. *Voyez* COMÈTE.

ETOILE MARINE PÉTRIFIÉE. Les Lithologistes donnent ce nom à quantité de pierres en forme d'étoiles , ou marquées d'étoiles en relief ou en gravure , ou parsemées d'étoiles. De-là vient que toutes les espèces de madrepores fossiles peuvent réclamer ce nom. M. Bertrand dit avec raison qu'on auroit dû réserver cette dénomination aux parties de l'étoile marine proprement dite , & dont on trouve les articulations vertébrales ou bourre-

lets osseux, en différens endroits, particulièrement en Suisse & en Tourraine. Les Lithographes peuvent aussi imposer ce nom aux articles des différentes *étoiles de mer* ou *Astrophites*, connues sous le nom de *Tête de Meduse*. Voyez ce mot & l'article ETOILE MARINE.

Les pédicules ou branches des encrinites, des entroques, peuvent aussi être comprises sous ce nom. Voyez l'article PALMIER MARIN.

ETOILE DE MER. Est le limaçon épineux du Cap.

ETOILE DE MER, *Stella marina*. Insecte de mer, auquel les Naturalistes ont donné ce nom, à cause de sa figure, & dont tous les curieux parent leurs cabinets. On en connoît plusieurs especes, qui varient par la couleur, par le nombre des rayons & par le mécanisme particulier qu'ils nous font voir dans leur marche. Nous en avons ramassé sur les parages du Texel & de Squeveling en Hollande, dont les unes avoient une, deux, trois, quatre & cinq branches ou pans; nous en avons recueilli au Confluent du Sund qui avoient treize rayons: on en apporte des Indes qui en ont jusqu'à trente-sept, & qu'on nomme *Soleil de mer*, à cause de leur figure & de la quantité de leurs rayons; d'autres ont les branches rameuses. Toutes celles que nous avons ramassées sur les divers rivages de la Méditerranée sont garnies de longues épines; & on ne les prend pas toujours aussi impunément dans les mains que celles des environs de l'Islande, qui en sont entièrement dépourvues. Ainsi l'on peut distinguer bien des sortes d'étoiles de mer: les unes sont lisses, les autres sont épineuses, il y en a d'arborescentes ou branchues.

Parmi les étoiles de mer, il y en a dont les rayons sont renflés dans le milieu, d'autres sont obtus, & d'autres ont une forme pyramidale. L'espece la plus ordinaire est divisée en cinq rayons; toutes ont au milieu ou centre du corps une ouverture sphérique, que les Naturalistes regardent comme le grand suçoir ou la *bouche* de l'animal, & autour de laquelle sont cinq dents ou fourchettes, dures & comme osseuses, dont les étoiles se servent pour tenir les coquillages qui sont leur nourriture: peut-être que c'est avec ces mêmes pointes qu'elles ouvrent les coquilles à deux pieces. La surface supérieure de l'étoile de mer & de chacun des rayons, est recouverte d'un cuir calleux, *callum durum*, diversement coloré; & hérissée de diverses petites éminences, de matiere dure, qui ressemblent beaucoup à des os ou à des coquilles. Chaque rayon de l'étoile de mer est garni à sa surface inférieure d'un grand nombre de jambes.

Les jambes de l'étoile de mer à cinq pans, sont en si grand nombre, qu'elles garnissent presque toute la surface des rayons du côté où elles sont attachées. Elles y sont posées dans quatre rangs différens, chacun desquels contient environ soixante & seize jambes, & par conséquent l'étoile entière est pourvue de quinze cens vingt jambes. L'étoile de mer ne marche cependant qu'avec beaucoup de lenteur. Ces jambes, il est vrai, sont si molles, qu'elles ne semblent gueres mériter le nom de jambes. Ce ne sont, à proprement parler, que des especes de cornes, assez semblables à celles du limaçon;

elles en ont la couleur , la consistance & la forme ; elles sont assez souvent retirées comme les cornes du limaçon , ce n'est que lorsque l'animal veut marcher qu'il les développe.

On peut en remarquer très aisément la mécanique admirable ; il ne s'agit que de mettre à découvert les parties intérieures d'un des rayons de l'étoile , en coupant la peau du côté de la surface supérieure de ce rayon. Lorsque cette opération est faite , on observe que chaque rayon est composé d'un grand nombre de *vertèbres* , construites de façon , qu'il se trouve une coulisse au milieu du corps , qu'elles ferment par leur assemblage. A chaque côté de cette coulisse , on observe deux rangs d'espèces de petites boules ou perles , claires , transparentes , rangées les unes auprès des autres. Ces petites boules sont formées d'une membrane mince , dont l'intérieur est rempli d'eau. Aussitôt qu'on vient à presser ces boules avec le doigt , on en découvre toute l'ingénieuse mécanique. Ces boules se vident , & l'eau qui en sort fait étendre & gonfler les jambes qui y correspondent ; lorsqu'on cesse de presser , les jambes se contractent par leur ressort naturel , & font remonter l'eau dans les boules. On conçoit aisément que tout ce que l'étoile a à faire pour enfler ses jambes , c'est de presser les boules par contraction. C'est de ces jambes ainsi allongées que les étoiles se servent pour marcher sur les pierres & le sable , soit qu'elles soient à sec , soit que l'eau de mer les couvre.

Il y a quelques années que parcourant les rivages de la mer d'Ecosse , je trouvai l'occasion d'y ramasser quantité d'étoiles de mer , & de satisfaire ma curiosité sur leur mouvement & sur la manière dont elles se nourrissent. J'étois placé fort avantageusement pour ces observations ; il y avoit plusieurs petites mares d'eau sur la greve , j'y portai toutes les étoiles que j'avois ramassées , & en les voyant cheminer , j'observai que ces animaux , qui sont mols , présentent une convexité d'un côté , & une concavité de l'autre : celle-ci étoit le côté de la bouche. Cette forme est celle qui m'a paru être naturelle à toutes les espèces d'étoiles marines lorsqu'elles nagent : elles se suspendoient obliquement dans l'eau , & formoient avec leurs rayons de légères ondulations , ce qui sans doute provenoit moins du frottement de l'eau , que du mouvement de contraction & de rallongement qu'elles exercent à l'instant où elles cheminent. L'animal veut-il descendre sur le sol , il cesse ses mouvements & éprouve une espèce d'inertie , & sa pesanteur spécifique le fait tomber perpendiculairement (dans l'eau tranquille) sur deux de ses pans ; mais si l'eau est agitée , il fuit en tombant une direction oblique. Est-il descendu sur le sol , il s'attache à la vase , & fait sortir & avancer à volonté les centaines de pieds dont nous avons parlé ci-dessus , & qui paroissent être autant de suçoirs mobiles , tendineux , susceptibles d'allongement & de contraction , mais très propres à fixer ces animaux au besoin dans le lieu qui leur est le plus convenable. En un mot , l'animal peut reculer , aller de côté , en avant , en tout sens , sans changer de position absolue. Les dents ou fourchettes des étoiles de mer servent à comminuer leurs aliments :

il se trouve dans l'intervalle , des vasculcs très convenables pour la déglutition. Chacun de ces instruments est adapté à autant d'especes de trachées , lesquelles s'unissent à des especes de petites poches grêles : ceux-ci sont recouverts d'une grande quantité d'une substance qui est comme laiteuse , gélatineuse , grumeleuse , semblable à la chair de l'oursin.

Les étoiles de mer font la déjection de leurs excréments par autant d'anvs intérieurs , qu'elles ont de fourchettes. Chaque espece de *boyau rectum* a son rendez-vous à-peu-près au centre de l'animal , où l'on voit une verrue ou une espece d'*opercule* : cette verrue est blanchâtre & osseuse ; elle est située dans la partie crustacée & à l'opposite de l'ouverture que l'on dit être la bouche. Il est étonnant que Linckius , qui a donné en 1733 un *Traité in folio* & avec figures de ces animaux , n'ait pas été instruit de la mécanique & des moyens que les étoiles marines emploient , soit pour manger , soit pour déjecter. M. de Réaumur les avoit presque tous connus , ainsi qu'on peut le voir dans un *Mémoire* qu'il a donné à ce sujet à l'*Académie des Sciences* , ann. 1710 , p. 634.

Les étoiles marines sont sujettes à perdre un , deux ou plusieurs de leurs rayons , & à les réparer , le tout de la même maniere qu'on l'observe dans les écrevisses. Les excréments des étoiles marines sont noirâtres , précédés & succédés d'une goutte de liqueur fraîche , âcre , demi-transparente , blanchâtre , semblable au *Nostoch usnée* & gélatineux qui se trouve dans les champs immédiatement après les orages , & dont MM. Geoffroi & de Réaumur ont parlé dans les *Mémoires* de l'*Académie des Sciences*. L'odeur de la chair des étoiles de mer est analogue à celle de l'oursin , & le goût à celui des crustacées.

Les étoiles épineuses ont communément cinq pattes , chacune desquelles est pointue , étroite à sa naissance , large vers le milieu , & plus ou moins longue selon la grandeur de l'animal. Le corps , les pattes de cette étoile sont garnis de piquants mobiles , & en quelque sorte semblables à ceux du hérisson ; différemment en cela des rayons de l'étoile lisse , qui sont seulement couverts de petits tubercules , à-peu-près comme il s'en trouve sur les pattes du polype.

Il y a de certaines especes d'étoiles de mer dont les rayons ne sont point garnis de jambes : ces rayons qui ressemblent à des queues de lézard , leur servent eux-mêmes de jambes. L'animal en accroche deux à l'endroit vers lequel il veut s'avancer , & se traîne sur ces deux-là , tandis que le rayon qui leur est opposé , se recourbe en un sens contraire , s'appuie sur le sable , & pousse l'étoile vers le même endroit.

Parmi les diverses especes d'étoiles , il y en a une entr'autres d'une structure très singuliere. Ses rayons se subdivisent en quelque sorte comme des rameaux d'arbres ; aussi la nomme-t-on *Etoile arborecente* : c'est un véritable polype , mais d'une espece aussi singuliere que celle du *pa'mier marin*. Voy. ce mot. On remarque d'abord cinq grosses branches arrondies , au milieu desquelles est la bouche , qui est , ainsi que le corps de cet animal , d'une

figure pentagone ; ainsi la bouche a aussi cinq angles qui naissent de la rencontre de cinq levres , qui répondent aux cinq côtés du corps : entre l'espace des branches il y a un trou ; chaque branche se partage en deux rameaux , ces rameaux en deux autres , & ainsi successivement en une infinité de petites ramifications , dont les dernières sont aussi fines que des cheveux. On en a trouvé 81920 dans une étoile de mer que l'on conserve dans le Cabinet de la Société Royale de Londres. Toutes ces branches & les rameaux qui en sortent sont recourbés en dedans , se plient comme un éprevier , & sont faits pour prendre la proie & la porter à la bouche. Telle est la *tête de Méduse* , qu'on voit dans tous les Cabinets de Naturalistes , & qui est plus ou moins estimée , à raison de sa grosseur , de sa couleur , du nombre & de la conservation de ses *rayons* ou *branches*.

Il y a une autre espèce de *petite étoile* qui avance & se remue par le moyen de ses branches , qu'elle plie & replie comme font les serpents : ces branches détachées du centre , ont encore du mouvement , comme cela arrive aux *vers* & aux *couleuvres* qu'on a coupés en plusieurs morceaux.

La petite étoile de mer , que l'on nomme *étoile à rayons à queue de lézard* , a effectivement des rayons aussi fragiles que la queue des lézards. Les moindres chocs que leur font essuyer les flots contre des pierres , leur font perdre des rayons : mais la Nature a pourvu à ces pertes fréquentes auxquelles sont exposées les diverses étoiles de mer ; à peine ont-elles perdu quelque rayon , qu'il leur en croît un nouveau. Pour éviter ce danger , les petites étoiles dont nous venons de parler , se tiennent sur des côtes unies qui ne sont couvertes que de sable : on les trouve souvent enfoncées sous ce sable , où elles marchent fort lentement.

On voit beaucoup d'étoiles marines aux Antilles. Ces animaux se promènent pendant le calme ; mais aussi-tôt qu'ils prévoient l'orage , ils s'attachent , à l'aide de toutes leurs pattes , contre les rochers : ces pattes deviennent pour eux autant d'ancres , qui les tiennent si fortement appliquées , que toute la violence des eaux irritées ne peut les en détacher.

ETOILE, PLANTE ou GAZON. Nom que l'on donne à Cayenne à une plante grimpante , connue sous le nom de *jasmin rouge* , c'est un lizeron , & le *quamoclit foliis tenuiter incisfis & pennatis* de Barrere. La fleur en est petite & couleur de feu : on en forme des berceaux très agréables. Voyez à l'article JASMIN.

ETOILE TOMBANTE. C'est un phénomène que l'on peut observer assez souvent dans les soirées du printemps & de l'automne. Il semble voir une étoile se détacher du ciel , & tendre par sa chute au bas de l'horison , ou quelquefois se perdre dans le vague des airs. Cette étoile apparente est un petit globe de feu , qui répand une lumière vive , semblable à celle de l'étoile : souvent il se dissipe dans les airs , quelquefois il parvient jusques sur la terre ; alors on trouve au lieu de sa chute une matière de couleur jaunâtre & visqueuse comme de la colle , la matière combustible ayant été entièrement consumée. Les Physiciens parviennent à imiter ce météore. Pour

cet effet , on forme une boule avec du nitre , du camphre & du limon ; on l'humecte avec de l'eau-de-vie , on y met le feu , on la lance dans les airs : sa lumiere & les circonstances de sa chute sont entierement semblables à celles du météore.

ETOILES. *Voyez* à la suite de l'article PLANETE.

ETOUFFEUR. *Voyez* GIBOYA.

ETOURNEAU ou SANSONNET, *Sturnus*. Oiseau assez connu par la beauté de son plumage. On en distingue plusieurs especes : savoir , l'*étourneau vulgaire*, les *étourneaux blancs*, l'*étourneau des Indes*, l'*étourneau marin*, l'*étourneau à rouges aîles*, &c.

L'*étourneau commun* est un oiseau qui vit de tout , & se trouve par-tout : il est de la grosseur d'un merle. Son plumage est noirâtre , tacheté de gris , de blanc , quelquefois de bleu , de jaune & de rouge pourpre qui change à différents aspects. Son bec est semblable à celui de la pie : sa langue est dure , de la nature de la corne , & fendue ; le mâle a un filet noir en dessous : il a l'œil noir , le dos plus chargé de couleur pourpre , & le croupion plus verdâtre. La femelle a une petite maille dans le blanc de l'œil : son plumage est aussi moins tacheté que celui du mâle. La queue de l'*étourneau* est courte & noire : il a les pieds jaunes & les ongles presque noirs. Le jeune *étourneau* n'a qu'une tache sur tout son plumage ; c'est pourquoi bien des personnes ont de la peine à le distinguer alors d'avec le merle ordinaire. L'*étourneau* a les cuisses garnies de plumes jusqu'aux genoux : il habite en été les endroits aqueux , vers les prés ; & en hiver , sur les tours & les toits des maisons : il vit de vers , de petits scarabées , de chair de cadavres , de baies , de raisins & de semences ; on le nourrit aussi en cage. Il pond quatre ou cinq œufs , qui sont légèrement teints d'un bleu verdâtre : il fait son nid dans des trous de maisons ou d'arbres.

Les *étourneaux* sont des oiseaux de société , qui volent & demeurent ensemble : leur vol est en quelque sorte circulaire , parcequ'ils tâchent de gagner toujours le milieu de la bande. Cet oiseau vit vingt ans & plus : il est fort docile ; on l'apprivoise facilement , & on lui apprend à répéter quelques mots : on lui fait la chasse vers le tems des vendanges , parcequ'alors il est gras & assez bon à manger.

Les Anciens faisoient grand cas de la chair des *étourneaux* ; ils en servoient souvent sur leurs tables. La tête sent un peu l'odeur de la fourmi , c'est pourquoi on la retire avant que d'apprêter l'oiseau ; on en ôte aussi la peau , parcequ'elle est amere.

ETALCH. C'est un arbre étranger , assez grand , épineux , dont le branchage & les feuilles ont beaucoup de rapport avec le cedre ou avec le genevrier : son bois , en Numidie , est blanc ; en Lybie , violet & noir ; & en Ethiopie , très noir. Les Italiens l'appellent *Sangu*. Il en découle une résine fort analogue à celle du mastic de Crete. Son bois est sudorifique , & sert aussi à faire des instruments de musique.

EVENTAIL DE MER. *Voyez* au mot CORALLINE.

EVENTAIL ou **POISSON EN EVENTAIL**. C'est le *Waycovisch* des Hollandois. Ce poisson a des nageoires fort longues sur le dos, qui se recourbent vers la tête, & forment en quelque sorte la figure d'un éventail, d'où lui est venu son nom. On lui remarque sur la tête deux proéminences, en maniere de cornes : il est armé sur le dos & au bas du ventre d'un grand nombre d'aiguillons, qui se joignent par une membrane : il a sur le dos trois taches rouges & quarrées ; le reste de son corps est d'un bleu assez clair. Les Indiens le font dessécher & fumer pour le manger. Ce poisson est rare en Europe.

ÉVÊQUE. Nom donné à un petit oiseau de la Louisiane & de l'Amérique, dont le plumage est bleu : ses ailes, qui forment une espece d'écharpe, tirent sur le violet. Il est moins grand que le serin. Par la mélodie de son ramage, il surpasse le chant de nos rossignols : il chante pendant l'espace d'un quart de minute, sans qu'on s'apperçoive qu'il reprenne sa respiration. Après s'être reposé deux fois autant de tems qu'il a chanté, il recommence & continue toujours de même pendant deux heures.

EVERTZEN. C'est un poisson des Indes, qui semble être de la famille des *Brêmes de mer*. Voyez ce mot. Les Navigateurs l'appellent *Maître* ; les Portugais, *Meris* ; & les Brésilois, *Gugapu-Guacu*. Sa couleur est noirâtre : il a sur le dos six aiguillons qui tiennent à ses nageoires, & des taches blanches ; on en voit aussi à la queue & aux nageoires ; tout le corps est tiqueté de marques de différentes couleurs. Il y a une saison où ce poisson est excellent à manger ; alors sa chair est grasse : mais dans un autre tems elle est si dure & si coriace, que les mâchoires les mieux dentées ne peuvent la déchirer. On en mange dans l'Isle d'Amboine & dans tous les autres lieux maritimes des Indes.

EUFRAISE, *Eufrafia*. Plante très commune sur les montagnes, dans les forêts & dans les prés : elle a une racine simple, menue, ligneuse, torrueuse, & garnie de fibres : elle pousse une ou plusieurs tiges, hautes de six pouces ou environ, greles, velues, noirâtres, tantôt branchues, tantôt nues : ses feuilles sont petites, veinées, luisantes & incisées autour, d'un verd foncé, d'une saveur visqueuse & un peu amere : ses fleurs sortent des aisselles des feuilles, représentant un muscle à deux levres, de couleur blanche, tachetées de points purpurins & jaunes : il succede à cette fleur un petit fruit ou capsule, partagée en deux loges, qui renferment des semences menues & blanches.

Cette plante est d'usage étant fleurie ; elle rend les humeurs plus propres à la circulation, & affermit le ton des fibres relâchées dans les glandes du cerveau. C'est pourquoi on dit que l'*Eufraise* est ophthalmique & céphalique ; en effet, elle fortifie merveilleusement la vue, & la rétablit souvent lorsqu'elle est foible & prête à se perdre. Tous les jours, des vieillards septuagenaires qui ont perdu presque entièrement la vue par des veilles & de longues études, la recouvrent par l'usage du suc exprimé de cette plante, infiltré dans les coins de l'œil, ou pris intérieurement avec de la poudre de

cloporte , à l'entrée du sommeil. Quelques-uns fument l'Eufraïse desséchée en guise de tabac : on en fait aussi une sorte de vin , en la cuisant avec du moût dans le tems de la vendange. Cependant on ne doit pas faire un usage intérieur trop immodéré de l'Eufraïse ; car l'on a quelques exemples du dérangement & des désordres qu'à la longue elle cause à l'estomac.

EUNUQUE , *Castratus* aut *Eunuchus*. Nom donné à un homme auquel on a ôté la faculté d'engendrer, pour lui procurer une voix nette & aiguë, &c. Voyez ce qui est dit de ces hommes mutilés , à la suite du mot HOMME.

EVONIMOIDE. Arbrisseau très commun aux environs de Quebec , & qu'on peut mettre au rang des *Fusains*. Voyez ce mot. L'Evonimoïde est très flexible ; il s'élève considérablement par le secours des arbres voisins autour desquels il s'entortille en tous sens. Quoiqu'il soit dépourvu de vrilles, il embrasse cependant les autres arbres si fortement , qu'à mesure qu'ils grossissent , il paroît s'enfoncer & s'ensevelir dans leur écorce & leur substance , & les fait enfin périr. Si dans son voisinage , il ne se rencontre point d'arbre pour s'élever , il se tortille sur lui-même. Voyez les *Mémoires de l'Académie des Sciences* , ann. 1716.

EUPATOIRE , *Eupatorium*. Cette plante , ainsi appelée du nom du Roi *Mithridate Eupator* , qui la mit le premier en usage pour les maladies du foie , croît naturellement aux lieux humides dans les environs de Paris : sa racine est oblique , fibreuse , blanchâtre & amère : sa tige est rameuse , haute de quatre pieds , droite , cylindrique , velue & d'un verd purpurin , remplie d'une moëlle blanche , jettant une odeur aromatique quand on la coupe : ses feuilles sont nombreuses , attachées trois ensemble sur une même queue , un peu semblables à celles du chanvre , oblongues , d'un goût amer : ses fleurs sont des bouquets à fleurons & évafés : ses semences sont oblongues & garnies d'une aigrette.

L'Eupatoire est toute d'usage. M. Geoffroi dit que les feuilles de cette plante contiennent un sel semblable au natron des Anciens. Elles sont vulnéraires , & bonnes pour les maladies du foie. On en fait sur-tout usage dans la cachexie & pour les personnes qui deviennent bouffies & menacées d'hydropisie : elle convient pour toutes les maladies de la peau. Gesner , qui éprouvoit sur lui-même la vertu de chaque remède , avec autant d'attention que Sanctorius faisoit ses expériences sur la transpiration , dit avoir bû la colature des fibres de la racine d'Eupatoire bouillies dans du vin ; qu'il lui en survint des évacuations abondantes par les selles & par les urines ; qu'il vomit douze fois , & rejetta plus de pituite & plus facilement qu'on ne le fait par l'hellebore.

On donne aussi le nom d'*Eupatoire femelle bâtarde* , ou *Chanvre aquatique* , au *Bidens foliis tripartito divisis* seu *Achmella* , qui a presque le même port , & dont on vante les qualités pour les difficultés d'uriner , & pour résister au venin que produit la morsure de certains serpent. L'*Eupatoire* de Mesué est le *Ptaimica lutea suave olens* de Tournefort.

EUPHORBE , *Euphorbium*. Plante de l'Afrique , ainsi appelé du nom d'Euphorbius ,

d'Euphorbius, Médecin du Roi Juba, qui mit le premier en usage la gomme résine qui en découle, & en guérit Auguste César. Nous parlerons de cette substance après avoir décrit l'*Euphorbier*, que plusieurs Botanistes ont mis dans le genre des *Tithymales*, à cause de ses fleurs. Il y a sept à huit especes différentes d'Euphorbier, qui ont la plupart beaucoup de rapport avec le cierge épineux, dont elles diffèrent cependant non-seulement par la fleur & par le fruit, mais encore par le suc laiteux & âcre dont elles sont empreintes en abondance. Voyez l'*Histoire des Plantes rares du Jardin d'Amsterdam*, par Commelin.

L'*Euphorbier* est un arbrisseau qui dans les terres sablonneuses est haut de plus de dix pieds : sa racine est grosse, pivotante & fibreuse, blanche intérieurement, & recouverte en dehors d'une écorce brune : sa tige, qui est simple, a trois ou quatre angles ; elle est comme articulée & entrecoupée de différens nœuds : les bords anguleux sont échancrés entre les nœuds, & garnis d'épines roides, brunes & placées deux à deux : cette tige est couverte d'une écorce épaisse, verte-brune, & remplie d'une espece de pulpe blanchâtre, très laiteuse ; elle se partage en plusieurs branches, dénuées de feuilles, mais garnies de quelques petits appendices, ronds, épais, laiteux, & placés seuls à seuls sur les bords : les fleurs naissent principalement du fond des sinuosités qui se trouvent sur les bords anguleux ; elles sont au nombre de trois ensemble ; leur pédicule est laiteux ; leur calice est renflé, & divisé en cinq quartiers : il succede à ces fleurs des fruits gros comme des pois ; ce sont des capsules à trois loges, applaties, laiteuses, vertes d'abord, qui rougissent un peu dans la suite : ces capsules contiennent trois graines arrondies & blanchâtres.

Toute cette plante est abondamment remplie d'un suc laiteux & âcre qui en découle, en quelqu'endroit qu'on y fasse l'incision. L'Euphorbier croît dans la Lybie sur le Mont Atlas, en Afrique, aux Isles Canaries, en Malabar & aux Indes Orientales.

L'Euphorbier est de toutes les plantes étrangères celle qui donne un plus mauvais goût au lait & à la viande. Elle donne ordinairement la diarrhée aux moutons ; cependant ces animaux, les vaches & les chevres mangent volontiers de cette plante, malgré son amertume & son âcreté. Mais si l'on ne s'est pas encore aperçu de ses mauvais effets sur les chevres, ils ne sont que trop évidens sur les moutons & sur les vaches ; elle altere la santé des premiers, elle gâte la chair & le lait des autres.

Quand on veut faire des incisions à l'Euphorbier d'Afrique, on se couvre le visage autant qu'on peut, ou bien on les fait de loin avec une lance, afin d'éviter l'incommodité que produisent les premières exhalaisons du suc laiteux, qui sont très subriles, très âcres, très pénétrantes & très violentes. Lémery dit qu'on reçoit ce suc dans des peaux de mouton, qu'on place autour de la plante, où il se condense & se durcit dans l'état où nous le recevons ; on nomme ce suc *Euphorbe*. C'est une gomme résine, que les Anglois

tirent des Isles Canaries, les Hollandois du Malabar, les Espagnols, les Italiens & les François de Salé au Royaume de Fez, où elle est apportée des pays de l'Afrique les plus éloignés de la mer.

L'Euphorbe est en larmes, d'un jaune plus ou moins foncé, branchues, caverneuses, friables, sans odeur; mais d'un goût très âcre, cuisant, qui cause des nausées: il suffit d'en toucher légèrement la langue pour avoir la bouche enflammée.

Toutes les parties de l'Euphorbier sont si subtiles qu'il suffit aussi de les flairer pour éternuer: si on se frotte les narines de son huile, il en découle beaucoup d'humeurs aqueuses; lorsqu'on en prend la poudre en guise de tabac, il en résulte une très forte irritation, souvent une hémorrhagie, & elle enflamme quelquefois les membranes du cerveau. Son acrimonie si violente fait qu'on ne pulvérise l'Euphorbe qu'avec beaucoup de peine: aussi les Droguistes & les Apoticaire ont soin de n'employer à cet effet que des personnes robustes; on les avertit de se détourner le visage de dessus le mortier, qui d'ailleurs est recouvert d'une peau de mouton. Malgré toutes ces précautions, il s'en exhale une vapeur subtile qui frappe si fort les narines & le cerveau, que l'éternuement, la chaleur, la douleur, les larmes & le crachement viennent tout-à-la-fois.

Les Anciens ne nous disent rien des vertus médicinales de l'Euphorbe. Les nouveaux Grecs, les Arabes, & avec eux les Médecins modernes de l'Europe, lui attribuent une puissante vertu de tirer la sérosité de tout le corps. Il est étonnant que ce remède, qui est le plus âcre, le plus ardent de tous les hydragogues, soit employé intérieurement. En effet, l'Euphorbe ne purge pas sans causer la défaillance, une sueur froide, & souvent des ulcères dans l'estomac & les intestins: les acides & les adoucissans émoussent sa vertu érosive; mais, malgré ces précautions, combien est peu sûr ce remède! Il convient tout au plus pour ébranler les membranes des viscères attaqués de paralysie; comme irritant, il convient encore dans les affections soporeuses & l'apoplexie. L'Euphorbe appliquée extérieurement, incise les humeurs épaisses, cause de la rougeur, de l'inflammation, & quelquefois des ulcères. Elle est utile dans le tremblement, dans la léthargie, & pour ceux qui perdent la mémoire,

Les Maréchaux se servent de l'Euphorbe en poudre pour le farcin & la galle des chevaux. Des personnes trop inconsidérées croient s'amuser fort innocemment en semant de cette poudre sur le parquet d'une chambre où l'on tient assemblée de danse: à peine les Dames ont-elles fait quelques pas, que leur robe volante agite la poudre & la fait monter au visage des spectateurs, qui tous éprouvent aussi-tôt les petites convulsions d'un éternuement violent, & une fonte d'humeurs très considérable.

EUROES. C'est la *Pierre de Judée*. Voyez ce mot.

EXCREMENT, *Excrementum*. Ce terme est employé dans un sens plus ou moins étendu: il signifie, en général, toute matière, soit fluide, soit

solide , qui est évacuée du corps des animaux , parcequ'elle est surabondante , inutile ou nuisible.

Ainsi le sang menstruel est une matiere excrémentielle rejetée des vaisseaux de la matrice , où il étoit ramassé en trop grande quantité. *Voyez* ce qui en est dit dans l'article *Puberté* , à la suite du mot HOMME.

Les matieres fécales sont poussées hors du corps où elles ne peuvent être d'aucune utilité pour l'œconomie animale , étant dépouillées de toutes les parties qui pouvoient contribuer à la formation du chyle.

L'urine , la matiere de la transpiration , la sueur , sont aussi séparées de la masse des humeurs , où elles ne pourroient que porter la corruption qu'elles commencent à contracter elles-mêmes.

Presque toutes les humeurs excrémentitielles sont formées des récrémens qui ont dégénéré à force de servir aux différens usages du corps.

Cependant on entend plus particulièrement par le seul mot *Excrément* , la partie grossiere , le marc des alimens & des sucs digestifs dont l'évacuation se fait par le fondement.

Les excrémens varient dans les animaux à raison de leurs especes & de la diversité de leurs alimens. Les excrémens des animaux sont pour la plûpart d'excellens engrais , dont la nature varie , & est par conséquent plus ou moins propre à différentes terres ; car on observe de la différence pour les effets , entre le fumier de cheval , celui de vache , les crottins de moutons , l'émeu du faucon , & la fiente du pigeon ou colombine. *Voyez* l'article FUMIER.

Les excrémens sont aussi d'usage en Médecine ou pour les Arts. La *merde du chien* , connue sous le nom d'*Album Gracum* , est employée pour teindre en noir certains cuirs , avec de la vieille féaille. L'*excrément du paon* est d'usage pour l'épilepsie ; celui de la *corneille* , pour la dyssenterie ; celui de l'*hirondelle* , pour la squinancie & la colique néphrétique ; celui du *mulet* , pour exciter la sueur ; celui des *poules* , pour les tranchées rouges des chevaux ; les *crottes du rat* , pour faire croître les cheveux ; le *crotin du cheval* , pour la pleurésie ; la *fiente du pigeon* & des *martres* , pour contrefaire le musc ; celle du *crocodile* , dont les Morettes se servoient autrefois comme d'un cosmétique propre à rendre le teint brillant ; enfin , l'*excrément de l'homme* , pour faire venir les bubons pestilentiels à suppuration , & pour désacérer l'acier.

A l'égard de la forme maronnée , &c. qu'ont la plûpart des fientes d'animaux , elle est dûe à la figure même des especes de loges espacées ou cellules dans lesquelles la fiente se moule par le séjour qu'elle y fait. Il en est de même pour la forme des autres sortes d'excrémens.

EXHALAISON. C'est la fumée ou vapeur qui sort d'une substance , & qui se répand dans l'air. On doit donner proprement le nom de *Vapeurs* aux fumées humides , qui s'élèvent de l'eau & des autres corps liquides ; & celui d'*Exhalaison* aux fumées sèches qui s'exhalent des corps solides , tels que

la terre , le feu , les minéraux , les soufres , les sels : ces corpuscules s'élevent des corps durs & terrestres , soit par la chaleur de l'air , soit par quelque autre cause , & sont conjointement , avec les vapeurs , les sources des *Météores aériens*.

On ne sauroit éviter avec trop d'attention de s'exposer aux exhalaisons qui s'élevent quelquefois de certains corps & dans certaines circonstances , telles que les vapeurs des volcans , les émanations cadavereuses & phosphoriques de ces corps tués qu'on a enterrés par tas & à peu de profondeur après une bataille sanglante ; car ces exhalaisons sont souvent mortelles , on en a des exemples de toute espece : il arrive même quelquefois qu'on est suffoqué par ces vapeurs , avant d'avoir pu en reconnoître les mauvais effets. On peut juger de-là combien est pernicieuse notre méthode d'enterrer dans les Eglises , & même dans des Cimetieres au milieu des grandes Villes. Heureusement que nos Magistrats attentifs à tout ce qui concerne la vie & le bien être du citoyen , viennent de pourvoir à ces inconvéniens. Il est rapporté dans les Mémoires de l'Académie , année 1701 , qu'un Maçon qui travailloit auprès d'un puits , dans la ville de Rennes , ayant laissé tomber son marteau , un Manœuvre qui fut envoyé pour le chercher , fut suffoqué avant d'être arrivé à la surface de l'eau ; deux autres hommes qu'on y descendit après , furent suffoqués de même ; on y descendit un quatrième , à qui on recommanda de crier dès qu'il sentiroit quelque chose ; il cria bien vite , dès qu'il fut près de la surface de l'eau ; & on le retira aussi-tôt ; mais il mourut trois jours après. Il dit qu'il avoit senti une chaleur qui lui devoit les entrailles. On descendit ensuite un chien , qui cria dès qu'il fut arrivé au même endroit , & qui s'évanouit dès qu'il fut en plein air : on le fit revenir en lui jettant de l'eau , comme il arrive à ceux qui ont été jettés dans la Grotte du Chien près de Naples. *Voyez GROTTÉ DU CHIEN*.

Après avoir retiré les trois cadavres avec des crocs , on les ouvrit , & on ne remarqua aucune cause apparente de mort. Ce qu'il y a de plus singulier , c'est qu'on buvoit de l'eau de ce puits sans qu'elle fît aucun mal. Les exhalaisons , en détruisant seulement l'élasticité de l'air , le privent de cette puissance qui le rend la source de la vie.

Voici un autre accident occasionné par des exhalaisons d'un autre genre ; mais non moins funestes. Un Boulanger de Chartres avoit mis dans sa cave la braise de son four : son fils y étant descendu avec de nouvelle braise , la lumière qu'il portoit s'éteignit au milieu de l'escalier ; il remonta , la ralluma & redescendit : dès qu'il fut dans la cave , il cria qu'il n'en pouvoit plus , & cessa bientôt de crier : son frere voulut courir à son secours ; mais il n'en revint point : trois autres personnes qui eurent la même hardiesse y périrent.

Le lendemain un Boulanger trop hardi , voulant retirer ces corps avec un croc , se fit descendre dans la cave avec une corde , & recommanda qu'on le retirât dès qu'il crieroit : il cria bien vite ; mais la corde s'étant rompue , il retomba , & quelque diligence que l'on fît pour renouer la corde , on ne

put que le retirer mort : on l'ouvrit , & on trouva toute l'organisation du corps très altérée , les lobes du poulmon tachetés de marques noirâtres , les intestins gros comme le bras , rouges , enflammés ; & ce qu'il y a de plus singulier , tous les muscles des bras , des cuisses & des jambes étoient comme séparés de ces parties. Le Magistrat prit connoissance de ce fait , & on consulta des Médecins. Il fut conclu que la braise , qui avoit été mise dans la cave , étoit sans doute mal éteinte , & avoit fait élever une vapeur maligne & mortelle ; qu'il falloit par conséquent jeter dans la cave une grande quantité d'eau , pour éteindre le feu & arrêter le mal , ce qui fut exécuté : ensuite on descendit dans la cave un chien , & une chandelle allumée ; le chien ne mourut point , & la chandelle ne s'éteignit point , preuve certaine que le péril étoit passé.

Ces exhalaisons malignes agissent diversement suivant leur nature , ainsi que le prouve le fait suivant. Quelques personnes creusèrent la terre dans une cave à Paris , croyant y trouver un trésor caché : après qu'elles eurent travaillé quelque tems , la servante étant descendue pour appeler son maître , les trouva morts tous dans la posture de gens qui travailloient , ayant les yeux ouverts , la bouche béante , de manière qu'ils sembloient encore respirer ; mais ils étoient roides comme des statues , & froids comme marbre.

Voici encore un autre accident , du même genre , qui est à la connoissance d'un grand nombre de personnes. Vers le milieu de l'année 1756 , il survint aux environs de Paris un orage considérable ; un Payfan de Saint-Ouen avoit rempli de fumier un trou qu'il avoit fait au milieu de sa cour ; la pluie fut si abondante qu'elle s'échappa de ce trou , & pénétra dans la cave : ce Payfan pour tâcher de conserver son vin , y descendit , & tomba mort : sa femme ne le voyant point revenir , fut le chercher ; elle éprouva le même sort. Leurs enfans s'étant aperçus de ce malheur , appelèrent du secours ; six personnes entrèrent dans la cave , & tomberent avec les mêmes accidens que ceux que produiroit le poison le plus violent. A force de frictions aux jambes , aux bras , & sur toutes les parties du corps , on ranima la circulation à cinq d'entr'eux (car le sixieme mourut). On eut recours aux esprits volatils , à la fumée du tabac insinuée par le nez pour faire revivre le jeu de la circulation , & on leur donna des cordiaux. Nous connoissons une cave qui appartient à des Religieuses , & où l'on cultive sur une couche de fumier des champignons : la vapeur infecte , qui s'élève de ce souterrain , a plus d'une fois fait perdre subitement connoissance , & même la vie aux personnes qui avoient été pour cueillir les champignons.

EXHALAISONS MINÉRALES , *Halitus minerales*. Il sort des entrailles de la terre & sur-tout des filons ou veines métalliques , qui sont proches de la surface de la terre , des galeries ou des souterrains d'où on retire le charbon de terre & autres substances minérales , sujettes à se décomposer par le contact de l'air , &c. il sort , dis-je , des exhalaisons de différentes especes , &

qui produisent des effets tous différens : nous allons les réunir ici sous un seul point de vue. Ces exhalaisons sont appelées différemment par les Mineurs, suivant leur nature : les unes sont nommées proprement *Exhalaisons* ; les autres *Feu Brisou*, d'autres *Mouphette* ou *Pouffe*, & d'autres *Gas*.

Les Mineurs nomment proprement *Exhalaisons*, celles qui sont très sensibles & très considérables, & qui se font voir, sur-tout le matin, dans le tems que la rosée tombe à la surface de la terre & dans son intérieur. A la suite de ces exhalaisons, les Mineurs trouvent les filons de mines qui sont dans le voisinage, stériles, dépourvus du minéral qu'ils contenoient, & semblables à des os cariés, ou à des rayons de miel. Quelquefois l'effet en est plus rapide ; les vapeurs paroissent enflammées, elles sortent de la terre accompagnées d'épaisses fumées, & produisent des éruptions, à la suite desquelles les veines métalliques se trouvent détruites : ces phénomènes tiennent aux mêmes causes que les inflammations des Volcans. *Voyez VOLCAN.*

Enfin, il regne dans les mines qui ont été long-tems abandonnées, des vapeurs souterraines, que l'on nomme *Inhalations*, qui contribuent infiniment à la composition & décomposition des minéraux métalliques, puisque par leur moyen il se fait continuellement des dissolutions, qui sont ensuite suivies de nouvelles combinaisons : ce sont ces exhalaisons minérales qui jouent le plus grand rôle dans la cristallisation, la minéralisation, & la coloration des pierres.

Feu Brisou, ou Terou.

On donne ce nom & celui de *feu sauvage* à des exhalaisons qui s'élèvent dans les mines de charbons, & dont les effets sont aussi terribles que singuliers. Cette vapeur sort avec une espèce de sifflement par les fentes des souterrains où l'on travaille : elle se rend même sensible aux yeux, & paroît sous la forme de ces sortes de toiles d'araignées ou fils blancs que l'on voit voltiger dans l'air à la fin de l'été. Lorsque l'air circule librement dans les souterrains & qu'il a assez de jeu, on n'y fait point beaucoup d'attention ; mais lorsque cette vapeur ou matière n'est point assez divisée par l'air, elle s'allume aux lampes des ouvriers, & produit des effets semblables à ceux du tonnerre & de la poudre à canon.

Pour prévenir ces effets dangereux, voici comme s'y prennent les ouvriers. Ils ont l'œil à ces fils blancs, qu'ils entendent & qu'ils voient sortir des fentes : ils les saisissent avant qu'ils puissent s'allumer à leurs lampes, & les écrasent entre leurs mains. Lorsqu'ils sont en trop grande quantité, ils éteignent la lumière qui les éclaire, se jettent ventre à terre, & par leurs cris avertissent leurs camarades d'en faire autant. Alors la matière qui s'est enflammée avant qu'ils aient pu éteindre leur lumière passe par-dessus leur dos, & ne fait de mal qu'à ceux qui n'ont pas eu la même précaution ; ceux-là sont exposés à être tués ou blessés. On entend cette matière sortir avec

bruit & mugir dans les monceaux de charbon , même à l'air libre & après qu'ils ont été tirés hors de la mine ; mais alors on n'en doit plus rien craindre.

Quand les mines de charbon sont sujettes à des vapeurs de cette espèce , il est très dangereux pour les ouvriers d'y entrer , sur-tout le lendemain d'un jour pendant lequel on n'y a point travaillé , parceque la matière s'est amassée dans le tems qu'il n'y avoit aucune commotion dans l'air. Aussi en Angleterre & en Ecosse a-t-on recours à un expédient avant d'entrer dans la mine. On y fait descendre un homme vêtu d'un *paliot* de toile cirée ou de linges mouillés : il tient une longue perche , au bout de laquelle est une lumière : lorsqu'il est descendu , il se met ventre à terre ; & dans cette posture , il s'avance , & approche sa lumière de l'endroit d'où part la vapeur : elle s'enflamme sur-le-champ avec un bruit effroyable , qui ressemble à celui d'un violent coup de tonnerre , & va sortir par un des puits. Cette opération purifie l'air , & l'on peut ensuite descendre sans crainte dans la mine : il est très rare qu'il arrive malheur à l'ouvrier qui a allumé la vapeur , pourvu qu'il se tienne étroitement couché contre terre , parceque toute la violence de l'action de ce tonnerre souterrain , se déploie contre le toit supérieur de la mine.

Les vapeurs des mines qui sont autant de *Gas* , voyez ce mot , peuvent être de natures différentes ; les unes sont simplement inflammables , telles étoient celles que l'on vit sortir à travers de l'eau dans une mine de charbon. M. Mead , de la Société Royale de Londres , produisit par art une vapeur qui présentoit les mêmes phénomènes : pour cet effet , il recueillit dans une vessie les vapeurs qui s'éleverent d'un mélange d'acide vitriolique , d'eau commune & de limaille de fer. L'inflammation d'autres vapeurs est accompagnée d'explosions terribles ; on lit dans les Transactions philosophiques qu'un homme s'étant approché imprudemment avec sa lumière de l'ouverture d'un des puits d'une mine , pendant que la vapeur en sortoit , elle s'enflamma sur-le-champ ; il se fit par trois ouvertures différentes une éruption de feu , accompagnée d'un bruit effroyable : il périt soixante & neuf personnes dans cette occasion. Deux hommes & une femme , qui étoient au fond du puits de cinquante-sept brasses de profondeur , furent poussés dehors , & jettés à une distance considérable. La secousse de la terre fut si violente , que l'on trouva un grand nombre de poissons morts , flottans à la surface de l'eau d'un petit ruisseau qui étoit à quelque distance de l'ouverture de la mine. Il est arrivé le premier d'Avril 1765 un accident aussi terrible dans une mine de charbon à une lieue & demi de Newcastle : par quelque imprudence des ouvriers qui la fouilloient à cent brasses de profondeur , l'air s'y est embrasé tout d'un coup , & la vapeur enflammée a produit une explosion qui a rendu à l'ouverture un bruit semblable à un grand coup de tonnerre. On a retiré le plutôt qu'il a été possible les malheureux qui étoient restés au fond de cet abyme : aucun n'étoit mort , mais le feu les y avoit ré-

duits dans l'état le plus déplorable. Le lendemain plusieurs personnes , & entre autres quelques Inspecteurs , s'étant rendus à l'ouverture de la mine pour examiner les effets de ce désastre , la vapeur mophétique s'est enflammée de nouveau , & éclatant avec plus de violence que la première fois, elle a tué huit personnes & dix-sept chevaux.

Le phénomène le plus singulier que les exhalaisons nous présentent , est celui que les Mineurs nomment *Ballon* : il paroît à la partie supérieure des galeries des mines , sous la forme d'une espèce de poche arrondie , dont la peau ressemble à de la toile d'araignée. Si ce sac vient à se crever , la matière qui y étoit renfermée se répand dans les souterrains , & fait périr tous ceux qui la respirent.

Mouphette ou Mofette ou Pouffe , Mephitis.

C'est une vapeur dangereuse , qui s'élève assez communément , sur-tout dans les chaleurs de l'été , dans les mines de charbon que l'on exploite.

Cette vapeur ressemble à un brouillard épais : elle a la propriété d'éteindre peu-à-peu les lampes & les charbons ardents : elle donne une toux convulsive , la phthisie , & même suffoque les ouvriers , lorsqu'ils s'en laissent surprendre. Aussi est-ce une maxime parmi eux , qu'il faut avoir l'œil , autant à la lumière qu'à son ouvrage. Lorsqu'ils apperçoivent que la lumière de leurs lampes s'affoiblit , le plus sûr pour eux est de se faire retirer promptement de la mine. L'effet de cette vapeur est d'appesantir & d'endormir ; mais elle agit quelquefois si promptement , que les ouvriers tombent de l'échelle en descendant dans la mine.

Lorsqu'on les secoure à tems , on peut les sauver : on les porte au grand air , où ils restent quelque tems sans donner aucun signe de vie. Le remède le plus efficace , est de couper un gazon , de coucher le malade sur le ventre , de façon que sa bouche pose sur le trou fait dans la terre , d'appliquer ensuite ce gazon sur sa tête. S'il n'a pas été trop long-tems exposé à la vapeur , il revient peu-à-peu , comme d'un profond sommeil. D'autres leur font avaler de l'eau tiède avec de l'esprit-de-vin ; ce mélange leur procure un vomissement très abondant de matières noires ; mais souvent il reste au malade une toux convulsive pour le reste de ses jours.

Ces terribles effets sont produits par un air stagnant , qui a perdu son élasticité étant chargé de particules acides sulfureuses. Pour ne point s'exposer à ces dangers , avant de se remettre à l'ouvrage , on descend par le puits une chandelle allumée , pour reconnoître l'état de l'air.

Heureusement ces exhalaisons ne regnent pas continuellement dans les mines ; & d'ailleurs , on a grand soin d'employer tous les moyens que l'art peut suggérer pour faciliter la circulation de l'air dans les souterrains. Pour cet effet , on ouvre une galerie horizontale au pied de la montagne ; & cette galerie fait , avec les bures ou puits perpendiculaires de la mine , une espèce de

ce de syphon, qui favorise le renouvellement. Mais de toutes les méthodes que l'on peut employer, il n'y en a pas de plus sûre que le ventilateur, ou la machine de Sutton. Au reste l'Histoire des exhalaisons minérales est très propre à éclaircir la théorie des *tremblemens de terre*, des *volcans*, & autres embrasemens souterrains : *voyez* ces mots & les articles CHARBON MINÉRAL & PYRITES.

EXOCET, ou ADONIS, ou FAUCON DE MER : Espece de *poisson volant* ; *voyez* ce mot.

EYSENRAU ou EYSEN-GLANTZ. *Voyez* EISENMAN.



F A B

F A I

FABAGO. Plante amere qui est une espece de *Peplus*, qu'on trouve dans la Romanie, & qu'on cultive à Paris au Jardin du Roi, &c. Sa racine est menue & serpentante : ses tiges sont rameuses, les feuilles oblongues, un peu semblables à celles du pourpier, nerveuses & ameres au goût. Il sort de leurs aisselles des pédicules qui soutiennent chacun une fleur rouge, disposée en rose : à cette fleur succede un fruit membraneux, long, cannelé, qui contient plusieurs semences applaties. Le fabago est estimé un excellent vermifuge.

FAGARE, *Fagara*. Fruit des Indes dont on distingue deux especes ; l'une qui ressemble en tout à la *Cubebe* ; l'autre, qui est plus grosse, ressemble à la *Coque du Levant*, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils sont l'un & l'autre aromatiques, & ont les mêmes vertus que la *Cubebe*. Voyez ce mot.

FAINE ou FOUESNE. Voyez au mot HÊTRE.

FAISAN, *Phasianus*. Le Coq-Faisan est admirable par la variété & par l'éclat de son plumage : il ressemble un peu au coq ordinaire. Quand le faisán est en amour, sa tête est extrêmement rouge, & ses yeux sont étincelans comme du feu. Le plumage de cet oiseau est de trois couleurs, brun, de couleur d'or, & verd : le dessus de sa tête est d'un cendré luisant. A l'endroit des oreilles il s'élève des plumes plus longues que les autres. La poule-faisande n'a point des couleurs aussi brillantes que le mâle ; elle est à-peu-près de la couleur de la caille. Les plumes des faisans servent quelquefois pour mettre aux chapeaux, au-lieu de plumes d'autruches.

Les faisans ne sont pas naturellement fort communs dans ce pays-ci ; mais par les soins qu'en font prendre les Princes & les Seigneurs, ils les multiplient beaucoup dans leurs parcs. Le goût de ce gibier est des plus exquis, lorsqu'il est suffisamment attendu : sa chair est très nourrissante. Pour faciliter la multiplication de ces oiseaux, on en élève dans des enceintes murées que l'on nomme *Faisanderies* ; telle est celle d'auprès de Versailles.

Cette éducation domestique que l'on fait des faisans & des perdrix rouges ou grises, est le meilleur moyen d'en peupler une terre, & de réparer la destruction que la chasse en fait. Par ces soins, on met les œufs & ces jeunes oiseaux à l'abri d'une multitude d'ennemis, tels que les *fouines*, les *renards*, les *oiseaux de proie*, qui mangent les œufs ou les petits encore foibles. La maniere d'élever les faisans, est presque la même que pour les perdrix rouges ou grises.

Maniere d'élever des Faisans.

Le lieu où l'on établit la faisanderie, doit être disposé de maniere que

l'herbe croît dans la plus grande partie , & qu'il y ait un assez bon nombre de petits buissons épais & fourrés , pour que chaque bande de faisandeaux puisse s'y retirer à part pendant la grande chaleur.

Pour se procurer beaucoup d'œufs de faisans , il faut nourrir pendant toute l'année un certain nombre de poules-faisandes. On les tient enfermées au nombre de sept avec un coq , dans de petits enclos séparés , où elles sont à l'abri de tous les animaux malfaisans. Il faut que chaque enclos soit bien séparé , & que les coqs ne se voient pas ; car la rivalité les troubleroit & nuiroit à la propagation. Au commencement de Mars , il est bon de leur donner un peu de sarrazin pour les échauffer & hâter le tems de l'amour. Il seroit dangereux que les poules fussent trop grasses , elles en pondroient moins ; & la coquille de leurs œufs seroit si molle , qu'ils courroient risque d'être écrasés dans l'incubation.

C'est vers la fin d'Avril que commence la ponte des poules-faisandes. On a soin d'aller ramasser le soir tous les œufs : si on ne prenoit point ce soin , ils se trouveroient souvent cassés & mangés par les poules mêmes. On fait ensuite couvrir ces œufs par une poule de basse-cour qui doit être bonne couveuse , c'est-à-dire , qui doit rester avec attache sur les œufs. Au bout de vingt-quatre à vingt-cinq jours les faisandeaux éclosent. On les enferme avec la poule sous une caisse aérée , & dont on augmente la longueur à mesure qu'ils grandissent. Les faisandeaux demandent beaucoup de soin pour leur nourriture : il est nécessaire dans le premier mois de les nourrir principalement avec des vers & nymphes de fourmis que l'on nomme improprement *œufs de fourmis* , ainsi qu'on le peut voir au mot FOURMI.

Si on ne peut en trouver , on y supplée en leur donnant des œufs durs hachés & mêlés avec de la mie de pain & un peu de laitue : à mesure qu'ils deviennent plus forts , on leur donne du grain. Ces jeunes oiseaux sont sujets à être attaqués par une espèce de poux , qui leur est commune avec la volaille ; ils maigrissent alors & meurent même quelquefois. Le meilleur remède pour les en garantir , est de les tenir proprement. Lorsque les faisandeaux ont un peu plus de deux mois , les plumes de leur queue tombent , & il leur en pousse de nouvelles. Ce moment est assez critique à passer ; l'usage des vers de fourmis le rend moins dangereux. Un des soins les plus importants , c'est de leur donner toujours de l'eau nouvelle : ce défaut d'attention leur cause une maladie commune aux poulets , qu'on nomme la *pépie* , & qui se manifeste par une pellicule blanche qui recouvre leur langue : cette maladie est presque toujours mortelle aux faisandeaux.

La méthode est la même pour élever les perdrix , il faut observer seulement que les perdreaux rouges sont plus délicats que les faisandeaux , & que les vers de fourmis leur sont plus nécessaires. Dès que les perdreaux rouges ont atteint six semaines , il seroit dangereux de les vouloir tenir renfermés ; ils deviennent alors sujets à une maladie contagieuse , qu'on ne prévient qu'en les laissant libres à la campagne. Cette maladie s'annonce par une enflure considérable à la tête & aux pieds , & elle est accompagnée d'une soif

qui hâte la mort quand on la satisfait. On ne doit donner la liberté aux faisans que lorsqu'ils ont deux mois & demi. La perdrix grise ne demande pas tant de soin, & s'élève beaucoup plus aisément que la perdrix rouge.

Les faisans se perchent la nuit dans les hautes futaies; le jour ils fréquentent les bois taillis, les buissons & les lieux remplis de broussailles. La femelle fait son nid à terre dans les buissons les plus épais : elle pond pour le moins autant d'œufs que la perdrix. Les coqs-faisans sont moins lascifs que nos coqs domestiques; cependant ils se battent quelquefois jusqu'à se tuer, pour jouir d'une femelle.

On dit que la poule domestique donne avec le coq-faisan, des œufs marquetés de noir, beaucoup plus gros que les œufs de la poule commune; & que les petits qui en proviennent sont si semblables à de vrais faisandeaux, qu'on pourroit s'y tromper. On prétend même que les femelles qui proviennent de ces œufs, produiroient des faisans parfaits à la première ou à la seconde couvée, si on les accouplait avec leur pere. Il y a beaucoup de variétés parmi les faisans, selon la diversité des pays où ils naissent.

Le plus beau de tous les faisans, est sans contredit le *Faisan rouge de la Chine*. Cet oiseau est hupé : il a le plumage doré, citron, couleur d'écarlatte, d'émeraude, bleu céleste, brun, jaune : toutes ces couleurs qui tranchent les unes sur les autres, font un très agréable mélange. Il porte une belle & longue queue. Cet oiseau conservé avec tout l'art possible, se fait remarquer par la richesse de ses couleurs, parmi ceux du Cabinet du Jardin du Roi : on y voit aussi le *Faisan blanc de la Chine*.

On trouve encore beaucoup de faisans dans plusieurs autres contrées, & qui varient, soit par le plumage, ou par quelque autre particularité. Le *Faisan de l'Amérique* a le plumage noir & une crête rouge pendante comme celle d'une petite poule d'Inde : ses pieds sont rouges. Le *Faisan du Brésil* a sur la tête une crête huppée : le dessous de sa gorge est sans plumes, & la peau en est rouge. Le *Faisan des Antilles* a le col très long, la tête & le bec d'un corbeau : dans une basse-cour il fait une guerre cruelle à tous les oiseaux domestiques. Il n'en est pas de même du *Faisan de Carasow* ou des Indes Occidentales : son caractère est doux, sociable; il vit fort bien avec les autres oiseaux : il a sur la mâchoire supérieure une excrescence ronde, jaune & dure, & de la grosseur d'une aveline : sa tête est huppée, d'un noir velouté & panaché. Le *Faisan-Paon* est ainsi nommé des espèces de plumes de paon qu'il a sur le dos : il se trouve en Chine : sa femelle est brune. Le *Faisan des Caffres* a le plumage blanc moucheté de gris : ceux de Congo sont noirs & bleus; celui de Juda à la Côte d'or, est d'un blanc mêlé de bleu, & a la tête couronnée d'une touffe noire. Le *Faisan de Madagascar* est violet : on le rencontre aussi dans le pays des Amazones. Sa tête est surmontée d'une huppe étagée de plumes noires & blanches, & qui baissent ou se dressent à la volonté de l'oiseau : sa démarche est noble & fière. La chair de toutes ces sortes de faisans, est d'un goût exquis & convient à tous les tempéramens.

FAISAN BRUANT ou FAISAN DE MONTAGNE : est le *Coq des bois* ou *Coq de bruyere*. Voyez ce mot à la suite de l'article Coq.

FAISAN D'EAU. Nom qu'on a donné au *Turbot*. Voyez ce mot.

FAISAN DE MER. Voyez au mot CANARD A DUVET : on l'appelle aussi PINTAIL.

FAITIÈRE, *Imbricata*. Nom donné à une espèce de coquillage bivalve de la famille des *Cœurs*. Voyez ce mot.

La faitière présente, de côté, un cœur ouvert; mais le faitage de dessus est son caractère spécifique. On remarque sur sa coquille sept principales & grandes stries, avec de grandes cavités entre deux, traversées de différentes lignes qui forment des étages & des couches.

FALAISE. Nom qu'on donne aux côtes de la mer qui sont élevées, escarpées, & garnies de landes à leur base.

FALANGES. On donne ce nom à de grosses mouches des Îles Antilles, qui ont la tête & le museau comme un singe. Il y en a de plusieurs espèces; les unes qui ont des trompes, d'autres qui ont des cornes. Les phalanges sont des espèces d'araignées. Voyez PHALANGE.

FALTRANCHS. Dans le commerce on donne ce nom à un mélange des principales herbes vulnérables qu'on a récoltées fleuries, & dans leur plus grande vigueur, sur les montagnes de la Suisse & de l'Auvergne. Les paysans Genevois & Suisses, sur-tout les Glaronnois, dès qu'ils les ont ramassées, les coupent par petits morceaux pour les déguiser, puis les font sécher pour s'en servir en infusion théi-forme, que l'on coupe quelquefois avec du lait & un peu de sucre. Ces herbes vulnérables sont ordinairement les feuilles & fleurs de *sanicle*, de *bugle*, de *pervenche*, de *véronique*, de *pyrole*, de *pied de chat*, de *pied de lion*, de *langue de cerf*, de *capillaire*, d'*armoïse*, de *pulmonaire*, de *brunelle*, de *bétoine*, de *verveine*, de *scrophulaire*, d'*aigremoine*, de *petite centaurée*, de *menche*, de *piloselle* & de plusieurs autres plantes. Voyez ces mots.

Les Suisses vendent ordinairement aux Droguistes leurs *faltranchs* en paquets de deux onces. Lorsque l'odeur, la couleur & la saveur sont de la qualité requise, les propriétés en sont plus efficaces. On s'en sert comme de bons diurétiques : ils sont propres pour la jaunisse, pour les rhumes invétérés, & pour dissoudre le sang coagulé. *Faltranck* est un nom Allemand composé de *Fallen*, tomber, & de *Trank*, boisson; ce qui signifie *Liqueur propre pour ceux qui sont tombés*.

FALUN ou CRON, ou CRAN Noms donnés vulgairement à des bancs de terre, composés d'un amas considérable de *triturs de coquilles fossiles*, & de *madreporites* qui ont perdu leur émail. Ces bancs appelés *falunieres*, se trouvent particulièrement en Touraine & au Vexin. On se sert de falun dans quelques pays, au lieu de marne, pour améliorer certaines terres.

La longueur, la largeur & la profondeur de ces couches, qui se trouvent sous terre, où elles ont été formées par des dépôts successifs, varient beaucoup. Les falunieres de Touraine ont trois grandes lieues & demie de lon-

gueur, sur une largeur moins considérable, & plus de vingt pieds de profondeur. D'où vient ce prodigieux amas dans un pays éloigné de la mer de plus de trente-fix lieues? comment s'est-il formé? Quelquefois on y trouve encore des corps marins peu calcinés ou non réduits en poudre; alors l'on peut les reconnoître, à la couleur près, par les caractères qui leur sont communs avec les analogues vivants. On y distingue sur-tout différentes especes de *madrepores*, de *coraux*, de *dents*, de vertebres d'*étoiles marines*, des *entrouques*, des os de poissons, des fragments de coquilles de tous genres. Ce *cron* est communément dans l'état d'un sable plus ou moins atténué. Combien de couches de terre calcaire semblent n'être que le résultat de *falunieres* très comminuées! telles sont peut-être les couches de craies de transport.

Les payfans, dont les terres sont en ce pays naturellement stériles, exploitent en Octobre les falunieres; enlèvent le *cron*, & le répandent desséché & d'une maniere uniforme, sur leurs champs pour les fertiliser. Cet engrais les rend fertiles, comme ailleurs la marne & le fumier; & une terre une fois *salunée*, l'est pour trente ans. Quand on veut exploiter une faluniere avec profit, on choisit celle qui est recouverte d'une couche de terre de peu d'épaisseur, de quatre pieds au plus: les endroits bas & aquatiques doivent être préférés en cette occasion; mais le travail demande de la célérité, l'eau se présentant de tout côté, pour remplir le trou à mesure qu'on le rend profond: aussi est-il rare qu'on emploie moins de quatre-vingts ouvriers à la fois. On en assemble souvent plus de cent cinquante: une partie des travailleurs creuse, l'autre épuise l'eau. On commence le travail de grand matin: on est forcé communément de l'abandonner sur les trois heures après midi. On a observé que le lit de falun n'est mêlé d'aucune matiere étrangere: on n'y trouve ni sable, ni pierre, ni terre; & l'eau qui s'y filtre, est claire & n'a point de mauvais goût. Le falun tiré après les premieres couches, est extrêmement blanc. Les coquilles qu'on y remarque sont toutes placées horizontalement & sur le plat. Les bancs des falunieres ont des couches distinctes. Tout ceci tend à prouver que la faluniere est le résultat de plusieurs dépôts successifs, & qu'elle est l'ouvrage du séjour constant & durable d'une mer assise & tranquille, ou du moins se mouvant d'un mouvement très lent. Voyez cet article dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences ann. 1720*.

Voyez aussi l'article TERRE de ce Dictionnaire.

FAMOCANTRATON. Espece de lézard de l'Isle de Madagascar, qui vit d'insectes, & qui se tient attaché à l'écorce des arbres où l'on a peine à l'appercevoir. Au-dessus du dos, de la queue, des jambes, du col, & à l'extrémité du museau, se trouvent des especes de griffes qui lui servent à s'attacher contre les arbres. Il tient toujours son gosier ouvert pour y recevoir des araignées & des mouches dont il fait sa principale nourriture. Cet animal s'élance très rapidement sur la poitrine des Negres lorsqu'ils s'approchent d'un arbre où il se trouve: ils le craignent beaucoup, parcequ'il se colle si fortement sur leur peau, qu'ils ne peuvent s'en défaire qu'avec le secours d'un rasoir. Dapper, *Description de l'Afrique*, pag. 458, dit que

le mot *Famocantraton* signifie en langue du pays , *Sauteur à la poitrine*.

FANNASHIBA. Hubner (*Dictionn. Univers.*) dit que c'est un grand arbre du Japon, dont les feuilles sont d'un verd forcé, & forment une es-
pece de couronne : ses fleurs sont en bouquets, étant attachées les unes
aux autres ; elles répandent une odeur très agréable, & si forte, qu'on la
peut sentir à une lieue quand le vent donne. Les Dames les font sécher, &
s'en servent à parfumer leurs appartements. On plante cet arbre dans le
voisinage des temples & pagodes ; & quand il est vieux, on le brûle dans
les funérailles des morts.

FAON. Est le petit d'une *biche* : on donne aussi ce nom au petit du *che-
vreuil* & du *daim*.

FARAFES. Sont des animaux sauvages de l'Isle de Madagascar, fort sem-
blables aux loups, mais encore plus voraces. Les habitans sont obligés d'en-
treenir continuellement du feu dans leurs cases pour en éloigner ces dan-
gereux ennemis. On soupçonne que c'est l'*adil* ou le *chacal*. Voyez ces
mots.

FARD. Voyez PIERRE A FARD.

FARINE. Est du grain moulu & réduit en poudre, dont on a séparé le
son avec des bluteaux. Les farines propres à faire du pain, sont celles de
froment, de seigle, de sarrazin, de maïs, d'orge, de ris, d'avoine, du
panis, & toutes celles qui étant mêlées avec de l'eau, sont alimenteuses &
susceptibles de la fermentation *panaire* & *vineuse*, ou de former, par la
coction, une espece de gelée connue sous le nom d'*empois*.

La substance farineuse est abondamment répandue dans le regne végétal.
La Nature nous la présente dans un grand nombre de plantes, dans les se-
mences de toutes les graminées & de toutes les légumineuses ; dans les
fruits de chêne, du hêtre, du châtaignier, dans la moëlle du sagoutier,
dans l'écorce d'une espece de pin, dans la fécule du manioc, dans les racines
de plusieurs plantes potageres & dans celles d'asphodele, dans la truffe ap-
pellée *pomme de terre*. Plusieurs Médecins ont observé que les farineux sont
plus propres à produire des acides dans les premieres voies que la plupart
des aliments tirés des animaux : d'un autre côté, l'expérience prouve que
les peuples qui font usage des aliments farineux non fermentés, ont un air
de santé, le teint frais & fleuri, & de l'embonpoint ; mais ils sont lourds,
paresseux, peu propres aux exercices & aux travaux pénibles, sans vivacité,
sans esprit, sans desirs & sans inquiétude. La bouillie de nos enfants se fait
avec de la farine de froment non fermenté : cependant on préfere le pain
fermenté au pain non levé. On emploie fort souvent les farines en cata-
plafine pour résoudre ou amollir.

FARINE EMPOISONNÉE. Les Mineurs donnent ce nom à l'arsenic en
fleurs, que l'on trouve quelquefois attachée aux voûtes de la miniere de
cette substance. Voyez ARSENIC.

On appelle aussi *farine empoisonnée*, le dépôt blanchâtre que produit une
fumée condensée dans des vaisseaux faits exprès, lorsqu'on travaille à retirer

le bleu d'émail du *cobalt*, ordinairement allié à l'*arsenic*. Voyez COBALT. Cette farine est également arsenicale ou empoisonnée.

FARINE FOSSILE ou MINÉRALE, *Farina fossilis*. Nom qu'on a donné par une suite d'erreurs populaires, à une substance crétacée, ou espèce de *gurh* calcaire, blanchâtre, ressemblant à de la grosse farine, & dont Bruckmann, *Epist. itin. de farin. fossil.* rapporte que les gens du commun firent autrefois usage, dans un tems de famine & de disette, comme d'une farine céleste. Il ajoute sérieusement, qu'ils en reconnurent bientôt la mauvaise qualité; ce qui n'est pas difficile à croire.

Il n'y a pas une grande différence entre la *farine fossile*, l'*agaric minéral*, le *lait de lune fossile*, & les *guhrs de craie*, Voyez ces différents mots.

La solidité, la ténuité, la couleur & la configuration y mettent peut-être la plus grande différence. Voyez Ludwig, Pott & Scheuchzer. Si la farine fossile est marbrée, en l'appelle *Terre miraculeuse*.

Comme l'on trouve toujours la farine fossile dans des endroits caverneux, un peu exposés à l'air, il y a lieu de croire qu'elle est, ou le résultat d'une stalactite décomposée, ou d'un guhr de craie desséché, & qui y a été apporté par le courant des eaux souterraines. Voyez GUHR.

FASCIOLA. Espèce de ver du genre des *tania*. Voyez ce mot, & dont M. Linnæus donne la figure dans son *Syst. Nat. p. 70, tab. 7, n. 1*. Il y en a plus dans les poissons & dans les chiens, que dans le corps de l'homme. C'est un ver aquatique qui se trouve dans les torrents & sous les pierres: son corps est d'une figure ovale, & à peine de la grandeur d'une semence de melon, un peu plus gros que le vrai *tania* ou ver solitaire: l'on en trouve de la longueur d'une aune, mais sans articulations sensibles; ce qui fait qu'on ne peut pas déterminer, si c'est un seul ver ou plusieurs ensemble, comme on le présume à l'égard du *tania*, dont la vraie longueur est indéterminée, & qui est divisé en travers, c'est-à-dire, par anneaux.

Le fasciola est applati, ses deux extrémités sont rondes; ses surfaces plates sont chargées de trois lignes longitudinales, & ses côtés sont crenelés.

FASÉOLE, Espèce de *fève* qui se mange verte, & qui est plus commune en Italie qu'en France. Il y en a de blanches, de jaunes, de rouges & de bigarrées. Voyez HARICOT.

Les Antilles produisent une sorte de *faseoles* brunes, qui rampent ordinairement au bord de la mer dans le sable, mais qui passent pour dangereuses, ainsi que les *Ricins*. Voyez ce mot.

FAU. Voyez HÊTRE.

FAUCHEUR ou ARAIGNÉE DES CHAMPS. Voyez son article à la suite du mot ARAIGNÉE.

FAUCON, *Falco*. Genre d'oiseau de proie, dont il y a plusieurs espèces. Ils ont été nommés ainsi, parceque leurs griffes sont faites en forme de faulx. C'est parmi ces oiseaux de proie qu'on a choisi les espèces les plus courageuses & les moins rebelles pour les dresser à la chasse du vol. Ces oiseaux
bien

bien dressés, poursuivent le *lievre*, & même les bêtes fauves, telles que le *loup*, le *sanglier*. &c.

On divise les *Faucons* en huit especes, dont quatre volent haut, & les quatre autres volent bas. Les quatre premiers sont, l'*autour*, l'*épervier*, le *gerfault* & l'*émérillon*; les quatre autres sont, le *faucon*, le *lanier*, le *sacre* & le *hobereau*. De tous ces oiseaux, le faucon & l'autour sont d'un service plus sûr & plus ordinaire que les autres.

Le faucon *gerfault*, *Gyrfalco*, approche beaucoup de l'*aigle* pour la grandeur; c'est, après lui, l'oiseau le plus fier, le plus hardi & le plus fort; ses plumes sont toutes blanches, excepté celles du dos & des aîles, qui ont des taches noires en forme de cœur; sa queue est courte & a des bandes transversales noires. Sa tête est aplatie; son bec & ses jambes sont de couleur bleue.

Cette espece de faucon aîre en Prusse & en Russie: c'est de Norwege, du Dannemarck, & principalement de l'Islande que viennent les meilleurs: on lui fait voler le milan, le héron, l'outarde, la grue & tout le gros gibier. Son tiercelet est plus délicat & plus difficile à gouverner. *Voyez le mot TIERCELET.*

Le Faucon *sacre*, *Falco sacer*, est plus petit que le *gerfault*, mais il le surpasse en courage & en agilité: on en distingue plusieurs especes. Le meilleur *sacre*, selon les habiles Fauconniers, se connoît par sa couleur tannée, rouge & grise: il doit avoir les jambes & le bec courts; les doigts des pieds bleus, de même que le bec; le corps allongé; les aîles & la queue longues.

On distingue plusieurs especes de *faucons-lanier*: elles ne different que par le plumage, qui, en général, tire sur le grisâtre: ces oiseaux ont le bec d'une médiocre grandeur, & un peu crochu par le bout.

Le *faucon émérillon* a le plumage brun; la partie inférieure de son corps est couleur de paille. *Voyez EMÉRILLON.*

L'*autour*, l'*épervier*, ont été décrits sous ces noms. *Voyez ces mots.*

Le *faucon*, proprement dit, est de couleur grise, armé d'un bec fort crochu & de ferres vigoureuses. Les faucons blancs sont les plus rares, mais peut-être aussi les plus braves: on en trouve en Islande, en Moscovie. Le Roi de Dannemarck envoie tous les ans quelques-uns de ses Fauconniers en Islande, pour prendre & transporter à Coppenhague autant de faucons capables de servir qu'on en peut avoir, soit pour sa propre Fauconnerie, soit pour en faire des présents dans les Cours Etrangères. Le Grand Maître de Malthe fait aussi présenter au Roi de France, tous les ans, douze de ces oiseaux, par un Chevalier de la Nation, à qui le Roi fait présent de mille écus. Les Marchands Fauconniers sont obligés, à peine de confiscation de leurs oiseaux, avant de pouvoir les exposer en vente, de les venir présenter au Grand Fauconnier qui retient ceux qu'il estime nécessaires aux plaisirs du Roi.

En Islande on prend les faucons, les *gerfaults* & autres oiseaux de proie par le moyen d'oiseaux dressés exprès à cet effet, & posés à terre dans des cages. Ces animaux voient en l'air le faucon à des distances incroyables, ils

en avertissent par certains cris leurs Maîtres qui se tiennent cachés dans une petite tente couverte de verdure, d'où ils lâchent aussi-tôt un pigeon attaché à une ficelle : le faucon, qui l'apperçoit, se plonge dessus, & il est pris vivant dans un filet qu'on jette sur lui. On les embarque dans des vaisseaux, on les nourrit de viande de bœuf & de mouton, & on en prend tous les soins imaginables : on les fait reposer sur des chassis de lattes minces, couverts de gazon & de gros draps, afin qu'ils soient mollement, & en même-tems fraîchement, sans quoi leurs jambes s'échauffent & deviennent sujettes à une espece de goutte.

Il y a aux Indes Orientales une espece de faucon huppé très beau : sa grandeur approche de celle de l'autour ; il a une double huppe sur la tête ; son col est rouge, son plumage est traversé de lignes blanches & noires ; l'iris de ses yeux est jaune ; son bec est d'un bleu foncé ; ses jambes sont garnies de plumes qui lui tombent jusques sur les pieds. Il y a plusieurs autres especes de faucons ; dont il seroit trop long & même inutile de donner les descriptions. Leurs petits se nomment *fauconneaux*.

Maniere dont on dresse les Faucons à la chasse du vol.

La chasse du faucon n'appartient qu'aux Rois & aux Princes : on se propose dans ces chasses la magnificence & le plaisir : elle est plus exercée en Allemagne qu'en France. Il y a dans la Fauconnerie plusieurs sortes de vols. Il y a le vol pour le milan, auquel on emploie le gersault, & quelquefois le sacre, ainsi que pour le vol du héron ; le vol pour la corneille & la pie, celui de la perdrix, celui des oiseaux de riviere, & le vol pour le poil.

Les oiseaux de proie que l'on dresse à la chasse du vol, sont, ou des oiseaux niais, ou des oiseaux hagards. On appelle oiseaux *niais* ou *béjaunes*, ceux qui ont été pris dans le nid ; ceux-ci sont les plus aisés à dresser. Les oiseaux *hagards*, sont ceux qui ont joui de la liberté avant d'être pris : ces derniers sont plus difficiles à apprivoiser. Les besoins étant le principe de la dépendance de l'oiseau, s'il est trop farouche, on l'affame, on cherche même à lui augmenter le besoin de manger en nettoyant son estomac par des cures, qui sont de petits pelotons de filasse qu'on lui fait avaler, & qui augmentent son appétit ; on l'empêche de dormir pendant plusieurs jours & pendant plusieurs nuits : s'il est méchant, on lui plonge la tête dans l'eau, & enfin on satisfait son appétit. Se voyant bien traité, l'oiseau se familiarise, & le Fauconnier en fait ensuite tout ce qu'il veut. Il y a plusieurs signes de force & de courage dans un oiseau de proie ; tels sont, le bec court, la poitrine nerveuse, les jambes courtes, les ongles fermes & recourbés. Une marque des moins équivoques de bonté dans ces oiseaux, c'est de chevaucher le vent, c'est-à-dire, de se roidir contre, & de tenir ferme sur le poing quand on les y expose.

Le principal soin du Fauconnier, est d'accoutumer l'oiseau de proie à se tenir sur le poing, à partir quand il le jette, à connoître sa voix ou tel autre

signal qu'il lui donne , & à revenir à son ordre. Pour amener l'oiseau à ce point , il faut se servir du leurre.

Le leurre est une représentation de proie ; c'est un morceau d'étoffe ou de bois , garni d'un bec , de pieds & d'ailes. On y attache de quoi paître l'oiseau. On lui jette le leurre quand on veut le réclamer , ou le rappeler. La vue d'une nourriture qu'il aime , jointe au cri que fait le Fauconnier , le ramene bien vite. Dans la suite la voix seule suffit. On donne le nom de *tiroir* aux différents plumages dont on équipe le leurre. On change le plumage suivant l'espece d'oiseau à la chasse duquel on veut le dresser ; on substitue à celui du perdreau , celui du héron , ou du milan. Pour affriander l'oiseau à son objet , on attache sur le leurre de la chair de poulet ou autre , mais toujours cachée sous les plumes du gibier : on y ajoute du sucre , de la canelle , de la moëlle & autres ingrédients propres à échauffer le faucon plutôt à une chasse qu'à une autre : de sorte que par la suite , quand il s'agit de chasser réellement , il tombe sur sa proie avec une ardeur merveilleuse. Quand on exerce ainsi l'oiseau , on le tient attaché à une ficelle qui a plusieurs toises de longueur.

Après plusieurs semaines d'exercice , on essaie l'oiseau en pleine campagne. On lui attache des grelots aux pieds pour être plutôt instruit de ses mouvements. On le tient toujours chaperonné , c'est-à-dire , la tête couverte d'un cuir qui lui descend sur les yeux , afin qu'il ne voie que ce qu'on lui veut montrer ; & si-tôt que les chiens arrêtent ou font lever le gibier que l'on cherche , le Fauconnier déchaperonne l'oiseau & le jette en l'air après sa proie. C'est alors une chose divertissante , que de le voir ramer , planer , voler en pointe , monter & s'élever par degrés & à reprises , jusqu'à se perdre de vue dans la moyenne région de l'air. Il domine ainsi sur la plaine , il étudie les mouvements de sa proie que l'éloignement de l'ennemi a rassurée ; puis tout-à-coup il fond dessus comme un trait , & la rapporte à son maître qui le réclame. On ne manque pas , sur-tout dans les commencements , à lui donner , quand il est retourné sur le poing , le gezier & les entrailles de la proie qu'il a apportée. Ces récompenses & les caresses du Fauconnier animent l'oiseau à bien faire , & à n'être pas libertin ou dépiteux , c'est-à-dire , à ne pas s'enfuir pour ne plus revenir , ce qui lui arrive quelquefois.

On dresse ces oiseaux au poil , c'est-à-dire , à poursuivre le lièvre ; & il y en a qui sont au poil & à la plume. On peut même dresser de jeunes faucons forts & vigoureux à la chasse du chevreuil , du sanglier & du loup. Pour y parvenir , on bourre la peau d'un de ces animaux : on met dans le creux de ses yeux la nourriture que l'on a préparée pour le faucon , & on a soin de ne lui en point donner d'autre : on traîne l'animal mort , pour le faire paroître en mouvement , comme s'il avoit vie ; le faucon se jette aussi-tôt dessus ; le besoin de manger le rend industrieux & attentif à se bien coller sur le crâne pour fourer son bec dans l'œil , malgré le mouvement. Quand on mène l'oiseau à la chasse , il ne manque pas de fondre sur la première bête qu'il aperçoit , & de se planter d'abord sur sa tête pour lui becqueter les yeux : il l'ar-

rète par ce moyen , & donne ainsi au Chasseur le tems de venir & de la tuer sans risque , pendant qu'elle est plus occupée de l'oiseau que du Chasseur.

Le faucon est sujet à une maladie qu'on appelle *crac*. Pour y remédier , il faut purger les oiseaux avec une cure de filasse ou de coton , & ensuite les paître avec des viandes macérées dans l'huile d'amandes-douces & dans l'eau de rhubarbe alternativement ; puis leur donner encore une cure de filasse comme auparavant. On peut lier la cure avec de la rhue ou de l'absinthe ; & si l'on remarque que le mal soit aux reins & en dehors , il faudra faire tiédir du vin & en étuver ces parties. On ne dit point en quoi consiste la *crac* ; mais ce qui est certain , c'est que la plupart des oiseaux de proie sont sujets à cette maladie , ainsi qu'à la *craie* , autre infirmité qui survient aussi aux faucons , & qui est une dureté des *émeus* , si extraordinaire , qu'il s'y forme de petites pierres blanches , de la grosseur d'un pois , lesquelles venant à boucher le boyau , causent souvent la mort aux oiseaux , si l'on n'y remédie promptement. Comme ce mal est causé par une humeur sèche & épaisse , il faut l'humecter & l'atténuer en trempant la pâture dans du blanc d'œuf & du sucre candi battus & mêlés ensemble. On peut aussi se servir de miel. La momie est le meilleur vulnéraire intérieur pour tous les efforts de l'oiseau de proie.

On croiroit qu'il n'y a point de remède au pennage cassé. On le rajuste cependant en entant un bout de plume sur celui qui reste , au moyen d'une aiguille que l'on introduit dans les deux bouts pour les rejoindre , & le vol n'en est point retardé. La penne cassée , même dans le tuyau , se rejoint à une autre en la chevillant des deux côtés avec des tuyaux de plumes de perdrix. Lorsque le pennage n'est que faussé , on le redresse en le mouillant avec de l'eau chaude. La chaleur & la pression remettent les plumes dans leur état naturel.

Vers le mois de Mars , qui est le tems de l'amour de ces oiseaux , on leur fait avaler de petits cailloux pour détruire leurs œufs naissants.

FAUCON MARIN, *Voyez* MILAN MARIN.

FAUFEL. Nom donné à la noix du Cachou. *Voyez à l'article* CACHOU.

FAULX ou FLAMBEAU. Espece de Tænia. *Voyez* FLAMBEAU.

FAUNE. Les Zoologistes donnent ce nom à un papillon qui se trouve dans les forêts. Le dessus de ses ailes est brun , & a des taches jaunes irrégulières : les premières ailes sont jaunes par-dessus , & ont les bords nébuleux : sur chacune il y a un point blanc qui a la figure d'un œil : les secondes ailes sont d'une couleur sombre , mêlée de blanc & de noir. On voit avec plaisir ce papillon dans les cabinets des Curieux.

FAU PERDRIEU. C'est un oiseau de rapine , qui prend les cailles & les perdrix : il leurre aussi le lapin , court sur le duc , & s'enfuit quand il apperçoit le sacre. Il vole au loin , près de la terre , & non en haut , comme le milan. Il vole moins bien que le faucon , le tiercelet & le sacre.

Le fau-perdrieu est beaucoup plus fort que le milan. Ses jambes sont plus grandes , fort déliées , jaunes & couvertes de tablettes : son bec & ses ongles

sont de couleur plombée & moins crochus que chez tous les autres oiseaux carnivores. Il a la queue & le bout des ailes noires : le plumage fauve. Le dessus de la tête & le dessous de la gorge sont blanchâtres & rougeâtres, de même que le pli de ses ailes, aux deux côtés de l'estomac ; les plumes qui lui couvrent les ouies sont noires.

Le fau-perdrieu fait son nid au plus haut des arbres isolés dans les plaines de l'Auvergne, le long des garennes, où il fait beaucoup de dégât.

FAUSSE BRANC-URSINE. *Voyez* BERCE.

FAUSSE CHELIDOINE. *Voyez* PIERRE D'HIRONDELLE.

FAUSSES CHENILLES. *Voyez ce mot à l'article* MOUCHES A SCIE.

FAUSSE-EBENE. C'est l'*Ebenier des Alpes*.

FAUSSE-GALENE. Les Minéralogistes désignent sous ce nom une substance minérale qui a quelque ressemblance pour le coup-d œil à la galene de plomb, mais dont on ne tire point de métal. *Voyez* GALENE.

FAUSSES GALLES. *Voyez* GALLES DE CHÊNE.

FAUSSE GUIMAUVE ou MAUVE DES INDES, *Abutilon*. Cette plante, qui croît dans les jardins, a une racine branchue, des tiges rameuses & hautes de quatre pieds ou environ, revêtues de feuilles un peu velues & semblables à celles des courges. Ses fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles : elles sont jaunâtres, & ressemblent à celle des mauves. Son fruit est arrondi, cannelé, & composé de plusieurs gaines membraneuses, qui s'ouvrent en deux parties, & renferment quelques semences noirâtres, qui ont la figure d'un petit rein. Cette plante est diurétique, pectorale, agglutinante & consolidante.

FAUSSES PLANTES MARINES. *Voyez à l'article* PLANTES MARINES.

FAUSSES PLANTES PARASYTES. *Voyez au mot* PLANTES PARASYTES.

FAUSSE-RHUBARBE. *Voyez* RUE DES PRÉS.

FAUSSES-TEIGNES. *Voyez à la suite de l'article* TEIGNES.

FAUVE, BÊTE FAUVE. Les Vénéurs comprennent sous ce nom, le *Cerf*, le *Daim*, & le *Chevreuil*. *Voyez* ces mots.

FAUVE. C'est un oiseau des Isles Antilles, ainsi appelé de la couleur de son plumage. Sa grosseur égale celle d'une poule d'eau. Son ventre est blanc.

Les fauves sont très maigres, & elles n'ont de valeur que par leurs plumes, dont on fait un bon débit. Ces oiseaux ont les pieds palmés comme les cannes, & le bec pointu comme la bécasse. Nul oiseau n'est aussi stupide que le fauve ; car, soit qu'il se lasse de voler, soit parcequ'il prend des barques pour des rochers flottans, ou des vaisseaux pour des arbres, dès qu'il en apperçoit quelqu'un à l'approche de la nuit, il vient aussi-tôt se poser dessus, & avec une telle confiance ou étourderie, qu'il se laisse prendre sans aucune difficulté.

FAUVETTE, *Motacilla*. C'est un petit oiseau très connu par le son mélodieux de son chant ; on en distingue plusieurs especes ; savoir, la *Fauvette*

brune, la *Fauvette rousse*, la *Fauvette fauve*, la *Fauvette noire*, & la *Fauvette de couleur diversifiée*.

La *Fauvette brune* est presque semblable au rossignol, mais plus petite. On l'éleve en cage, où elle chante. Elle se retire dans les creux des murailles, & diffère de son mâle par le sommet de la tête, qui est de couleur rannée. Elle fréquente le bord des ruisseaux, où on l'entend chanter. Elle fait son nid sur le bord des grands chemins; & ce nid est très artificieusement tissu de crins de cheval. Les œufs qu'elle pond ont communément une couleur cendrée, avec des taches de couleur de fer.

La *Fauvette à tête rousse* se retire dans les chenevrières, où elle chante continuellement : elle se nourrit de vers qu'elle va chercher autour des buissons & des arbrisseaux. Sa gorge, sa poitrine & son ventre sont d'un blanc tirant sur le jaune; le reste est brunâtre. Elle a le bec jaunâtre & longuet, la tête plate, la queue courte & jaunâtre par-dessous, le dessus est de couleur de rouille; les environs des cuisses sont noirâtres; ses pieds sont longs, déliés, & d'un jaune pâle; ses ongles sont noirs : le plumage du mâle est plus rougeâtre. La femelle pond quantité d'œufs : elle construit son nid dans des masures, des buissons, & derrière des murailles.

La *Fauvette fauve* est de couleur de châtaigne, excepté par le devant, qui est entièrement blanchâtre dans la femelle, & cendré dans le mâle. Les grandes plumes des ailes sont noires & tachetées de blanc.

La *Fauvette à tête noire*, (*Atri capilla* seu *Ficedula*), porte sur la tête une grande tache noire. Son col est cendré, le dos d'un verd obscur, la poitrine & le ventre sont d'un gris blanchâtre, le bec est noir, & les pieds sont plombés.

Toutes les fauvettes se nourrissent de mouches & de vers : elles aiment les lieux aquatiques. Leur chair est apéritive, & fort bonne à manger. On élève de préférence les fauvettes à tête noire, à cause de leur chant. On nourrit les petits, six jours après qu'ils sont éclos, avec une pâtée faite de chenevi écrasé, de persil haché & de mie de pain, bien arrosée. On les tient dans une cage, où il n'entre de l'air que par la porte, & on a soin de les tenir chaudement dans l'hiver.

FAUX, *Facinellus*. Oiseau imantopède ou de la taille du héron, & qui a toutes les mêmes façons de faire : il approche beaucoup de l'ibis. Ses cuisses, le ventre, le dos, le col & la poitrine sont d'un beau rouge tirant sur le brun. Ces deux dernières parties sont particulièrement couvertes de longues taches brunes; & le milieu du dos est rempli de taches d'un verd obscur. Cette même couleur se voit encore en quelques endroits des ailes & de la queue. Son bec est noir, fort long, & conformé par devant en manière de faux, d'où lui est venu son nom. Ses jambes & ses pieds sont de la même couleur, & d'une étendue assez considérable.

FAUX ACACIA. Voyez ACACIA COMMUN.

FAUX ACORUS. Voyez à la suite du mot ACORUS.

FAUX ALBATRE. Voyez ALABASTRITE.

FAUX ALUN DE PLUME. *Voyez* FAUX ASBESTE.

FAUX ASBESTE, *Pseudo Asbestus*. Cette substance, qu'on appelle aussi *Faux alun de plume*, est une espèce de gypse fibreux, qui se réduit facilement en poudre. Sa couleur est blanche : il n'est point réfractaire au feu, comme l'asbeste, & ne se dissout pas si facilement que l'alun ; il n'en a pas la faveur, c'est pourquoi on lui donne l'épithète de *Faux Asbeste*. On le vend mal-à-propos dans les boutiques sous le nom d'*Alun de plume* : il nous vient de plusieurs lieux de la France ; nous en avons rencontré une grande quantité dans la montagne de Sommerfet, près de Dijon en Bourgogne. Lorsqu'on brise cette matière entre les doigts, & qu'on en met la poudre sur la peau, elle y excite, ainsi que l'asbeste roide, un picotement semblable à celui que causeroient de petites pointes de plumes *Voyez* ASBESTE, ALUN DE PLUME, & GYPSE.

FAUX BOURDONS. On donne ce nom aux mâles des abeilles. *Voyez* ABEILLE.

FAUX CAFFÉ. *Voyez* à l'article PALME DE CHRIST.

FAUX CHERVI. *Voyez* CAROTTE SAUVAGE.

FAUX CORAIL. On donne ce nom aux *madrepores* & aux *éponges vésiculaires*. *Voyez* l'article CORAIL & celui de CORALLINE.

FAUX CUMIN ou CUMIN NOIR. *Voyez* NIELLE ROMAINE.

FAUX DICTAMNE, *Pseudo Dictamnus*. C'est une plante qu'on cultive quelquefois dans les jardins. Sa racine est menue, ligneuse & fibrée : elle pousse beaucoup de petites tiges menues, nouées, velues & blanchâtres. Ses feuilles sont arrondies, ressemblent un peu à celles du dictamne de Crête, & sont triangulaires comme elles. Ses fleurs sont en gueule, verticillées, de couleur purpurine : il leur succede des semences oblongues. Cette plante est dessicative, & possède d'ailleurs les vertus du véritable dictamne, mais dans un degré beaucoup inférieur.

FAUX GERME. Conception d'un fœtus informe, imparfait, & entièrement défectueux. *Voyez* au mot HOMME.

FAUX GRENATS. Ce sont les *Grenats d'or*. *Voyez* ce mot à l'article OR, & à celui de GRENAT.

FAUX LAPIS. C'est l'émail bleu qu'on retire du *Cobalt*. *Voyez* ce mot.

Pour la manière de retirer cette chaux colorante du cobalt, *voyez* notre *Minéralogie* & le *Dictionnaire de Chymie*.

FAUX-PISTACHIER, ou NEZ COUPÉ, ou PISTACHE SAUVAGE, *Staphilodendron*. Les fleurs de cet arbrisseau viennent par grappes pendantes : elles sont languettes, disposées en rose de couleur jaune. Aux fleurs succèdent des fruits membraneux, ou plutôt des vessies remplies d'air, divisées deux à deux, ou trois à trois, par des cloisons membraneuses. On trouve dans l'intérieur de leurs fruits deux ou trois noyaux aplatis, dont on fait des chapeliers qui ressemblent à ceux du bois de coco. Les fruits du faux-pistachier croissent si mal dans ce pays-ci, & les amandes en sont si petites, qu'on ne peut en retirer de l'huile, comme on le fait dans les climats

chauds. Les feuilles de cet arbrisseau sont composées de trois ou cinq folioles ovales, attachées à une nervure commune; elles sont opposées sur les branches.

Le faux-pistachier étant taillé, peut former de fort jolis buissons, qui font un effet très agréable dans les bosquets du printems, lorsqu'on fait contraster leurs grappes jaunes avec les grappes blanches des cytises, en entremêlant alternativement ces deux especes d'arbrisseaux.

FAUX SANTAL DE CANDIE, *Abelicea*. On donne ce nom à un grand & bel arbre, droit & rameux, qui croît sur le haut des montagnes de l'Isle de Candie. Ses feuilles ressemblent à celles de l'alaterne; mais elles sont plus arrondies & dentelées profondément. Son fruit est une baie de la grosseur & de la figure du poivre, de couleur verte-noirâtre: son bois est dur, rouge, peu odorant, imitant assez le santal rouge, quand il est en poudre.

FAUX SCORDIUM ou SAUGE SAUVAGE. Voyez la suite de l'article GERMANDRÉE D'EAU.

FAUX-SEIGLE. Voyez RAY-GRASS.

FAUX SENNÉ. C'est le *Baguenaudier*. Voyez ce mot.

FAUX SIMAROUBA. Voyez COUPAYA.

FAUX TURBITH. Voyez l'article TURBITH & celui de TAPSIE.

FELD-SPATH ou SPATH DES CHAMPS. Selon les Minéralogistes Allemands, ce n'est qu'un quartz irrégulier. Voyez QUARTZ.

FELOUGNE. Voyez CHÉLIDOINE.

FEMME. Voyez la description de cette moitié du genre humain, au mot HOMME.

FEMME MARINE & POISSON FEMME. Voyez le mot HOMME MARIN.

FENOUIL, *Feniculum*. On en distingue deux especes principales: savoir, le *Fenouil commun*; & le *Fenouil doux*.

Le FENOUIL COMMUN ou FENOUIL DES VIGNES, *Feniculum vulgare*, est celui qu'on vend quelquefois à Paris sous les faux noms d'*anis* & d'*aneth*; (voyez ces mots); & qui, dans les pays chauds, vient sans culture parmi les cailloux. La racine de ce fenouil est vivace, & dure plusieurs années; elle est de la grosseur du doigt, droite, blanche, odorante, d'un gout un peu doux & aromatique: elle pousse une tige haute de cinq pieds ou environ, droite, cannelée, noueuse, lisse, couverte d'une écorce mince, & de couleur verte-brune. Cette tige est remplie intérieurement d'une moëlle fongueuse & blanche; elle est rameuse vers sa sommité: ses feuilles sont laciniées en filaments longs, d'un verd foncé, d'un goût aromatique. Ses sommités fourrissent des ombelles ou bouquets larges, jaunâtres, odorants, appuyés sur un calice qui se change en un fruit composé de deux graines oblongues, arrondies, convexes & cannelées sur le dos, applaties de l'autre côté, noirâtres, d'un goût âcre un peu fort. Cette graine est adoucie par la culture, & la plante devient un peu différente; de-là naissent les variétés de cette especes de fenouil: on la cultive dans nos jardins. On se

se sert, en cuisine & en médecine, de ses graines, de ses feuilles & de ses racines.

LE FENOUIL DOUX, *Fœniculum dulce*, ne diffère du précédent que par sa tige, qui est moins haute, plus grêle; & par ses feuilles qui sont plus petites: en revanche, ses graines, qui jaunissent avec le tems, sont beaucoup plus grandes, plus douces, & moins âcres; en un mot, plus agréables au goût & à l'odorat.

Nous venons de dire ci-dessus que le fenouil commun devient doux par la culture; de même le fenouil doux ou cultivé dégénère à mesure qu'on le resème, & redevient fenouil commun. On prétend que le fenouil est originaire de Syrie & des Isles Açores. La racine de cette plante tient le premier rang parmi les cinq grandes racines apéritives: son suc pris à jeûn, guérit les fièvres intermittentes; c'est un sudorifique & un carminatif qui souvent excite des rots fétides. Toutes les parties du fenouil fortifient l'estomac: ses feuilles en décoction fortifient la vue, & excitent le lait aux Nourrices.

La graine de fenouil desséchée, est une des quatre grandes semences chaudes; elle facilite la digestion, & donne bonne bouche étant mâchée: c'est un spécifique dans les fièvres putrides accompagnées de malignité. Son usage est excellent dans les coliques; car elle fait sortir des vents par haut & par bas, d'où est venu cet adage de l'école de Salerne:

Semen fœniculi referat spiracula culi.

On en fait, avec l'eau-de-vie & le sucre, une eau de fenouil qui est fort estimée. On tire de cette graine une huile par la distillation, qui, mêlée avec du sucre, n'est pas moins bonne pour guérir la colique venteuse, aider la digestion, & qui est utile aux asthmatiques. On dit que toute la plante cuite dans du bouillon & de la bouillie, est employée utilement pour faire maigrir ceux qui ont trop d'embonpoint. En Italie & en Languedoc, on présente au dessert les jeunes pousses de fenouil avec la tête de la racine, assaisonnées avec le poivre, l'huile, &c. comme on fait pour la salade. Quelques Apicius de nos jours recommandent d'envelopper le poisson dans les feuilles de fenouil pour le rendre plus ferme, &c. soit qu'on veuille l'appêter frais, soit qu'on le garde dans de la saumure. On met aussi les sommités du fenouil dans les salades, dans les ragoûts & dans les court-bouillons du poisson, pour les rendre plus savoureux.

On ne cultivoit autrefois le fenouil qu'à Florence; mais on en cultive aujourd'hui dans le Languedoc & dans d'autres lieux secs & chauds. On en sème la graine en planches. On cueille la plante au mois d'Août, & elle repousse après qu'on l'a coupée. Le fenouil que les Italiens appellent *Finocchio*, ne diffère du *fenouil doux* que par l'extrême agrément de son goût & de son odeur; aussi n'est-il cultivé que pour être servi sur les tables comme le celeri, en guise de salade. Les Italiens & les Anglois en font un grand usage: voyez Miller pour la culture du *finocchio*.

FENOUIL ANNUEL ou HERBE AUX GENCIVES : voyez VISNAGE.

EENOUIL MARIN : voyez PASSE-PIERRE.

FENOUIL DE PORC : voyez QUEUE DE POURCEAU.

FENOUIL TORTU : voyez SESELI de MARSEILLE.

FENTES MINERALES & FENTES PERPENDICULAIRES. Nous parlerons de cette premiere espece de fentes à l'article FILONS : il nous suffira de dire ici qu'on trouve des fentes dans toutes les couches de la terre , & même dans les pierres disposées par couches. Ces fentes sont sensibles & aisées à reconnoître , sur-tout dans les terres qui n'ont pas été remuées : on les peut observer dans les cavernes & les excavations , & dans toutes les coupes un peu profondes. Elles sont toujours *perpendiculaires* ; ce n'est que par accident , dit M. de Buffon , qu'elles sont obliques. Comme les couches horizontales ne sont inclinées que par accident , il est visible que ces fentes ont été produites par le dessèchement & écartement des matieres qui composent les couches horizontales. Les fentes perpendiculaires des carrieres , qui sont incrustées de concrétions plus ou moins régulières & à demi transparentes , sont autant de canaux souterrains par où l'eau coule dans les grottes & les cavernes qui en sont les bassins & les égouts : voyez STALACTITES , les mots TERRE , FILONS , GLACIERS. C'est dans les fentes de grès ou de schiste , ou de roc , que se trouvent les métaux , les minéraux , les cristaux , les soufres , les bitumes. Dans les carrieres de marbre ou de pierre à chaux , elles sont remplies de spath , de gypse , de sable terreux : dans les argiles , dans les craies , dans les marnes , on trouve ces fentes ou vuides , ou remplies de matiere déposée par les eaux de pluie.

FENU-GREC, *Fænum-Græcum*. On en distingue deux especes ; l'une cultivée , & l'autre sauvage. Comme cette dernière ne differe de l'autre que par le défaut de culture , nous ne parlerons que de la premiere espece.

Le fenu-grec que l'on cultive dans les champs a une racine menue , blanche , simple & ligneuse. Sa tige est seule , haute de six pouces ou environ , grêle , verte , creuse en dedans , & rameuse. Ses feuilles sont rangées trois à trois sur une queue : elles sont semblables à celles du treffle des prés , mais plus petites , un peu dentelées tout au tour , vertes en dessus , cendrées en dessous. Ses fleurs sortent des aisselles de ses feuilles : elles sont légumineuses , blanchâtres. Il leur succede des gouffes longues , plates , pointues , courbées , étroites , remplies de graines à-peu-près rhomboïdales avec une échancrure , de substance mucilagineuse , d'une odeur & d'un goût désagréables qui portent à la tête.

On cultive cette plante principalement à Aubervilliers , d'où on nous apporte la semence seche à Paris , &c. Cette graine est d'usage en Médecine : elle est émolliente & propre à appaiser les douleurs : on en fait du mucilage en la mettant tremper dans de l'eau chaude : on l'emploie dans presque toutes les fomentations : c'est un excellent anodin en lavement pour le flux de ventre & les inflammations des intestins , excepté pour les femmes

sujettes à la passion hyſtérique : ſon mucilage convient auſſi dans les ophthal-
mies. La graine du fenu-grec entre dans les farines réſolutives. Les Indiens
ont l'art d'en tirer un vin doux qu'ils favent approprier au beſoin.

FER, *Ferrum*. Le fer eſt un métal peu malléable , mais très compacte ,
ſolide , très dur , ſonore & le plus élaſtique des métaux. Les reſſorts ou arcs
d'acier , les outils propres à limer , le ſon & l'extension des cordes de claveſ-
ſin , ſont preuve de ces propriétés. La couleur du fer eſt d'un gris obſcur ,
brillant dans l'endroit de la fracture , où l'on remarque des grains rhomboï-
daux : il eſt , après l'étain , le plus léger des métaux. La violence des coups
de marteau redoublés , un frottement violent & rapide ſuffiſent pour le faire
rougir au point d'enflammer des corps combuſtibles : échauffé dans le feu ,
il pétile , jette de longues étincelles , & rougit long-tems avant que de ſe
fondre ; alors il exhale beaucoup de vapeurs ſulfureuſes : expoſé au mi-
roir ardent , il ſe demi-vitrifie en une matiere noirâtre , ſpongieuſe , ou
bien ſe diſſipe en écailles étincelantes. Il ſe rouille à l'air & dans l'eau , &
ſon ochre eſt plus ou moins foncée : il devient verd dans l'acide vitrioli-
que , jaune dans l'acide du ſel marin , & rouge dans l'acide nitreux. Au-
tant il marque d'antipathie pour le *mercure* , autant il a de ſympathie avec
l'*aimant* , (quand il ne ſ'y rencontre point d'antimoine interpoſé qui puiſſe
en empêcher le jeu) , puisqu'ils ſ'attirent réciproquement ; ceci eſt un
moyen ſuffiſant pour reconnoître le fer par-tout où il eſt ſous ſa forme mé-
tallique : telles ſont les principales propriétés générales du fer. La Nature
qui a donné au fer des propriétés ſans nombre & ſi utiles , l'a répandu auſſi
plus abondamment dans les entrailles de la terre , qu'aucun autre métal.

Dès les premiers tems , les hommes ont connu le fer. On prétend qu'il
avoit été trouvé & travaillé par Tubalcain , le ſixieme descendant de Caïn.
On ſ'en ſervoit beaucoup du tems d'Abraham. On lit auſſi dans les annales
de Leangt-cheou , que ce métal a été mis en uſage , même avant les pre-
miers conducteurs des Chinois , & que les anciens habitans de Pekin con-
nurent la caſtine du fer ; & l'on préſume avec aſſez de vraieſemblance , que
le grand Ya ſ'eſt ſervi d'inſtrumens de fer pour couper les montagnes , &
creuſer ces grands canaux qu'il fit pour donner un libre cours aux eaux qui
inondoient alors les terres.

Le fer a ſes mines propres & particulières. Il y a peu de pays qui n'ait
dans ſes environs des mines & des fonderies de fer. Il y en a des mines très
riches en France , en Angleterre , en Allemagne , en Norwege , & même
en Amérique ; mais il n'y a point de pays en Europe qui en fourniſſe une
auſſi grande quantité , de la meilleure eſpece , que la Suede , ſoit par la
bonté de la nature de ſes mines , ſoit par les ſoins que l'on ſe donne pour le
travail de ce métal. Tous les Naturaliſtes qui ont voyagé , connoiſſent la
montagne de fer de Taberg en Suede. Cette terre métallique ſituée à qua-
rante lieues de la mer , & qui a plus de quatre cens pieds de hauteur per-
pendiculaire , & une lieue de circuit , n'eſt , à proprement parler , qu'une

masse ou filon de fer très riche : ce qu'il y a de singulier , est que dans les environs il n'y a aucune mine de ce métal. Cette montagne qui est un des plus singuliers échantillons du Cabinet de la Nature , est posée sur un lit de sable fin dont elle paroît avoir été autrefois entièrement couverte , & semble avoir été transportée dans cet endroit. Quoique depuis plus de deux siècles on en ait fait sauter des masses énormes , elle ne paroît pas considérablement diminuée. On apperçoit sur la surface de cette montagne plusieurs crevasses ou fentes remplies de sable de mer très fin & très pur ; on y trouve aussi des os de cerf & d'autres animaux , rangés horizontalement dans les lits de sable.

La miniere de fer est la moins profonde : il y en a même beaucoup qui se trouvent à la superficie de la terre , ou à huit , à douze pieds ; rarement les trouve-t-on à cinquante ou soixante pieds de profondeur. Les bords des mines de fer sont âpres , raboteux , noirâtres ou jaunâtres , & fort secs : le minerai y est toujours disposé par lits ou couches horizontales , comme celles des carrieres d'où l'on tire la pierre calcaire à bâtir , ou pierre de taille ; cependant on en trouve dans l'ancienne terre en filons inclinés à l'horison. Le minerai de la nouvelle terre est communément répandu dans la première couche de la terre , & en morceaux de différentes formes , grosseurs & couleurs. Voici les diverses especes de fer dont font mention les Métallurgistes.

Le fer est rarement pur dans la terre : les ouvrages des Minéralogistes & les Cabinets de quelques Curieux en offrent divers morceaux , qui vraisemblablement ne doivent leur existence qu'à des feux souterrains. Ce *fer naturel* peut être traité plus facilement sous le marteau , que la fonte de fer : il est en grains ou en masses irrégulières. Il s'en trouve des masses & des roches très considérables au Sénégal.

La MINE DE FER CRISTALLISÉE est aussi très rare : elle est ou octaèdre , ou cubique. Sa couleur varie & tire pour l'ordinaire sur la rouille : elle est trop minéralisée pour que l'aimant l'attire. La fameuse mine de fer de l'Isle d'Elbe , connue du tems des Romains , est de cette espece.

Ce qui suit va faire connoître que le fer , ainsi que le cuivre , est susceptible d'avoir , dans l'état de mine , toutes les formes & couleurs possibles :

La MINE DE FER BLANCHE est rameuse & en stalaçite : elle contient , pour l'ordinaire , très peu de fer ; telle est celle des Pyrenées. On en trouve cependant qui produit à la fonte depuis vingt-cinq jusqu'à quatre-vingts livres de fer par quintal ; mais elle n'est pas attirable à l'aimant : on nomme cette mine de fer , *Flos ferri* ; telle est celle de Styrie. La mine de fer blanche en cristaux ou poreuse , est grisâtre : celle qui ressemble à du spath fusible chatoyant , est d'une couleur fauve : elle est très bonne à la fonte ; mais nos Fondeurs n'ont pas toujours l'art d'en tirer tout le fer , ni d'en séparer l'alliage : telle est la mine d'Alvare en Dauphiné , qui est remplie de plomb blanc , de galène & de pyrite de cuivre. La mine de Champelite en Franche-

Comté, a une grande ressemblance à de la castine ou marne blanche. Quand on fait rougir dans le feu ces sortes de mines, elles noircissent aussi-tôt ; mais exposées à l'air libre, elles y acquièrent une couleur rougeâtre.

La MINE SPÉCULAIRE de fer est d'un brun fauve : elle est ou lamelleuse, ou rhomboïdale & luisante, comme du spath vitreux ; c'est pourquoi on l'appelle *Mine de fer à facettes* ou *miroitée* : elle contient beaucoup de bon fer. On en trouve à Valdajo en Lorraine, & particulièrement dans la mine d'Alvare.

La MINE DE FER D'UN GRIS DE CENDRE est très riche en métal ; elle blanchit à la comminution : elle est souvent mêlée d'arsenic & d'antimoine : c'est peut-être une des causes pourquoi l'aimant ne l'attire pas. Les Fon-
deurs mettent cette sorte de mine au nombre des mines sèches : on en trouve beaucoup en Suede.

La MINE DE FER BLEUATRE est quelquefois rougeâtre dans l'endroit de sa fracture. Quoique riche en fer, elle n'est que peu ou point attirée par l'aimant : elle est plus ou moins facile à fondre ; selon la quantité de spath vitreux & de pyrites qui s'y rencontrent. On en trouve considérablement en Suede : on croit que sa couleur bleue est l'effet d'une inhalation minéralisatrice.

La MINE DE FER NOIRATRE est très pesante, d'une couleur plus foncée que n'est le fer purifié. Cette mine contient tant de métal, qu'il n'est pas rare de la voir fortement attirée par l'aimant, & rendre à la fonte depuis cinquante jusqu'à soixante & même quatre-vingts livres par quintal. Cependant les Fon-
deurs de mines la regardent comme une des principales mines sèches : on en trouve quelquefois de beaux morceaux à Geromagny.

Rien n'est plus varié que la figure des parties de cette espece de mine.

La MINE DE FER ARSENICALE est minéralisée par l'arsenic, le soufre, &c. Elle est très dure, de la plus difficile fusion, même vorace & réfractaire. Sa couleur est ou argentine, brillante, ou noirâtre ; elle est ou striée ou lamelleuse, & comme cubique, ressemblant un peu ou à de la mine d'antimoine, ou aux cristaux d'étain minéralisés : elle donne quelquefois des étincelles avec l'acier ; elle devient rouge à mesure qu'on l'écrase. Il n'est pas rare d'y rencontrer de la pyrite ou de la galène de plomb ; c'est pourquoi on la nomme *Galène de fer*. On en trouve en Suede, & quelque peu en Lorraine. C'est une espece de *Wolfram* ou d'*Eisenram*. Voyez ces mots ; voyez aussi le *Traité des Mines* par Lehmann.

La MINE DE FER, appelée PIERRE HÆMATITE, ou FERRET D'ESPAGNE, ou SANGUINE A BRUNIR, *Hæmatites Schistus*, est, en quelque sorte, la mine de fer la plus riche. Sa forme est ou mamelonnée, ou striée ; toujours convexe en sa superficie, ses aiguilles forment intérieurement une pyramide irrégulière. On en trouve des morceaux qui s'éclatent, & qui ont la configuration de bois un peu pourri ; c'est pourquoi on l'appelle *Fer fossile*. Cette mine est brillante en dehors & dans l'intérieur, très dure, compacte, nullement attirable par l'aimant. Le fer qu'elle fournit est aigre, cassant, au point

qu'on ne peut le rendre malléable, qu'en le mêlant avec une mine de fer doux & plus pauvre : elle produit souvent dans la fonte, depuis quarante jusqu'à soixante & même quatre-vingts livres de fer par quintal. Ce fer devient alors très attirable à l'aimant. Les principales mines de pierre hæmatite sont en Espagne, dans la Galice. Les habitants de Compostelle en font un assez bon commerce, parceque cette mine de fer est très recherchée par sa dureté & par la propriété qu'elle a de polir les glaces, l'or en feuilles, l'acier & les autres métaux. Les Doreurs & les Orfèvres s'en servent pour brüner. L'*hæmatite d'Espagne* est rouge pourpre ; celle du pays de Hesse est rouge brun ; celle de l'Isle d'Elbe en Toscane, est brune-noirâtre ; celle de la Lombardie & de la Forêt noire, en Allemagne, est globuleuse & noire.

La mine de fer appelée AIMANT (*Magnes*), est grainelée, de différentes couleurs & figures, assez semblable en poids & en couleur, à l'espece de mine de fer qu'on appelle *Fer en roche*. On ne réduit point l'aimant dans les fonderies de fer, parceque ce minerai entre très difficilement en fusion, & qu'il ne donne qu'une très petite quantité d'un assez mauvais fer. On reconnoît cette mine à la propriété qu'elle a d'attirer la limaille & des petits morceaux de fer, & d'indiquer les Pôles. Voyez le mot AIMANT pour ses propriétés physiques.

Tous les pays qui ont des mines de fer, ont aussi du minerai d'aimant. L'Afrique en a dans l'Ethyopie ; l'Espagne dans la Biscaye ; la France dans l'Auvergne, la Lorraine & le Saumurois ; le Nord dans la Suede, &c.

La mine de fer appelée EMERIL (*Smyris*), est vorace, réfractaire, & si pauvre, qu'on n'en tire presque rien. Sa couleur est tantôt cendrée ou grisâtre, tantôt brune ou rougeâtre, & ressemble à une pierre : elle est très pesante, & d'une dureté si extraordinaire, que pour la mettre en poudre, l'on est obligé de se servir de moulins ou de machines d'acier, inventées à cet effet. Le peu de métal que contient l'émeril, n'est point attirable à l'aimant : il durcit au feu, & ne peut se fondre sans un flux très puissant ; mais ce n'est point pour le réduire en métal, qu'on exploite l'émeril, car on n'en tireroit que difficilement très peu de mauvais fer ; c'est à cause de ses propriétés pour les Arts : divers ouvriers s'en servent à sec, à l'eau, à l'huile, ou pour dégrossir, ou pour polir les ouvrages de verrerie & les métaux, tels que les armes de fer & d'acier, & les glaces ; pour tailler, nettoyer & adoucir quantité de matieres pierreuses. On appelle *Potée* ou *Boue d'émeril*, la substance qui se trouve au fond de l'auge des Lapidaires qui emploient l'émeril.

Les mines d'émeril qui se trouvent à Gersey & à Gernesey, Isles Angloises, proches des côtes de Normandie, donnent un minerai grisâtre & solide ; celui d'Espagne est également grisâtre, mais lamelleux ; celui du Pérou est rougeâtre, brunâtre, tendre, graveleux, plein de paillettes de mica, & parsemé de petits points d'or & d'argent effectifs ; ce qui le fait nommer *Emeril d'or*, *Emeril d'argent*, ou *Emeril de cuivre*. On ne voit cette sorte d'émeril, ainsi que celui de Naxie en Grece, que dans les plus

riches Cabinets où il y a des Droguiers complets. L'émeril noirâtre est aussi fort rare ; il est orné de points pyriteux : on le trouve en Pologne & en Angleterre.

La mine de fer appelée MANGANAISE ou MAGNÉSIE par les Verriers , est encore une mine réfractaire , pauvre & aigre : elle est grainelée ou striée, d'un bleu noirâtre , & salit les mains. La manganaise ne contient guere que dix livres de métal par cent ; encore M. Pott prétend-il que le fer est étranger à la vraie condition de la manganaise. Le tissu de cette mine n'est pas toujours grainelé ; souvent il est composé de stries plus ou moins fines , qui se croisent. Cette mine est souvent traversée de filons quartzeux ou pyriteux : elle produit au feu un verre jaune ou violet. On la trouve dans le Piémont , dans la Toscane , dans la Bohême & en Angleterre , proche les collines de Mendippo , dans le Comté de Sommerset.

La manganaise sert aux Potiers-de-terre pour noircir les couvercles de leurs ouvrages ; les Verriers en mettent aussi dans le verre fondu , pour lui enlever sa couleur bleuâtre ou verdâtre , & lui donner une transparence sans couleur ; c'est de-là qu'on l'a appelée le *Savon du verre*. Les Emaillleurs ont remarqué que , quand on en met trop dans le verre fondu , loin de le purifier & de le blanchir , elle augmente la couleur bleuâtre , & le rend un peu opaque ou d'une couleur pourpre ; tel est le défaut trop commun du verre de Saxe & de Bohême.

La Mine de Fer , appelée PIERRE DU PÉRIGORD (*Lapis petracorius*), est une substance métallique , que l'on peut mettre au nombre des Mines de fer de la moindre espece ou pauvres. La pierre de Périgord a été nommée ainsi , parceque la premiere a été trouvée en terre perdue , à deux lieues aux environs de Perouse dans le Périgord. Ce que les Droguistes vendent sous le nom de *Pierre de Périgueux* , a des formes & des propriétés peu constantes : nous en avons vû qui étoit à tous égards une sorte de manganaise ; d'autre , qui n'étoit qu'une espece de scorie de fer ou de mâche-fer. Cette dernière , qui est la plus ordinaire , est poreuse , d'un noir jaunâtre , facile à casser , mais difficile à réduire en poudre , semblable à cette sorte de faux-fer que l'on trouve répandu sur la surface des terres , dans les vallées , dans les bois , & par-tout où il y a eu autrefois de petites fonderies ou forges portatives : on en trouve aussi dans les environs des volcans.

La MINE DE FER MICACÉE est arsenicale , composée d'écailles très minces & peu compactes , facile à écraser. Sa couleur est rannée , obscure : elle devient rouge par le frottement : elle donne à la fusion un fer aigre & cassant.

La MINE DE FER LIMONEUSE est composée de particules de fer très atténuées. Leur couleur est ou bleuâtre ou jaunâtre comme du fer rouillé. Dans le premier cas , c'est une bonne mine de fer noirâtre , comminuée & charriée par des courants d'eau qui se rendent dans des lacs ou des étangs , ou au bord des rivières ; c'est-là que les portions métalliques se feront déposées en forme de sédiment ou de mine égarée. Dans le second cas , c'est une eau vitriolique , qui arrose des mines de fer , en charrie , décompose & précipite

une partie sous la forme d'*ochre* ; c'est communément dans des endroits creux & ferrés qu'on trouve cette espece de mine de fer.

Les mines limoneuses sont toujours graveleuses, sablonneuses & caverneuses : on les trouve par couches & par lits sous l'eau, & sous la forme d'une matiere terreuse peu compacte, dans les endroits humides ou marécageux : elles semblent s'y être formées comme le *Tuf*. Le fer qu'on en retire par la réduction, n'est que peu ou point attirable à l'aimant ; tantôt il est cassant à froid, tantôt il casse à chaud : c'est, à proprement parler une Mine ochracée de fer, mais qui differe un peu de l'ochre : voyez OCHRE.

Il est rare qu'on travaille à réduire les mines d'ochre, tandis que les Mineurs exploitent & fondent volontiers les mines limoneuses. La figure bizarre qu'on remarque dans les diverses glebes ou morceaux de cette espece de mine est assez difficile à expliquer. L'une est tantôt rougeâtre & à petit grain ; une autre est verdâtre, happe à la langue, & est ou fableuse ou en grains gros comme des avelines ; une autre est noire comme du fer brûlé, ou poreuse comme l'ostéocolle, ou en bâtons comme des stalactites, ce qui la fait appeller *Mine de fer à tuyau* ; ou en globules, détachés & arrondis comme des pois, ou aplatis comme des fèves, ce qui la fait appeller *Mine de pois* ou *Mine de fèves*. La mine de fer limoneuse, en godets, en géodes ou pierres d'aigles, ou lenticulaire, ou en rognons, &c. appartient encore à cette espece.

La MINE DE FER SABLEUSE n'est communément qu'un amas de grains de fer qui ont été entraînés de leur miniere par où l'eau a passé, dégrossis par le frottement & la longueur du roulis, enfin déposés sur les havres, dans les endroits où l'eau se perd dans la mer. Ce fer, dont on vient de découvrir dans la Virginie une très belle mine, est souvent très riche & attirable à l'aimant. Sa couleur est d'un noir plus ou moins foncé : il rend à la fusion jusqu'à quatre-vingt-dix livres par quintal. La mine de fer sableuse n'est donc qu'une mine de transport. C'est ordinairement dans un sable de cette espece que se trouve l'or en paillettes, ou l'or de lavage. Voyez OR.

Observations générales sur le fer & ses usages.

On voit, par ce qui vient d'être exposé, que le fer se rencontre dans les eaux, dans les différentes terres, & dans les pierres : il est allié à quantité de minéraux, de pyrites, de demi-métaux & de métaux, & sur-tout avec les mines d'or : il donne la couleur à quantité de marbres, d'argilles à Potiers, de jaspes, de pierres précieuses, de pétrifications & de fossiles : il se trouve dans les végétaux & dans les animaux ; en un mot, tout notre globe & tout ce qui y est contenu est mêlé de parties de fer : mais si le fer est le métal le plus abondant dans les mines, il est aussi celui qu'il est le plus facile d'en tirer. Aussi rien de si commun que les mines de fer, & de si varié : figure, couleur, mélange, profondeur, inégalité presque par-tout différentes.

C'est en consultant les Ouvrages des Métallurgistes, Emanuel Swedenborg,

borg, *de ferro*, le Dictionnaire de Chymie, celui des Arts & Métiers, & notre Minéralogie, qu'on y apprendra les moyens de l'approprier à nos besoins. Nous devons encore dire ici qu'en 1755 l'Académie de Besançon avoit proposé pour sujet du prix qu'elle devoit distribuer en 1756 : *De déterminer la meilleure maniere de construire & de gouverner un fourneau, de fondre les mines de fer, relativement à leurs différentes especes; de diminuer la consommation des charbons, d'accélérer le tems de chaque coulée, & de donner une meilleure qualité au fer & à la fonte* : cet objet a été rempli par M. Robert, Maître de Forges, &c. sous le titre de *Méthode pour laver & fondre avec économie les mines de fer relativement à leurs différentes especes*. Mais comme les détails que présente ce Mémoire ne sauroient être compris sans le secours des figures, nous renvoyons nos Lecteurs à l'Ouvrage même, qui est imprimé in-12. à Paris.

Communément il faut écraser & laver la mine de fer dans une fosse appelée *Lavoir* ou *Patouillet*, avec une eau courante, qui emporte les parties terreuses inutiles. On le fond ensuite à l'aide d'un fondant & d'un feu violent & entretenu à force de charbon. (La plupart des mines de fer blanches, & celles qui sont mêlées d'arsenic, demandent à être grillées & ensuite exposées à l'air, préalablement avant que de les laver.) On tient le fer fondu pendant douze heures; puis on le coule en lingots, dans des moules ou ruisseaux triangulaires de sable. Ce fer de première fonte, s'appelle *Fer en gueuse* ou *Fer de fonte*. Chaque lingot pèse environ 1800 livres ou environ : c'est avec ce fer qu'on fait des pots, des vases, des tuyaux, des boulets de canon, des bombes, des mortiers, des marmites, des poids à peser, des contre-cœurs de cheminée. Si l'on vouloit des ustensiles plus fins, il faudroit tenir le fer en fusion pendant seize heures au moins. C'est la propriété qu'a le fer d'augmenter de volume en cessant d'être fluide, qui donne aux vases, jettés en moule, la régularité & la précision.

On peut, dans l'instant de la fonte, connoître si le fer est cassant à froid ou à chaud. Le premier est le fer doux : il est ductile, très malléable étant rouge; mais est fragile & casse sous le marteau étant refroidi. Le fer cassant à chaud est le fer ferme; étant rougi, il se casse sous le marteau, & se sépare par éclats en beaucoup de morceaux; mais étant refroidi, il prend du corps, résiste au marteau, & s'y laisse, en quelque sorte, étendre plutôt que d'y casser. Pour purifier davantage le fer, on le fait passer par la forge de l'affinerie, où on le fond de nouveau, en le remuant fortement avec des barres de fer. Lorsqu'il est à demi-refroidi, on le porte sur des enclumes, où, à l'aide d'un marteau de plus de six cents livres pesant, on le bat & rebat en tous sens; alors le fer est malléable. On le porte de-là à la chaufferie, & on le travaille de nouveau sur l'enclume, pour l'étendre de la maniere que l'on veut, en barres rondes, ou quarrées, ou plates, en carillons, en bottes, en courçons, en cornettes, en plaque, en tôle : c'est ainsi que se fabrique le fer forgé, & que par le moyen du martelage, on peut le réduire en feuilles,

qu'on enduit d'étain pour le préserver de la rouille : on le nomme alors *Fer-blanc*. Le fil d'archal, les cordes de clavecin, de psaltérion, &c. se tirent du fer en barre, qu'on fend en deux avec des roues d'acier, pour en former des verges de fer : on passe celles-ci par une filière ou planche de fer percée d'un nombre de trous de différents diamètres : on les amène par ce moyen à la finesse d'un cheveu.

L'acier n'est qu'un fer purifié & raffiné par la cémentation, surchargé de phlogistique, & ensuite trempé. En cet état, il peut couper & limer le fer : il a une flexibilité élastique. On en fait des rapes, des ciseaux, des lancettes, des rasoirs, des aiguilles, des filières pour les Tireurs d'or, & des burins pour les Graveurs. On lui retire cette abondance de phlogistique en le cémentant avec des substances maigres, & il reprend alors sa première condition de fer.

Le fer de fonte, celui de forge & l'acier, sont d'un usage continuel & indispensable. Le fer seul fournit à la navigation, au charroi & à tous les arts, les ustensiles dont ils ont besoin pour abattre, pour affermir, pour creuser, pour tailler, pour embellir, pour produire en un mot toutes les commodités de la vie. Les Sauvages en sentent aussi-bien le prix que les Nations les plus policées, puisqu'ils donnent à nos Voyageurs commerçants une assez grande quantité d'or & d'argent ou d'épicerie, pour une serpe, une bêche, un hoyau, ou quelque autre instrument de fer. Les fers diffèrent beaucoup entr'eux : mais ce seroit un grand malheur qu'ils fussent tous égaux ; nos besoins ne le sont pas.

Le fer est aussi d'usage en Médecine, au moins l'ordonne-t-on dans la jaunisse, pour exciter la circulation du sang, &c. ou en limaille, ou après avoir été exposé à la rosée de Mai pour en faire un safran de Mars apéritif. M. Geoffroi a beaucoup célébré la vertu balsamique & vulnérable du fer : il y a longtemps que l'on a dit de ce métal, *pungit & ungit, sauciat & sanat*.

Le fer & le soufre combinés produisent quelquefois, dans l'intérieur de la terre, des ravages redoutables : voyez l'article PYRITES, celui de VOLCANS, & celui de TREMBLEMENTS DE TERRE. C'est par le moyen du fer & des mélanges convenables qu'on imite ces phénomènes dévastateurs & les météores ignés ; tels que le tonnerre & les éclairs. Voyez ces mots.

FER DE CHEVAL, *Ferrum equinum*. Plante qui croît aux lieux incultes dans les pays chauds. On en distingue deux espèces ; l'une vivace, & l'autre annuelle. Sa racine est ligneuse & un peu fibrée : elle pousse plusieurs tiges hautes comme la main, menues, anguleuses & garnies de feuilles oblongues, un peu semblables à celles de la lentille. Sa fleur est légumineuse & jaune : il lui succède une gousse plate, composée de plusieurs pièces courbées en fer à cheval, & attachées bout-à-bout. Chacune de ces pièces renferme une semence figurée en croissant. On estime cette plante vulnérable, stomachique & alexipharmaque.

FER SCISSILE. Voyez l'article *Pierre hamatite* au mot FER.

FEROCOSSE. Dans l'Isle de Madagascar on donne ce nom à un arbrisseau qui porte une espèce de petit chou rond, dont les Insulaires se nourrissent.

FERRET D'ESPAGNE. Voyez l'article *Pierre hématite* au mot FER.

FERRUGINEUX. C'est ce qui participe de la nature du fer, ou qui contient des particules de ce métal. La plupart des eaux minérales sont ferrugineuses : il y a aussi l'ochre de fer, &c. Voyez FER, OCHRE, & l'article EAU.

FERRUGO. On donne ce nom à la rouille de fer qui se produit naturellement sur les barres de ce métal, exposées à l'impression des fluides.

FERULE, *Ferula*. Plante qui croît en plusieurs pays de l'Afrique, de l'Asie & de l'Europe, aux lieux chauds. Sa racine est grande, branchue, droite, noirâtre, & pleine d'un suc laiteux. Sa tige est haute de sept à huit pieds, grosse, fongueuse, moëlleuse, rameuse ; devenant dure vers l'automne, & ensuite ligneuse. Ses feuilles ressemblent à celles du fenouil ; mais elles sont plus amples : il naît, aux sommités, des fleurs en ombelles, jaunâtres & disposées en rose. Lorsque la fleur est passée, il paroît des semences jointes deux-à-deux, grandes, ovales, minces & enveloppées d'une membrane : on en cultive en Languedoc dans les jardins.

La moëlle de la fêrûle, prise en décoction, est astringente & sudorifique. Sa semence est carminative : on se sert de ses tiges, encore molles, pour lier & supporter les plantes qui s'inclinent trop. C'est ce sarment fongueux & verdâtre, dont les Régents des Collèges se servoient autrefois pour châtier leurs Disciples ; d'où vient que Martial a appelé la fêrûle, *Sceptrum Padagogorum*.

En Grece, le creux de la tige de la fêrûle (*Narthex*) est abondamment rempli d'une moëlle blanche, qui étant bien sèche prend feu comme la mèche ordinaire. Ce feu s'y conserve parfaitement bien, & ne consume que peu-à-peu la moëlle, sans endommager l'écorce ; ce qui fait qu'en certains pays on se sert de cette plante pour porter du feu d'un lieu à un autre. Cet usage est de la première antiquité, & nous explique le passage de Martial, où il fait dire aux fêrûles : *Nous éclairons par les bienfaits de Prométhée*. Ces mêmes tiges sont quelquefois assez fortes pour servir d'appui, mais trop légères pour blesser ceux que l'on frappe. Cette tige étoit autrefois le sceptre des Empereurs du Bas-Empire : elle étoit aussi la marque de l'autorité des Rois : on l'employoit alors avec art en particulier pour faire des ouvrages d'Ebenistes les plus précieux ; aujourd'hui on la brûle dans la Pouille en guise d'autre bois, & elle ne sert plus en Grece même qu'à faire des tabourets : pour cela on applique alternativement en long & en large les tiges sèches de cette plante, pour en former des cubes arrêtés aux quatre coins avec des chevilles.

Les arbres ou arbrisseaux, d'où découlent les gommes résines, telles que la gomme ammoniac, le galbanum, l'assa-fœtida, &c. sont du genre des fêrûlacées. Voyez ces mots.

FETICHE. Poisson qui se pêche à l'embouchure du Niger, en Afrique ; & qui tient son nom du respect ou de l'espèce de culte que les Negres d'Afrique lui rendent, comme à l'interprete de leur Divinité. Il est d'une rare beauté. Sa peau, qui est brune sur le dos, devient plus claire & plus brillante près de l'estomac & du ventre. Son museau est droit, & terminé par une espèce de corne dure & pointue, de trois pouces de longueur. Ses yeux sont grands & vifs : aux deux côtés du corps, proche des ouies, on découvre quatre ouvertures longues, dont on ignore l'usage : on en voit de sept pieds de longueur & plus. *Hist. Génér. des Voyages, L. 11, pag. 147.*

FETU, *Festuca*, aut *festua avenacea sterilis elatior*. Espèce de gramen, qui semble être un seigle bâtard ou une avoine sauvage, & qu'on trouve en quantité entre les bleds, parmi l'orge & le plus souvent entre les seigles, quand l'hyver a été humide. Le fétu pousse des tiges ou tuyaux bas, menus, faciles à se fendre, & garnies de feuilles semblables à celles du froment : ses sommités soutiennent des épis pareils à ceux de l'avoine, ils renferment des grains grêles, oblongs, rougeâtres & barbus : ces épis sont quelquefois ramassés comme un petit paquet, d'autres fois ils sont dispersés. Cette plante est bonne pour conduire les tumeurs à la suppuration.

FETU-EN-CUL ou **OISEAU DU TROPIQUE.** Voyez **PAILLE-EN-CUL.**

FEU, *Ignis*. On doit considérer le feu sous deux états différents ; ou entrant comme principe dans la composition des corps, ou bien seul dans son état naturel. L'examen du feu considéré comme entrant dans la composition des corps, & qu'on nomme alors phlogistique, est absolument du ressort de la Chymie, & pour le connoître sous ce point de vue, nous renvoyons au *Dictionnaire de Chymie*, ainsi qu'aux Ouvrages des Pyrologistes, & sur-tout au *Traité du Feu*, par Boherrave.

Le feu, que les Scholastiques regardent comme un des quatre éléments ; le feu, dis-je, considéré dans son état naturel, mérite proprement le nom de feu, de matiere du soleil, de la lumière, de la chaleur. Cet élément naît avec nous, pénètre notre propre substance ; ses effets nous suivent par-tout ; rien ne nous est plus familier, & c'est peut-être une des raisons qui nous empêchent d'en connoître plus particulièrement la nature. Le soleil paroît être comme le réservoir général de cette substance qui semble s'en émaner perpétuellement. Le feu se répand dans tous les corps que nous connoissons ; mais non pas comme principe essentiel à leur mixtion, puisqu'on peut les en priver, du moins en grande partie, sans qu'ils souffrent pour cela la moindre décomposition. Le plus grand changement que sa présence ou son absence leur cause, est de les rendre ou fluides ou solides, en sorte qu'on peut regarder la plûpart des autres corps comme solidés de leur nature ; & le feu, comme fluide par essence, & principe de la fluidité des autres.

Une des principales propriétés de ce feu pur, est de pénétrer facilement tous les corps, & de se distribuer entr'eux avec une sorte d'égalité. Une autre propriété du feu, est de dilater tous les corps qu'il pénètre. Les Physiciens ont profité de cet effet pour construire des thermometres, qui

leur font connoître les variations de la température de l'atmosphère.

Quoique le feu soit par-tout , il a fallu que les hommes , pour l'approprier à leurs besoins , inventassent des moyens de le faire paroître : le frottement , le mélange de certaines liqueurs , la plûpart des phosphores , les miroirs concaves , & les verres convexes , sont les principaux moyens que l'industrie des hommes a imaginés pour commander en quelque manière à cet élément.

Les expériences de l'électricité , qui paroissent avoir un rapport si intime avec le phénomène du tonnerre , prouvent d'une manière bien sensible , avec quelle profusion le feu est répandu dans toute la Nature : voyez TONNERRE.

Lorsque le feu est caché dans les corps , il y est paisible , & dans une sorte d'inertie ; mais s'il agit visiblement , il les consume. D'après cette dernière propriété , nous dirons que le feu est cet être actif que nous reconnoissons à son éclat , qui nous donne de la chaleur , & qui nous cause de la douleur lorsque nous en approchons de trop près ; mais qui , à une certaine distance , nous fait éprouver une sensation à-peu-près égale à celle que nous ressentons dans une saison moyenne & tempérée : toutes ses parties se mettent en équilibre avec elles-mêmes , agissent & se répandent avec égalité dans les corps ; mais sans tendre vers aucun point de la terre : ses principales propriétés , sont de causer l'évaporation des fluides , la vitrification des terres & pierres , la détonation , la calcination , la fusion & réduction des métaux , la combustion & l'incinération des végétaux & des animaux , la liquation des résines , &c. M. de Voltaire , dans sa Dissertation sur le feu , jugée digne de l'impression par l'Académie des Sciences , rappelle en deux vers toutes les propriétés du feu. Voici la belle devise qu'il a mise à la tête de sa pièce :

Ignis ubique latet , naturam amplectitur omnem ;

Cuncta parit , renovat , dividit , urit , alit.

Pour produire tous ces effets , le feu a besoin d'aliment ; & les matières les plus propres à lui en servir , sont les huiles , les tourbes , les différentes espèces de charbons , le bois , &c. ajoutez à cela l'accès libre de l'air. Voyez ce mot.

FEU BRISOU. Voyez son article à la suite du mot EXHALAISON.

FEU DU CIEL. C'est le tonnerre. Voyez ce mot.

FEU S. ELME. C'est le nom que l'on donne à de petites flammes que l'on voit sur mer , dans les tems d'orage , aux mâts , aux pavillons , à toutes les parties saillantes & supérieures des vaisseaux. Ce phénomène est très fréquent sur les vaisseaux surpris par la tempête dans la mer des Indes : ces météores ignés tombent en forme de boule çà & là sur le vaisseau sans faire aucun mal , & par conséquent sans le brûler ni le couler à fond , quoi qu'en disent Plin & Cardan. Ce feu , qu'on a nommé aussi *Castor & Pollux* , n'est autre chose que le feu électrique.

FEUX FOLLETS , *Ambulones*. Ce sont de petites flammes foibles , qui

volent dans l'air à peu de distance de la terre, & qui paroissent errer çà & là à l'aventure. Ces feux se voient dans les lieux d'où s'élèvent des parties volatiles inflammables, tels que les cimetières, les gibets, les lieux marécageux & où l'on tire de la tourbe. C'est en été & au commencement de l'automne qu'ils se font voir, sur-tout dans les pays chauds. Les feux follets sont la terreur des gens de campagne, parcequ'ils fuient ceux qui les poursuivent, & poursuivent ceux qui les fuient; effet tout naturel produit par l'air comprimé, qui chasse cette flamme légère devant celui qui la poursuit, tandis qu'elle paroît poursuivre celui qui fuit, parcequ'elle se précipite dans le vuide qu'il laisse en fuyant. Lorsqu'on les saisit, on trouve que ce n'est autre chose qu'une matière lumineuse, glaireuse comme le frai de grenouille, & qui n'est ni brûlante ni chaude.

Il y a une autre espèce de feu follet nommé *Ignis lambens*; c'est une petite flamme ou lumière que l'on apperçoit quelquefois sur la tête des enfants, des hommes & sur la crinière des chevaux lorsqu'on les peigne. Cet effet qui n'est point un météore aérien, est produit par des exhalaisons onctueuses, qui s'attachent aux cheveux & aux crins, & s'enflamment par le frottement sans donner de chaleur. Les étincelles qui sortent dans l'obscurité du dos des chats, en le frottant à contre-poil, tiennent, ainsi que l'*ignis lambens* & même les feux follets, aux phénomènes électriques.

FEU SOUTERRAIN. L'existence en est incontestable; il se fait sentir dans les bains chauds, & dans les fontaines, sur les eaux desquelles on voit des flammes; il se manifeste par une foule de vapeurs chaudes qui s'élèvent de la terre ou des montagnes brûlantes qui sont répandues dans toutes les parties du Monde: le feu souterrain est quelquefois produit par l'effervescence fortuite de quelques mélanges propres à exciter le feu: d'autres fois il est entretenu par des matières sulphureuses, bitumineuses, & par l'air qui s'y communique de caverne en caverne, &c. Les Mineurs, qui travaillent aux mines métalliques, assurent que plus on creuse avant en terre, plus on éprouve une chaleur incommode, qui s'augmente toujours à mesure qu'on descend, sur-tout au-dessous de 480 pieds de profondeur. *Voyez* à l'article **CHALEUR**. Souvent ces sortes de feux renfermés trop à l'étroit ouvrent le haut des montagnes, & déchirent les entrailles de la terre, qui en souffre une grande agitation. Quelquefois quand le foyer est sous la mer, il en agite les eaux avec une violence qui fait remonter les fleuves, & qui cause des inondations: c'est probablement à cette cause qu'on doit attribuer les tremblements de terre & une partie des funestes inondations qu'on a essuyés dans plusieurs endroits de l'Europe en 1755; année qui sera tristement fameuse dans l'histoire: *voyez* les articles **PYRITES**, **TERRE**, **TREMBLEMENTS DE TERRE**, **VOLCANS**, **FEU** & **BITUMES**.

FEVE, Faba. Ce nom convient à plusieurs espèces de graines légumineuses: nous les restreindrons ici à la fève de marais, & à la fève petite ou feverolle.

La **FEVE DE MARAIS** ou **DE JARDIN**, *Faba major vulgaris*, est une plante

légumineuse, fort connue, & qu'on cultive dans les jardins & les marais, &c. Sa racine est en partie droite, & en partie rampante, garnie de tubercules & de fibres : ses tiges sont hautes d'environ trois pieds, quarrées, creuses en dedans, couvertes de plusieurs côtes qui naissent par intervalles, auxquelles sont attachées des paires de feuilles oblongues, arrondies, un peu épaisses, bleuâtres, veinées & lissées : les feuilles sont légumineuses, oblongues, de couleur tantôt blanche, marquée de taches noires, tantôt purpurine & noirâtre : il leur succede des gouffes longues, grosses, relevées, charnues, composées chacune de deux cosses, qui renferment quatre ou cinq grosses fèves applaties, oblongues, ordinairement blanches, mais quelquefois rouges, purpurines, ayant une marque longue & noire à l'endroit où elles sont attachées à leur gouffe : l'écorce de cette fève est épaisse & comme coriace ; la substance intérieure étant desséchée, est dure & se partage aisément en deux parties ; on y observe alors, à une des extrémités, la plantule apparente.

La FEVEROLLE, *Faba minor*, qu'il ne faut pas confondre, comme quelques-uns, avec le *haricot* (voyez ce mot), ne diffère de la précédente que par sa petitesse, & parcequ'elle est plus garnie de feuilles, de fleurs & de fruits : ses fèves sont de couleur, ou blanchâtre, ou jaunâtre, ou noire : on la cultive dans les champs.

La tige, les feuilles, les fleurs, les gouffes & les graines des fèves de marais sont d'usage en Médecine. Les fèves se mangent vertes ou mûres, après les avoir fait cuire avec des herbes aromatiques & les assaisonnements ordinaires. Ilidore prétend, *liv. 17, origin. chap. 4*, que les fèves ont été le premier légume dont les hommes ont fait usage. Pline dit que l'on a essayé d'en faire du pain. Les fèves sont venteuses, indigestes étant vertes, & fournissent une nourriture trop grossière pour les personnes délicates, & sur-tout aux gens de cabinet ; ceux qui sont accoutumés à de gros travaux peuvent s'en accommoder. Les personnes qui sont sujettes à la colique, au mal de tête & au resserrement de ventre, doivent s'en abstenir. On sert tous les jours sur les meilleures tables des fèves vertes : on les prépare de diverses manières, après en avoir ôté l'écorce pour les rendre plus tendres. Lorsqu'elles sont seches on en fait de la purée : en général on en mange peu de sechées à Paris ; mais il y a des Provinces où elles sont une nourriture fort ordinaire : sur mer les Matelots en font un usage fort journalier. La farine de fèves pelées, *lomentum*, faite par trituration, est au nombre des quatre farines résolutives, qui sont, les *farines d'orge, d'orobe, de lupin & de fèves* : on met aussi la farine de fèves parmi les cosmétiques pour les taches du visage. Dans les boutiques on trouve une eau distillée des fleurs de fèves, propre à dégraisser & à adoucir la peau. Les Egyptiens ont regardé les fèves comme impures & comme le symbole de la mort, & leurs Prêtres s'en absteignent. Les fèves ont servi autrefois pour donner les suffrages dans l'élection des Magistrats. Aujourd'hui les Anglois les font cuire avec du miel pour servir d'appas au poisson.

FEVÉ DE BENGALÉ, *Faba Bengalensis*. Fruit étranger qu'on trouve

souvent avec le myrobolan citrin que l'on nous envoie des Indes Orientales. C'est comme une excroissance compacte, ridée, ronde, aplatie, creusée en manière de nombril, large d'environ un pouce, brune en dehors, noirâtre en dedans, d'un goût stiptique & astringent, sans odeur. On soupçonne que la *feve de Bengale* est le myrobolan citrin lui-même, qui a été blessé par la piquure d'un insecte, ce qui lui a donné une forme monstrueuse : voyez MYROBOLANS.

FEVE D'EGYPTE. Plante exotique, assez curieuse par sa beauté. C'est le *Nelumbo* du Ceylan. La plupart des Auteurs Botanistes connoissent la *feve d'Egypte* pour une espèce de nymphée à fleurs blanches, pourpres & incarnates : il semble qu'Hérodote ait voulu parler de cette plante, en faisant mention d'un lys d'eau, couleur de rose, & d'un lys blanc qui naissent dans le Nil. Sa fleur ne seroit-elle pas la même qu'un certain Poète présenta comme une merveille à Adrien, sous le nom de *Lotus antinoie*. Plutarque l'appelle le *crépuscule*, par rapport à la couleur de ce beau moment du jour. Son fruit qui a la forme d'une coupe de ciboire, en portoit le nom chez les Grecs. Dans les bas-reliefs, sur les médailles & sur les pierres gravées, il sert souvent de siège à un enfant. La tige de la feve d'Egypte a un pied & demi de haut. Ses feuilles sont fort larges, creusées en forme de nombril, & attachées à des pédicules hérissés d'épines. On trouve la figure de cette plante entière dans *Commelin*, *Breynius* & *Plucknet*.

FEVE EPAISSE. Voyez ORPIN.

FEVE DE S. IGNACE. Petit fruit des Indes Orientales, qui est un puissant purgatif. Voyez l'article NOIX VOMIQUE.

FEVE MARINE ou PIERRE DE SAINTE MARGUERITE, *Faba marina*. C'est l'opercule rouge d'un petit *limacon* à bouche ronde. Voyez ce mot.

FEVE DE MALAC ou BALADOR, *Faba de Malacca*. C'est l'anacarde. Voyez ce mot.

FEVE DU MEDICINIER. Voyez au mot RICIN.

FEVE PURGATIVE, Occidentale. Voyez RICIN.

FEVE DE TREFLE. On donne ce nom à l'*anagryis puant*. Voyez ce mot.

FEVEROLLE. Voyez FEVE DE MARAIS & HARICOT.

FEUILLE & FEUILLAGE, *Folium & Frondes*. On donne le nom de feuillage à l'assemblage de branches & de feuilles que l'on voit sur les arbres & sur les plantes. Le *feuillage* est aussi un terme qui sert aux Botanistes pour exprimer la figure que les feuilles prennent ; c'est ainsi qu'on peut dire que dans l'orme, le tilleul, &c. le *feuillage* est applati, parceque leurs feuilles s'étendent horizontalement, les unes d'un côté, les autres d'un autre côté, sur un même plan. Le *feuillage* est croisé dans la plupart des plantes qui ont les feuilles opposées, ainsi qu'on le voit dans le myrthe & le jasmin. Le *feuillage* est rond dans le pin, parceque ses feuilles s'étendent circulairement autour des branches. Le *feuillage* est verticillé, lorsque plus de deux feuilles opposées

opposées rayonnent autour de la tige , où elles forment comme autant d'étages ; la famille des Aparines en fournit beaucoup d'exemples. On fait que c'est la diverse position des feuilles qui fait le plus au port des plantes herbacées , comme la disposition des branches fait le port des arbres.

On nomme feuillaison , *foliatio* , les feuilles proprement dites que produisent annuellement toutes les plantes ; mais toutes ne les renouvellent pas dans le même tems : la plupart des mousses , par exemple , & des pins , se couvrent de feuilles pendant l'hiver ; celles de la famille des Gramens & des Liliacées au printems : d'autres plantes , telles que quelques champignons & mousses , la plupart des fougères , &c. ne sont bien en vigueur qu'en automne. La feuillaison est encore avancée ou retardée selon que le soleil amène plutôt ou plutôt le degré de chaleur convenable à chaque espèce. M. Linnæus a été le premier qui ait écrit sur le tems comparé de la feuillaison des plantes , dans chaque climat , voyez (*Amœnit. Acad. vol. 3 , pag. 363, vernatio arborum*) : mais M. Adanson prétend que ce Naturaliste a négligé de tirer des résultats moyens entre toutes les observations qu'il a publiées comme absolues , & il a donné dans quatre Tables , ce qui convient pour déduire des règles certaines , & pour conclure plus positivement du fait dont il est question. Voyez le premier volume des familles des plantes ; depuis la page 85 jusqu'à 99. La plupart des plantes quittent leurs feuilles tous les ans ; c'est ce qu'on appelle *effeuillaison* , *defoliatio* , ou chute des feuilles , qui a ses limites comme la feuillaison. On remarque une grande variété dans la manière dont la plupart des plantes quittent leurs feuilles ; car 1°. il y en a qui les laissent tomber toutes à la fois tous les ans , 2°. d'autres fois elles restent sur l'arbre & y meurent par le froid de l'hiver ; mais la force de la sève du printems les fait tomber pour faire place à de nouvelles feuilles , ainsi qu'on le remarque dans le chêne , le charme , &c. 3°. d'autres conservent vertes leurs feuilles jusqu'au printems , saison où il en repousse de nouvelles , comme on le voit sur le jasmin jaune des bois , le troène , le lilas , l'érable de Crète ; 4°. d'autres les conservent constamment vertes toute l'année , & ne laissent tomber les anciennes feuilles que longtemps après la production des nouvelles. Le noyer est un des arbres qui prennent le plus tard leurs feuilles , & qui les quittent le plutôt : enfin il paroît que la température de l'air a beaucoup de part à l'effeuillaison , & qu'un soleil ardent contribue aussi beaucoup à la hâter. Le froid ou l'humidité de l'automne , accélèrent encore plus la chute des feuilles , comme la sécheresse tend à la retarder. Nous ne parlerons ici que des feuilles des plantes mêmes , car on donne aussi le nom de feuille florale (*petale*) à celle qui se trouve & ne paroît qu'avec la fleur. Voyez l'article FLEURS.

M. Adanson considère les feuilles comme des tiges ou branches qui seroient applaties : elles ont , dit-il , les mêmes parties , un épiderme , une écorce des deux côtés , & un corps ligneux au centre ; elles en diffèrent seulement en ce que leur épiderme a des mamelons ou glandes corticales sur toute la surface dans les herbes , & à la surface inférieure seulement dans

les arbres. 2°. Le tissu cellulaire ou parenchyme y est plus considérable que dans les tiges, & toujours dans son état de verdure, & succulent sans passer à celui de moëlle. De l'organisation des feuilles passons à leur division.

On divise les feuilles en trois genres; savoir, en *simples*, en *composées* & en *indéterminées*. Les *feuilles simples* sont celles dont le pétiole ou pédicule n'en porte qu'une: on en fait sept ordres, où on les considère suivant la circonférence, les angles, les sinus, la bordure, la surface, le sommet & les côtés: ainsi l'une est orbiculaire ou ronde; l'autre est en forme de coin, ou en fer de lance, ou en forme d'âlène; une autre est en forme de main, ou dentelée, ou membraneuse, ou piquante, ou vésiculeuse, ou lisse, ou ondée & nerveuse, ou charnue, ou fistuleuse. Les *feuilles composées* se forment de plusieurs feuilles réunies ensemble sur un même pétiole. Ces feuilles sont quelquefois *recomposées*; telles sont celles dont le pétiole commun se partage deux fois avant de se charger de folioles: elles sont *sur-composées*, quand le pétiole se subdivise plus de deux fois. Les *feuilles indéterminées* sont celles qui se font distinguer sans avoir égard à leur structure ni à leur forme, mais à la direction, au lieu, à l'insertion & à la situation.

On nomme *feuilles pavoisées*, *folia peltata*, celles qui sont attachées au pédicule par leur centre, ou à-peu-près, & non par les bords; telles sont celles de la capucine, du ricin, &c. Les *feuilles palmées*, ou en éventail, ou en parasol, *folia palmata*, *flabelliformia*, sont celles qui ont des divisions profondes, mais réunies à leur base, telles que celles du latanier, du magnoc, du ricin. Les *feuilles digitées*, *folia digitata*, sont celles qui sont rassemblées en rayons au sommet du même pédicule, dont elles se séparent d'elles-mêmes, comme dans le maronnier, le lupin, le ceiba, le baobab, &c. Les *feuilles ailées*, *folia alata*, sont celles dont les découpures en ailerons font partie de la côte ou de leur pédicule, comme celles de la roquette, de la benoîte, & de la plupart des ombellifères.

On appelle *feuilles pinnées*, ou empennées, *folia pinnata*, celles dont les divisions forment autant de petites feuilles distinctes & attachées à une côte commune, avec laquelle elles ne font pas corps; telles sont la plupart des légumineuses. Enfin les *feuilles conjuguées*, *folia conjugata*, sont encore des espèces de feuilles pinnées, mais au nombre de deux seulement, sur le même pédicule commun, comme dans le courbari.

Il y a des plantes qui n'ont point de feuilles, telles que les bisfuss, les champignons, & un nombre de fucus, &c. Malpighi, dans son *Anatom. Plantar.* a observé le premier la manière dont les feuilles des plantes sont pliées ou roulées dans les bourgeons avant leur développement. M. Linnæus a étendu ces mêmes recherches en 1751 dans son *Phil. Botan. p. 105.*

Nous avons eu soin, en décrivant chaque plante, de considérer les feuilles par rapport à leur structure, à leur superficie, à leur figure, à leur consistance, à leur découpure, à leur situation ou disposition, & à leur grandeur, au moins dans celles qui exigeoient ces sortes de détails botaniques.

Utilités des Feuilles, leur inspection au microscope, &c. &c.

Les feuilles sont utiles sur l'arbre (elles sont aux branches ce que le chevelu est aux racines), & se sont encore après leur chute : sur l'arbre, elles sont une des plus grandes beautés de la Nature. Nos arbres fruitiers n'ont rien qui approche de la verdure des forêts : elles procurent, pendant l'été, une ombre communément salutaire à toutes les espèces d'animaux, & peut-être qu'elles fournissent la vie aux arbres mêmes. L'air influe beaucoup sur les végétaux, & les feuilles semblent être les premières parties de l'arbre, destinées à en recevoir les impressions : il y a lieu de croire qu'elles sont aussi les principaux organes de la sève & de la transpiration ; en effet le fruit périt sur les branches dégarnies de feuilles ; il a moins de goût si on n'en retire qu'une partie ; enfin le fruit est dans toute sa bonté, si on y laisse toutes les feuilles. Pendant le jour la chaleur fait monter la sève dans les feuilles, directement & latéralement : cette sève transpire même quelquefois par les pores des feuilles. Au retour de la nuit & de la fraîcheur, il se fait un mouvement de la sève tout contraire au précédent : les feuilles qui ont exhalé tout le jour, pompent de nuit la rosée, & elles en humectent les branches, les fleurs, les fruits, & l'arbre entier ; c'est ce qui a déterminé plusieurs personnes à faire arroser dans les chaleurs, non-seulement le pied de leurs espaliers & de leurs arbres de tige, mais même le feuillage entier, sur-tout quand il se fanne : pratique qui leur a réussi.

La sève, qui circule avec moins d'activité en hiver qu'en été, fait que le suc des feuilles s'épaissit à l'arrivée des froids : elles tombent par leur propre poids, ou bien elles jaunissent, s'éventent & se dissipent à la moindre secousse de vent ; la terre en est bientôt couverte : elles se pourrissent au pied des arbres, & forment un terreau qui les fertilise. Cette jonchée de feuilles préserve, sous son épaisseur, les racines des plantes encore jeunes, & les met à l'abri du grand hâle & des vents froids : elle couvre les glands & toutes les graines, & entretient autour d'elle une humidité qui les aide à germer comme si elles étoient dans la terre. Les pauvres gens de la campagne en font souvent de grands amas : ils brûlent ces feuilles pendant l'hiver pour se chauffer, & se servent ensuite des cendres pour fertiliser les terres fortes ou stériles. Les feuilles d'ormes & de vignes cueillies vertes, se donnent en nourriture aux bêtes à cornes dans les pays où les pâturages manquent : les feuilles de murier servent à nourrir les vers à soie, &c.

Plusieurs liliacées à feuilles charnues & solides se reproduisent par leurs feuilles ; mais ce sont de vrais bourgeons qui sortent, ou de leur aisselle ou base, ou pédicule, comme dans l'aloès & la scille maritime, ou de leur extrémité comme dans quelques arums. Ces bourgeons s'élèvent de la partie supérieure de la feuille, tandis qu'il sort des racines, de la partie inférieure ou opposée au bourgeon. Cette dernière observation, dit M. Adanson, revient à celle de M. Bonnet, qui a vu sortir des racines des nervures & des pédicules de certaines feuilles de melisse, de belle-de-nuit, d'haricot

& de chou , plongées pendant quelque tems dans l'eau ; mais qui ne produisirent jamais de branches , ni du côté des racines , ni du côté opposé. *Voyez* le bel ouvrage sur les feuilles , par M. Bonnet , publié à Leyde en 1754 , in-4°. avec figures.

On ne peut voir les divers ordres de distributions de feuilles sans se livrer aux sentimens d'admiration pour les loix éternelles , qui ont merveilleusement approprié les moyens à la fin. On est pénétré des mêmes sentimens , quand on considère la régularité avec laquelle les feuilles sont couchées & pliées avant que de sortir du bouton , & de la prévoyance de la Nature pour les mettre à l'abri de tout accident. *Voyez l'Anatomie des plantes* du Docteur Grew , *Liv. 1 , tab. 41 & 42 ; voyez aussi Malpighi de Gemmis , & la Statique des végétaux* de M. Hales. L'inspection des feuilles au microscope nous offre encore le spectacle de mille beautés frappantes que l'œil nud ne peut appercevoir ; on en est convaincu par la lecture des observations microscopiques de Bakker. La feuille de certaines roses , par exemple , est toute diaprée d'argent sur sa surface externe. Celle de sauge offre une étoffe raboteuse , mais entièrement formée de touffes & de nœuds aussi brillants que le cristal. La surface supérieure de la mercurielle est un vrai parquetage argentin , & ses côtés un tissu de perles rondes & transparentes , attachées en maniere de grappes , par des queues très fines & très déliées. Les feuilles de rue sont criblées de trous semblables à ceux d'un rayon de miel ; d'autres feuilles présentent comme autant d'étoffes ou de velours raz de diverses couleurs. Mais que dirons-nous de la quantité presque innombrable de pores de certaines feuilles ? Leuwenhoeck en a compté plus de cent soixante-deux mille sur un seul côté d'une feuille de buis. Quant aux singularités de la feuille d'ortie piquante , dont nous devons la connoissance au microscope de Hooek , voyez ORTIE. *Voyez aussi les observations & expériences de Thummingius , sur l'anatomie des feuilles , dans le Journal de Leipfick , ann. 1722 , pag. 24 , & l'observation sur l'écorce des feuilles , &c. par M. de Saussure.*

FEUILLE AMBULANTE. On donne ce nom à une espece de fauterelle , qui provient d'un œuf gros comme un grain de coriandre , & verdâtre. Lorsque les œufs viennent à éclore , il en sort de petits insectes noirs , semblables à des fourmis. Quand cet insecte a acquis une certaine grandeur dans son nid , qui est pendu à un arbre , il y file une toile dont il s'enveloppe en quelque maniere : ensuite il s'agite violemment jusqu'à ce que ses aîles , étant libres , puissent s'étendre ; alors plus vigoureux , il brise cette toile , & tombe de l'arbre , ou s'envole. A peine ces insectes ont-ils acquis leur grandeur & grosseur naturelles , qu'il leur vient des aîles proportionnées à leur force progressive. Leurs aîles ressemblent à une feuille morte : il y en a d'un verd clair ou brun ; d'autres marbrées & grises , quelquefois semblables à une feuille de citronnier desséchée : il n'est donc pas étonnant que de simples amateurs aient été persuadés (d'après la couleur , la configuration & le lieu où l'on observe ces animaux) , que la feuille ambulante

provenoit des arbres mêmes d'où elle tombe (*Hist. des Insectes de Surinam*). On voit plusieurs de ces insectes ailés dans divers Cabinets d'Histoire Naturelle en Hollande.

FEUILLE INDIENNE ou **MALABATRE**, *Folium Indum*, aut *Malabathrum*. Cet ingrédient, qui entre dans la grande thériaque & dans d'autres antidotes, est une feuille semblable à celle du cannelier ou du citronnier, dont elle ne diffère que par l'odeur & le goût : elle est oblongue, pointue, compacte, luisante, distinguée par trois fortes nervures, qui vont de la queue à la pointe ; d'un verd pâle, luisante, d'une légère odeur & saveur aromatique, qui approche un peu du gérosle. Cette feuille naît sur un arbre qui croît en Cambaya, dans les Indes, d'où on nous l'apporte sèche.

L'arbre qui porte cette feuille s'appelle, chez les Indiens, *Katou-Karua*, en latin *Canella Silvestris Malabarica* : il croît dans les montagnes du Malabar. Cet arbre ressemble au cannelier de Ceylan, mais il est plus grand & plus haut : les fleurs sont petites, disposées en ombelle, sans odeur, d'un verd blanchâtre, & à cinq pétales : il leur succede de petites baies qui ressemblent à nos groseilles rouges. Les fleurs paroissent en Juillet & Août, & les fruits sont mûrs en Décembre ou en Janvier. On ne se sert que des feuilles comme d'un alexipharmaque.

FEUILLES PETRIFIÉES, *Lithophylla*. L'exemple des feuilles pétrifiées ou incrustées n'est pas rare. On trouve communément dans des carrières de ruf en divers endroits de la France, & particulièrement près de Montpellier, des feuilles de roseaux, de vignes & de plusieurs autres especes de végétaux : il ne faut pas confondre cette pétrification & incrustation avec les *Empreintes*. Voyez ce mot.

Scheuchzer, *Herbar. Diluvian*, en cite une assez grande quantité, qu'on trouve aussi rapportées dans le *Dictionnaire Oryctologique* de M. Bertrand.

FEURRE. Nom donné à la paille de toute sorte de *bled*. Voyez ce mot & celui de **PAILLE**.

FIATOLE, *Fiatola*. Poisson excellent, très connu à Rome, & qui se trouve dans la Mer Rouge & dans la Méditerranée. Il a des traits tortus & dorés sur-tout le corps : on en voit qui ont le dos & les côtés bleus, le ventre blanc, argenté, & les lèvres rouges. Ce poisson est presque rond & plat : sa langue approche en figure de celle de l'homme : sa chair est molle, mais très bonne à manger. Les Vénitiens nomment la Fiatole, *Lisette*.

FICOIDE ou **POIRE MARINE**, *Ficoïtes*. Voyez **FONGITE** & **FIGUE FOSSILE**.

FICOIDES : genre de plante exotique, qui n'est connue que des Botanistes & des Curieux, & beaucoup plus en Hollande & en Angleterre : toute cette plante est succulente ; les feuilles sont conjuguées & croissent deux à deux : sa fleur est en cloche évasée, découpée ordinairement fort

menu , & percée dans le fond par où elle s'articule avec le pistil. Lorsque la fleur est passée , le pistil & le calice deviennent tous les deux ensemble un fruit divisé en plusieurs loges , remplies de semences très menues. Le fruit du *Ficoïde* se mange , & il fait la plus grande partie de la nourriture des Hottentots.

Boherrave distingue cinquante-trois especes de *Ficoïdes* ; & Miller en nomme quarante-une qui sont aujourd'hui cultivées dans les jardins d'Angleterre. C'est mal-à-propos que quelques Botanistes ont confondu le *Ficoïdes* avec le Bananier , & d'autres avec l'*Opuntia* ; *Figuier d'Inde*. Le *Ficoïdes* a pourtant cette ressemblance avec cette dernière plante , que son fruit est toujours formé avant que la fleur s'épanouisse , & qu'il a à-peu-près la figure d'une figue ; ce qui a engagé Bradley a le nommer *Soucy-Figue*.

Presque tous les *Ficoïdes* sont originaires des environs du Cap de Bonne - Esperance ; ils croissent communément dans les pierres & les rocailles aux endroits où il n'y a pas trop d'humidité : on les multiplie de graine ou de bouture. Cette plante se plaît à découvert , & les petites gelées ont de la peine à mordre dessus : elle périt souvent au bout de trois ans : ou si elle vit , elle est ordinairement mal faite & délabrée.

Il y a quelques especes de *Ficoïdes* , qui sont annuelles , & qu'on doit multiplier de graine tous les ans : leurs feuilles & leurs branches sont couvertes de vésicules transparentes , qui les font paroître comme autant de cristaux lorsque le soleil donne dessus. Il y a une autre sorte de *Ficoïdes* qui est nain , & qui a la même forme que l'aloës : il croît toujours fort près de terre , sans pousser de branches : il dure cinq à six ans. Le *Ficoïdes* en buisson , dont la tige est ligneuse , doit être plus arrosée que les especes précédentes : il demande la chaleur , & à être exposé au soleil , sans quoi ses fleurs ne s'épanouiront jamais , à l'exception des especes qui ne fleurissent que la nuit.

Les *Ficoïdes* sont très diversifiés par la couleur de leurs fleurs blanches , jaunes , dorées , orangées , bleues , pourpres , écarlates ; & même quelques especes sont continuellement en fleurs. Un des plus remarquables *Ficoïdes* est celui que les Anglois nomment *diamont plant* ou *ice plant* , & les Botanistes *Ficoïdes d'Afrique* , à fleurs de plantain ondées , argentées & brillantes comme des facettes de glace.

Miller a trouvé le moyen d'en perfectionner la culture , & de faire venir en Angleterre la tige , les branches & les feuilles de cette espece , plus belles qu'en Afrique. Voyez ce qu'il a dit à ce sujet dans son *Dictionnaire des Plant. de jardin* : Voyez aussi l'*Histor. Plantar. succulent. cum figur.* DE BRADLEY , & dont les diverses décades ont paru successivement à Londres depuis 1716 ; jusqu'en 1727 , iii-4°. ENCYCLOP.

FIEL DE TERRE. Voyez FUMETERRE.

FIENTE : voyez EXCREMENT.

FIGUE. Les Conchyliologues donnent ce nom à une espece de co-

quillage de la classe des *Univalves* & du genre des *Conques sphériques*. La coquille en est allongée & recourbée, & sa forme imite assez la figure d'une *figue*.

FIGUE ou POIRE FOSSILLE, *ficoïtes*. Ce sont des corps que l'on trouve dans l'intérieur de la terre, dont la ressemblance extérieure avec ces fruits, peut servir d'excuse à ceux qui, d'après un examen superficiel, les ont regardés comme des fruits pétrifiés. Ils ont effectivement une ouverture ronde, qui pénètre dans l'intérieur; mais leur organisation intérieure bien examinée, prouve qu'ils en diffèrent essentiellement. On trouve rarement, parmi les fossiles, des corps végétaux qui aient été originairement mols & flexibles. M. Guettard y trouve des caractères qui lui font regarder ces fruits apparens, comme des Madrépores, quoiqu'il convienne qu'il ignore à quelle espèce de Madrépore on doit les rapporter. *Voyez Hist. de l'Acad. ann. 1752*. Peut être que la figue de mer, sur-tout celle qui ressemble aux lobes des poumons, n'est qu'une espèce d'*alcyonium* fossile. L'alcyon est de couleur d'olive foncée & d'une substance subéreuse: il répand une odeur très désagréable, lorsqu'on l'ouvre, & contient quantité de particules jaunâtres & de petits sacs remplis d'une liqueur limpide & visqueuse. Sa surface est ornée de petits trous réguliers.

FIGUE BACOVE. *Voyez* à l'article BANANIER.

FIGUIER, *ficus*. Arbre qui donne des fruits délicieux, sur-tout dans les pays chauds, tels que l'Italie & la Provence. On distingue jusqu'à trente & même quarante espèces de figuiers; mais plusieurs ne peuvent être vraiment regardés que comme des variétés: nous ne parlerons ici que du figuier domestique, & du figuier sauvage ordinaire.

LE FIGUIER DOMESTIQUE, *ficus sativa*. Est un arbre d'une hauteur médiocre, branchu, touffu, & qui ne devient jamais bien gros, parcequ'il pousse du pied une multitude de rejettons. Le bois de cet arbre est blanchâtre, mou, moëlleux, il n'est presque pas d'usage; cependant les Serruriers & les Armuriers s'en servent, parcequ'étant spongieux, il se charge facilement de beaucoup d'huile & de poudre d'émeril, qu'ils emploient pour polir leurs ouvrages. Ses feuilles sont les plus grandes de celles des arbres à fruits, rudes, d'un verd foncé; ses fruits naissent le long des branches auprès de l'origine des feuilles, sans avoir été précédés par aucune fleur apparente. Ces fruits sont plus ou moins gros, plus ou moins ronds, de couleur différente suivant les espèces, mais ils approchent toujours de la figure d'une poire; lorsqu'ils sont en parfaite maturité, ils doivent être fort mous & succulents. Les espèces de figuiers qui réussissent le mieux, sont les figues connues de tout le monde, la *ronde* & la *longue*; celle-ci est plus abondante, l'autre est plus précocée: toutes deux sont excellentes.

On a cru que le figuier ne portoit point de fleurs, mais les Botanistes les ont enfin découvertes. Il n'est pas étonnant qu'elles aient échappé à la vue; car elles sont cachées dans le fruit même. En ouvrant une figue, dans les circonstances favorables, on peut observer à l'intérieur autour de la cou-

ronne du fruit , les fleurs mâles qui sont des étamines supportées par de petits filets , & les fleurs femelles qui sont placées près du pédicule : il leur succede de petites graines dures. *Voyez les Mém. de l' Acad. des Sciences , année 1712.*

Quoique le figuier puisse venir dans presque tous les terrains & à toutes les expositions , il vient infiniment mieux dans les terres légères ; & dans une bonne exposition , le fruit y a un goût plus sucré , plus fin ; & dans nos pays méridionaux la récolte revient deux fois par an. Cet arbre réussit à merveille entre des rochers.

La Quintinie , Bradley & Miller , ont déployé tout leur art pour la perfection de cette culture , & pour celle des figueries. Les figuiers sont d'un tempéramment très délicat , & résistent avec peine aux hivers de notre climat : pour les conserver , on les couvre de paille pendant l'hiver ; mais malgré ce soin il en périt toujours des branches , & les nouvelles qui repoussent , ne peuvent donner du fruit qu'à la troisième année ; on a grand soin de les planter contre les murailles : c'est la plus avantageuse de toutes les expositions. Il y a des personnes qui les mettent en caisse , & qui prétendent que c'est un moyen d'avoir des figues plus précoces , en plus grande abondance & de meilleur goût : de plus on a l'avantage de pouvoir les mettre dans la serre pendant l'hiver. On a éprouvé avec succès , qu'un des moyens de hâter la maturité des figues , sans leur rien ôter de leur bonté , c'est de mettre avec un pinceau un peu d'huile d'olive à l'œil des figues , c'est-à-dire , à cette ouverture que l'on apperçoit à l'extrémité du fruit ; d'autres personnes conseillent de piquer l'œil de la figue avec une plume ou paille graissée d'huile. Si on choisit pour objet de comparaison deux figues de même grosseur sur une même branche , & qui soient parvenues aux deux tiers de leur grosseur , on observe bien sensiblement ce phénomène , & de plus celle qui a été piquée , devient plus grosse que l'autre. M. Duhamel a pensé que dans cette occasion , l'huile fait à-peu-près le même effet que les insectes de la caprification , dont nous allons parler plus bas.

Le figuier , ainsi que les autres arbres , a besoin d'être taillé , pour être d'un meilleur rapport & d'une plus longue durée. Cet arbre diffère des autres arbres fruitiers , en ce que le fruit vient sur les grosses branches. Il est essentiel de tailler ces arbres avant que la sève soit en mouvement , parce que lorsqu'on les taille , il découle un suc laiteux dont cet arbre abonde , & il en résulte une perte du suc nourricier qui nécessairement affoiblit l'arbre. Ce suc laiteux est amer , si âcre , si brûlant & si corrosif , qu'il fait prendre le lait comme la présure , qu'il dissout celui qui est caillé , comme le fait le vinaigre , & qu'il enlève la peau , ou y fait des taches ineffaçables lorsqu'on l'applique dessus. Cependant cette sève avec de si étranges qualités , produit les fruits les plus doux , les plus sains , & les plus agréables au goût. Tels sont les procédés ou plutôt les miracles de la Nature.

Quelques personnes ont fait usage avec succès du suc laiteux du figuier pour détruire les verrues ou porreaux qui viennent sur la peau. Ce suc lai-
teux

teux entre dans la classe de ces écritures sympatiques, qui ne sont visibles qu'en les chauffant ; si l'on trace des lettres sur le papier avec le lait ou le suc des jeunes branches de figuier, elles disparaissent bientôt ; lorsqu'on veut les lire, il faut approcher le papier du feu, & dès qu'il est échauffé, les caractères deviennent visibles. Le suc du figuier partage cette propriété, non-seulement avec le suc de limon, le vinaigre & les autres acides, mais elle lui est même commune avec toutes les infusions & toutes les dissolutions, dont la matière dissoute peut se brûler à très petit feu, & se réduire en une espèce de charbon.

Le figuier se multiplie facilement de rejettons, de boutures, par la greffe en flûte, & par la graine : cette dernière méthode qui est très longue, donne des variétés.

LE FIGUIER SAUVAGE nommé par les Botanistes *Caprificus* ou *Caprifiguier*, est semblable en toutes ses parties au figuier ordinaire, mais il porte des figues qui ne servent qu'à la caprification, dont ont tant parlé les anciens. Les observations de M. de Tournefort, & de M. de Godheu, Commandeur à Malthe, nous ont donné toutes les lumières que l'on peut désirer sur cette pratique singulière.

Les habitants de l'Isle de l'Archipel font leur principale nourriture de figues séchées au four, qu'ils mangent avec un peu de pain d'orge. Cette raison les engage à donner toute leur attention à ce qui peut augmenter la fructification des figuiers.

On cultive dans les Isles de l'Archipel & à Malthe deux sortes de figuiers. La première espèce est le figuier domestique, qui porte beaucoup de fruits, mais qui ne viendroient pas à maturité, si on n'avoit recours à l'art. La seconde espèce, est le figuier sauvage dont nous venons de parler. Ce figuier sauvage porte pendant l'année trois sortes de fruits, qui sont nommés des Grecs *forrites*, *cratirites*, & *orni* : ces fruits ne sont pas bons à manger, mais ils sont nécessaires pour faire mûrir les fruits des figuiers domestiques, par l'opération que l'on nomme *caprification*.

Les FORNITES ou TOKAR-LEOUEL des Malthois, que l'on peut nommer *figues d'automne*, paroissent dans le mois d'Août, & durent jusqu'en Novembre sans mûrir. Il s'y engendre de petits vers produits d'œufs déposés par certains mouchérons (espèce de très petits ichneumons d'un noir luisant) qui voltigent toujours autour du caprifiguier. Dans les mois d'Octobre & de Novembre ces vers devenus mouchérons, piquent d'eux-mêmes les seconds fruits appelés *Cratirites* par les Grecs, ou *Tokar-Lanos* par les Malthois, qui ne paroissent qu'à la fin de Septembre, & que l'on peut nommer *figues d'hiver* ; les figues d'automne tombent peu après la sortie de leurs mouchérons. Les figues d'hiver au contraire restent sur l'arbre jusqu'au mois de Mai suivant, & renferment les œufs qui y ont été déposés par les mouchérons des figues d'automne. Dans le mois de Mai, la troisième espèce de figues que l'on nomme *orni* dans le Levant, & *tokar-taiept* à Malthe, & que nous pou-

vons appeller *figues printannieres* , commencent à paroître. Lorsqu'elles sont parvenues à une certaine grosseur , & que leur œil commence à s'ouvrir , elles sont piquées dans cet endroit par les moucheron qui se sont élevés dans les figues d'hiver.

Dans les mois de Juin ou de Juillet , quand les vers qui se sont métamorphosés dans ces figues , sont prêts à sortir sous la forme de moucheron , les payfans les cueillent & les portent enfilés à des brochettes sur les figuiers domestiques , qui sont alors en fleuraison. C'est en cela que consiste le grand travail de la caprification : car si l'on attend trop tard , les figues printannieres tombent , & la plus grande partie du fruit des figuiers domestiques ne fait que languir. Les payfans Grecs vont tous les matins examiner leurs figuiers sauvages & domestiques , ils observent avec soin l'œil de la figue : car cette partie ne marque pas seulement le tems où les piqueurs doivent sortir , mais aussi celui où la figue peut être piquée avec succès. Ils transportent alors ces figues printannieres , sur les figuiers domestiques qui sont en état de les recevoir ; les moucheron métamorphosés qui sortent de ces figues , s'accouplent & entrent par l'ombilic dans les figues domestiques , qui sont alors grosses comme des noix , & en fleur ; ils y déposent non-seulement la poussiere fécondante des étamines d'autres figues d'où ils sortent , & dont ils sont couverts , mais encore leurs œufs ; & les insectes qui y éclosent donnent lieu aux figues domestiques de mûrir & de grossir ainsi successivement.

Les payfans connoissent si bien ces précieux momens de la caprification , qu'ils ne les laissent guere échapper. Il leur reste cependant encore une légère ressource , c'est de répandre sur les figuiers domestiques , les fleurs d'une plante qu'ils nomment *ascolimbo* ou *kolimo* ; il se trouve quelquefois dans les têtes de ces fleurs des moucheron propres à piquer ces figues ; ou peut-être que les moucheron de ces figues sauvages vont chercher leur nourriture sur ces fleurs. Cette caprification fait un effet si singulier , qu'un de ces figuiers domestiques qui donneroit à peine vingt cinq livres de figues mûres & propres à sécher , en donne plus de deux cents quatre-vingts livres. Il faut cependant avouer que la caprification fatigue les arbres , & que les figuiers , qui par ce moyen ont donné beaucoup de fruit dans une année , en donnent peu l'année suivante. Voilà tout le mystere de cette fécondation appelée *caprification*.

L'effet de la caprification est bien propre à piquer la curiosité. Si l'on ouvre en différens tems ces figues domestiques , on voit d'abord les moucheron qui se promènent çà & là dans l'intérieur de la figue : quelque tems après , on apperçoit que les pepins sont extrêmement gros , & en les ouvrant , on trouve qu'ils contiennent , (suivant l'expression de M. Godheu) des amandes vivantes , c'est-à-dire , qu'il y a intérieurement des vers qui se nourrissent des amandes des figues , ce qui prouve encore une nouvelle génération de ces insectes.

En ouvrant les figues lorsqu'elles approchent de leur maturité , on voit les mouchérons sortir des pepins , & aussitôt qu'ils ont séché leurs aîles , ils s'envolent.

Quand les poires nouent , il y a quelquefois des mouchérons qui déposent leurs œufs dans l'œil de ces jeunes fruits ; les vers qui en naissent entrent dans le fruit par le canal du pistil , & se nourrissent de ce qu'ils rencontrent. Ces poires grossissent beaucoup plus promptement que les autres , & elles tombent. Cette augmentation de grosseur vient-elle , dit M. Duhamel , de ce que le ver ayant détruit les organes qui vont au pepin , les sucres nourriciers se portent plus abondamment dans la chair du fruit ? ou cette grosseur dépend-elle d'une extravasation des sucres , comme il paroît par les galles qui naissent à l'occasion de la piquure des insectes ? C'est ce qui n'est pas encore bien décidé ; mais il semble qu'il y a quelque rapport entre ce qui arrive aux fruits verveux , & ce qui résulte de la caprification , d'autant que les figues caprifées ne sont jamais si bonnes que les autres. La chaleur du soleil ne suffit pas pour dessécher les figues caprifées , il faut les mettre au four qui leur donne un goût désagréable ; mais cette opération est nécessaire pour faire périr la semence vermineuse.

On est étonné de ne pas voir les Grecs multiplier davantage les figuiers que l'on élève en France & en Italie , & avoir constamment pendant deux mois la patience de porter les piqueurs d'un figuier à l'autre , pour recueillir de mauvaises figues. La raison en est , que comme c'est une de leurs principales nourritures , ils ne sauroient trop en avoir. Leurs arbres produisent jusqu'à deux cents quatre-vingt livres de figues , au lieu qu'ils en pourroient tirer à peine vingt-cinq livres des nôtres.

La *caprification* nous indique assez que les graines du figuier en général , de telle espèce qu'il soit , ne mûrissent pas sans la fécondation , quoique leurs figues ou les enveloppes de leurs fleurs mûrissent souvent sans ce secours. La manière dont se fait cette fécondation , est si singulière que quelques Auteurs la révoquent en doute ; néanmoins elle rentre , ainsi qu'on le vient de voir , dans les loix ordinaires & communes aux végétaux. L'on voit par ce détail , 1°. que la *caprification* des anciens Grecs & Romains , décrite par Théophraste , Plutarque , Pline & autres Auteurs de l'antiquité , se rapporte parfaitement à ce qui se pratique encore aujourd'hui dans l'Archipel & en Italie ; ils s'accordent tous à dire que les fruits du figuier sauvage , *caprificus* , ne mûrissoient jamais , mais qu'on les suspendoit aux branches des figuiers domestiques pour mûrir les leurs : 2°. qu'il est naturel de conclure que le principal objet de la caprification opérée naturellement par les ichneumons , est de féconder des graines qui n'auroient pas mûri sans ce secours , & par conséquent qui n'auroient point produit d'amandes propres à nourrir les petits de ces insectes , & à perpétuer leur race.

Dans les Provinces méridionales de ce Royaume où les figues sont un aliment très commun & très ordinaire pendant cinq mois consécutifs , il est de fait que ces fruits bien choisis dans leur maturité , sont un des meilleurs que

l'on puisse manger, & même des plus sains, lorsqu'on n'en mange point avec excès. L'eau que l'on peut boire ensuite, est la liqueur la plus propre à en délayer la pulpe dans l'estomac, & à remédier à une certaine viscosité incommode de la salive. Mais on y a aussi observé que les figues qui n'avoient pas acquis une maturité parfaite, qui contenoient encore un suc laiteux dans leur pédicule & dans leur peau, causoient très communément des dyssenteries & des fièvres : c'est ce que j'ai éprouvé par moi-même en 1762.

Les figues seches sont estimées pectorales & adoucissantes, à cause de l'espece de miel qu'elles contiennent. L'Italie, l'Espagne, le Languedoc, la Provence, & le Levant, font un commerce considérable de figues desséchées au soleil.

FIGUIER D'ADAM. Cette grande & belle plante, que l'on nomme *Plane* en quelques contrées, ne porte point ce nom aux Antilles, on l'appelle simplement *Figuier bananier*, si semblable au bananier simple, qu'à moins d'une grande habitude on ne peut les distinguer que par le fruit, qui dans le premier est le plus petit, & plus gros à proportion de sa longueur, la chair en étant d'ailleurs beaucoup plus délicate. Les Espagnols les nomment *Plantains*. Voyez BANANIER.

FIGUIER D'AMÉRIQUE, GRAND FIGUIER ou FIGUIER ADMIRABLE. Cet arbre, que l'on a confondu avec le paletuvier, n'a rien de commun avec lui, que la façon dont il se reproduit & s'étend à la ronde, au moyen de ses branches, qui en se recourbant, prennent racine, & forment de nouveaux troncs.

Le fruit de ce figuier est à-peu-près de la grosseur d'une noisette; du reste il ressemble exactement à la figue d'Europe, tant extérieurement qu'intérieurement; mais il a le goût un peu plus fade.

FIGUIER D'INDE ou NOPAL : voyez OPUNTIA.

FIGUIER DES INDES ou PARETURIER ou PALETUVIER, *Ficus Indica*. C'est un grand & gros arbre qui croît vers Goa aux Indes : il répand ses rameaux au large, d'où sortent des filaments semblables à ceux de la cuscute, & qui sont de couleur dorée. Lorsqu'ils sont parvenus à terre, ils y prennent racine & forment peu-à-peu autant de nouveaux arbres, qui produisent à leur tour de nouveaux filaments, & ainsi à l'infini; de sorte qu'un de ces figuiers multiplie tellement, qu'il remplit un grand pays d'arbres de son espece, aussi gros & aussi hauts que lui, formant une ample & épaisse forêt, qui produit beaucoup d'ombre. Les feuilles des jeunes rameaux sont semblables à celles du coing, vertes en dessus, blanchâtres & lanugineuses en dessous : elles servent de nourriture aux éléphants. Ses fruits sont de petites figues faites comme les nôtres, mais rouges, tant en dehors qu'en dedans, douces, & un peu moins bonnes à manger que celles de l'Europe : l'écorce de cet arbre sert dans le pays à faire des habillements.

On donne le nom de figuier d'Inde au *Chivef*, qui croît en l'Isle de Ziapangu, mais qu'on croît être une espece de *Papayer*. Voyez ces mots.

FIGUIER SAUVAGE. C'est le *figuier* cité par Barrere, sous le titre de *figuier venimeux*, *pougouli*. Cet arbre qui se trouve dans le pays de Cayenne, est rempli d'un suc laiteux, si caustique, qu'il cause des ulcères & des inflammations. Aussi les Sauvages prennent-ils la précaution de se couvrir le corps de feuilles quand ils coupent cet arbre, qui est très haut, rempli de piquants. Ses racines sont raboteuses, rampantes, & saillent de terre de manière qu'on croiroit que le tronc est monté sur des espèces d'arcs-boutans. Le bois en est mol & n'est d'aucun usage. C'est le *Comacai* des Portugais du Para. Voyez-en la description sous le nom de *Figuier sauvage*, dans les *Mém. de l'Acad. des Sciences*, ann. 1751, p. 324, & la fig. de sa feuille & de son fruit, pag. 332, pl. 18.

FIL DE LA VIERGE. Nom que le peuple donne à certains filaments blancs, & quelquefois assez épais, qu'on voit voltiger en l'air dans les jours d'été, pendant les grandes chaleurs : on croit que ce sont des toiles d'araignées emportées & dispersées par le vent, ou même de simples filaments très fins de l'espèce d'araignée appelée *Faucheux*. Ne pourroit-on pas encore soupçonner que parmi ces filaments aériens, il y en a beaucoup qui doivent leur origine au duvet de certaines plantes dont les feuilles & la tige sont cotonneuses. Voyez *ARAIGNÉE* & *SAULE*.

FIL DE MER. Voyez ce que c'est, à l'article *CORALLINE*, pag. 288.

FILANDRES. On appelle ainsi des vers petits & fort déliés, qui incommodent fort les faucons & quelques autres oiseaux, soit à la gorge, autour du cœur, soit au foie, aux reins, aux poumons, & qui quelquefois leur font du bien, en ce qu'ils se nourrissent de ce qu'il y a de superflu dans ces parties. On reconnoît que les oiseaux ont cette maladie lorsqu'ils bâillent fréquemment, qu'ils crient extraordinairement pendant la nuit, & qu'ils se frottent par-tout. On apperçoit facilement ces vermicules en ouvrant le bec de l'oiseau : ils montent au larynx & redescendent. On prétend que c'est la mauvaise nourriture qui donne aux oiseaux cette maladie : on les en délivre en leur faisant avaler une gousse d'ail.

FILARIA ou **PHYLARIA** ; *Phillyrea folio ligustri*. C'est un arbrisseau de moyenne grandeur, toujours verd & fort branchu, recouvert d'une écorce blanchâtre ou cendrée. On en connoît de beaucoup d'espèces, entr'autres une qu'on cultive dans les jardins, remarquable par ses feuilles panachées, dentelées en leurs bords, qui sont d'un beau verd, un peu semblables à celles du troërne ou du lentisque, & se conservent tout l'hiver. Elles sont opposées les unes aux autres ; caractère suffisant pour distinguer de cet arbrisseau l'alaterne, pour lequel les Herboristes le donnent souvent. Ses fleurs qui naissent vers les extrémités des feuilles, sont, suivant M. Fournefort, en entonnoir ou en godet divisé en quatre parties, de couleur blanche, verdâtre ou herbeuse, ressemblant un peu à celle de l'olivier. A ces fleurs succèdent des baies rondes, grosses comme celles du mirthe, noires quand elles sont mûres, d'un goût doux accompagné de quelque amertume, & disposées en petites grappes : on trouve dans chacune de ces baies, un petit

noyau rond & dur. Le bois du filaria est médiocrement dur, & a une couleur jaune approchant un peu de celle du buis, mais qui se passe assez promptement : il ne devient point assez gros pour être un bois de service. Ses feuilles & ses baies sont astringentes & rafraîchissantes. Ses fleurs pilées dans du vinaigre ; & appliquées sur le front, sont céphaliques.

Le filaria croît abondamment dans les haies & les bois aux environs de Montpellier. Il fleurit en Mai & Juin, & son fruit est mûr en Septembre. Comme son feuillage est toujours verd & qu'il garnit beaucoup, on en fait aisément des berceaux ou cabinets de verdure, & des palissades qui sont fort agréables. Il s'élève facilement de graine ou de bouture. On le tond comme l'on veut, en buisson ou en boule, en haie, en espalier, quelquefois même on le met en caissé.

FILICITE, *filicites*. On donne ce nom aux pierres qui portent l'empreinte d'une fougere.

FILICULE. Plante qu'on met au rang des capillaires, & dont on distingue plusieurs especes. Elle croît dans les terres humides, entre les buissons & sur la base du tronc de quelque chêne. Elle est estimée apéritive & pectorale. *Voyez l'article FOUGERE.*

FILIPENDULE, *filipendula*. Plante fort commune dans les bons terroirs, même dans les bois & les endroits pierreux de la France. Sa racine est charnue : elle s'étend en beaucoup de fibres déliées, auxquelles sont pendues plusieurs tubercules ou petits glands qui ont la figure d'une olive allongée ; de couleur noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans ; d'un goût âcre, astringent, mêlé de douceur avec un peu d'amertume. Ses feuilles ressemblent à celles du boucage, mais elles sont plus découpées : leur saveur est styptique, un peu salée : elles sont odorantes & gluantes. Sa tige est quelquefois unique, haute d'environ un pied, dure, cannelée, ronde, rougeâtre & branchue. Elle porte en son sommet des fleurs comme disposées en parasol, en rose, blanches en dedans, rougeâtres en dehors, odorantes, portées sur un calice dentelé ou frangé. Il leur succède un fruit presque sphérique, composé d'environ douze graines, qui sont rudes, applaties, ramassées en maniere de tête, & rangées comme les douves d'un petit tonneau. Cette tête s'attache aisément aux habits.

Les racines & les feuilles de filipendule sont d'usage en Médecine : elles sont incisives & diurétiques. La poudre des racines est très usitée pour les hémorrhoides, les fleurs blanches & les maladies scrophuleuses.

Il est parlé de la filipendule aquatique sous le nom d'*œnanthe*. Voyez ce mot.

FILLE : voyez à la suite de l'article HOMME.

FILLES D'ARTICHAUX. On appelle ainsi les œilletons que l'on prend au pied des artichaux. Voyez ce mot.

FILONS ou VEINES METALLIQUES, *Vena metallica*. On donne ce nom à de gros rameaux qui courent sous terre, & sont remplis de substances minérales ou métalliques, quelquefois de cristallisations : quelquefois aussi

les filons sont vuides. Le filon est, dans le langage du Mineur, la principale veine de la mine : il ne faut pas le confondre avec les fibres ou vénules qui forment de très petites ramifications ; ainsi l'interruption d'une roche dans son lit qui se trouve remplie de matieres minérales, forme une veine solide qui s'appelle *filon*. Souvent les filons sont profondément ensevelis en terre, & il en part des branches qui se subdivisent en vénules ou veines, selon la quantité & le diametre des crevasses ou fibres souterraines.

On peut considérer les filons eu égard à leur direction, à leur volume ou à leur matiere. Les Mineurs considèrent la direction des filons ou leur situation, par rapport aux quatre points cardinaux ; la boussole la détermine : mais quand le filon est encore inconnu, on devine cette direction par celle des couches ou des lits des rochers qui servent d'enveloppe aux filons.

La situation des filons, quant à l'horison, varie aussi. C'est une autre attention des Mineurs ; & c'est ce que l'on peut appeller l'*inclinaison* ou *chûte des filons*. On la détermine par le quart de cercle : plus les filons approchent de la perpendiculaire, plus ils sont gros & riches. Les filons qui marchent horizontalement, sont, pour l'ordinaire, pauvres. Il y a différentes mines où ils ont la même inclinaison que les couches de la terre qui les recouvrent, à moins que quelque obstacle ne vienne à interrompre leur direction & leur parallélisme. Ces obstacles sont, dans les mines de charbon, &c. des roches formées tout-à-coup, qui viennent couper à angles droits, ou obliquement, ou en tous sens, non-seulement le filon, mais encore les lits de terre & de pierre qui sont en-dessus ou en-dessous. Les morceaux de mines ont dans ces endroits une couleur de gorge de pigeon, ou ornés des différentes couleurs de l'arc-en-ciel. La couche de terre supérieure, s'appelle le *toit de la mine* ; & celle qui est en-dessous, le *sol* ; de même la partie du filon qui s'approche de la surface de la terre, s'appelle la *tête* ; celle qui s'en éloigne, se nomme la *queue* : celle-ci est plus riche.

Le volume ou la force du filon se détermine par sa masse & par son étendue. La Nature n'a point produit de regles constantes à cet égard. Il y a des lieux où le filon finit tout à-coup ; d'autres fois il est interrompu par une vallée ou par une rivière ; mais il paroît au côté opposé, & souvent il est suivi pendant plusieurs lieues. Il y a des endroits où le filon n'a que quelques pouces de largeur, & ailleurs il offre un ventre de plusieurs pieds, & même de plusieurs toises. Ici c'est un filon dilaté : là c'est une masse énorme qui s'enfonce comme un abysme & qui remonte plus loin.

La richesse du filon dépend de la quantité du minéral qu'il contient. En certains lieux, le minéral remplit tout le filon ; d'autres fois il est par rognons ou par masses. Dans quelques endroits on trouve des pierres stériles & poreuses ; ailleurs des fluors, des trusens, des mines diversement décomposées ou détruites par des eaux ou par les exhalaisons souterraines & minérales. C'est en raison de leur volume, que les filons sont avantageux : plus il en part de vénules qui s'y rendent ou y aboutissent, plus le filon est riche, & plus on doit le suivre.

La matiere ou le produit du minéral est la quantité du métal même qu'on tire des glebes par les opérations métallurgiques. Les matieres hétérogenes, & les substances sulfureuses ou arsenicales qui se trouvent dans les mineraux, font varier ce produit. Aussi les filons sont-ils réputés précieux & nobles, ou communs, ignobles & stériles, selon qu'ils contiennent plus ou moins de blends, de pyrites, de cristallisations, &c. *voyez* l'article MINE. On peut consulter sur toutes ces matieres, les Ouvrages de MM. Schlutter, Lehman, Cramer, Agricola, &c.

Observations sur les Filons.

1°. Les mines en filons sont ordinairement plus riches que celles qui sont par couches. 2°. On peut distinguer les filons, en *filons continus*, en *filons foibles*, en *filons perdus*, en *filons retrouvés*. 3°. La roche est entiere, lorsque le lit qu'elle forme ou fournit au filon, n'est point séparé, interrompu par des fentes ou des coupures, ni par des ouvertures. 4°. On appelle les espaces vuides, *fentes*; & les coupures tapissées de cristallisations, de quartz ou de spath, *nids de drusen*. 5°. S'il y a dans ces fentes des matieres de mines métalliques avec des vuides, ce sont des fentes nobles qui indiquent la proximité d'une bonne mine. 6°. S'il coule de l'eau par ces fentes, & des eaux depuis la surface de la terre en dedans, ce sont des fentes stériles où il ne faut jamais chercher de métal. 7°. Si la filtration des eaux est intérieure, leur goût & leur couleur, même le *gühr* qu'elles produisent, soit par inhalation ou par dépôt, annonce souvent la nature du minéral; & on nomme alors ces fissures, des *fentes aqueuses*. 8°. Si les fentes sont remplies de terre glaise ou marneuse, le minéral est encore bien éloigné; & ces fentes sont appelées *fentes terreuses*. 9°. La fente est réguliere lorsqu'elle conserve sa direction; & on la nomme *irréguliere* lorsqu'elle en change. 1°. Quand plusieurs fentes aboutissent à une seule, ou s'y dirigent, celle-ci est capitale; & c'est vers celle-ci qu'il faut chercher le minéral: *voyez* l'article FENTES MINÉRALES.

On donne encore aux filons d'autres dénominations, qui sont communément usitées aujourd'hui dans la plupart des mines: savoir, *filons pleins*, lorsqu'ils occupent tout l'espace de la fente sans interruption; *filons en grenaille*, quand le minéral est en grains comme du sable: on appelle *filon plat*, celui qui est parallele à l'horison; *filon profond*, celui qui est vertical & qui s'enfonce dans la montagne; & s'il est oblique, il tire son nom de celui dont il approche le plus. On dit enfin que le filon est dévoyé, & du nombre de degrés que son angle fait avec le plan horisontal ou avec le vertical.

Tous les filons sont ordinairement inclinés, & rarement perpendiculaires: ils sont accompagnés d'une écorce ou lisiere de la roche, qu'on appelle *Salband*. *Voyez ce mot.*

La partie supérieure du filon se nomme *toît*, & l'inférieure prend le nom d'*appui*. Lorsque dans cette lisiere on apperçoit du spath, c'est une preuve que le filon, si on le suit, deviendra plus riche. Si on y apperçoit des gerçures

cures ou des fentes remplies de quartz ou de cristallisations en trop grand nombre, les espérances diminuent.

Nous avons dit que c'est par le quart de cercle qu'on détermine la situation des filons, eu égard à la ligne verticale ou perpendiculaire : on les appelle donc *perpendiculaires* ou *droits*, s'ils s'enfoncent vers le centre de la terre : on les regarde comme horisontaux ou couchés, si l'angle qu'ils font avec la ligne horisontale est au-dessus de vingt degrés : on les nomme *plats*, entre le vingtième & le soixantième degré ; & *obliques* ou *inclinés*, entre le soixantième & le quatre-vingtième.

La direction ou situation des filons, par rapport aux quatre points cardinaux du monde, est divisée en vingt-quatre parties égales ou degrés, qu'on nomme *heures*. Pour les reconnoître, on fait usage de la boussole manuelle ou minéralogique, que les Allemands appellent *berg-compass*. Quoique garnie d'une aiguille aimantée, elle diffère de la boussole vulgaire, & elle ne sert qu'à montrer l'espace des filons & leurs degrés d'inclinaisons : elle est figurée dans Lehman. On appelle *filon debout* celui qui court depuis douze heures jusqu'à trois : ceux dont le cours est dirigé depuis trois jusqu'à six, prennent le nom de *filon du levant* ou *du matin* ; ceux qui vont de six à neuf, sont appelés *filons du soir* ou *du couchant* ; enfin, ceux qui vont depuis neuf jusqu'à douze, sont les *filons inclinés*. Mais comme il y a quantité de circonstances qui viennent dégrader le filon principal ou lui font changer de direction, il est très essentiel de connoître toutes ces choses par la pratique, pour ne pas se méprendre, & entreprendre les travaux d'une exploitation infructueuse. Voyez les Ouvrages qui ont été publiés à cet effet, & particulièrement les *Traité de Physique, d'Histoire Naturelle & de Minéralogie* de M. Lehman.

La meilleure disposition d'un filon, par rapport aux Mineurs & à l'Entrepreneur, est, quand un filon est profond, parcequ'on y trouve de la matière de tous les côtés, & qu'on l'exploite par puits & par galeries.

FIMPI. Est un arbre de l'Afrique, de la grandeur de l'olivier, dont l'écorce est légèrement aromatique, musquée, mais d'une saveur plus mordicante que le poivre. Les Portugais l'appellent *Bois d'Aguilla*.

FIONOUTS. Est une plante particulière à l'Isle de Madagascar : elle a l'odeur du melilot, & la vertu de faire tomber le poil des parties où elle est appliquée. On brûle le fionouts, & on se sert de ses cendres pour déterger les plaies amenées à suppuration.

FIRMAMENT. On appelle ainsi le huitième ciel, cette huitième sphère de couleur bleue où les étoiles fixes paroissent attachées. On dit *huitième ciel* par rapport aux sept ciels des planètes qu'il environne. Les étoiles ne sont attachées à aucune surface sphérique : c'est notre imagination & nos sens qui se trompent là-dessus. Voyez les articles CIEL & ÉTOILE à la suite du mot PLANETE.

FLAMAND ou FLAMBANT, ou PHœNICOPTERE. Voyez BECHARU.

FLAMBEAU ou FLAMBO. Nom d'un poisson qui est le *Tania* d'Arif.

tote , le *Vitta* des Latins , & que l'on a nommé aussi *Ruban* , parcequ'il est effectivement long & étroit comme une bande de ruban. On lui a donné en Languedoc le nom d'*Espace* , c'est-à-dire *épée* , à cause de sa figure ; & celui de *flambo* , parcequ'il est de couleur de feu. Sa tête est plate, composée de plusieurs os : ses yeux sont grands & ronds , & sa prunelle est petite. Près des ouies il a une nageoire de chaque côté ; & sur le dos il a , depuis la tête jusqu'à la queue , des filets qui sont comme des poils. Ce poisson est si mince , qu'en le regardant au jour , on voit ses arrêtes le long du dos. Il y en a une espece dont la chair est blanche & a le goût de la sole.

FLAMBEAU DU PEROU. Voyez CIERGE ÉPINEUX.

FLAMBE BLANCHE. Voyez IRIS.

FLAMBERGENT ou HIMANTOPE , ou PIE DE MER. Voyez BÉCASSE DE MER.

FLAMBOYANTE. Est une coquille de la classe des *univalves* & du genre des *volutes*. Voyez ces mots. Sa clavicule est fort élevée , & les zones qui la distinguent sont d'une belle couleur aurore , un peu foncée.

FLAMME. On appelle ainsi ce corps subtil , léger , lumineux & ardent , qu'on voit s'élever au-dessus de la surface des corps qui brûlent. La flamme qui est la partie du feu la plus brillante & la plus subtile , est formée par les parties volatiles du corps brûlant. Voyez FEU.

FLAMMETTE ou POIVRÉE. Nom donné , sur le bord des mers de France , à une espece de *Came* , dont le poisson enflamme la bouche quand on le mange. C'est une sorte de *Lavignon*. Voyez ces mots.

FLECHE D'EAU , *Sagitta aquatica major*. C'est une espece de *Renoncule de marais*. Voyez ce mot. Ses feuilles sont pyramidales comme une fleche.

FLECHE DE MER. Voyez DAUPHIN , à l'article BALEINE.

FLECHES DE PIERRE , *Sagitta formes*. Les Lithologistes donnent ce nom ou aux *Belemnites* , ou aux *Pyrites* pyramidales , & quelquefois à des pierres très dures qu'on trouve taillées sous cette forme , & dont les Anciens se servoient en guise de traits. Ils avoient aussi l'art de tailler ces pierres sous d'autres formes.

FLETAN ou FAITAN , *Hippoglossus*. C'est un poisson plat & large , qu'on trouve sur les côtes de l'Océan. On peut , dit-on , le regarder comme une *Plie* ou une *Limande* , ou une *Sole cétacée* , puisqu'on en prend dans la mer d'Allemagne qui pèsent cent vingt livres : l'on en prend aux environs de l'Islande qui pèsent jusqu'à quatre cents livres. Son aspect a quelque chose d'effrayant : sa bouche est armée , tant en haut qu'en bas , d'un double rang de dents , un peu courbées en dedans , & fort pointues. Sa langue est très forte , roide , & hérissée au fond du palais de quantité de petites dents également pointues : ses ouies ont de pareils piquants , & par-dessus , trois couvercles ou oreilles. Ce poisson est sans écailles , & nage à plat : il est trop mince pour se mouvoir en arriere , de côté , en avant , aussi facilement que d'autres poissons de la même longueur. On trouve dans l'estomac

de cette *plie* énorme , des harengs & des poissons non totalement digérés , mais tout déchirés par le nombre de pointes dont nous avons parlé ci-dessus. Son corps est tout environné de nageoires : sa figure extérieure , ses rames , ses entrailles , tout lui est commun avec les *plies* ; il manque également de la vessie propre à contenir l'air : ce défaut rend cette espece de poissons incapable de s'élever beaucoup dans l'eau & de nager loin. On remarque encore dans le flétan , cette peau que la Nature a donnée à tous les poissons mauvais nageurs de cette espece , & qu'ils mettent devant leurs yeux , comme un voile , pour les garantir contre les aspérités du sable lorsqu'ils s'y enterrent pendant la tempête , pour ne pas être balottés par les flots.

Ce poisson est assez commun à Anvers. Sa chair est de bon goût , mais trop grasse pour qu'on la puisse digérer facilement. Dans la Basse-Saxe , on prépare , avec les nageoires du flétan , qu'on coupe bien avant dans le dos avec la graisse , & qu'on sale un peu , une espece de manger qu'on nomme *raf* ou *rekel* , mais qui n'est guere en usage que pour les gens du peuple , dont l'estomac est robuste. Cet aliment incommoderoit les riches , dont la délicatesse affoiblit le tempérament. Pour conserver long-tems le *raf* , on le laisse sécher au vent. Les Norwégiens préparent le meilleur *raf*. Ils pêchent le flétan pendant la nuit , & immédiatement après la pêche du *cabeliau*. Ce travail dure jusqu'à la fin de Juin. Les François qui font des expéditions pour la pêche de la morue , préparent aussi du *raf* avec les nageoires ou des bandes longues de graisse & de peau qu'ils coupent aux flétans qu'ils pêchent sur les bancs de Terre-Neuve : ceux-ci sont plus petits que ceux du Groënland. Le flétan ne feroit-il pas une espece de *Raye* ?

FLETELET. Voyez FLEZ.

FLEUR , *Flos*. Les fleurs sont des productions des *plantes* , qui se changent en fruits après avoir satisfait notre vue par la vivacité & la diversité de leurs couleurs , & avoir flatté notre odorat par les parfums qu'elles exhalent dans l'atmosphère.

L'idée que Césalpin avoit sur la nature des fleurs , est assez singulière pour mériter qu'on en fasse mention ici. Ce Botaniste regardoit le calice des plantes parfaites , comme une expansion de l'écorce extérieure & grossière des branches ; la corole , comme l'expansion de l'écorce intérieure ; les étamines , comme un prolongement des fibres du bois ; le pistil , comme une expansion de la moëlle de la plante : mais à ne consulter que ce qui sera dit ci après de l'organisation de ces parties , on verra que cette idée n'est pas tout-à-fait exacte.

La fleur est composée de trois parties. La première est l'enveloppe appelée *calice* par les Botanistes : c'est elle qui soutient les fleurs & les conserve dans cet arrangement qui est propre à chacune. La seconde est le feuillage appelé *pétales* : il est composé de feuilles de toutes couleurs. La Nature a destiné ces feuilles à couvrir le cœur de la fleur , & à le mettre à l'abri des injures de l'air ; mais à l'aspect du soleil , elles s'épanouissent ordinairement.

La troisième partie est le *cœur* : c'est la partie la plus précieuse de la fleur ; il est composé des *étamines*, du *pistil* & des *sommets*.

Les fleurs peuvent être divisées en *fleurs en feuilles* & en *fleurs à étamines*. Les premières sont celles qui, outre les étamines ou filets chargés de sommets, sont encore composées de ces parties qu'il faut appeler *feuilles de la fleur* ; telles sont les fleurs de la *renoncule*, du *chou*, de la *paquerette*. Les secondes sont celles qui n'ont point de feuilles, mais seulement des étamines ou filets chargés de sommets : telles sont les fleurs de la *prêle*, de l'*avoine*, de l'*arroche*, &c. Presque toutes les fleurs à étamines ont un calice, si on en excepte le *ruban d'eau* & la *queue de cheval*.

On peut donc considérer les fleurs ou comme simples, ou comme composées. Les *simples* sont celles qui ne renferment qu'une seule fleur dans le calice ; telles que sont les fleurs de la *jusquiame*, de la *sauge*, du *cerisier*, &c. Les fleurs *composées* sont celles qui sont effectivement composées d'autres fleurs : on les appelle *fleurs à fleurons* & à *demi-fleurons* ; telle est l'*aubifoin*. Voyez l'*exposit. caractérist. des fleurs composées*, par M. le Francq de Berkey, impr. à Leyde, in-4°. avec fig.

Les Botanistes distinguent encore les fleurs, en *solitaires*, en *fleurs en tête*, en *fleurs en ombelles*, en *fleurs en corimbe*, en *verticillées*, en *fleurs en épis*, ou en *pannicule*, ou en *grappe*, ou en *fleurs écailleuses* ; &c.

Il y a dans la disposition des fleurs quelques difficultés qui ne sont pas bien éclaircies, sur-tout à l'égard des *épis*, *pannicules*, *grappes*, *ombelles* & *corimbe* (Voyez ces mots dans le tableau alphabétique de l'article PLANTES). Quant à la situation des fleurs, les unes se trouvent répandues sans ordre sur la plante, le long des branches ou du tronc, comme dans plusieurs fougères ; les autres sont aux aisselles des feuilles ou des branches, ou opposées aux feuilles ; d'autres terminent le bout des tiges ou branches.

M. Adanson observe judicieusement qu'on induit trop souvent en erreur les Etudiants en Botanique, lorsqu'on leur dit que nombre de plantes, tels que le *musa*, la plupart des genres de la famille des *jujubiers*, &c. ont des fleurs mâles mêlées avec des femelles. Toutes leurs fleurs sont hermaphrodites ; mais une partie avorte étiolée par les autres qui en absorbent les suc ; & ces plantes n'ont pas plus de fleurs mâles que les *abricotiers*, les *pêchers*, & tant d'autres arbres qui laissent tomber toutes celles qu'ils ne peuvent nourrir. On doit regarder comme *fleurs mâles*, celles qui ont quelques parties du sexe masculin, telles que les *anthers* ou les filets des *étamines* ; comme *femelles*, celles qui ont quelques parties du sexe féminin, telles que l'*ovaire*, le *stile* ou *stigmat* ; comme *hermaphrodites*, celles qui ont quelques portions de ces deux parties ; comme *neutres*, celles qui n'ont absolument que la corolle ou le calice, sans aucune apparence d'organes sexuels, telles que quelques *bissus* ou *champignons*.

Les fleurs hermaphrodites, ainsi que les fleurs mâles & les femelles, peuvent être stériles ; & il ne faut pas confondre les fleurs stériles avec les

neutres. Une fleur stérile, continue M. Adanson, doit avoir au moins une des deux parties sexuelles, & peut les posséder toutes deux ensemble; au lieu que la fleur neutre ne peut & ne doit en avoir aucune: ainsi la fleur hermaphrodite peut être *fertile*; & si elle avorte, elle devient *stérile*. Voyez l'article *SEXE*, dans le tableau alphabétique du mot *PLANTE*; voyez aussi l'article *HERMAPHRODITE* de ce Dictionnaire, & le *Discours sur les amours des plantes*, par M. Pinard, Professeur de Botanique & Membre de l'Académie des Sciences de Rouen.

De cette distinction il résulte que parmi les fleurs, il s'en trouve qui, n'étant pas des hermaphrodites fertiles, c'est-à-dire, ne renfermant pas dans une même enveloppe les deux sexes parfaits pour se féconder réciproquement, alors elles ne peuvent pas produire du fruit. Quelquefois les fleurs d'une plante entière ou d'un arbre, sont unisexes, c'est-à-dire, ou toutes mâles ou toutes femelles: celles-ci ne peuvent être fécondées, c'est-à-dire, produire du fruit ou de la graine, qu'en recevant auparavant dans leur stigmate, la poussière prolifique qui se trouve sur les étamines des fleurs mâles de la même espèce. Ces fleurs mâles ne produisent point de fruit après leur chute: elles sont à cet égard ce que les animaux sont à l'égard de leurs femelles; celles-ci n'engendrent point qu'elles n'aient été fécondées par les mâles. Nous avons trop d'exemples sous les yeux de cette merveille dans les plantes, pour insister plus long-tems; il suffira de lire les articles du *figuier*, du *dattier*, du *chanvre*, du *pistachier*, du *châtaignier*, du *houblon*, du *coudrier*, &c. pour être instruit comment certaines plantes sont stériles, & les moyens de les faire fructifier.

Combien de plantes ont les fleurs bisexes, c'est-à-dire des fleurs de deux sexes, dont les mâles sont sur des pieds différents de ceux des femelles, ou seulement séparées sur le même pied! Qui ignore que les fleurs & les végétaux mêmes peuvent varier à l'infini, lorsque la poussière qui tombe des étamines d'une plante, vient à être portée par le vent sur le pistil d'une fleur d'une autre espèce ou de différente couleur? C'est ainsi qu'en 1751, M. Linnæus (*Dissert. de Plantis hybridis*) a cru reconnoître que la *Pimpinella agrimonoides* est une nouvelle espèce de plante née de la pimprenelle commune, fécondée par la poussière de l'aigremoine: il ajoute que le *nymphoïdes* paroît reconnoître pour pere le menyanthe, & pour mere le nenuphar: le *datisca* a eu de même pour pere le chanvre, & pour mere le reseda, &c. &c. Ces exemples de changements, causés par des fécondations étrangères, se multiplieront certainement à mesure qu'on sera plus attentif à les observer, ou qu'on voudra se les procurer en fécondant une plante femelle par une espèce différente, comme il est dit ci-dessus. M. Adanson dit à cet égard, qu'on pourroit essayer de féconder le ricin par le tithymale, le chanvre par le houblon, l'ortie par le murier, le faule par le peuplier, &c. Tout le monde fait qu'en coupant toutes les étamines d'une tulipe rouge avant l'émission de leur poussière, & qu'en poudrant le stigmate de cette même plante avec les étamines d'une autre tulipe blanche, les graines de

cette tulipe rouge produisent des tulipes dont les unes sont rouges , les autres blanches ; d'autres blanches , rouges & marbrées : de même que deux animaux de même espèce transmettent leurs couleurs aux animaux qu'ils engendrent. Ce que nous venons de dire des tulipes , peut aussi s'appliquer aux anémones , aux jacinthes , aux renoncules , &c.

On observe que les fruits ou la graine qui succèdent aux fleurs purement femelles , naissent pour l'ordinaire en un autre endroit que la fleur , différemment en cela des fleurs hermaphrodites fertiles , dont le fruit naît communément dans le calice de la fleur qui l'a précédé. Il y a une infinité de détails répandus à ce sujet dans le corps de cet ouvrage , aux articles qui nous présentent ces sortes de phénomènes.

Nous répétons , car on ne peut trop le dire , qu'il suffit pour que la fécondation s'opère , que la moindre parcelle de la matière contenue dans la poussière des étamines , soit répandue sur le stigmate du pistil. On sait que l'ovaire ou son style & son stigmate , sont percés d'un bout à l'autre , même très sensiblement dans plusieurs liliacées , dans le baobab , l'herbe maure , & quelques autres plantes ; mais il y en a beaucoup plus où ils sont fermés & pleins. Cela seul suffiroit pour prouver que ce n'est pas l'intromission de la poussière des étamines , qui opère la fécondation , ni qui porte le germe dans les ovaires , s'il n'étoit pas connu par des observations microscopiques , que l'embryon se trouve tout formé dans les graines des plantes qui n'ont pas été fécondées , & dont le parenchyme ne fait qu'un corps continu avec lui ; de la même manière que le fœtus se trouve tout formé dans les œufs de la grenouille & dans ceux de la poule avant la fécondation , selon les observations de Malpighi , de M. Haller , & de plusieurs autres Anatomistes modernes aussi célèbres. La fécondation , dit l'Auteur des *Familles des plantes* , s'opère donc dans les végétaux & les animaux , par une vapeur comme spiritueuse volatile , à laquelle la matière prolifique sert simplement de véhicule , cette vapeur aussi ténue sans doute & aussi animée , aussi prompte que celle qui enveloppe les corps électriques , s'insinue , selon le même Auteur , dans les trachées qui se terminent à la surface des stigmates , descend au placenta lorsqu'il y en a , passe de-là aux cordons ombilicaux jusques dans chaque graine où elle donne la première impulsion , le premier mouvement ou la vie végétale à l'embryon qui est d'abord comme invisible , & qui peu après sa vivification , paroît comme un point verdâtre dans les uns , & blanc dans d'autres.

L'on voit par tout cet exposé , 1°. que les moyens dont la Nature se sert pour procurer la fécondation dans ces plantes , varient comme leurs mœurs & comme la structure de leurs parties : 2°. que deux plantes unisexes , l'une mâle & l'autre femelle , naissent de graines recueillies sur le même pied : 3°. que les fleurs mâles fleurissent en même-tems que les femelles ou avant ; & que les étamines des hermaphrodites fertiles ou bien conditionnées , s'ouvrent lorsque les pistils sont en état de recevoir leurs poussières. Les fleurs ne s'ouvrent communément que dans les beaux tems , & si dans cet état , le

tems menace de pluie avant que la fécondation soit achevée, alors elles se ferment pour en garantir les étamines & le stigmate, ou même pour les préserver de l'humidité de la nuit; il n'y a que celles dont les étamines sont couvertes, qui ne se ferment pas la nuit; enfin, toutes se ferment dès que le pistil a reçu la poussière des étamines: 4°. que les étamines des fleurs hermaphrodites sont courbées sur le stigmate du pistil; dans les plantes bifexes androgynes, les fleurs mâles sont communément placées au-dessus des femelles, comme dans le mays, le typha, le mancenilier, le figuier, &c. cependant il y en a beaucoup qui ont les mâles placées au-dessous, comme dans le ricin, le buis, le manihot, le pin, &c. & c'est le vent qui porte leur poussière sur les femelles qui sont au-dessus: 5°. qu'en général les étamines & les stigmates observent respectivement le degré de hauteur & de situation nécessaire pour se féconder dans le tems de la fleuraison, &c.

Nous considérerons maintenant les fleurs dans leur *origine*, leur *culture*, leur *multiplication*, leur *conservation*, leur *destination*, &c.

Origine des fleurs.

Tout le monde fait que les fleurs proviennent ou de plantes ou d'oignons, & que tous les oignons & la plupart des plantes tirent leur origine des graines; mais dans les paragraphes suivants nous indiquerons des moyens par lesquels on fait venir différentes sortes de fleurs plus promptement que de leurs graines. Les Jardiniers-Fleuristes n'appellent fleurs que celles qui servent d'ornement & de décorations aux jardins, tels sont les œillets, les tulipes, les renoncules, les anémones, les tubéreuses, &c. Ce qu'il y a de singulier, c'est que nous n'avons point de belles fleurs, excepté les œillets, qui originellement ne viennent du Levant: mais aujourd'hui il ne faut plus aller à Constantinople pour admirer les fleurs; c'est dans les jardins de nos Curieux qu'il faut voir leur étalage successif, & en apprendre la culture: voyez aussi l'article PLANTES.

Culture des fleurs.

C'est sur des couches, sur des planches, dans des pots, & dans les plattebandes des parterres, qu'on sème & qu'on élève des fleurs provenues de *graines hâtives*, & dont la bonté se reconnoît à leur pesanteur qui les fait aller communément au fond de l'eau. La meilleure saison de semer, est depuis Mars jusqu'en Septembre. On sème à quatre doigts d'intervalle. Si c'est une terre meuble & facile à percer, on recouvre la graine d'un doigt de la même terre: si on sème sur couche (lorsque le fumier a perdu sa grande chaleur), on la recouvre de deux doigts de terreau. On sème sur la fin d'Août ce qu'on veut replanter avant l'hiver. On a soin d'arroser tous les jours avec de l'eau échauffée au soleil, & de couvrir les graines d'un doigt de paille longue; mais quand elles sont levées, il faut les découvrir, & toutefois les

garantir des gelées par des paillassons en dos d'âne. Si on plante des *oignons de fleurs*, il faut creuser la terre à un pied de profondeur, ensuite cribler de la terre maigre & légère sur la couche en quantité suffisante pour remplir les sillons ou rigoles, puis unir le tout avec un rateau, & y placer les oignons dans une distance proportionnée, & à quatre doigts sous terre. Autour des bordures on peut mettre des anémones ou des tulipes; mais point de renoncules, car elles demandent à être seules, tant en pleine terre que dans les pots.

Il faut être exact à sarcler dans le tems où la rosée tombe, parcequ'on arrache mieux alors les racines des plantes inutiles; il faut aussi avoir grand soin de faire la guerre aux limaçons, aux perce-oreilles & autres insectes qui rongent les plantes.

On transplante les fleurs dans le printems & dans l'automne en pleine terre ou dans des pots; mais on ne transplante qu'après la seconde année les oignons qui viennent de graines: on les met alors en bonne terre neuve & légère, & on a des fleurs à la troisième année.

Pendant l'hiver, pour garantir les fleurs du froid, on les met dans une serre aérée: on les doit arroser légèrement après le lever du soleil. Dans l'été, il faut les défendre du trop grand soleil, & ne les arroser qu'après le soleil couché. Il faut que les plates-bandes soient toujours élevées vers le milieu, & que les pots soient percés par le fond, afin que l'eau s'écoule, & ne pourrisse pas, par son séjour, le pied des plantes. Au défaut de pots, on peut se servir de caisses plates & portatives, dont le fond ait été percé de plusieurs trous de tarière, & couvert de deux pouces de charbon de terre ou d'autres matières poreuses; les petites caisses sont très commodes, elles font un berceau pour l'enfance des fleurs. Il est digne de remarque que la plupart des fleurs doublent facilement par la culture, sur-tout dans le *rosier*. On peut même faire éclore en hiver & le jour que l'on veut la fleur d'une plante: pour cela, on choisit sur la tige, dans le tems que les dernières fleurs paroissent, les boutons les mieux formés & prêts à s'ouvrir: on les coupe avec des ciseaux, observant de leur laisser une queue fort longue. On bouche l'endroit coupé avec de la cire, on laisse faner les boutons, puis on les enveloppe chacun à part dans un papier sec, & on les serre ainsi dans une boîte. Enfin, lorsqu'on veut jouir de la fleur, il suffit de couper dès la veille le bout garni de cire, & de le mettre dans un vase qui contiendra de l'eau chargée d'un peu de nitre, le lendemain on verra les boutons s'ouvrir, s'épanouir, briller de leurs vives couleurs & reprendre leur odeur naturelle.

On ne manque pas d'ouvrages sur la culture des fleurs; entr'autres, Ferrarius de *Florum cultura*, Amsterdam 1648, in 4°. Morin, *Traité de la cult. des fleurs*, Paris, 1658, in-12. Liger, le *Jardinier fleuriste*, Paris 1705: le *Jardin de la Hollande*, Leyde 1724, in-12. Miller, *Dictionn. du jardinage*; indépendamment de quantité de Traités généraux. On ne manque pas encore d'instructions sur la culture de quelques fleurs particulières, comme des œillets, des tulipes, des oreilles-d'ours, des roses, des tubéreuses, &c.

Enfin

Enfin personne n'ignore que la passion des fleurs , & leur culture , a été poussée si loin en Hollande dans le dernier siècle , qu'il a fallu des loix de l'Etat pour borner le prix des *tulipes*. Voyez ce mot.

Multiplication des fleurs.

On multiplie les fleurs par différents moyens : 1°. par les *rejettons* ou *surgeons* qui sortent du pied d'une plante , mais avec des racines : ils reprennent aisément , & ce sont autant de nouvelles plantes. 2°. Par les *provins*, qui sont des branches qu'on couche en terre , sans les séparer de leur mere-branch. 3°. Par *marcottes*, qui sont de jeunes branches , belles & fortes , qu'on fait tenir sur la plante qu'on veut marcotter , en y faisant une incision par le milieu jusqu'auprès d'un nœud ; on tient l'incision ouverte par quelque brin de paille , puis on la couvre de quelque peu de terre , & on l'y arrête , de peur qu'elle ne se releve. Dès que la marcotte a pris racine , on la coupe , pour la séparer de la mere-plant. 4°. Par les *boutures*, qui sont des boutons qu'on prend sur quelque plante ou arbruste , & qu'on fiche en terre sans autre apprêt : on doit chercher les plus vives , les tailler par le bout en pied de biche , les laisser tremper quelques jours dans l'eau , & les planter toutes fraîches ; c'est un moyen pour qu'elles produisent promptement des racines. 5°. Par les *tales*, c'est une maniere de multiplier propre seulement aux fleurs , & qui se pratique en éclatant leurs plantes en racines. 6°. Par les *cailleux* & *œilletons*, qui sont certains bourgeons que quelques plantes poussent de leurs pieds pour se régénérer. Voyez ces différents mots dans l'alphabet des termes , &c. à l'article général PLANTES.

Moyen de conserver les fleurs pendant long-tems dans leur forme & avec une partie de leurs odeurs , leurs couleurs naturelles , ou en les changeant.

L'intérêt & la curiosité ont fait trouver les moyens de panacher & de charmer de diverses couleurs les fleurs vivantes des jardins ; comme de faire des roses vertes , jaunes , bleues , & de donner en très peu de tems deux ou trois couleurs différentes à un œillet , outre son teint naturel. On pulvérise , par exemple , pour cela de la terre grasse desséchée au soleil , on l'arrose ensuite l'espace de vingt jours d'une eau rouge , jaune , ou d'une autre teinture , après qu'on a semé dans cette terre grasse la graine de la fleur d'une couleur contraire à cet arrosement artificiel. On lit dans l'Encyclopédie que des personnes ont semé & greffé des œilliers dans le cœur d'une ancienne racine de chicorée sauvage , qui l'ont relié étroitement , & qui l'ont environné d'un fumier bien pourri ; & par les grands soins du Fleuriste , on a vu sortir un œillet bleu , aussi beau qu'il étoit rare. D'autres ont enfermé dans une petite canne , trois ou quatre graines d'une autre fleur , & l'ont recouverte de terre & de bon fumier : ces semences de diverses tiges ne faisant qu'une seule racine , ont ensuite produit des branches admirables pour la

diversité des fleurs. Enfin quelques Fleuristes ont appliqué sur une tige divers écussons d'œillets différents, qui ont poussé des fleurs de leur couleur naturelle & qui ont charmé par la variété de leurs couleurs. Les fleurs en théâtre ou en parterre varient aussi par leur voisinage : si les poussieres qui tombent des étamines sont portées par l'air sur le pistil d'une autre fleur voisine de même espece, mais différente de couleur, les graines qui en proviendront produiront une nouveauté dans le coloris de la fleur future.

Les plantes qu'on dessèche, sans les applatir, sans les comprimer, & dans leur situation naturelle, sont communément celles dont les fleurs servent d'ornement, ou sur la tête des Dames, ou sur les tables dans les desserts, ou dans les Eglises; aussi avant que de les sécher, l'art change souvent en des couleurs plus belles, ou varie celles qui en sont susceptibles, avec les acides : c'est ainsi que l'esprit de nitre change en un beau jaune citron les fleurs blanches du *xeranthemum* (espece d'immortelle); en un bel incarnat les fleurs violettes d'un autre *xeranthemum*; & en un beau rouge cramoisi les fleurs bleues de l'aconit, du pied d'alouette annuel, & diverses gentianes. L'eau-forte ne leur causeroit aucun changement, si elles étoient desséchées; on les panache simplement, en passant dessus un pinceau trempé dans l'eau-forte, ou bien on les change totalement en les plongeant en entier & renversées dans cet acide, sans y enfoncer leurs tiges qu'il amoliroit & brûleroit : on les retire de même pour les suspendre & laisser égoutter pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'elles aient pris assez de couleur; alors on les plonge dans de l'eau claire pour leur enlever toute l'eau-forte, & on les suspend pour la dernière fois, afin qu'elles se séchent entièrement. Il faut observer que toutes les fleurs ne se colorent pas de même; il y en a qui perdent à être ainsi trempées dans l'acide nitreux & qui s'y ternissent. Telles sont celles de l'immortelle citron, du souci en Octobre, en Novembre, car celles d'été se séchent difficilement; celles du bluet, de l'œillet d'inde, de la bruiere, de l'amarante, des renoncules, de la ravenelle, &c. La plupart de ces plantes, ainsi préparées, se dessèchent naturellement & conservent par-là leur souplesse; il y en a même que l'humidité de l'air ou de la tête qui les porte dans les cheveux fait épanouir, & que la sécheresse fait refermer, comme il arrive à la rose de jeriko, & particulièrement au *xeranthemum*, à l'immortelle jaune, dont la substance est sèche & comme cartilagineuse. Mais toutes celles qui sont tant soit peu charnues, comme l'amarante, ou dont les fleurs sont sujettes à se friser & à se chiffonner, comme le bluet, l'œillet, l'œillet-d'inde, la ravenelle, les renoncules, ont besoin de passer au four, ce qui les rend souvent cassantes, lorsqu'on ne leur ménage pas la chaleur par degrés & qu'on les y expose à nud. Voici comment cela se pratique, soit pour des fleurs, soit pour la plante entière. Ce procédé est dans son origine dû à M. Joseph de Monti, de l'Académie de Boulogne.

Il faut avoir un sable pur de riviere, ou du sablon fin, le faire sécher ou au soleil ou dans une poêle à l'étuve, puis le tamiser, afin qu'il soit d'un grain égal & fin : d'une autre part, l'on a un bocal assez grand, ou une caisse

de bois ou de fer-blanc étamé , d'une largeur médiocre : on couvre le fond de cette caisse de trois ou quatre doigts de ce sable , & on y enfonce le bout de la queue de ces fleurs , de maniere qu'elles se tiennent droites les unes à côté des autres , mais sans se toucher aucunement ; ensuite on remplit tout le vuide autour des queues avec ce sable : quand elles sont bien enterrées , on en répand autour des fleurs & des feuilles , en-dedans & par-dessus , prenant garde de déranger leur situation naturelle , & on couvre le tout d'une couche de deux ou trois doigts de ce même sable : puis on porte cette caisse dans un endroit exposé au soleil , ou , ce qui vaut mieux , dans un lieu échauffé par un poêle ou dans un four chaud d'environ 30 à 36 degrés , & on l'y laisse trois ou six heures , jusqu'à ce que les fleurs soient bien séchées , ce que l'on reconnoît par un échantillon que l'on met au haut du vase. A l'égard des tulipes , il faut en couper adroitement le pistil qui s'élève au milieu & renferme la graine , & remplir le vuide de sable. On dessèche aussi au four , à nud & sans sablon , l'amarante qu'on y met aussi-tôt qu'on en a tiré le pain : cette exsiccation vive ternit sa couleur ; mais on la fait revenir en la plongeant dans l'eau chaude , & la faisant sécher à l'air. Le fruit de l'églantier & plusieurs se dessèchent par cette méthode.

Parmi les fleurs desséchées naturellement ou par l'art , & qu'on veut charmer , il y en a quelques-unes , sur-tout l'immortelle blanche , appelée *éternelle* , ou *bouton blanc* , qu'on trempe dans une eau de gomme épaisse ; pour les poudrer ensuite de diverses couleurs , telles que le carmin , le vermillon , la lacque colombine pour le rouge ; pour le bleu , l'azur , la cendre bleue & le tournesol qui s'y applique liquide ; pour le jaune , la gomme-gutte liquide ou la poudre d'or. On sèche au soleil les fleurs ainsi saupoudrées , ensuite on les retrempe dans l'eau de gomme arabique , ou dans le vernis de blanc d'œuf édulcoré avec quelques gouttes de lait de figuier ou de rithymale.

Les Napolitains , pour donner à leurs fleurs artificielles les mêmes odeurs qu'ont les fleurs naturelles , cachent un peu d'*oleo saccharum* dans le calice de la fleur artificielle : cet *oleo saccharum* est une huile essentielle , combinée avec du sucre ; car le sucre se charge de l'huile aromatique , & lui donne des entraves qui l'empêchent de se dissiper aussi promptement qu'elle feroit sans cela : c'est encore un moyen pour rendre ces huiles miscibles avec l'eau.

On peut aussi déterminer l'odeur des fleurs naturelles & vives ; il suffit d'arroser un terreau de vinaigre ambré & musqué , &c. avant d'y semer les graines ou oignons , également macérés dans cette même liqueur.

Fleurs des quatre saisons , &c.

Le retour du printems est le retour des fleurs : celles de cette saison sont les tulipes hâtives , les anémones simples & doubles à peluche , les renoncules de Tripoli , les jonquilles simples & doubles , les jacinthes , le mu-

guet , les lilas , les primes-veres , les narcisses , la couronne-impériale , l'oreille-d'ours , la giroflée , les violettes de Mars , la pensée , les paquerettes & les primes-veres.

Celles qui ornent les jardins en été , c'est à-dire , en Juin , Juillet & Août , sont les tulipes tardives , les lys , les tubereuses , les pavots , les hémérocales ou fleurs d'un jour , les martaguons , qui ressemblerent aux lys ; les œillets de diverses especes , les giroflées jaunes , l'immortelle , les basilics , les pivoines , la croix de Jérusalem , la julienne.

Les fleurs d'automne sont la tubereuse , les balsamines , les reines-marguerites , les fonceis doubles , les amarantes , les passe-velours ou queue de renard , les œillets d'inde , les roses d'inde , le safran automnal , le *geranium* couronné.

Celles d'hiver sont les anemones simples , les jacinthes d'hiver , le *cyclamen* d'hiver , le laurier-thim , le perce-neige , les immortelles , les narcisses simples , le *crocus* printannier , les hépatiques , &c. Toutes les fleurs doivent être cueillies au moment où elles s'épanouissent.

De même que toutes les plantes ne fleurissent pas dans la même saison & le même mois , de même aussi toutes celles qui fleurissent le même jour dans un même lieu , ne s'épanouissent & ne se ferment pas à la même heure. Les unes s'ouvrent le matin , telles que les laitues & les labiées ; d'autres à midi , telles que les mauves ; les autres , le soir ou la nuit après le soleil couché ; tels sont quelques cierges , quelques especes d'herbes à robert , &c. & parmi celles qui s'ouvrent le matin , il y en a qui se ferment aussi le matin , tandis que d'autres ne se ferment que le soir. Il y a à cet égard une grande variété , dont la cause principale dépend de la chaleur de la lumière , & de beaucoup d'autres circonstances de l'atmosphère , qu'on ne peut guère déterminer ou soumettre à un calcul général. Ainsi toutes les remarques qu'on pourroit faire sur l'heure de l'épanouissement de certaines fleurs pour le climat où elles ont été faites , & le tableau que M. Linnæus en a publié sous le nom d'*horloge botanique* , n'est exact que pour le climat d'Upsal.

Les Jardiniers fleuristes sèment toutes les graines en quatre tems ; savoir , en Février , en Mars , en Avril & en Mai ; mais on en peut semer toute l'année. On plante les oignons des fleurs en automne & au printemps. Le coup d'œil des fleurs est des plus ravissants , quand elles sont exposées en amphithéâtre. Il faut cependant les disposer de manière que l'air puisse circuler librement , & avoir soin de mettre les pieds des tréteaux du théâtre dans des vases de plomb remplis d'eau. Cette précaution empêche que les insectes malfaisants aillent butiner sur les fleurs.

Réflexions sur les fleurs , & leur utilité.

Il est bon d'observer que les fleurs subissent des changements presque à chaque génération , soit par la culture , le terrain , le climat , la sécheresse , l'humidité , l'ombre , le soleil ; tous ces changements sont plus ou moins

prompts , selon le nombre , la force , la durée des causes qui se réuniront pour les former , & selon la nature , la disposition & les mœurs , pour ainsi dire , de chaque plante.

La fleuraison , *floratio* , & la défleuraison , *defloratio* , peuvent être considérées sous deux points de vue différents ; savoir , 1^o. relativement au tems ou à la saison de l'année où elles se font , ce qui s'appelle simplement *fleuraison annuelle* : 2^o. par rapport à l'heure du jour où les fleurs s'ouvrent , cet épanouissement s'appelle *floraison journalière*. On doit observer qu'en général les plantes des climats les plus froids & celles des montagnes , fleurissent au printems de l'Europe : celles de nos climats tempérés fleurissent pendant notre été : celles du Canada , de la Virginie , du Mississipi , surtout les plantes vivaces & les annuelles non cultivées , ne fleurissent qu'en Automne : celles du Cap de Bonne-Espérance fleurissent pendant notre hiver qui est leur été. Ce n'est qu'en suivant ces diverses considérations , que nous pouvons entretenir nos jardins toujours fleuris de plantes vivaces , dont la fleuraison ne dépend pas de nous , comme celle des plantes annuelles que nous pouvons avancer ou retarder , en les semant plutôt ou plus tard. Au reste , les fleurs suivent dans leur épanouissement , à-peu-près les mêmes loix que les feuilles dans leur développement. *Voyez* FEUILLE.

Les fleurs sont un des plus agréables ouvrages de la Nature ; elles semblent prodiguer tous les charmes du coloris : en effet , l'arrangement symétrique de toutes leurs parties , leurs couleurs vives & franches , mais variées & brillantes , leurs parfums exquis attirent & touchent l'homme le plus insensible. Un parterre peut donc être regardé comme la palette & la cassiolette de la Nature : en un mot , les fleurs semblent n'être faites que pour plaire à l'homme , & pour décorer son séjour. Mais il faut convenir qu'on ne peut jouir entièrement de l'agrément des fleurs , si l'on se contente de les considérer dans les bornes étroites d'un parterre. L'homme en auroit-il soumis tant d'espèces à son domaine , s'il n'avoit été attentif à remarquer dans ses promenades , qu'elles embellissent les vallées & les montagnes , que les prairies en sont émaillées , & qu'on les trouve répandues avec une espèce de profusion dans les bois , dans les déserts , sur la cime des arbres , & sur l'herbe qui rampe. Le charme en est si sûr , que la plupart des Arts qui veulent plaire , ne croient jamais mieux réussir qu'en empruntant leur secours : la sculpture les imite dans ses ornements les plus légers : l'Architecture embellit souvent de feuillages & de festons les colonnes & les faces trop nues de ses édifices : les plus riches broderies ne présentent guère que des feuillages & des fleurs : les plus magnifiques étoffes en sont parsemées ; & on les trouve d'autant plus belles , qu'elles approchent davantage de la vivacité des fleurs naturelles. Les fleurs ont été de tout tems incompatibles avec le deuil : on les écarte de tous les lieux où regnent la douleur & les larmes ; mais on les regarde comme le symbole de la joie & la parure inséparable des festins , particulièrement sur la fin des repas , où elles viennent avec les fruits ranimer la fête qui commence à languir.

Les fleurs nous donnent des pâtes qui enrichissent nos desserts, des poudres qui parfument nos demeures, & même des remèdes qui nous soulagent de quantité de maladies. Les violettes, les jonquilles, les fleurs de pêchers, les roses, les jacinths, les œillets, & sur-tout les fleurs d'orange, nous fournissent des conferves, des confitures, des essences, des eaux distillées, qui nous font jouir des odeurs & des autres qualités des fleurs, long-tems après qu'elles sont passées.

Chaque fleur a reçu de la Nature la commission de renouveler & de perpétuer d'année en année la plante qui lui a donné naissance; c'est elle qui fait naître la graine qui lui succède. La fleur porte dans son sein un germe reproductif, qui procure l'immortalité à son espèce; & souvent elle nous prépare un fruit délicieux, un grain nourrissant, une farine dont le goût, quoique simple, est toujours attirant, & qu'on préféreroit, dans la nécessité du choix, aux aliments les plus piquants, les plus délicieux & les plus recherchés. Aussi Plin a-t-il eu raison de dire, *in floribus, Natura est maxima*.

FLEUR D'ARGENT. Nom que plusieurs Auteurs donnent au *lait de lune*. Voyez ce mot.

FLEUR D'ASIE. Différents Voyageurs ont donné ce nom à un sel qui se trouve à la surface de la terre, dans plusieurs endroits de l'Asie: on l'appelle aussi *terre savonneuse de Smyrne*. C'est le *Natron*. Voyez ce mot.

FLEURS DE BISMUTH & DE COBALT. Voyez aux articles BISMUTH & COBALT.

FLEUR DE CHAUX NATURELLE, *Calx nativa*. On donne ce nom à un *guhr de craie*, qu'on rencontre quelquefois nageant à la superficie des eaux thermales. Ce guhr a la propriété de reluire dans l'obscurité; propriété qu'il tient probablement des parties animales qui se rencontrent toujours dans la terre marine ou calcaire.

FLEUR DU CIEL ou **NOSTOCH**. Voyez MOUSSE MEMBRANEUSE.

FLEUR DE CONSTANTINOPLE. Voyez CROIX DE JERUSALEM.

FLEUR DE CUIVRE, *Flos cupri*. Des Minéralogistes donnent ce nom aux petits grains rouges de cuivre vierge: ils l'appellent aussi *verre de cuivre*.

FLEUR DORÉE. Nom donné à la marguerite jaune. Voyez MARGUERITE.

FLEUR D'ÉPONGE. Communément on donne ce nom aux branches de l'éponge rameuse. Voyez ÉPONGE, à la suite de l'article CORALLINE.

FLEUR DE FER. *Flos martis*. Les Naturalistes donnent ce nom à une mine de fer blanche, voyez au mot FER; mais souvent ce n'est qu'une concrétion pierreuse accidentelle, une sorte de stalactite spatheuse, formée dans les cavernes des mines, ou dans des fissures de rochers. Lorsque ces concrétions contiennent effectivement du fer, étant exposées au feu elles y deviennent noires. On trouve beaucoup de ces belles stalactites, appelées *flos ferri*, dans la Hongrie, dans les Pyrénées: celles de Stirie sont d'un

blanc de neige, mais elles brillent moins que celles des Pyrenées, dont le tissu extérieur est raboteux, & semble n'être qu'un amas d'aiguilles sparsueuses. Il faut user de précaution quand on détache ces cristallisations dans les souterrains, afin de les obtenir bien conservées : l'on doit avoir quelqu'un qui soit prêt à les recevoir, tandis qu'on introduit des coins de fer à coups de marteau par la base de la congellation.

FLEUR DU GRAND SEIGNEUR. *Voyez* à la suite du mot AMBRETTE.

FLEURS DE GRENADE. *Voyez* BALAUSTES.

FLEURS DE GYPSE. *Voyez* à l'article GYPSE.

FLEUR DE JALOUSIE. *Voyez* AMARANTE.

FLEUR DE LA PASSION. *Voyez* GRENADILLE.

FLEUR DE MUSCADE. On donne improprement ce nom au macis, qui est une seconde écorce de la *muscade*. *Voyez ce mot*.

FLEUR DU PARNASSE, *Gramen Parnassi*. Plante annuelle qui vient ordinairement dans les prés & dans les lieux humides. Sa tige est d'un demi-pied de haut, menue, chargée de feuilles arrondies & attachées à de longues queues rougeâtres, semblables à celles de la violette ou du lierre, & embrassées vers le bas d'une feuille sans queue. La fleur est rosacée ou blanche, composée de dix feuilles, cinq grandes & cinq petites, qui sont frangées : à ces fleurs succèdent des fruits ovales remplis de semence, qu'on peut semer sur couche ou en pots, quand on veut placer cette plante dans les jardins.

FLEUR DE SAINT-JACQUES. *Voyez* JACOBÉE

FLEUR DE SEL MARIN, *Adarce*. On donne ce nom à une écume salée, qui s'attache aux roseaux & à plusieurs autres plantes sur les bords des mers, & qui s'y endurecit : on l'estime propre à détruire les dartres & autres maladies de la peau.

FLEUR DU SOLEIL. On donne ce nom à l'*hysope des garigues* ; voyez HÉLIANTEME : & à l'*herbe au soleil* ; voyez ce mot.

FLEURS DE SOUFRE NATURELLES. *Voyez* à l'article SOUFRE.

FLEUVE. *Voyez* au mot FONTAINE.

FLEZ ou FLETELET, ou FLET, *Fletleta*. Espèce de poissons plats fort communs sur la côte du Boulonnois & en Angleterre : ils sont très bons, agréables au goût, & à peu-près de la même qualité que la *limande*.

Le *flez* est couvert de petites écailles noires, marbrées de rouge : il ressemble beaucoup au carrelet. Ce poisson de mer ne se trouve point dans la Méditerranée, mais il entre dans les rivières qui confluent à l'Océan.

FLIONS, *Tellina*. Ce sont des coquillages bivalves du genre des *Cames*. *Voyez ce mot*, & celui de TELLINE.

FLOREE D'INDE ou COCAGNE. *Voyez* l'article PASTEL.

FLORIPONDIO, *Stramonioïtes arboreum, oblongo & integro folio, fructu lvi*. Arbre de plein vent & commun dans le Chili, dit le Pere Feuillée, à qui seul nous en devons une exacte description. Cet arbre s'élève à la hauteur de douze pieds : la grosseur de son tronc, qui est fort moëlleux, est

à-peu-près de six pouces. Ses branches forment toutes ensemble une belle tête sphérique : elles sont chargées de feuilles cotoneuses qui naissent comme par bouquets ; les moyennes ont environ sept à huit pouces de longueur , sur trois à quatre pouces de largeur : leurs nervures forment un réseau très agréable. Les fleurs sont en tuyau , blanches , d'une grande beauté , & d'une odeur admirable : il leur succede des fruits arrondis , gros comme une orange , couverts d'une écorce d'un verd grisâtre , & contenant plusieurs amandes. Les Chiliens se servent des fleurs de *floripondio* pour amollir , résoudre , & pour avancer la suppuration des tumeurs.

FLOS-FERRI. Voyez FLEUR DE FER.

FLOTS ou VAGUES. Voyez à l'article MER.

FLUKEN. Nom que les Mineurs du pays de Cornouailles donnent à une espece de terre grisâtre , qui contient des fragments de quartz roulés. Voyez QUARTZ.

FLUORS ou FLUEURS, *Fluores*. On donne ce nom à des crySTALLISATIONS peu dures , prismatiques ou cubiques , ou pyramidales , colorées , plus ou moins transparentes , & comme imparfaites. On en trouve beaucoup à l'embouchure des volcans , dans la surface intérieure des salbandes qui tapissent les filons des mines , & quelquefois contre les parois ou à la voûte des grottes. On regarde les primes d'émeraude & d'améthyste , les fausses topases , &c. qui sont tendres , peu claires , mais pesantes , & semblables au spath fusible , comme de véritables fluors. Encelius, *de Re Metallica* , pag. 256 , édit. de Francfort , 1757 , donne le nom de *Fluors* à des cristaux qui se fondent si facilement au feu , qu'ils semblent y couler & fluier , comme fait la glace au soleil. Les Mineurs Allemands donnent le nom de *Flusse* aux fluors , parcequ'ils ont souvent la propriété de servir de fondants ou de flux aux mines que l'on exploite dans leur voisinage.

FLUTE. C'est un poisson des Indes fort long , mais aussi menu que le petit doigt. Il fait tant de bruit par son sifflement , que la nuit on l'entend d'assez loin. Les habitans d'Amboine s'en nourrissent. Les Hollandois l'appellent *Fluiter*. Des Voyageurs donnent le nom de *Flute* à la *Murène*. Voyez ce mot.

FLUX & REFLUX DE LA MER. Les Marins donnent ce nom , ou celui de *Flot* , à l'élévation périodique des eaux de la mer ; & ils appellent *Reflux* , ou *Jusant* , l'abaissement de ces mêmes eaux. Le moment où finit le flux , lorsque les eaux sont stationnaires , s'appelle la *Haute mer* ; la fin du reflux s'appelle la *Basse mer*. Voyez ce qui en est dit à l'article MER.

FOCA ou FOCAS. Fruit en forme de poire & d'une belle couleur de pourpre , qui rampe à terre comme le melon , & dont on vante le goût. Ce fruit croît dans l'Isle de Formosé , près de la Chine. *Hubner* , *Dict. Univers.*

FÆTUS. C'est l'animal formé dans la matrice de sa mere. Quels sont les premiers principes de ce corps ? comment commence-t-il ? est-il d'abord tout formé ? C'est un point que toutes les recherches & les observations faites

faites sur la génération tendent à éclaircir. Ainsi , sans nous arrêter aux différentes hypothèses imaginées pour expliquer les principes du développement des corps animés , nous renvoyons nos Lecteurs au mot HOMME , où l'on remonte à la forme du corps humain la plus petite que les yeux les mieux habitués à observer aient pû appercevoir. Voyez aussi GÉNÉRATION , EMBRION , & ce qui est dit du *fœtus* à la suite du mot HOMME.

FOIN , *Fœnum*. On donne ce nom à l'herbe des prés quand elle est mûre. Le gramen y domine , ainsi que le trefle , le plantain. Il n'est pas rare de distinguer dans un foin bienfaisant , appétissant & succulent , la jaccée noire , la grassette des prés , la pimprenelle des prés , les paquerettes , le tussilage , tous les chiendents , le sainfoin , la petite chélidoine , le trefle des prés , les marguerites , la dent-de-lion , la primevere , l'oliet ou le trefle sauvage jaune , &c.

On fauche les foins en Juin , quand l'herbe commence à jaunir & qu'elle est en graine : ensuite on laisse sécher & faner l'herbe sur le pré , & on la remue de tems en tems avec des fourches : trois jours après on met le foin en sillons ou en petits tas ; ensuite on en fait des meules hautes & rondes , & on le laisse suer en cet état : on le met en bottes sur le pré , & enfin on le serre dans le fenil. Il y a même bien des pays où l'on serre le foin sans le botteler. Lorsque toutes ces opérations sont faites par un beau tems , le foin peut se garder , en meule ou dans le fenil , au moins deux ans ; s'il avoit été mouillé , il pourriroit en tas , s'échaufferoit , & pourroit même mettre le feu au grenier. Le Laboureur peut prévenir cet accident en logeant au cœur du tas deux ou trois fagots d'épines ; par ce moyen , il ménage un grand espace où les exhalaisons chaudes viennent se rendre de toutes parts , & perdent toute leur activité.

Le foin desséché est l'aliment ordinaire du cheval & de la plupart des bestiaux : la quantité en est nuisible aux vieux chevaux qu'elle conduit à la pousse. On doit faire attention à la qualité du foin ; qui varie selon la situation & la nature du terrain & des prés , où on l'a cueilli. Le foin vassé , le foin nouveau , celui qui est trop gros , ou qui est pourri , &c. ne peut être que pernicieux au cheval , & sur-tout celui dans lequel il se trouve des plantes pernicieuses. Voyez FOURRAGE.

FOIN DE MER. C'est le *Fucus* : voyez ce mot. On donne le nom de gros foin au *Sain-foin*. Voyez ce mot.

FOLE. C'est un animal qui se trouve en Chine , & que les habitans du Royaume de Gama ont nommé ainsi : il a presque la forme humaine , les bras fort longs , le corps noir & velu : il marche avec tant de légèreté & de vitesse qu'on ne peut le surpasser à la course. Cet animal qui est , dit-on , anthropophage , ne feroit-il point une espèce de grand Singe ?

FOLIO , *Cytharus*. Nom qu'on donne à Rome à un poisson de mer plat , & semblable à la sole : il a la langue déliée , & les dents ferrées les unes entre les autres : ses écailles sont âpres , grandes , & en figure de losange : il a depuis la tête jusqu'à la queue , par le milieu du corps , une ligne menue

comme une corde de luth ; quelquefois ce trait est assez large : ses parties intérieures sont en tout semblables à celles du turbot & de la sole. Comme ce poisson se nourrit d'algue , sa chair n'est pas de bon goût. Le *Folio* est différent du *Babillard*. Voyez ce mot.

FOLLETTE. Voyez ARROCHE.

FOLLICULES DE SÉNÉ. Voyez SÉNÉ.

FONDRIERE. On donne ce nom en général à toutes les profondeurs répandues sur la surface de la terre qui se sont faites par des affaissemens ou éboulemens de terrains que le feu , l'eau ou d'autres causes naturelles ont minés. Voyez les articles CAVERNE , GROTTES , TERRE & ARGILLE.

FONGITE , *Fungites*. On donne ce nom , ainsi que celui de *Fongipore* , de *Bonnet de Neptune* , de *Champignons de mer pétrifiés* , &c. à quantité de productions marines à polypier , devenues fossiles , & dont les figures sont très différentes entr'elles ; plusieurs ressemblent aux champignons terrestres , d'autres au cerveau des animaux ; il y en a de poreuses , ou rayées , ou lisses , ou lamelleuses & feuillées , ou sillonnées , ou réticulaires , ou rubereuses , mais toujours sous des formes très variées. Les classifications que les Auteurs en ont faites jusqu'aujourd'hui sont très nombreuses & très embrouillées. La plupart étant formées sur des différences individuelles , ou des variétés dans l'espece ; il est plus naturel de les distinguer par la totalité de la figure que par quelques accidens. Alors on auroit , 1°. les *Alcyons fossiles* ; voyez ALCYONUM : 2°. les *Ficoïtes* ; voyez FIGUES FOSSILES : 3°. les *Champignons fossiles* ; ainsi nommés de leur ressemblance avec les champignons terrestres , & qui à cause de leur figure , prennent quelquefois le nom de *Bonnet de Neptune* , &c. Voyez ces mots.

On trouve beaucoup de fongites sous d'autres figures qui ressemblent au lépas , ou qui sont orbiculaires , ou représentent des agarics ou champignons qui croissent au pied des arbres ; il y en a qui ressemblent à des racines , à une morille , à une petite tête de chou , aux fesses , à un chapeau détroussé : la plupart des fongites sont ou cannelés ou étoilés , quelquefois lisses. Quantité de pierres calcaires à bâtir , sur-tout celles de Verberie , sont remplies & formées pour la plus grande partie de ces dépouilles de la mer , dont on attribue la fabrique aux *Polypiers*. Voyez ce mot , ainsi que les articles CORAIL & CORALLINE.

FONTAINE ou SOURCE , *Fons*. On a donné proprement le nom de *Fontaine* aux eaux qui fourcillent de certaines couches de la terre entr'ouvertes , s'amassent dans de grands bassins , & versent ensuite au dehors ce qu'elles ont reçu. Il semble qu'on ne désigne par le nom de *Source* , que les canaux naturels qui servent de conduits souterrains aux eaux , à quelque profondeur qu'ils soient placés.

Comme les rivières tirent leur origine des sources & des fontaines , & que les fleuves sont formés de la réunion des rivières , nous allons en donner l'histoire dans ce même article : leurs phénomènes sont liés trop intimement par la nature pour en faire des articles séparés. D'un côté , il n'y a point

d'effets plus visibles , ni peut-être de plus grand ornement dans notre globe , que cet inépuisable flux des fontaines , & ce cours des rivières & des fleuves , qui roulent majestueusement leurs eaux , à plein canal , dans la longue durée des siècles. D'un autre côté , il n'y a point d'effet dont la Nature semble avoir plus affecté de nous cacher les causes. Où peuvent être placés les réservoirs , pour ainsi dire , éternels , immenses , invisibles , qui de leur plénitude fournissent d'une manière aisée des eaux toujours nouvelles , & qui remplissent par des canaux inconnus les vastes lits des fleuves , avec une profusion assez grande pour pourvoir à tous nos besoins , & assez mesurée pour ne pas inonder la terre au lieu de la fertiliser ? Par quel mécanisme enfin ces réservoirs réparent-ils abondamment leurs pertes journalières.

Les hommes ont fait usage de tout leur génie pour chercher l'origine de ces phénomènes. Il y a diversité de sentimens ; mais dans celui que nous allons présenter au Lecteur , on reconnoît la marche de la Nature , & il paroît porté jusqu'à l'évidence , par les démonstrations des Mariottes & des Halley.

Il s'élève continuellement des rivières , des fleuves , des lacs , de toute la surface de la mer , une vapeur qui est emportée dans l'étendue de l'air , en forme de nuées ou brouillards. Cette vapeur suit l'impression des vents , & selon qu'elle rencontre un air froid ou qu'elle se trouve arrêtée par les montagnes , elle se condense & se résout en rosée , en neige , en pluie. Les eaux qui en proviennent , trouvent ensuite diverses ouvertures pour s'insinuer dans le corps des montagnes & des collines , où elles s'arrêtent dans des cavités & sur des lits , tantôt de pierre , tantôt de glaise , & forment , en s'échappant de côté , par la première ouverture qui se présente , une fontaine passagère ou perpétuelle , suivant les circonstances.

On fait par différentes expériences qu'il s'évapore par an , environ vingt-neuf pouces d'eau ; or cette évaporation est plus que suffisante pour produire la quantité d'eau que les fleuves portent à la mer. Jean Keil prouve par un calcul assez plausible , que dans l'espace de 812 ans toutes les rivières ensemble rempliroient l'Océan ; d'où il conclut que la quantité d'eau qui s'évapore de la mer , & que les vents transportent sur la terre & sur les hautes montagnes , pour produire les ruisseaux & les fleuves , est d'environ les deux tiers d'une ligne par jour , ou vingt-un pouces par an ; ce qui confirme ce que l'on vient d'avancer , que les vapeurs de la mer sont plus que suffisantes pour produire les fleuves : le surplus de ces eaux est absorbé & employé pour la nourriture des végétaux & des animaux.

Ce sentiment paroît beaucoup plus vraisemblable que celui de Descartes , qui supposoit que les eaux s'élevoient dans les montagnes en vapeurs , comme dans un alambic. D'un autre côté , l'expérience ayant démontré l'impossibilité de dessaler l'eau de la mer , & de lui enlever son goût bitumineux & sa viscosité par la seule infiltration ; cela prouve la fausseté du sentiment de ceux qui disoient que les eaux de la mer se filtroient à travers les terres dans

les cavités des montagnes. Les percolations du centre du globe à la circonférence ne sont pas plus certaines. Bernard Palissi, dans un siècle encore peu éclairé sur ces objets, étoit si bien convaincu que les pluies forment les fontaines, & que l'organisation des premières couches de la terre est très favorable à l'amas des eaux, à leur circulation, & à leur émanation, qu'il publioit hautement être en état d'imiter ces opérations de la Nature. Pour cet effet il auroit formé une monticule, dans laquelle il auroit observé la même distribution de couches qu'il avoit remarquée à la surface de la terre dans les lieux qui lui avoient offert des sources. Cette promesse, disent les Auteurs de l'Encyclopédie, n'étoit point l'effet de ce charlatanisme, dont les savans ne sont pas exemptés, & que les ignorans, qui s'en plaignent, & qui en sont les dupes, rendent souvent nécessaire.

Les fontaines présentent des singularités bien propres à piquer la curiosité, soit par rapport à leur écoulement, soit par rapport aux propriétés & aux qualités particulières du fluide qu'elles produisent.

Il y a des fontaines *uniformes*, c'est-à-dire, qui ont un cours soutenu, égal & continu, & qui produisent dans certaines saisons la même quantité d'eau. D'autres sont *périodiques*; & de celles-là, les unes sont intermittentes, les autres sont intercalaires. Les *intermittentes* sont celles dont l'écoulement cesse entièrement & reparoît à différentes reprises en un certain tems. Telles sont la fontaine du lac de Bourguet, en Savoie : la source bruyante nommée *Bullerborn*, en Westphalie, qui sourd en bouillonnant; elle est à sec deux fois le jour : la fontaine de Colmar en Provence, dont l'eau coule de la grosseur du bras, & s'arrête alternativement de sept minutes en sept minutes; ses périodes sont extrêmement réglées. Le jour du tremblement de terre de Lisbonne (premier Novembre 1755), elle devint continue : elle n'a repris son intermittence qu'en 1763. Les fontaines *intercalaires* sont celles dont l'écoulement, sans cesser entièrement, éprouve des retours d'augmentation & de diminution qui se succèdent après un tems plus ou moins considérable. On a donné encore le nom de *fontaines temporaires*, à celles qui ne coulent que pendant une saison de l'année. On appelle *fontaines mariales*, celles dont l'écoulement commence vers le mois de Mai, à la fonte des neiges, & finit en automne. Enfin plusieurs fontaines présentent dans leurs cours des modifications qui les font passer successivement de l'uniformité à l'intermittence, & de l'intermittence à l'intercalaison, & revenir ensuite à l'uniformité par des nuances aussi marquées.

Les fontaines vraiment intermittentes, celles qui ont attiré l'attention du Peuple & des Philosophes, sont celles dont l'intermission ne dure que quelques heures ou quelques jours. On explique d'une manière fort ingénieuse, & qui paroît très naturelle, le mécanisme des fontaines périodiques, soit intermittentes, soit intercalaires. On suppose dans les collines des cavités où se réunissent les eaux; & comme il y a dans les couches de la terre des courbures très propres à donner aux couches, qui contiennent les eaux pluviales, la forme d'un syphon, on suppose que les écoulemens périodiques

dépendent du degré de hauteur de l'eau dans l'une des branches du syphon. On peut voir dans l'*Encyclopédie* un détail très curieux & très bien expliqué de ce mécanisme des fontaines. Ce détail est de M. Desmarets, si avantageusement connu des Physiciens.

Le peuple, dans les pays qui avoisinent certaines fontaines périodiques a toujours été effrayé, ou livré, à la vue de ces vicissitudes & des dénouemens de ces bizarreries apparentes dont il ignoroit la cause, à des croyances superstitieuses, qui, dans les matieres de physique, sont toujours son partage.

Pline, *lib. 31, cap. 2*, nous apprend que les Cantabres tiroient des augures de l'état où ils trouvoient les sources du *Tamaricus*, (aujourd'hui la *Tamara*, dans la Galice.) Ils regardoient comme un augure sinistre, lorsque la fontaine venoit à cesser de couler dans l'instant qu'on la regardoit. Les Prêtres des Dieux, qui tenoient registre des tems où ces fontaines couloient, pouvoient, moyennant des salaires honnêtes, procurer la satisfaction & l'assurance de voir couler les sources.

Dans des tems moins reculés on voit encore le même esprit de superstition : le peuple croit, en Savoie, que la *fontaine des Merveilles*, près de Hautecombe, ne coule point en présence de certaines personnes. On retrouve les mêmes idées dans les habitans de Briscam, en Devonshire, au sujet de la source périodique de Lawyel, dont les flux & les repos intercalaires se répètent jusqu'à seize fois pendant une demi-heure : on sent bien qu'elle doit cesser de couler devant celui qui arrive à l'instant de l'intermittence naturelle de la fontaine.

On a attribué plus constamment aux fontaines la propriété d'annoncer l'abondance ou la stérilité : cette idée ne paroît point si erronnée que la précédente ; ces présages peuvent avoir une cause physique aisée à saisir. On fait que certaines années pluvieuses ou sèches, sont stériles ou abondantes. Une fontaine qui éprouvera, dans son cours, des variations qui seront dépendantes de la sécheresse ou des pluies, fera une espece de météorometre, qui, la plupart du tems, rendra des réponses assez justes. Jean Fabre, Médecin de Castelnaudari, prétend que les habitans de Belestat, en Languedoc, peuvent juger des années par le cours de Fontestorbe, qui signifie la Fontaine intermittente : elle est située dans le Diocèse de Mirepoix.

Les fontaines périodiques varient beaucoup pour la durée de leur intermittence : les unes ont des intermittences très longues & d'autres très courtes : celle de Colmar, dans le Diocèse de Senez en Provence, coule huit fois dans une heure, & s'arrête autant de fois. Tous ces effets doivent dépendre en partie de la cavité plus ou moins grande, qui correspond à une des branches du syphon.

Dans le Royaume de Cachémire, on voit une fontaine maïale qui coule & s'arrête régulièrement trois fois en vingt-quatre heures, au commencement du jour, sur le midi, & à l'entrée de la nuit : elle ne coule que pendant le mois de Mai, tems où les neiges fondent : elle tarit enfin & demeure

re à sec pendant le reste de l'année. Cependant après de longues pluies , elle coule sans intermittence & sans ordre , comme les autres fontaines : ainsi elle est maïale , intermittente & uniforme.

Il y a des fontaines qui ont des flux & reflux ; il est très possible que celles qui sont situées à une très petite distance de la mer , aient avec ses eaux une communication souterraine ; l'intumescence produira un refoulement jusques dans le bassin de ces sources , assez semblable à celui que les fleuves éprouvent à leur embouchure lors du flux.

Il y a des fontaines dont l'eau , quoique très froide , ne laisse pas de bouillonner , & d'imiter le mouvement qu'elle auroit sur le feu ; telle est la fontaine nommée la *Ronde* , à deux lieues de Pontarlier ; la cause de ce phénomène pourroit bien n'être qu'un air raréfié , renfermé sous terre , & poussé continuellement à la surface de l'eau.

Varrenius place au Japon une fontaine thermale & périodique. Ses écoulemens se répètent deux fois par jour & durent une heure : l'eau en sort avec impétuosité , & forme près de-là un lac brûlant. Son eau est , dit-il , plus chaude que l'eau bouillante.

La source de la Reinette , à Forges , offre sur les six à sept heures du soir & du matin un phénomène digne de remarque ; l'eau de cette source se trouble , devient rougeâtre , & se charge de flocons roux , sans être plus abondante dans ces changemens.

Il y a des fontaines , telles que celle d'Arcueil près de Paris , & celle que l'on voit à Clermont en Auvergne , dont les eaux sont chargées de particules pierreuses insensibles , & qui s'incrustent sur les corps que l'on jette dans ces fontaines : d'autres , chargées de particules cuivreuses , recouvrent d'une couche cuivreuse la surface des morceaux de fer qu'on y jette. Il y a de ces fontaines en Pologne & dans les monts Crapaks en Hongrie. *Voyez EAUX CEMENTATOIRES & CUIVRE DECEMENTATION.*

Les eaux d'une fontaine de Paphlagonie ont la propriété d'enivrer comme le vin ; & celles d'une fontaine de Senlisse , village proche de Chevreuse , font tomber les dents sans fluxion & sans douleur. Il y a des fontaines dont les eaux sont chaudes ; on les nomme *Eaux thermales*. Voy. le mot EAU.

Il y a des fontaines & des ruisseaux dont les eaux ont des saveurs salées : communément elles doivent leur origine à des eaux qui ont dissous telle ou telle espèce de sel dans leur trajet souterrain. On voit d'autres fontaines ou ruisseaux , dont il s'élève des vapeurs insensibles qui sont inflammables ; si on y approche du feu , une flamme légère se répand aussi-tôt sur l'eau comme sur l'esprit de vin. Ce phénomène dépend vraisemblablement de ce que ces eaux , passant par des mines de soufre & de bitume , se chargent de particules atherées , qui s'enflamment aussi-tôt qu'on y approche un flambeau allumé. On voit près de Boseley , dans la Province de Shrop , la fameuse fontaine brûlante. L'eau qu'elle contient est froide ; mais elle exhale des vapeurs que l'on enflamme avec une chandelle allumée ; aussi-tôt il

en part des flammes , tellement chaudes & brûlantes , qu'elles réduisent en un moment de gros morceaux de bois verd en cendres. *Voyez à l'article VOLCAN.*

On peut aussi rapporter ici les singularités de quelques étangs. Les uns situés au milieu des continens , sont pleins pendant la sécheresse , & presque à sec pendant la pluie. D'autres assez près de la mer où des rivières qui ont le flux & reflux , baissent quand la marée est haute , & montent quand la marée est basse. Tel est l'étang de Greenhivie , entre Londres & Gravesand.

On peut expliquer par le mécanisme des fontaines périodiques un phénomène singulier que présentent certaines cavernes. Près de Salfedan , dans les montagnes des environs de Turin , est un rocher qui a une fente perpendiculaire , d'où il sort pendant un certain tems un courant d'air assez rapide pour repousser au-dehors les corps légers qu'on expose à son action ; ensuite l'air y est attiré , & il absorbe les pailles & ce qu'il peut entraîner. Un semblable rocher aspire l'air , & l'expire aussi sensiblement. Tout ceci paroît avoir pour principe le mouvement d'un syphon. Tandis que l'eau souterraine qui se décharge dans la caverne , n'est pas parvenue au niveau de l'orifice inférieur du syphon , l'air s'échappe de la caverne par le syphon , à mesure que la caverne se remplit ; mais il sort ensuite par la fente du rocher , lorsqu'il n'a plus l'issue du syphon , & que l'eau d'ailleurs versée par le canal d'entretien le comprime. Il y rentre lorsque l'eau coule abondamment par le syphon & que la cavité se vuide. *Voyez CAVERNE.*

Fleuves & Rivières.

Les rivières & les fleuves prennent toujours leur origine du milieu ou du bas des montagnes. Il y a sur la surface de la terre des contrées élevées qui paroissent être des points de partage marqués par la Nature , pour la distribution des eaux. Les environs du mont Saint-Gothard sont un de ces points en Europe. Un autre point est , en Amérique , la Province de Quito , qui fournit des eaux à la mer du Sud , à la mer du Nord & au golfe du Mexique ; en Asie , le pays des Tartares-Mogols , d'où il coule des fleuves , dont les uns vont se rendre dans la mer Tranquille ou nouvelle Zambie , d'autres à la mer de Corée , & d'autres à celle de la Chine.

C'est un spectacle vraiment intéressant , que de considérer une rivière dans ses divers accroissemens. Ce n'est d'abord qu'un filet d'eau qui découle de quelque colline sur un fond de sable ou de glaise. Les moindres cailloux , épars à l'aventure , suffisent pour l'embarrasser dans sa route : elle se détourne & se dégage en murmurant : elle s'échappe enfin , se précipite & gagne la plaine , emplit les lieux bas où elle tombe ; & , grossie par la jonction de quelques ruisseaux , elle s'élève en écartant par le choc de ses eaux le limon qu'elle a détaché : elle le dépose de côté & d'autres : elle mine insensiblement ce qui lui résiste , & se renferme dans le sillon qu'elle s'est elle-même tracé. La décharge des étangs , la fonte des neiges , la chute des

ravines & des courans de toute espece l'enrichissent & la fortifient : elle prend un nom & un cours réglé ; de vastes prairies & une verdure riante l'accompagnent par-tout : elle tourne autour des collines , & serpente dans les plaines pour embellir plus de lieux , & y porter des avantages sans nombre. Les hommes ont joint leurs travaux à ceux de la Nature , pour former des lits aux fleuves , afin d'empêcher que leurs terres ne fussent inondées.

On a observé , assez généralement , que les fleuves coulent d'Orient en Occident , ou d'Occident en Orient , du moins dans une partie de leur longueur ; & qu'il n'y a pas une riviere , un peu considérable , qui aille du Nord au Sud , ou du Sud au Nord.

Les fleuves sont sujets à de grands changements dans une même année , suivant les différentes saisons , & quelquefois dans un même jour. Ces changements sont occasionnés par les pluies & les neiges fondues. Au Pérou & au Chili , il y a des fleuves qui ne sont presque rien pendant la nuit , mais qui roulent leurs eaux avec abondance pendant le jour , parceque leurs canaux en sont fournis par les neiges que le soleil fait fondre sur les montagnes.

On voit des fleuves s'enfoncer brusquement sous terre , & qui reparoissent dans d'autres lieux , comme de nouveaux fleuves ; tels sont , dit-on , le Niger & le Tigre. D'autres changent de lit , comme on l'a observé la nuit du 8 Février 1756 sur la riviere de Frooyd dans le Comté de Montmouth en Angleterre. On assure que dans la partie Occidentale de l'Isle Saint-Dominique , il y a une montagne , au pied de laquelle sont plusieurs cavernes , où les rivières & les ruisseaux se précipitent avec tant de bruit , qu'on les entend de sept ou huit lieues.

Au reste , le nombre de ces fleuves qui se perdent dans le sein de la terre , est fort petit , & il n'y a pas d'apparence que ces eaux descendent bien bas dans l'intérieur du globe : il est plus vraisemblable qu'elles se perdent , comme celles du Rhin , en se divisant dans les sables ; ce qui est fort ordinaire aux petites rivières qui arrosent les terrains secs & sablonneux.

M. Guettard , dans un Mémoire inséré parmi ceux de l'Académie des Sciences pour l'année 1758 , a décrit ce qu'il a observé dans plusieurs rivières de la Normandie , qui se perdent & reparoissent ensuite : ces rivières sont au nombre de cinq ; la Rille , l'Ithon , l'Aure , la riviere du Sap-André , & la Drome. Les trois premières se perdent peu-à-peu , & reparoissent ensuite : la quatrième se perd peu-à-peu aussi , & enfin totalement ; mais elle reparoît après : la cinquième perd un peu de ses eaux dans son cours , & finit par se précipiter dans un gouffre d'où on ne la voit plus reparoître.

Ce qui semble donner lieu à la perte de la Rille , de l'Ithon & de l'Aure , c'est la nature du terrain des lieux par où elles passent : M. Guettard a observé qu'il est en général poreux , & composé d'un gros sable dont les grains sont peu liés entr'eux. Ces rivières se perdent toutes les trois à-peu-près de la même façon , c'est-à-dire par des ouvertures que les gens du pays appellent *bétoires*. Voyez ce mot ; & qui absorbent plus ou moins d'eau , selon qu'elles sont plus ou moins grandes. M. Guettard , qui les a soigneusement obser-
vées ,

vées, remarque que ces bétoires sont des trous formés en entonnoir, dont le diametre & l'ouverture est au moins de deux pieds, & va quelquefois jusqu'à dix & quinze pieds, & dont la profondeur varie également depuis un & deux pieds, jusqu'à cinq, six, & même quinze & vingt. La preuve que l'eau se filtre à travers le sable, c'est que souvent dans un bétoire qui a deux ou trois pieds de profondeur, & par laquelle se perd beaucoup d'eau, on ne peut enfoncer nulle part un bâton plus loin que la surface de son fond. M. Guettard est fort porté à croire qu'il se trouve dans ces cantons des cavités souterraines par lesquelles les eaux peuvent couler. Voici un fait que l'on observe dans les bétoires des rivières dont nous avons parlé, & particulièrement dans ceux de la Rille, qui semble prouver qu'il y a dans les montagnes qui bordent son cours, des étangs d'eau considérables : ce fait est que ces bétoires deviennent en hiver, pour la plupart, des fontaines, qui fournissent autant d'eau dans le lit de la rivière, qu'ils en avoient absorbé pendant l'été : or, d'où cette eau peut-elle venir, si ce n'est des réservoirs ou étangs qui sont renfermés dans les montagnes, lesquels étant plus bas en été que la rivière, en reçoivent l'eau, & étant plus hauts en hiver par les eaux de pluie qu'ils ont reçues, la lui rendent à leur tour.

La rivière du *Sap-André* se perd en partie de même que celles de l'*Ithon* & de la *Rille*; mais elle a cette particularité de plus, qu'à l'extrémité de son cours, & sans qu'on remarque de cavité sensible dans cet endroit, elle s'engouffre, pour ainsi dire, & sans chute l'eau passe entre les cailloux. Ce qui fait prendre à cette rivière cette direction souterraine, est un obstacle que son cours rencontre en cet endroit; elle y trouve une éminence de six à sept pieds de haut, dont elle a apparemment miné le dessous pour y passer, n'ayant pu la franchir. A quelque distance de cet endroit elle reparoît; mais en hiver, comme l'eau est plus abondante, elle passe par-dessus cette élévation, & son cours devient continu. Mais la *Drome*, après avoir perdu une partie de son eau dans son cours, se perd entièrement dans une espèce de gouffre.

Il n'est pas absolument rare de voir de ces rivières qui se perdent ainsi sous terre; la rivière d'*ierre ou Hyere* a cette singularité, qui est presque inconnue à tout le monde, quoique cette rivière soit très près de Paris.

Une rivière aussi-bien fournie d'eau que celle-là, qui ne tarit & ne gele jamais lorsque l'eau a reparu sur terre; une rivière, dit M. Guettard, qui pourroit être aussi utile à Paris par sa communication avec la Seine, mériteroit sans doute qu'on fît quelques efforts pour augmenter ses eaux, ou du moins pour empêcher qu'elles ne se perdissent; il ne s'agiroit peut-être que de faire de bonne maçonnerie dans les endroits où elle se perd, ou de détourner un peu son cours dans ces endroits, & lui creuser un nouveau lit : on ne rencontreroit pas par-tout, comme en Normandie, des cailloux sans liaison ou liés simplement par une terre qui se délaie.

Les eaux de l'*Hyere* pourroient encore être beaucoup augmentées, si on faisoit de pareils ouvrages pour les petits ruisseaux qui s'y rendent en hiver & qui perdent même en ce tems une partie de leurs eaux.

Quelques fleuves se déchargent dans la mer par une seule embouchure, quelques autres par plusieurs à la fois. Le Danube se jette dans la Mer Noire par sept embouchures, & le Volga par soixante-dix au moins. On prétend que le Nil n'en avoit originairement qu'une pour se joindre à la Méditerranée; les fables qu'il a chariées lui ont formé jusqu'à sept embouchures; à force d'en apporter, il s'est obstrué le passage à lui-même, & il n'en reste aujourd'hui que deux qui soient navigables. La pente de presque tous les fleuves va toujours en diminuant jusqu'à leur embouchure; mais il y a des fleuves dont la pente est très brusque, & forme des *Cataractes*. Voyez ce mot.

Une singularité digne de remarque, c'est que les sinuosités des fleuves augmentent lorsqu'ils approchent de la mer. On prétend qu'en Amérique, les Sauvages jugent, par ce moyen, à quelle distance ils sont de la mer.

Il y a dans l'ancien Continent, environ quatre cents trente fleuves grands comme l'est la *Somme* en Picardie, & qui tombent immédiatement dans l'Océan ou dans la Méditerranée, ou dans la Mer Noire. Dans le nouveau Continent, on ne connoît guere que cent quatre-vingts fleuves qui aillent se décharger dans la mer.

Plusieurs rivières & fleuves roulent des paillettes d'or & d'autres métaux. On n'en trouve une quantité un peu considérable que dans les saisons pluvieuses, parceque les eaux en détachent davantage des minieres: c'est aussi dans les sinuosités des rivières que s'amassent ces paillettes, & qu'on les y cherche.

On voit quelquefois des rivières diminuer tout-à-coup. C'est ainsi que dans la nuit du 28 au 29 Décembre 1762 les eaux de la rivière d'Eden, dans le Comté de Cumberland, baissèrent au moins de deux pieds perpendiculairement; & cet abaissement fut si subit que plusieurs poissons n'eurent pas le tems de suivre le courant, & furent trouvés morts le lendemain sur les bords qui étoient restés à sec. Les eaux restèrent en cet état jusqu'à onze heures du matin, & remonterent ensuite par gradation à leur premier niveau. On n'a remarqué aucune circonstance qui ait pu occasionner ce phénomène.

Certains fleuves sont sujets à des débordements périodiques, qui inondent toutes les terres adjacentes, en y portant en même-tems la fertilité & l'abondance.

Parmi ces fleuves, le plus célèbre est le Nil, qui s'enfle si considérablement, qu'il inonde toute l'Egypte, excepté les montagnes. L'inondation commence vers le 17 de Juin, augmente pendant quarante jours, & diminue pendant le même espace de tems. Hérodote nous apprend qu'il étoit autrefois cent jours à croître & autant à décroître. Cette différence dans la durée des périodes, ne peut être attribuée qu'à ce que les pluies & les torrents ont détaché, dans les montagnes, de la terre qu'ils ont déposée, & le terrain du Nil s'est élevé à proportion. La cause du débordement du Nil vient des pluies qui tombent en Ethyopie, depuis le commencement d'Avril jusqu'à la fin de Septembre, & du vent du Nord qui chasse les nuages qui por-

tent cette pluie du côté de l'Abyssinie , & fait rouler les eaux du Nil à leur embouchure. Aussi-tôt que le vent tourne au Sud , le Nil perd dans un jour ce qu'il avoit acquis dans quatre.

Les plus grands fleuves de l'Europe sont le Volga , le Danube , le Don , le Nieper , la Duine , puis le Rhône , le Rhin , la Loire & la Seine : les plus grands fleuves de l'Asie sont le Hoanho , le Jenisca , l'Oby , le fleuve Amour , le Menamcon , le Kian , le Gange , l'Euphrate , l'Indus & le Sirderoias : les plus grands fleuves de l'Afrique sont le Sénégal qui comprend le Niger , le Nil , le Zair & le Coanza , le Couama , le Quilmanci : enfin les plus grands fleuves de l'Amérique , qui sont aussi les plus larges du Monde , sont la riviere des Amazones , le fleuve Saint-Laurent , celui du Mississipi , celui de la Plata , l'Orinoque & le Madera. Mais les fleuves les plus rapides de tous sont le Tigre , l'Indus , le Danube , l'Yrtis en Siberie & le Malmistra en Cilicie.

Les eaux des fleuves & des rivières , en descendant des montagnes , acquièrent une vitesse ou accélération qui sert à entretenir leur courant ; à mesure qu'elles font plus de chemin , leur vitesse diminue , tant à cause du frottement continuel de l'eau contre le fond & les côtés du lit où elles coulent , que parcequ'elles arrivent après un certain tems dans les plaines , où elles coulent presque horizontalement.

Pour savoir si l'eau d'une riviere , qui n'a presque point de pente , coule par le moyen de la vitesse qu'elle a acquise dans sa descente , ou par la pression perpendiculaire de ses parties , il faut opposer au courant un obstacle , un morceau de bois , par exemple , qui lui soit perpendiculaire. Si l'eau s'élève & s'enfle tout de suite au-dessus de l'obstacle , sa vitesse vient de sa chute ; si elle ne fait que s'arrêter , sa vitesse ne vient que de la pression de ses parties.

Les eaux des fleuves rongent continuellement les bords de leur lit ; mais en même-tems leur courant devient moins tortueux , & leur lit s'élargit , c'est-à-dire , que le fleuve perd de sa profondeur , & par conséquent de la force de sa pression ; ce qui continue jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la force de l'eau & la résistance des bords : pour lors le fleuve ni les bords ne changent plus. L'expérience le prouve , puisque la profondeur & la largeur des rivières ne passe jamais certaines bornes.

FONTAINES DE MER. Kolbe , dans sa Description du Cap de Bonne-Espérance , *T. 3 , p. 136 , ch. 14* , donne ce nom à des poissons testacées , dont les coquilles qui sont d'un verd d'eau , ressemblent à une éponge ou à un morceau de mousse , & se tiennent si fortement attachées aux rochers , que ni les vents , ni les vagues ne peuvent les en séparer. En ouvrant une de ces coquilles , on apperçoit une substance charnue , nullement susceptible de vie apparente ; mais lorsqu'on la touche , on voit sortir de trois ou quatre trous , de petits filets d'eau , qui s'arrêtent dès qu'on cesse de la toucher , & qui recommencent toutes les fois qu'on y met le doigt , jusqu'à ce que la liqueur en soit épuisée : cette prétendue coquille est-elle un *Zoophyte* ou un *frai de Buccins* ?

FORBICINE, *Forbicina*. Insecte très commun, fort connu, mais dont presque aucun Naturaliste n'a parlé. M. Geofroi (Histoire abrégée des Insectes) dit que son port, sa couleur argentée, & sa légèreté à courir le font remarquer. On trouve cet insecte dans les vieux bois humides; on diroit de petits poissons. On leur distingue six pattes, dont l'origine est écailleuse & large; deux yeux, une bouche avec deux barbillons mobiles & longs; des antennes filiformes; trois filets espacés au bout de la queue, & le corps couvert de petites écailles. Il y a deux especes de *forbicines*; l'une qui est platte, & l'autre cylindrique. Celle-ci, outre les six pattes, a huit paires d'épines ou de fausses pattes courtes, mobiles, savoir deux à chaque anneau, dont elle se sert pour sauter.

FORET, *Sylva*. C'est une vaste & naturelle plantation d'arbres de toute espece, de tout âge, & d'une grandeur plus ou moins considérable. Il paroît que de tout tems on a senti l'importance de la conservation des forêts; elles ont presque toujours été regardées comme le bien propre de l'Etat & administrées en son nom: aussi le bois, cette matiere si précieuse & si nécessaire à tous les usages de la vie, a toujours été très abondant en France & dans toute l'Europe; mais depuis quelques siècles que la France s'est prodigieusement peuplée, le nombre & l'étendue des forêts ont extrêmement diminué.

Dans le douzieme siècle, les forêts étoient encore d'une étendue beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui: on en tiroit aussi moins d'utilité. Jusques-là les chênes n'avoient rendu que des oracles, & reçu tous les honneurs du mystere fabuleux, & on ne leur demandoit que le Gui Sacré; mais d'autres motifs de vénération, de religion, en firent abandonner d'abord de très grandes portions aux premiers Religieux qui y firent leur retraite. Ces Solitaires convertirent peu-à-peu en des terres d'un excellent revenu, les endroits les moins apparents, mais très propres à leurs vues: on peut dire à leur honneur, qu'ils furent eux-mêmes les ouvriers de ces grandes fortunes qu'on envie à présent à leurs successeurs.

Nous venons de dire qu'à mesure que le nombre des habitants s'est accru chez nous, la quantité de terres labourables a augmenté; car c'est une regle d'expérience, que plus la terre est cultivée, plus elle nourrit d'habitants; & que réciproquement, plus elle a d'habitants, & plus elle est cultivée. L'Etat s'est donc bien trouvé de la méthode des défrichements; & il seroit à desirer que tout ce qui est en landes fût défriché, mais qu'on cessât d'abattre tant de bois, pour ne pas éprouver le sort de l'Angleterre, qui a laissé totalement dépérir ses forêts, & qui est obligée de brûler autant de *charbon de terre*, que les Hollandois brûlent de *tourbe*. Voyez ces mots. Ce n'est pas sans raison qu'on doit craindre que nos forêts soient généralement dégradées: le bois à brûler est très cher; le bois de charpente & celui de la construction deviennent rares à l'excès. M. de Réaumur en 1721, & M. de Buffon en 1739, ont consigné dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, des réclamations contre ce dépérissement qui étoit déjà marqué. En fait de bois, &

sur-tout de grands bois , lorsqu'on s'apperçoit de la disette , elle est bientôt extrême ; les réparations sont très longues , il faut cent cinquante ans pour former une poutre : les connoissances , quelquefois le courage , plus souvent les moyens manquent au plus grand nombre des cultivateurs. Ajoutons que dans cette partie de l'économie rustique , on n'y voit point de ces prompts changements de scene qui excitent la curiosité & animent l'intérêt dans ces tems où l'on est empressé de jouir.

Heureusement que la Maîtrise des Eaux & Forêts empêche aujourd'hui les dégradations & abattis arbitraires : on n'abandonne plus le bois de haute futaie au caprice des particuliers ; le tems de la coupe en est prescrit : on a mis aussi des réserves à la coupe des taillis , c'est-à-dire , des menus bois dont on fait des fagots , des chevrons , des cerceaux. On laisse toujours dix arbres par arpents lorsqu'on abat les hautes *futaies*. Voyez *ce mot*.

Le bois de corde , celui de charpente pour la fabrique des maisons & des vaisseaux , ont aussi paru trop importants pour n'être pas compris dans la même Ordonnance. Louis XIV ordonna de plus le quart en réserve de toutes les forêts des Gens d'Eglise & des Communautés Ecclésiastiques , ou , comme on dit , des *Gens de main-morte*. Peu content de ces sages précautions sur l'entretien des forêts , le Gouvernement , convaincu qu'une vigilance publique est dépositaire des droits de la postérité , a fait border nos grands chemins de longues files d'ormes ou d'autres bois voyers , pour être au besoin une ressource considérable , soit pour le présent , soit pour les générations suivantes. Le Voyageur , en traversant des Provinces entières , jouit à la fois , & de la verdure qui le couvre , & de la beauté du paysage qu'elle ne lui dérobe pas. Dans toute la France aujourd'hui on ne voit qu'avenues formées ou naissantes , & qui annoncent de tous côtés des jardins de plaissance , des châteaux , des villes.

Dans tous les pays , une forêt assure le chauffage à ses habitants voisins : c'est un trésor indispensable pour une grande ville ; on y amène d'ordinaire le bois flottant au fil de l'eau , ou lié par trains.

Il y a des forêts très renommées & d'une grande antiquité , telles sont la forêt d'Hercynie , la forêt Noire , la forêt d'Ardenne , & d'autres formées depuis peu ; mais il faut un certain laps de tems pour profiter de celles-ci. Voyez l'article FUTAIE , les mots BOIS & ARBRE , où l'on trouvera des détails sur la coupe du bois & sur différentes autres parties de l'économie forestière.

FORGERON , *Faber*. On donne ce nom à un poisson dans lequel on trouve les figures des instruments d'un Forgeron. C'est un gros & large poisson de mer qu'on découvre près des rochers. Sa tête est aplatie , osseuse , anguleuse , de couleur obscure , parsemée de quelques taches purpurines. Sa gueule est fort large & béante , mais sans dents : ses yeux sont grands , d'un jaune doré ; son dos est brun , & marqué au milieu d'une tache noire , & de trois petites figures de couleur dorée : ses écailles sont si petites , qu'on a de la peine à les appercevoir. Le forgeron est armé , des deux côtés , d'os

aussi aigus & aussi tranchants que des couteaux. Il se nourrit de poisson. Sa chair est tendre, bonne à manger : il est facile à digérer.

FORMICA-LEO. Voyez FOURMILION.

FORMICA-VULPES. On a donné ce nom à une espèce d'insecte, pour le distinguer du *formica-leo*, & marquer sa finesse. Un ami de M. Carré cherchant à la campagne des *formica-leo*, trouva dans le sable de ces trous qu'ils savent faire avec tant d'adresse; mais la plupart étoient sans *formica-leo*, ce qui lui fit croire que ces insectes avoient été la proie de quelques animaux plus lions qu'eux-mêmes. Il fut bien étonné, en remarquant au fond de ces trous de petits vers longs d'environ six lignes, sur une demi-ligne de large : il en prit quelques-uns qu'il mit dans du sable, où il leur vit faire leur trou à la manière des *formica-leo*. Il jeta à ces *formica-vulpes*, des fourmis que les *formica leo* aiment tant; & ils s'en saisirent avec ardeur, en les enveloppant avec la moitié de leur corps, car l'autre demeure enfoncée dans le sable. Comme ils n'ont pas autant de force que les *formica-leo*, leur proie leur échappe souvent; & pour la rattraper, ils se servent de la même ruse : ils construisent leurs fosses en talus; le sable s'éboule sous l'insecte qui fuit, & l'animal retombe. Les *formica-vulpes* s'en accommodent fort bien; mais il ne faut pas s'en étonner, puisqu'ils s'accoutument bien de leur propre espèce. Ces vers se métamorphosent en un insecte fort semblable au cousin, sinon qu'il est plus long & plus gros.

FOSSANE. Espèce d'animal qui se trouve en Afrique & en Asie, & que quelques Voyageurs avoient désigné sous le nom de *Genette de Madagascar*; mais cet animal en diffère absolument, car il n'a point la poche odoriférante; caractère bien distinctif de la genette de Madagascar. Il a les mœurs de notre fouine : se nourrit de viande & de fruits; mais il préfère les derniers. Les fossanes, quoique susceptibles de s'appriivoiser, conservent toujours un peu de férocité.

FOSSILES, *Fossilia*. Ce sont des substances qui se tirent du sein de la terre, & qui appartiennent au *Regne minéral*. Voyez ce mot. Cependant le nom de fossiles se donne principalement aux terres & aux pierres, & plus particulièrement encore aux coquilles & à toutes les productions à polipier de mer qui se trouvent dans les entrailles de la terre. Sous ces deux points de vue, les Naturalistes regardent les fossiles comme fossiles propres à la terre, ou comme fossiles étrangers à la terre.

Les premiers sont appelés en latin *fossilia nativa*, & comprennent les terres, les pierres, les sels, les sulfures & bitumes, les demi-métaux & métaux, même les pierres formées dans l'eau ou dans le feu. Voyez chacun de ces mots.

Les fossiles étrangers à la terre, *fossilia heteromorpha*, contiennent des productions qui ont appartenu aux regnes végétal & animal, & même des ouvrages de l'art. Les corps organisés ont été ensevelis dans la terre à différentes profondeurs, par une espèce de révolution locale; & selon les circonstances, ces fossiles ont été plus ou moins altérés. On en trouve encore

dans leur état primitif, & qui ont conservé en terre (sur-tout les coquilles) leur émail brillant, quelques couleurs, & les mêmes emplacements qu'elles avoient du tems que la mer les contenoit; d'autres qui sont terrifiés ou endurcis comme une pierre, ou convertis en spath; d'autres qui sont minéralisés par des sels, ou embaumés dans le bitume, ou détruits sous la forme d'un noyau ou d'une empreinte. Voyez ces mots. Il y a des endroits où l'on trouve de ces fossiles en si grande quantité, qu'on peut les ramasser à pleines mains. Ceux qui se trouvent dans les glaises, sont souvent chargés d'un enduit pyriteux, ou convertis en ochre de fer, &c. Voyez l'article PÉTRIFICATION; & encore les mots *astroïtes* ou *astérites*, *hystérolytes*, *ivoire fossile*, *ostéolithes*, *belemnites*, *glossopétres*, *entroques*, *coquilles-fossiles*, *fongites*, *échinites*, *bois pétrifié*, &c. & quantité d'autres articles de ce genre, répandus dans notre Dictionnaire : on peut aussi consulter la dixième classe de notre *Minéralogie*.

L'on peut dire que de tous les phénomènes que présente l'Histoire Naturelle, il n'en est point qui ait plus attiré l'attention des Naturalistes, que la quantité prodigieuse de corps étrangers à la terre, organisés & devenus fossiles. Que d'hypothèses, que de conjectures, que de systèmes pour expliquer comment ces substances ont été, pour ainsi dire, dépayssées & transportées d'un regne dans un autre ! Ce qu'il y a sur-tout de frappant, c'est l'énorme quantité de coquilles & de corps marins dont on rencontre des couches & des amas immenses dans toutes les parties du monde habité, & souvent à une distance très grande de la mer. Sans sortir de l'Europe nous en avons des exemples frappants; les environs de Paris même nous présentent des carrières inépuisables de pierres propres à bâtir, qui paroissent uniquement composées de coquilles-fossiles, lesquelles forment des couches immenses & toujours parallèles à l'horizon. Quelquefois il y a plusieurs couches séparées les unes des autres par des lits intermédiaires de terre ou de sable. Il semble que les animaux qui ont habité ces coquilles, aient vécu en famille, & formé une espèce de société : effectivement on trouve toujours les mêmes fossiles ensemble couchés sur le plat, & formant des amas considérables.

On a remarqué que les fossiles marins qui se trouvent dans nos pays, n'ont leurs analogues vivants que dans les mers des Indes & des pays chauds. Quelques individus qui sont de tous les pays, & que l'on trouve avec ces fossiles, ne détruisent point cette observation générale. Que peut-on penser de tant de corps marins renfermés en certains endroits dans la terre ! il faut absolument convenir qu'autrefois ces lieux ont servi de lit à la mer. Ce sentiment est celui de tous les Philosophes tant anciens que modernes. (Nous exceptons de ce nombre certains Savants qui succéderent aux siècles d'ignorance, & à qui la Philosophie péripatéticienne & les subtilités de l'école avoient fait adopter une façon de raisonner fort bizarre, prétendant que les coquilles & autres fossiles étrangers à la terre, avoient été formés par une force plastique, ou par une semence universellement répandue; en un mot,

comme des jeux de la Nature : tandis que l'analogie de la forme, de la structure organique, &c. eût seul suffi pour les détromper. Comment des explications aussi absurdes peuvent-elles trouver encore aujourd'hui des partisans). D'ailleurs l'expérience prouve que les amas de corps marins que l'on trouve dans l'intérieur de la terre, n'y ont point été jettés au hasard ; outre cela ces corps ne se trouvent point disposés comme étant tombés en raison de leur pesanteur spécifique, puisque souvent on rencontre dans les couches supérieures d'un endroit de la terre, des corps marins d'une pesanteur beaucoup plus grande que ceux qui sont au-dessous. Enfin, des corps fort pesants se trouvent quelquefois mêlés avec d'autres qui sont beaucoup plus légers : tout semble annoncer un séjour des eaux de la mer très long & de plusieurs siècles, & non pas une inondation passagère & de quelques mois, comme quelques-uns le prétendent. Nous le répétons, si les fossiles marins eussent été apportés par une inondation subite & violente, tous ces corps auroient été jettés confusément sur la surface de la terre ; ce qui est contraire aux observations. Ceux qui prétendent que ces corps ont été apportés par des courants d'eaux ; ne sont pas mieux appuyés, parcequ'on devroit plutôt trouver les fossiles dans le fond des vallées que dans les montagnes : cependant on trouve presque toujours le contraire. On voit par tout ce qui vient d'être dit, que le sentiment le plus probable est celui des Anciens, qui ont cru que la mer avoit autrefois occupé le continent que nous habitons. Tout autre système est sujet à des difficultés invincibles, & dont il est impossible de se tirer. Voyez les articles FALUN, DÉLUGE, TERRE, PÉTRIFICATION, & l'anecdote vers la fin du mot BOIS-FOSSILE.

FOTOK. Voyez POU DE MER.

FOU ou CANARD A BEC ÉTROIT, *Stulus*. Oiseau aquatique, ainsi nommé de la forme de son bec, & parcequ'il se laisse prendre à la main lorsqu'il vient se poser sur les vergues des vaisseaux qu'il trouve en mer. Le fou a la grosseur, le geste & le bec semblables à nos corbeaux : son bec est crenelé par les côtés. Il a les aîles & le dos couverts de plumes grises, & tout le ventre garni de plumes blanches : les quatre doigts de ses pieds sont palmés en la manière de ceux des canards. Il nâge fort bien : il bat de l'aîle en volant, & se soutient très bien en l'air. Il se nourrit de poissons qu'il prend en rasant la surface de l'eau. Il s'apprivoise aussi facilement en deux ou trois jours, que si on l'avoit élevé dès l'instant de sa naissance. Sa chair a un goût de marécage.

Le fou se trouve dans l'Isle de Cayenne : on en voit beaucoup sur le roc appelé le *Grand Connétable* aux Isles de Ramires. On en distingue plusieurs sortes qui different par la grandeur & par la variété des couleurs ; mais la plus grande quantité se rapporte aux caractères que nous venons de décrire. Le fou s'appelle aux Antilles *Epervier marin* : on le nomme aussi *Pirate de mer*, parcequ'il se nourrit de poisson, & qu'on lui apprend, comme au cormoran, à pêcher & à dégorger le poisson qu'il a pris.

FOUDRE. Est la matière enflammée qui sort d'un nuage avec bruit & violence.

violence. La matiere de la foudre paroît être la même que celle de l'électricité, & sur-tout du tonnerre : celui-ci n'en differe que parceque cette même matiere enflammée roule avec bruit au-dedans des nuages. Plus un pays exhale de vapeurs sulfureuses, plus il est sujet aux éclairs, au tonnerre, aux tremblements de terre, & à la foudre. L'Italie qui est remplie de soufre, en est un exemple; c'est aussi pour cela qu'il tonne toute l'année à la Jamaïque. Voyez TONNERRE, TREMBLEMENTS DE TERRE, VOLCANS & BITUMES. Les effets surprenants que produit la foudre ont fourni de tout tems une ample matiere à la spéculation des Physiciens, & à la superstition des peuples. On fait que les Romains porteroient au plus haut comble d'extravagance, ces folies : si le tonnerre grondoit du côté droit, c'étoit un bon augure; si au contraire on l'entendoit du côté gauche, c'étoit un signe fatal. Ciceron rapporte qu'il n'étoit pas permis de tenir les assemblées publiques lorsqu'il tonnoit : *Jove tonante, fulgurante, comitia populi habere nefas.*

FOUENES. Voyez au mot HÊTRE.

FOUGERE, *Filix*. Il suffit de lire les catalogues des nouveaux genres de cette espece de plante par le Pere Plumier, le Chevalier Hans Sloane & Petiver, pour être instruit que l'un & l'autre monde contiennent beaucoup de sortes de fougères, & qu'il n'y a point de plante à qui l'on ait fait tant d'honneur. Nous ne rapporterons ici que les trois especes principales : savoir, 1°. la *fougere mâle*, 2°. la *fougere femelle*, 3°. la *fougere aquatique*.

La FOUGERE MALE, *Filix non ramosa, dentata*. Sa racine est inodore, épaisse, & semble formée d'un assemblage de grosses fibres, charnues, jointes les unes aux autres, de couleur noire en dehors, pâle en dedans, d'une faveur d'abord douceâtre, ensuite un peu amere & astringente. Elle jette au printems plusieurs jeunes pousses, lesquelles se changent par la suite en autant de feuilles larges, hautes d'environ un pied & demi, droites, cassantes, vertes, étendues en aîles, & composées de plusieurs autres petites feuilles placées alternativement sur une côte garnie de duvet brun : chaque petite feuille est découpée en plusieurs crêtes, larges à leur base, & dentelées tout autour. Il regne une ligne noire dans le milieu des feuilles, & chaque lobe est marqué en dessus de petites veines, & en dessous de deux rangs de petits points de couleur de rouille de fer : ces points sont les fruits de cette plante (car on n'y voit point de fleurs apparentes; & l'on doute encore que ces graines, découvertes en Angleterre dès 1669 par M. Williamcole, & en Hollande en 1673 par Swammerdam, ne soient les étamines. On fait cependant que quelques graines de fougères furent découvertes en 1739 par M. de Jussieu, & que plusieurs autres l'ont été en 1760 par M. Maratti. Ils sont composés d'un tas de coques presque ovales, très petites, entourées d'un cordon à grains de chapelet, par le raccourcissement duquel chaque coque s'ouvre en travers, comme par une sorte de ressort, & jette beaucoup de semences menues. Cette fougere aime les lieux découverts, montagneux & pierreux.

FOUGERE FEMELLE ou fougere commune & ordinaire, *felix ramosa, non*

dentata. Sa racine est oblongue , grosse environ comme le doigt , noirâtre comme la précédente , serpentante & empreinte d'un suc gluant , d'un goût amer : étant coupée à sa partie supérieure , elle représente une espèce d'aigle à deux têtes ; c'est pourquoi quelques-uns nomment la fougere femelle , *fougere impériale* , à cause de cette figure d'aigle qui représente les armes de l'Empire d'Allemagne. Sa tige ou plutôt son pédicule est haut de cinq pieds ou environ , droit , ferme , branchu , un peu anguleux & rempli de moëlle. Ses feuilles sont disposées en aîles , comme celles de la fougere mâle , mais plus petites & non dentées. Ses fruits vésiculaires sont placés sur les bords des petites feuilles , qui se plongent & se réfléchissent tout au tour en automne , en formant des sinuosités. Quelques-unes de ces petites vessies contiennent dans certaines fougères , environ cent graines , si petites , qu'elles sont absolument invisibles à l'œil , & l'on ne peut les distinguer qu'à l'aide d'une excellente lentille. Quelle disproportion entre la graine & la plante ! On trouve dans les *Transact. Philosoph. n°. 461 , pag. 774 & suiv.* la manière d'observer le jet de ces graines & l'opération de la Nature sous le microscope , en faisant l'expérience avec la fougere fraîchement cueillie au commencement de Septembre. On peut donc dire que la fougere est une plante *épiphyllisperme* , c'est-à-dire portant ses graines sur le dos des feuilles. Cette plante croît par-tout dans les forêts ombrageuses & aux lieux stériles & déserts.

La FOUGERE AQUATIQUE , autrement dite *osmonde* ou *fougere fleurie* , est ainsi nommée ; de ce qu'elle croît aux lieux marécageux , dans les fossés , & de ce qu'elle ne porte point de fleurs. La racine de cette plante est un amas de fibres longues & noirâtres , entortillées les unes dans les autres. Ses tiges sont nombreuses & hautes d'environ trois pieds , vertes , cannelées , rameuses & s'étendant en large. Ses feuilles sont longues , assez étroites , terminées par une pointe mouffe , rangées par paires , plusieurs sur une côte terminée par une seule feuille. Le haut de la tige est partagé en quelques pédicules qui soutiennent chacun de petites grappes longues d'un pouce , chargées de graines. Les Herboristes nomment *fleurs d'osmonde* , les feuilles non développées qui cachent les graines naissantes. Les fruits sont ramassés comme en grappes , & sont des capsules sphériques semblables à celles des autres fougères : ils se rompent par la contraction de leurs fibres , & jettent une poussière d'une extrême finesse.

La fougere femelle est pour les Laboureurs une mauvaise herbe qui leur nuit beaucoup , & qui est très difficile à détruire quand elle a trouvé un terrain favorable pour s'y enraciner ; car souvent elle pénètre par ses racines jusqu'à huit pieds de profondeur ; & traçant au long & au large , elle s'élève ensuite sur la surface de la terre , & envoie de nouvelles fougères à une grande distance. Quand cette plante pullule dans les pâturages , il faut , pour la détruire , faucher l'herbe où elle se trouve , trois fois par an. Heureusement que les moutons la détruisent aussi très promptement en partie par leur fumier & leur urine , & en partie en marchant dessus. La fougere qu'on

coupe quand elle est en seve , & qu'on laisse ensuite pourrir sur la terre , est un excellent engrais.

La racine de fougere mâle donne par l'analyse chymique , les mêmes produits que celle de la fougere femelle. Le pauvre peuple du Nord de l'Angleterre fait des boules avec les cendres des fougères pètries dans de l'eau ; on les fait sécher au soleil & même rougir au feu , & on s'en sert au lieu de savon & de soude pour nétoyer le linge. Les gens de la campagne du Comté de Saxe , se servent aussi des fougères desséchées pour cuire la chaux & pour chauffer le four , en place de bois & de paille. Quelquefois on jette ces cendres de fougere sur des terres , afin de les améliorer ; d'autres fois on en tire un sel dont on fait , avec du sable , le verre verd qu'on appelle *verre de fougere* , & qui est si commun en Europe. Il y a des endroits où l'on se contente de mêler les cendres de fougere avec les cailloux ; le verre n'en est pas moins beau : tel est celui de Florence. On lit dans les *Transact. Philosoph.* n°. 105 , que les cendres de fougere femelle présentent un autre phénomène bien singulier. Si on expose une quantité de son sel fixe lixiviel à l'humidité , pour qu'il tombe en huile par défaillance (*per deliquium*) , on décante cette huile , & le reste du *lixivium* qui est rougeâtre , très pesant , étant mis à part dans un vaisseau de verre qu'on tient débouché pendant cinq ou six mois , laisse tomber au fond de la liqueur une assez grande quantité de sel précipité sur lequel nâge une liqueur claire. Sur la surface de cette liqueur , se forment des crySTALLIFICATIONS de sel d'une figure régulière , semblable à plusieurs plantes de fougere commune qui jetteroient un grand nombre de feuilles de chaque côté de la tige. Ces ramifications salines subsistent plusieurs semaines dans leur état , si l'on ne remue point le vaisseau ; mais le moindre choc les détruit , & alors elles ne se reforment jamais. Les Chinois font entrer dans la composition du vernis de leur porcelaine , le sel de la fougere avec la chaux & le borax , &c. Il seroit peut-être à désirer qu'on en tentât le procédé dans nos Manufactures de porcelaine : celle de Bristol n'a de la réputation que parcequ'elle est parvenue à découvrir le secret des Chinois.

Quant aux vertus médicinales , on préfere la fougere femelle. Sa racine étoit d'un usage très fréquent chez les Anciens pour les maladies chroniques : elle est apéritive & antispasmodique. Il faut éviter d'en donner aux femmes grosses , dans la crainte de leur procurer l'avortement. C'est aussi un excellent vermifuge & le plus grand secret des Empiriques , qui la mêlent adroitement avec quelque préparation mercurielle , pour chasser du corps les *lombrics* , les *vers plats* & le *solitaire*. Dans la disette de 1693 , les Auvergnats en faisoient du pain qui étoit fort mauvais , semblable à des mottes à brûler ; & cependant ils s'en nourrissoient , tant la nécessité fait trouver de ressources.

La principale vertu de l'osmonde , consiste dans ses grappes chargées de fruits , ou dans la moëlle blanchâtre de sa racine. Cette plante prise en infusion théiforme , est très utile pour les hernies des enfans , pour les

ruptures & les chûtes. Bien des personnes la regardent comme une panacée végétale.

FOUGERE ARBRE. Est cette belle & grande fougere que le Pere Plumier a mise à la tête des autres, dans la premiere planche de son Ouvrage. Ce végétal de l'Amérique croît en effet à la hauteur des arbres fruitiers d'Europe. Ses tiges font de très bons pieux pour les palissades du pays.

FOUGERE MUSQUÉE. Voyez à la suite de l'article CERFEUIL.

FOUGERE PÉTRIFIÉE. Voyez FILICITE.

FOUILLE-MERDE. Est le pro-scarabée de fumier, ou le scarabée pilulaire. Voyez les mots SCARABÉE & ESCARBOT.

FOUINE, *foyna, seu martes domestica.* La fouine que quelques Naturalistes ont confondue avec la marte, en differe cependant par le naturel, par le tempérament, & même un peu par les couleurs extérieures. La fouine & la marte peuvent être regardées comme deux especes distinctes; car il y a lieu de penser qu'elles ne se mêlent point ensemble.

La fouine, *martes fagorum*, differe de la marte, *martes abietum*, pour la couleur, en ce qu'elle est plus brune, & qu'elle a la queue plus grande & plus noire. Sa gorge est blanche, & celle de la marte est jaune: elle en differe par le naturel & le tempérament, puisque la marte fuit les lieux découverts, habite au fond des bois, demeure sur les arbres, & ne se trouve en grand nombre que dans les climats froids; au-lieu que la fouine s'approche des habitations, s'établit même dans les vieux bâtimens, dans les greniers à foin, dans des trous de murailles. Enfin l'espece en est généralement répandue en grand nombre dans tous les pays tempérés, & même dans les climats chauds, comme à Madagascar, aux Maldives; & elle ne se trouve pas, comme la marte, dans les pays du Nord.

La fouine est de la grandeur du chat: elle a la tête petite, le corps allongé, les jambes très courtes, une queue presque de la longueur de son corps, bien touffue, & dont le poil a deux pouces de longueur. Cet animal, dit M. de Buffon, a la physionomie très fine, l'œil vif, le saut léger, les membres souples, le corps flexible, tous les mouvemens très prestes: il saute & bondit plutôt qu'il ne marche; il grimpe aisément contre les murailles qui ne sont pas bien enduites, entre dans les colombiers, les poulaillers, mange les œufs, les pigeons, les poulets, en tue quelquefois un grand nombre, & les porte à ses petits. La fouine prend aussi les souris, les rats, les taupes & les oiseaux dans leurs nids.

La fouine s'apprivoise à un certain point; mais elle demeure toujours assez sauvage, pour qu'on soit obligé de la tenir enchaînée. M. de Buffon en a élevé une qui s'est échappée plusieurs fois de sa chaîne: les premieres fois elle ne s'éloignoit guere & revenoit au bout de quelques heures, mais sans marquer de la joie, sans attachement pour personne: elle demandoit cependant à manger comme le chat & le chien. Peu après elle fit des absences plus longues, & enfin ne revint plus: elle avoit alors un an & demi, âge apparemment auquel la Nature avoit pris le dessus, dit M. de Buffon. Elle

mangeoit de tout ce qu'on lui donnoit, à l'exception de la salade & des herbes. On a remarqué qu'elle buvoit fréquemment ; qu'elle dormoit quelquefois deux jours de suite ; qu'elle étoit aussi quelquefois deux ou trois jours sans dormir, & que pour lors elle étoit toujours dans un mouvement continuel.

Les fouines s'établissent, pour mettre bas leurs petits, dans un trou de muraille, dans un grenier à foin, dans un trou d'arbre. Elles portent autant que les chats. On trouve des petits depuis le printems jusqu'en automne. Ces animaux ne vivent guere que huit ou dix ans ; car au bout d'un an ils ont acquis presque toute leur grandeur naturelle.

Les fouines, ainsi que les *martes*, rendent des excréments d'une odeur de musc. Ces animaux ont des vésicules intérieures qui contiennent une matière odorante, semblable à celle que contient la *civette*. La chair de ces animaux en contracte un peu l'odeur ; cependant celle de marte n'est pas mauvaise à manger, au-lieu que celle de la fouine est très désagréable. Comme ces animaux sont de terribles destructeurs de volailles, on tâche de les prendre au piège, en y mettant pour appas un poulet ou un œuf.

La fourrure de la fouine est moins estimée que celle de la marte : on la met au rang des pelleteries communes, appelées *Sauvages*. Les fouines sont très communes en France. Il y a en Natolie une espece de fouine, dont le poil est très fin & très noir, & dont les fourrures sont très estimées. C'est au Levant & à Constantinople que s'en fait la plus grande consommation.

FOULIMENE ou OISEAU DE FEU. On le trouve dans l'Isle de Madagascar. Ses plumes sont de couleur écarlate : sa beauté fait regretter les difficultés qu'on a d'en élever. Il meurt en hiver.

FOULON, *Fullo*. Est un insecte volant, du nombre des coléoptères, & qui ronge les racines des arbres. Cet insecte est fort commun. Le mâle a les antennes de couleur de feuille, & oblongues : la femelle les a rondes : leurs élytres ou aîlés feuillées sont tachetées de blanc. Ce scarabée maculé provient d'un ver blanc, qui acquiert en grandissant des taches brunes sur le dos, & qui ensuite se métamorphose en *foulon*. Quelques-uns donnent improprement le nom de *frélon* au *foulon*, & celui de *foulon* à la guêpe. Voyez ces mots.

FOULQUE ou POULE D'EAU, *Gallina aquatica*. Est un oiseau aquatique & de l'ordre des oiseaux plongeurs. On en distingue plusieurs especes principales : savoir, la *foulque*, proprement dite le *diable de mer* ou *macrelle*, la *macreuse* de la baie d'Hudson, la *Poule d'eau* du Mexique & la *mouette* ; mais nous ne parlerons dans cet article que de la foulque.

La Foulque, *Fulica*, est ainsi nommée de sa couleur de suie. Cet oiseau est gros comme une poule ordinaire, a la poitrine cendrée, le dos noir-brunâtre, le devant de la tête est de figure ovale, sans plumes, mais couvert

d'une pellicule blanche incarnate , représentant en quelque sorte la crête d'une poule. Sa langue est plus molle que celle de la poule : il a le bec court, pointu , fort , & de couleur blanche ; le gozier rempli de petites dents molles. Il a aux pieds des membranes noires fort larges , disjointes ; il n'a que le doigt de derrière frangé : il marche gravement , se tenant droit sur ses longs pieds , dont les ongles sont un peu courbes & pointus ; mais il court légèrement. Il se plaît dans les marais , dans les fossés des places de guerre , dans les étangs : il se perche rarement sur des arbres. Il se nourrit d'herbes & de semences. On estime assez sa chair , quoiqu'un peu marécageuse : on en peut manger en carême. Roberg a remarqué à cet oiseau une singularité ; c'est que ses côtes sont doubles & osseuses , & qu'elles se croisent.

Cet oiseau fait son nid d'herbes , de joncs brisés , &c. de manière qu'il flotte sur la surface de l'eau , & qu'il est susceptible de hausser & de baisser , selon la crue ou la diminution de l'eau. Sa construction est telle dans les joncs , qu'il n'est point entraîné par le courant de l'eau.

FOURMI , *formica*. Cet insecte a été beaucoup vanté pour son travail , sa diligence & son économie , sans qu'on ait bien connu en quoi consiste ce travail , cette diligence , cette économie , en un mot , l'industrie , la science & la politique de ces petits animaux. Ce qu'on a dit des prétendues provisions que les fourmis font l'été pour l'hiver , se trouve détruit par des observations modernes. Ce seul fait prouve combien les faits d'Histoire Naturelle les plus reçus , ont encore besoin d'être examinés de nouveau.

La fourmi est un insecte qui , vû au microscope , paroît fort curieux par la structure de sa tête , de son corps , de sa queue , de ses yeux , de ses cornes , de ses mâchoires , de ses jambes & par son armure hérissée de soies blanches & brillantes. Voyez les Observ. microscop. de Hooek , de Powers , de Bakers & de Lewenhoëck.

On distingue plusieurs sortes de fourmis , dont la plus grande différence se trouve dans la grandeur & la couleur ; mais dont l'historique est à-peu-près le même. Il y en a deux espèces qui frappent communément notre vue ; savoir , la petite espèce de fourmi rouge , que nous voyons dans nos jardins sur nos arbres , & la grosse fourmi des bois.

On nomme *fourmillière* le lieu que les fourmis ont choisi & qu'elles ont arrangé pour y établir leur domicile. On trouve dans une fourmillière des fourmis mâles , des femelles , & des ouvrières ou mouches sans sexe , comme parmi les abeilles. Ces trois espèces de fourmis ont des différences sensibles entr'elles , & il y a des caractères propres qui distinguent ce genre d'insecte de tout autre.

Un de ces caractères principaux , tiré de l'inspection seule de l'insecte , consiste en une petite écaille relevée qui se trouve placée dans la fourmi précisément entre le corselet & le ventre , à l'endroit où ces deux parties se tiennent par un pédicule mince & court. Cette écaille se trouve dans toutes les espèces de fourmis & dans tous les individus , soit mâles , soit femelles ,

soit dépourvus de sexe ou mulets : ce caractère est très propre à faire distinguer les fourmis ailées , que l'on pourroit quelquefois méconnoître , de toutes les autres especes d'insectes.

Les mâles & les femelles de ces insectes sont ailés , suivant les observations de l'Auteur de la *nouvelle Histoire abrégée des Insectes* , quoique quelques Naturalistes eussent avancé qu'il n'y avoit que les mâles qui eussent des aîles. Les fourmis ouvrières n'acquièrent jamais d'aîles , suivant ces observations. Les mâles sont de toutes les fourmis les plus petites. Je les ai trouvés , dit l'Auteur dont nous venons de parler , moins gros que les fourmis ouvrières. Ces mâles , outre leur petitesse , sont reconnoissables par la grosseur de leurs yeux qui est considérable par rapport à leur corps. Les femelles sont très grandes , très grosses , ailées comme les mâles , & surpassent de beaucoup pour la grosseur toutes les autres fourmis , mais leurs yeux sont plus petits à proportion , que ceux des mâles. Enfin les ouvrières tiennent le milieu pour la grosseur entre les mâles & les femelles : elles sont dépourvues d'aîles , mais elles ont les mâchoires plus grandes que les unes & les autres : on observe que leur mâchoire inférieure est divisée en deux parties qui sont courbes , qui avancent au dehors , & qui sont terminées chacune par sept petites pointes ; ces deux portions de mâchoires sont mobiles , & servent comme des bras pour transporter les jeunes fourmis , &c. aussi les ouvrières sont-elles chargées de tous les travaux de la fourmillière.

On ne rencontre gueres dans les fourmillières que les ouvrières & les femelles. Ces dernières s'y rendent pour déposer leurs œufs. Les mâles volent aux environs & vont s'accoupler avec les femelles qui voltigent aussi , mais ils s'approchent peu de l'habitation générale. On les voit souvent le soir en été voltigeans tout accouplés avec leurs femelles. Ces dernières en volant les emportent en l'air avec elles , & on est tout surpris en les attrapant au vol , de voir qu'au lieu d'un seul insecte on en a saisi deux dont l'un est cinq ou six fois plus gros que l'autre.

Ces petits insectes établissent ordinairement leur fourmillière dans un terrain sec & ferme , au pied d'un arbre ou d'un mur ; ils la placent toujours du côté qui est échauffé par le soleil. L'entrée de cette habitation est un peu ceintrée en voûte , soutenue par des racines d'arbres ou de plantes , ou de paillettes allongées , qui empêchent en même-tems l'eau d'y pénétrer. Les fourmis s'établissent , autant qu'il leur est possible , dans un lieu déclive ; il paroît que la terre qui est humectée leur convient mieux que celle qui est trop sèche ou trop humide : quelquefois il y a deux ou trois entrées pour une seule demeure. Ces entrées conduisent à une cavité souterraine enfoncée souvent d'un pied & plus en terre , assez large , irrégulière en dedans , mais sans aucune séparation ni galerie , ainsi que quelques Naturalistes l'avoient avancé. On sent qu'une pareille cavité doit avoir coûté beaucoup de peines & de travaux à des insectes aussi petits. Ils ne peuvent détacher à la fois qu'une très petite molécule de terre & l'emporter ensuite dehors à l'aide de leurs mâchoires ; mais le nombre des ouvrières supplée à leur force & à

leur grandeur. Ce nombre prodigieux de fourmis travaille à la fois sans s'incommoder & s'embarrasser : elles ont soin de se partager en deux bandes ; dont l'une est composée de fourmis qui emportent la terre dehors , l'autre de celles qui rentrent pour travailler ; par ce moyen l'ouvrage va continuellement & sans interruption. Qui ne pourroit accorder de l'intelligence à tous ces petits animaux , & avouer que l'Auteur de la nature les a rendus tels , en renfermant dans leur corps une ame d'une espece convenable à leur condition ?

Lorsque la fourmilliere est creusée , les fourmis s'y retirent les soirs , & ce n'est qu'après ce travail fait , qu'elles pensent à manger ; jusques-là on les voit uniquement occupées à leurs travaux. Pas une ne porte de la nourriture à l'habitation ; mais lorsque leur ouvrage est fini , elles vont à la picorée. Tout leur est bon , fruits , graines , insectes morts , charogne , pain , sucre. Dès qu'elles ont trouvé quelque butin , elles s'en chargent pour le porter à la fourmilliere , & en faire part à leurs compagnes. Ainsi c'est à la fourmilliere que l'on porte les vivres pour la consommation journaliere ; c'est là le réfectoire , la salle des festins & le lieu d'assemblée : il n'y a point de table particuliere chez cette république , tout y est en commun. Différens rameaux conduisent au même centre. On voit ces insectes porter ou tirer des fardeaux beaucoup plus pesans qu'eux. Si le morceau est trop lourd , les fourmis se mettent quelquefois trois ou quatre après , ou bien elles le déchirent avec leurs mâchoires & l'emportent piece à piece. Il semble que celles qui ont fait quelque bonne découverte en fassent part à leurs compagnes : on ignore par quel signe cet avis se communique , mais l'on peut conjecturer que c'est par un coup de tête , ou un coup de patte , appliquée d'une certaine façon que celle-ci donne à la premiere qu'elle rencontre en revenant sur ses pas ; celle-là se conduit de même envers sa plus proche voisine , & ainsi de l'une à l'autre , de sorte qu'en un instant toute la république est instruite de l'heureuse nouvelle : en effet , aussi-tôt qu'elles sont retournées au domicile commun , on voit toute la fourmilliere se mettre en marche & former une espece de procession. Toutes vont l'une après l'autre prendre part au butin , en suivant les traces de celle qui a découvert la capture & qui sert de guide , & elles le rapportent avec le même ordre dans la fourmilliere , en formant une autre bande qui n'interrompt point la file de celles qui viennent. Si dans la marche quelqu'une vient à périr par accident ou autrement , d'autres emportent aussi-tôt son corps assez loin. On peut faire sortir des légions de la fourmilliere , & les mettre en quête en répandant à un , deux & trois pieds de distance , du pain en miettes , ou de menues graines. Il nous est arrivé de faire cette épreuve entre deux fourmillieres & nous avons observé que toutes les fourmis d'une même république se connoissent ; amies entr'elles elles ne souffrirent point la visite d'étrangères , & quand elles arrivèrent pour picorer sur le champ où il y avoit du butin , chaque fourmi de la même cité rebrouffoit chemin , il y en avoit cependant qui se battoient & le parti le plus fort s'emparoit des victuailles.

Les fourmis sont carnassieres : elles ne s'attachent pas seulement aux carcasses des hannetons & des autres scarabés ; mais si l'on jette dans une fourmilliere une grenouille , un lézard , une vipere ou un oiseau , on les trouvera au bout de quelques jours disséqués dans la dernière perfection. C'est le vrai moyen d'avoir les squelettes de ces animaux plus délicatement préparés qu'ils ne pourroient l'être par les mains des plus subtiles Anatomistes. Il y a du risque à les irriter : elles dardent un petit aiguillon qu'elles ont au derriere , & insinuent dans la plaie une liqueur âcre & mordicante qui occasionne de petites enflures accompagnées de démangeaisons. La nourriture que les fourmis rapportent à leur habitation n'est point mise en réserve , elle est consommée entr'elles sur-le-champ , & sur-tout elle est partagée à leurs petits. On trouve tout au plus dans le souterrain quelques restes qui n'ont pu être mangés tout de suite , encore les fourmis les emportent-elles promptement dehors dès qu'ils commencent à fermenter ou à se gâter.

Le principal soin des fourmis regarde leurs petits. Ces insectes ressemblent en cela aux abeilles : ils ne travaillent avec tant d'ardeur & d'activité que pour la propagation de leur espece. Ce sont les femelles ailées qui déposent leurs œufs. C'est pour cette raison qu'on trouve ces femelles dans les fourmillieres , mêlées avec les ouvrières , mais en beaucoup plus petit nombre. On les y voit sur-tout dans le fort de l'été qui est le tems de la ponte : dans les tems froids il n'y en a aucune ; toute la fourmilliere n'est composée que des ouvrières , qui n'ont point d'ailes. Pendant cette saison les femelles périssent , mais elles sont remplacées au printems par celles qui éclosent des nymphes qui ont passé l'hiver. Le seul travail des femelles est de déposer leurs œufs ; les ouvrières ont soin du reste. Les œufs sont blancs , petits & presque imperceptibles. Au bout de quelques jours il en sort des vers qui grossissent bien vite , & au point d'être même plus gros que les fourmis : ce sont ces vers blancs que l'on nomme improprement *œufs de fourmis* , & que l'on vend dans les marchés pour nourrir les rossignols , les perdrix , & dont on nourrit aussi les faisandeaux. Les ouvrières ont le plus grand soin de ces jeunes vers. Comme ils sont tendres & délicats , elles ont attention vers le milieu du jour , pendant la chaleur , de les apporter à l'entrée de leurs souterrains pour leur faire sentir l'influence de l'air doux. A l'approche de la nuit elles les reportent au fond de la fourmilliere pour les garantir du froid. On voit les fourmis porter avec leurs mâchoires ces vers beaucoup plus gros qu'elles , sans cependant les blesser. Elles les nourrissent avec le même soin : si les vivres sont rares elles font diete & donnent tout à leurs petits. Comme ces vers n'ont point de pattes , lorsqu'ils sont gros ils ressemblent assez à une espece d'œuf allongé. Si on les examine au microscope , on voit que leur tête est recourbée vers leur poitrine , & que leur corps est composé de douze anneaux. Le ver parvenu à sa grosseur passe à l'état de nymphe : voyez au mot INSECTE les détails curieux de ces transformations.

Les nymphes sont dans les commencemens fort molles & presque fluides , elles sont enveloppées d'une peau blanche & transparente , qui a l'air d'une pellicule. A mesure que la nymphe se fortifie & prend de la consistance , cette peau , qui paroïssoit remplie de fluide , se colle & s'applique sur les différentes parties de la nymphe , & l'on distingue alors très bien toutes les parties de la fourmi qui doit sortir de cette enveloppe.

Les fourmis ont pour ces nymphes & pour les enfans les mêmes soins que pour les vers , excepté qu'elles ne sont pas obligées de leur donner de la nourriture. Ces soins sont si indispensables , que jamais Swammerdam ne put parvenir à faire éclore à l'aide d'une chaleur artificielle les nymphes des fourmis. Lorsque la nymphe est parvenue à sa perfection , elle quitte son enveloppe , & devient un insecte complet , une véritable fourmi , ailée si elle est mâle ou femelle , & sans aîles lorsqu'elle est du nombre des ouvrières. C'est toujours en l'air que se fait l'accouplement des fourmis. Les femelles fécondées vont ensuite à la fourmillière pour y déposer leurs œufs. Cela fait , tous les mâles périssent , ainsi qu'une grande partie des femelles , & on ne trouve guere que des ouvrières dans le commencement de l'hiver. (Peut-être les fourmis mâles ont-ils le sort des abeilles mâles que les ouvrières tuent après que les femelles sont fécondées.) Pendant cette mauvaise saison elles restent dans leur souterrain , où elles sont engourdies sans aucun mouvement comme beaucoup d'autres insectes & entassées les unes sur les autres. On voit par-là combien il seroit inutile à ces insectes de faire les provisions qu'on leur a attribuées. Aussi ne font-ils aucun amas. Mais dès que les premières chaleurs du printemps se font sentir , les fourmis commencent à se réveiller de leur état léthargique , elles débouchent les ouvertures & toutes les issues intérieures des rameaux qui aboutissent au lieu où elles se retirent ; elles sortent enfin de leur demeure pour aller jouir de l'air & chercher des alimens.

Mais que signifie cette cérémonie que nous voyons tous les jours se pratiquer dans les allées de nos jardins ? Une fourmi en embrasse une autre , qui se replie entre ses serres & ses jambes de devant , sans que cela empêche la porteuse de marcher librement par-tout où elle a affaire. Se rendent-elles ce service-là mutuellement ? Lorsqu'on les prend dans cet état , celle qui étoit portée par l'autre , & dont le dos recourbé sembloit toucher la terre , se déprend , & en les remettant à bas , chacune enfile le chemin qui lui convient. On ne remarque pas que l'une soit plus petite que l'autre , & que ce soit une politesse du mâle pour la femelle : *Replique de M. de la Soriniere à M. Carré sur la police des fourmis , que cet Auteur a inserée dans le Mercure du mois de Mai 1749.*

Les fourmis ont beaucoup d'ennemis ; le piverd , ainsi que toutes les pies , en détruit beaucoup , & plusieurs autres oiseaux en sont fort avides. On peut voir au mot FOURMI-LION , la jolie chasse que cet insecte en fait. On a cru , pendant long-tems , que les fourmis portoient une grande amitié aux

pucerons , autour desquels elles s'amassent , & qu'elles semblent lécher & caresser. L'observation a appris que cette prétendue amitié n'est fondée que sur ce que les fourmis sont fort friandes d'une espece de liqueur sucrée & mielleuse que rendent les pucerons , & dont ils sont fort souvent enduits. On fait une guerre cruelle aux fourmis dans la crainte qu'elles ne gâtent les arbres ; mais ce ne sont point elles qui leur font du tort ; ce sont les pucerons qui s'attachent aux fleurs , & qui recoquillent les feuilles des pêchers & des poiriers en les suçant. Cependant comme les fourmis attaquent nos fruits , il est important de s'en défaire. On les attire dans des bouteilles à moitié pleines d'eau miellée où elles se noient. Un des moyens les plus efficaces , pour les détruire , est de bouleverser la fourmilliere en tems d'hiver ou de pluie ; l'eau du ciel alors les noie & les fait périr. Il est d'autant plus essentiel de détruire les fourmillieres qu'elles causent aussi un grand dommage aux prairies sèches , sur-tout dans les pays chauds , non-seulement en diminuant d'autant le fourage qui y est précieux , mais encore en alterant la sève de l'herbe & ne laissant qu'une nourriture pernicieuse au bétail affamé : en un mot elles brûlent toutes les voies qu'elles se frayent : cela se reconnoît sur le gazon , où leur chemin devient bientôt marqué , sans herbe & tout brûlé.

Quelques Observateurs prétendent que les grosses fourmis font du tort aux bois , parcequ'elles s'attachent sur les jeunes tiges de chêne , & les font périr , ou languir.

Fourmis étrangères.

Il y a aux Antilles une espece de fourmis noires , que l'on appelle *chiens* , à cause de leur piquure qui est plus douloureuse que celle des *scorpions* ; mais cette douleur dure au plus une heure , & n'est point suivie de dangers. Les fourmis sont en si grand nombre dans ce pays là , qu'elles causent souvent de grands dommages , en enlevant les graines de tabac & autres plantes aussi-tôt qu'elles sont semées. Elles infectent aussi les provisions de bouche , telles que les confitures , les viandes , les graisses , les huiles , les fruits , &c. Quelquefois elles couvrent les tables , de façon qu'on est obligé de les abandonner sans pouvoir manger de ce qui a été servi ; on est aussi contraint de sortir de son lit lorsqu'elles y arrivent. La nature à cet égard traite fort mal les Mexiquains , ils sont obligés de porter leurs lits dans des especes d'îles , ou de les suspendre entre des arbres , ou de les jucher sur de grands bassins d'eau , sur des étangs. Quelquefois on trouve à peu de profondeur une surface fort étendue en tous sens , composée d'œufs & de nymphes de ces fourmis vénimeuses : dès que ces fourmis ont mangé les racines d'un arbre , aussi-tôt l'arbre perd toutes ses feuilles & devient noir comme s'il étoit brûlé. Les Castellans qui habitent ce pays , n'ayant pas le courage de chercher quelques moyens humains de se délivrer de ce fléau , ont jugé plus à propos & sur-tout plus facile d'employer un moyen surnaturel , qui ne leur

réussit pas mieux. Pour se faire un Protecteur contre les fourmis & ne rendre jaloux aucun des Saints qu'ils connoissent, ils ont jetté le fort; il est tombé sur Saint Saturnin.

Au Sénégal, on voit des fourmis blanches, dont les fourmillieres sont élevées en forme de pyramide, unies & cimentées au-dehors : elles n'ont qu'une seule ouverture qui se trouve vers le tiers de leur hauteur, d'où les fourmis descendent sous terre par une rampe circulaire.

Sur la Côte d'Or, en Guinée & à Maduré, dans les Indes Orientales, on trouve des fourmillieres au milieu des champs, qui sont de la hauteur d'un homme, & qui sont enduites en dessus d'un mortier impénétrable : elles en construisent encore de grandes sur des arbres fort élevés. Ces fourmis, que les Indiens nomment *carreyan*, viennent quelquefois en troupe, comme une armée, dans les habitations. On distingue, dit-on, à la tête de leurs bataillons trente ou quarante guides qui surpassent les autres en grosseur, & qui dirigent leur marche. Si on a oublié d'enfermer quelques provisions de bouche, elles s'en emparent, & l'armée des fourmis se retire avec beaucoup d'ordre, en emportant avec elle son butin.

Pendant le séjour que l'Auteur qui cite ces faits fit au Cap de Corse, un grand corps de cette milice vint rendre visite au Château. Il étoit presque jour, lorsque l'avant-garde entra dans la Chapelle, où quelques domestiques Negres étoient endormis sur le plancher : ils furent éveillés par l'arrivée de cette petite armée, dont l'arrière-garde étoit encore à la distance d'un quart de mille. Après avoir tenu conseil sur cet incident, on prit le parti de mettre une longue traînée de poudre sur le sentier que les fourmis avoient tracé & dans tous les endroits où elles commençoient à se disperser : on en fit sauter ainsi plusieurs millions qui étoient déjà dans la Chapelle. L'arrière-garde ayant connu le danger, tourna tout d'un coup, & regagna directement ses habitations. Le rat & plusieurs autres animaux ne peuvent éviter ces fourmis : elles se jettent sur leur corps, les accablent par le nombre & par les blessures, & les entraînent où elles veulent. En une seule nuit elles dévorent des moutons & des chevres, & il n'en reste que les os.

A Batavia, les fourmis font leurs fourmillieres sur des cannes, pour éviter les inondations : elles les construisent avec une terre grasse, & y forment des cellules.

Les Habitans de Paramaribo (colonie Hollandoise dans le pays de Surinam) voient arriver, dans de certains tems, des fourmis, que les Portugais appellent *fourmis de visites* ou *visitatrices*. Ces fourmis marchent en grande troupe, & exterminent les rats, les souris & autres animaux nuisibles.

Lorsqu'on voit paroître ces fourmis, on s'empresse d'ouvrir les coffres & les armoires, afin qu'elles puissent trouver les rats & les insectes : elles ne viennent pas aussi souvent qu'on le desireroit ; car il se passe quelquefois trois ans sans qu'il en arrive. Lorsque les hommes les irritent, elles se jet-

rent sur leurs fouliers & leurs bas qu'elles mettent en pieces. Ces fourmis de visite sont aussi utiles & aussi désirées , que les armées de celles de la Guinée sont redoutées.

Il faut convenir que les fourmis d'Europe ne rendent pas au genre humain des services de cette importance , mais aussi sont-elles moins cruelles envers les autres animaux. Cependant en Suisse , en Lusace , &c. on les fait servir à-peu-près aux mêmes usages. On en tire par exemple un parti merveilleux pour exterminer les chenilles : voici la maniere dont on s'y prend. Si un arbre est infecté de chenilles , on enduit le bas du tronc de poix molle , ou de glaise délayée , & l'on accroche au haut de l'arbre un sachet rempli de fourmis , auquel on laisse une ouverture par où elles puissent passer. Les fourmis parcourent l'arbre & ne peuvent l'abandonner , arrêtées par la glaise ; mais pressées par la faim , elles se jettent sur les chenilles , qu'elles dévorent universellement. *Journ. étrang. Avril 1762.*

Mademoiselle Mérian parle de fourmis extrêmement grandes qui se trouvent en Amérique , & qui , en une seule nuit , coupent toutes les feuilles de plusieurs arbres , & les emportent dans leurs nids pour la nourriture de leurs petits : elles habitent dans la terre , quelquefois à huit pieds de profondeur. Quand elles veulent aller quelque part où elles ne trouvent point de passage , elles se font un pont singulier. La premiere s'attache à un morceau de bois , qu'elle tient serré avec ses dents ; une seconde se place après la premiere ; une troisieme s'attache de même à la seconde ; une quatrieme à la troisieme , & ainsi de suite. Dans cette situation , elles se laissent emporter au vent , jusqu'à ce que la derniere attachée se trouve de l'autre côté , & aussi-tôt un millier de fourmis passent sur celles-ci. Ces fourmis sont-elles les mêmes que celles que l'on nomme *fourmis de visite* , qui se trouvent aussi en Amérique ?

Il y a une espece de fourmis en Amérique & dans les Indes Orientales qui ne marchent jamais à découvert , mais qui se font toujours des chemins en galerie , pour parvenir où elles veulent être. On les a vues se former ainsi des routes sur un tas de clous de gérosle qui alloit jusqu'au plancher , dans un magasin de la Compagnie des Indes Orientales. Arrivées là , elles percerent le plancher , & gâterent , en peu d'heures , pour une somme considérable d'étoffes des Indes , au travers desquelles elles s'étoient fait jour.

Des chemins d'une construction si pénible , semblent devoir coûter un tems excessif aux fourmis qui les font : il leur en coûte cependant beaucoup moins qu'on ne le croiroit. L'ordre avec lequel la multitude y travaille avance la besogne : on voit à côté l'une de l'autre , deux files de fourmis , dont l'une porte de la terre , & l'autre une matiere visqueuse. L'une des deux premieres de la file , applique sa terre au bord du tuyau ou de la voûte commencée ; l'autre dégorge la liqueur visqueuse : elles pétrissent toutes les deux cette terre , & lui donnent la forme qu'elle doit avoir : elles rentrent ensuite le long de la galerie , pour se pourvoir de nouveaux matériaux , & prennent leur place à l'extrémité postérieure des deux files. Les fourmis , qui après

celles-ci étoient les premières en rang, & toutes celles qui suivent, font de même; & par le moyen de cet ordre dirigé par un chef de chaque file qui marque la route, plusieurs centaines de fourmis travaillent dans un espace fort étroit sans s'embarrasser, & avancent leur ouvrage avec une vitesse surprenante.

On dit que la raison pour laquelle ces insectes font de si grands travaux, est pour se mettre à l'abri du soleil & de la lumière qui leur sont très dangereux; car elles meurent si elles y restent exposées trop long-tems: la nuit, au contraire, leur rend toutes leurs forces. Dans les pays qu'habitent ces fourmis, on est obligé, pour conserver les meubles, de les élever sur des piédestaux garnis de goudron. On voit aussi de ces espèces de fourmis dans la Guinée; on les appelle *vag-vague* au Sénégal. Voyez *POU DE BOIS*.

Barrere, dans son Histoire Naturelle de la France équinoxiale, parle de plusieurs espèces de fourmis qui se trouvent à Cayenne & dans d'autres parties de l'Amérique. Il y a, entr'autres, une espèce de fourmi volante, dont les Negres & les Créoles mangent le derriere, qui a la forme d'un petit sac, de la grosseur à-peu-près d'un pois chiche, & qui est rempli d'une liqueur blanchâtre, qui paroît n'être autre chose que les œufs mêmes de cet insecte.

Par-tout on remarque que chaque espèce de fourmi fait constamment bande à part, & qu'on ne les voit jamais mêlées ensemble; si quelqu'une par inadvertance se rend dans un nid de fourmi qui ne soit pas de son espèce, elle perd nécessairement la vie, à moins qu'elle n'ait le bonheur de se sauver promptement.

Fourmis qui donnent la Réfine laque, ou lac.

On a ignoré pendant long-tems quelle étoit la véritable origine de la résine laque; mais il paroît presque démontré présentement, qu'elle est dûe à des fourmis volantes, qui se trouvent dans plusieurs Provinces des Indes Orientales, telles que Pégu, Siam, Bengale & Malabar. Ces fourmis déposent la laque sur des branches d'arbres ou sur des branchages que les Habitans ont soin de piquer en grande quantité, pour servir de soutien à l'ouvrage de ces petits insectes.

M. Géofroi, *Mém. de l'Acad.* 1714, ayant examiné avec soin la laque en bâton, c'est-à-dire la laque attachée aux branchages, l'a reconnue pour être une sorte de ruche, approchant, en quelque façon, de celle que les abeilles ou d'autres insectes ont coutume de travailler. En effet, quand on la casse, on la trouve partagée en plusieurs cellules ou alvéoles, d'une figure assez uniforme, & qui marque que ce n'a jamais pu être une gomme ou une résine qui ait découlé des branchages sur lesquels on les trouve, comme quelques Naturalistes l'avoient pensé. Les cloisons de ces alvéoles sont extrêmement fines, & toutes pareilles à celles des ruches de mouches à miel. Comme elles n'ont rien qui les défende des injures de l'air, elles sont recouvertes d'une couche de cette même matière, assez épaisse pour leur servir d'abri; d'où l'on peut conclure que ces insectes ne travaillent pas avec moins

d'industrie que les abeilles , puisqu'ils ont beaucoup moins de commodités.

Ces alvéoles contiennent de petits corps plus ou moins renflés , & qui y sont moulés. Ces petits corps sont d'un beau rouge ; les uns plus foncés & les autres moins. Quand on les écrase , ils se réduisent en une poudre aussi belle que celle de la cochenille. En mettant ces petits corps dans l'eau , ils s'y renflent comme la cochenille , la teignent d'une aussi belle couleur , & en prennent à-peu-près la figure ; en sorte que la seule inspection fait connoître que ce sont de petits corps d'insectes , en quelque état qu'ils soient ; & ce sont vraisemblablement les embryons de ces fourmis. Ce sont ces petits corps qui donnent à la laque la teinture rouge qu'elle paroît avoir ; car quand elle en est absolument dépouillée ou peu fournie , elle ne donne qu'une teinte très légère. Il paroît donc que la laque n'est qu'une sorte de cire , que recueillent ces fourmis , comme les abeilles recueillent notre cire ordinaire ; soit qu'elle s'élabore dans l'estomac des fourmis ; soit qu'elles la trouvent dans l'état où elle est sur les fleurs & sur les arbres.

Il y a des fourmis à Madagascar qui construisent aussi des alvéoles sur des branches avec une espèce de laque , mais qui a absolument l'odeur & la couleur de la cire. Cette laque ne donne point de couleur , & ne peut être employée en teinture , ni à faire de la cire à cacheter ; cependant les habitants du pays s'en servent comme de colle & de mastic. Cette laque n'étant point d'usage dans le commerce , est moins connue.

Les fourmis de Pégu préparent & travaillent la laque pendant huit mois de l'année , pour la production & la conservation de leurs petits. C'est cette laque que les hommes ont su mettre à profit , en l'employant pour la belle teinture d'écarlate qui se fait au Levant , & dont l'on se sert principalement pour colorer les peaux de chevres , que l'on nomme cuirs maroquins : cette résine est aussi d'usage pour la cire à cacheter & pour le vernis.

On sépare la laque des bâtons en la faisant fondre : on la lave ; on la jette ensuite sur un marbre , où elle se refroidit en lames : on la nomme alors *laque plate*.

La laque en grain est ce qui reste de plus grossier après qu'on en a tiré la teinture : c'est cette laque qu'on emploie dans certains vernis , & pour la cire à cacheter. On colore cette cire avec du vermillon : la cire noire est colorée avec du noir de fumée ; & celle qui est de couleur d'aventurine , avec de l'orpiment.

Les Indiens font avec leur laque colorée , une pâte très dure , d'un très beau rouge , dont ils forment des bracelets appelés *manilles*. Le nom de *lac* ou *loc* que l'on donne à la résine ou cire laque , lui vient des Arabes , de qui les Indiens l'ont appris. On la nomme aussi *trec* dans le Royaume de Pégu & de Marraban.

Les fourmis contiennent un acide assez développé ; la preuve en est , que si l'on jette dans une fourmillière une fleur bleue , elle deviendra rouge. L'analyse qu'on a faite de ces insectes , démontre cet acide : on les distille avec de l'esprit-de-vin , & on en retire ce qu'on appelle *Eau de magnani*.

mité, à cause des grandes vertus qu'on lui attribue pour fortifier le corps ; & pour réparer les forces abattues. En effet, les fourmis sont regardées comme portant singulièrement aux voies urinaires & aux organes de la génération, & comme réveillant puissamment l'action des organes ; c'est pourquoy elles passent pour un remède excellent dans la foiblesse des vieillards, dans la paralysie, la disposition à l'apoplexie, la foiblesse de la mémoire, l'impuissance ; & cela, soit employées intérieurement en substance, soit extérieurement sous forme de bain ou de fomentation : on s'en sert encore contre le bourdonnement des oreilles. Voyez le *Traité des fourmis* de M. Gould, Lond. 1747, & les *Transact. Philosph. n^o. 482, Sect. 4.*

FOURMILIER ou TAMANOIR, ou TAMANDUA, ou MYRMÉCOPHAGE ; autrement GROS MANGEUR DE FOURMIS ou RENARD AMÉRICAIN, *Ursus formicarius*. Animal naturel au climat de l'Amérique Méridionale, dont le caractère est d'avoir le museau long, la gueule étroite, comme pointue, & sans aucunes dents, la langue ronde & longue, qu'il insinue dans les fourmillières, & qu'il retire pour avaler les fourmis dont il fait sa principale nourriture. On en distingue trois espèces.

La première, est le fourmilier *tamanoir*. Cet animal a, depuis l'extrémité de la queue jusqu'à l'extrémité de la bouche, environ six pieds & demi de longueur : son museau est extraordinairement allongé, l'ouverture de sa bouche très petite, sa langue menue & longue de plus de deux pieds ; il la roule dans sa gueule lorsqu'il la retire toute entière : ses oreilles sont courtes & rondes, ses yeux petits ; ses jambes de derrière sont longues d'un pied, & terminées comme celles de l'ours ; celles de devant sont un peu plus longues : il a quatre doigts aux pieds de devant, & cinq à ceux de derrière, qui sont tous armés d'ongles forts ; les deux du milieu des pieds de devant sont les plus longs, les plus forts & les plus crochus : sa queue est longue de deux pieds & demi, couverte de poils rudes & longs d'un pied ; ceux du col & de la tête paroissent tournés en avant ; ils sont tous variés de blanc, plus noirs cependant vers la partie postérieure du corps. On remarque une grande bande noire qui couvre la poitrine transversalement, passe sur les côtes, va se terminer sur le dos, vers la moitié de sa longueur ; les jambes de derrière sont noires ; celles de devant sont blanches, avec une tache noire vers le pied : c'est la plus grande espèce de fourmilier : elle se trouve dans la Guiane & dans le Brésil, où il est appelé *tamanduaguacu* ou *tamandua ouassou*.

Cet animal relève sa queue sur son dos, s'en couvre tout le corps lorsqu'il veut dormir ou se mettre à l'abri de la pluie & de l'ardeur du soleil ; les longs poils de la queue & du corps ne sont pas ronds dans toute leur étendue, ils sont plats à l'extrémité & secs au toucher comme de l'herbe desséchée ; l'animal agite brusquement & fréquemment sa queue lorsqu'il est irrité, mais il la laisse traîner en marchant lorsqu'il est tranquille, & il en balaie le chemin où il passe. Ses pieds paroissent moins faits pour marcher, que pour grimper & pour saisir des corps arrondis ; aussi serre-t-il avec une si grande force

force une branche ou un bâton, qu'il n'est pas possible de les lui arracher.

Le second de ces animaux est celui que les Américains appellent seulement *tamandua* : il est beaucoup plus petit que le *tamanoir* ; il n'a qu'environ dix-huit pouces depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue ; sa tête est longue de cinq pouces ; son museau est allongé & courbé en dessous ; il a la queue longue de dix pouces , & dénuée de poils à l'extrémité ; les oreilles droites , longues d'un pouce ; la langue ronde , longue de huit pouces , placée dans une espece de gouttiere ou de canal creux , au dedans de la mâchoire inférieure : ses jambes n'ont guere que quatre pouces de hauteur ; il a également quatre ongles aux pieds de devant , & cinq aux pieds de derriere ; il grimpe & serre aussi-bien que le *tamanoir* , & ne marche pas mieux ; il ne se couvre point de sa queue , qui ne pourroit lui servir d'abri étant en partie dénuée de poil , lequel d'ailleurs est beaucoup plus court que celui de la queue du *tamanoir* : lorsqu'il dort , il cache sa tête sous son col & sous ses jambes de devant.

La troisieme espece est le *petit fourmilier* , autrement dit le *petit mangeur de fourmis*. Les Guianois l'appellent *ouatirouaou* : c'est effectivement le plus petit des fourmiliers. Il a environ quinze pouces de long , y compris sa queue , qui est plus longue que le reste du corps : son col est très court. Il a deux doigts aux pieds de devant , & quatre à ceux de derriere ; son museau est court ; l'ouverture de sa bouche assez grande ; ses oreilles sont petites ; ses yeux grands : il est tout couvert de poils jaunâtres , mêlés de gris , doux au toucher comme de la soie. C'est le *Tamandua miri* du Bresil.

Au reste ces trois animaux , qui different si fort par la grandeur & les proportions du corps , ont néanmoins beaucoup de choses communes , tant pour la conformation que pour les habitudes naturelles. Tous trois se nourrissent de fourmis , & plongent leur langue dans le miel & dans les autres substances liquides & visqueuses ; ils ramassent assez promptement les miettes de pain , & les petits morceaux de viande hachée. On les apprivoise & on les élève aisément ; ils soutiennent long-tems la privation de toute nourriture ; ils dorment ordinairement pendant le jour , & marchent pendant la nuit. La langue de ces animaux est longue & ronde , un peu semblable à celle du Pic , de façon qu'ils peuvent la faire sortir & la retirer aisément ; mais ils la laissent traîner pour prendre des fourmis quand ils ont faim : pour cela ils vont près d'une fourmilliere , ils couchent leur museau à terre , sur le bord du sentier où les fourmis passent , ils poussent leur langue au travers du sentier ; les fourmis s'y arrêtent , & dans un instant leur langue en est couverte : dès qu'ils sentent qu'elle en est suffisamment chargée , ils la retirent en dedans & les engloutissent de la sorte ; ensuite ils recommencent le même exercice aussi long-tems qu'ils sont pressés de la faim. C'est avec les ongles ou griffes des pieds de devant qu'ils déterrent & culbutent les fourmillieres pour se nourrir de leurs habitans. Le Fourmilier marche si lentement qu'on peut le prendre aisément. Si on le touche avec un bâton , il s'accroupit sur ses pieds comme un ours. Comme il ne peut mordre , il se défend avec ses

griffes : il dort tout le jour , la tête posée entre ses deux jambes de devant : quand il boit , il sort de l'eau par ses narinés : il est d'une vie fort dure ; il ne marche que la nuit ; sa chair sent mauvais , cependant les Sauvages en mangent : pour l'animal , il exhale une forte odeur de fourmi. Les mâles ont cela de particulier , que leurs testicules sont cachés en dedans sous la peau. Les femelles mettent bas autant de petits qu'elles ont de tettes : ce qui leur est commun avec les truies. On prétend que ces animaux recourbent , ainsi que les singes , l'extrémité de leur queue en dessous , & s'en servent comme d'une main pour se suspendre aux branches des arbres ; dans cette situation ils balancent leurs corps , approchent leur museau des trous & des creux des arbres ; ils y insinuent leur langue , & la retirent ensuite brusquement pour avaler les insectes qu'elle a ramassés.

FOURMILLIERE. Nom donné à ces petits monceaux de terre que les fourmis forment en cône pour leur demeure commune , & pour la nourriture de leurs petits : *Voyez* FOURMI.

FOURMI-LION ou FOURMILLON ou FORMICALEO : *voyez au mot* DEMOISELLE DU FORMICA-LEO.

M. de Réaumur croit qu'il y a du côté d'Avignon une espèce de formicaleo , différente du nôtre par la grandeur. On en trouve à Saint-Domingue encore une espèce plus grande que celle des environs d'Avignon. Le formicaleo , du pays de Geneve , marche quelquefois en avant , il est plus gros & plus distinct. Toutes les espèces de formicaleo se métamorphosent , & sont de l'ordre des insectes névropteres. *Voyez à l'article* INSECTE.

FOURRAGE. Nom donné à tous les herbages qui servent de pâture aux animaux qui vivent de végétaux. Le fourrage du cheval comprend le *foin* , l'*avoine* , la *luzerne* , le *sainfoin* , le *son* , & la *paille de froment*. *Voyez ces mots*. Ces sortes de fourrages sont une partie de commerce & d'économie rustique , très précieuse : mais il y a beaucoup de choix ; car un fourrage peut être corrompu ou altéré par le mélange. Un animal libre , & abandonné à lui-même pour chercher sa pâture dans les prairies & dans les bois , n'a garde de brouter parmi les plantes celles qui de leur nature peuvent être nuisibles à sa santé ; son instinct seul le guide & dirige son appétit vers les plantes propres à son entretien. Mais il en est tout autrement pour un animal dans l'état d'esclavage , il est obligé de se nourrir de ce que l'aveugle industrie de l'homme lui prépare & lui présente. La nécessité lui fait prendre souvent des alimens qui lui sont contraires ; & son appétit naturel irrité par la faim , n'a pas la liberté du choix : combien n'a-t-on pas vu de fourrages altérés dans le pré pendant la fenaison , ou falsifiés par la cupidité des Marchands , dans un tems de disette , & produire au plus secourable des animaux (le cheval) le farcin , la gale , la maladie du feu , & souvent même la morve : c'est de la plupart des mauvais fourrages , que viennent ces maladies épidémiques qui s'étendent sur le bétail , se multiplient & font les plus grands ravages dans les armées , dans les villes & dans les campagnes : ainsi la nourriture la plus commune du cheval est aussi la plus suspecte. Nous avons donné , au mot

Foin, une liste des plantes qui doivent composer un foin salutaire ; voyez FOIN. Nous le répétons , l'on ne peut trop se mettre en garde contre l'usage d'un foin mêlé de mauvais herbages , c'est ce qui nous engage à indiquer ici les plantes malfaisantes qui peuvent se trouver confondues avec les bonnes , brisées , desséchées & bottelées ensemble. Les principales sont l'aconit , toutes les espèces de thymales , la gratiole , les perlicaires , la catapuce , le thlaspic , le thora , l'espèce de renoncule appelée *Douve* : ces végétaux sont pour le cheval autant de poisons qui lui donnent des tranchées de différens genres , & le font périr enflé , constipé.

La paille que l'on donne à manger aux animaux , ou qui leur sert de litière , est communément de froment. La plus nourrissante & la plus appétissante doit être blanche , menue & fourrageuse , c'est-à-dire mêlée de bonnes plantes , telles que sont la gesse , le fétu , le grateron , le laitron , le lizeron , le melilot , la perce-feuille , le pié-de-lievre , la vesce , la bourse à pasteur , la velvete , le coquelicot & plusieurs autres dont les graines nuisent beaucoup à la bonté du blé & de l'avoine. Mais cette nourriture n'est propre que pour les chevaux qui font peu d'ouvrage , & qui sont d'ailleurs grands mangeurs.

L'avoine est sans contredit le principal fourrage des chevaux : ils en font rarement dégoûtés , à moins qu'il ne se rencontre des graines de senevé , de colza , de coquelicot , &c. Voyez AVOINE. Le son est un accessoire du fourrage. Quand il est nouveau , les chevaux en sont friands : lorsqu'il est vieux il acquiert une rancidité qui empêche le cheval d'avaler l'avoine , ou de boire l'eau dans laquelle on en auroit mis : voyez PRAIRIES.

FOUTEAU , FAU ou FOYARD. Arbre de haute-futaie , qui se nomme aussi *Hêtre* : voyez ce mot.

FRAGMENTS , *Fragmenta preciosa*. Dans les boutiques des Apoticaire & des Droguistes , on donne le nom de cinq *Fragments précieux* , à des particules , de *rubis* , de *saphir* , d'*émeraude* , de *topaze* & d'*hyacinthe* , qui résultent de ces diverses pierreries à l'instant où le Lapidaire les dégrossit pour en former des pierres régulièrement taillées : souvent ces fragments ne sont que des *primes de pierreries ou quartzieuses* , ou de *spath fusible* : voyez ces mots. Autant les anciens employoient les *fragments* dans les compositions pharmaceutiques , autant les modernes instruits les proscrivent , & les regardent tout au plus comme capables de faire illusion à ceux que le brillant séduit. En effet , le plus grand bien qu'on puisse attendre des *fragments* pris intérieurement , c'est qu'ils ne produisent aucun mauvais effet : la pratique de la Médecine court assez d'autres hasards sans celui-là , & nous voyons actuellement en France ces pierreries rendues aux mains du luxe.

FRAGON ou PETIT HOUX : voyez HOU FRÉLON.

FRAI : voyez FRAY.

FRAISE. Ce nom se donne au fruit du *fraisier* : voyez ce mot ; & à une coquille bivalve de la famille des cœurs. *Fraise* est encore dans les animaux destinés à notre nourriture , les entrailles avec leur enveloppe.

FRAISIER, *Fragaria*. Plante basse & touffue, qui vient naturellement dans les forêts & à l'ombre, & qu'on cultive aussi dans les jardins où elle profite davantage : sa racine est vivace, fibreuse, de couleur brune foncée, d'un goût astringent ; elle pousse plusieurs pédicules ou queues menues, longues ; velues, grêles, branchues à leurs sommets, & qui portent des fleurs : elle jette aussi des queues de même longueur & figure, qui soutiennent des feuilles. De plus, elle pousse certains filamens noueux, qui serpentent sur terre, y prennent racine, & donnent, de chaque nœud, des feuilles & des racines, par lesquelles cette plante se multiplie. Ses feuilles sont au nombre de trois sur une queue, oblongues, peu larges, dentelées tout au tour, vénées, velues, vertes en dessus, & blanchâtres en dessous. Ses fleurs sont attachées quatre ou cinq à un même pédicule ; elles sont en roses, à cinq pétales blancs, placées en rond ; leur pistil se change, dans le printems, en un fruit ovoïde, plein de suc, charnu, mol, d'abord blanc, puis rouge extérieurement, rempli de graines menues, d'une odeur agréable, & d'un goût doux, vineux, fort exquis. Ce fruit s'appelle *fraise*, il mûrit quelquefois blanc.

Le goût des fraises cultivées est plus délicieux : cependant la fraise des bois est plus salubre & plus odorante : leur suc mis à fermenter donne du vin, dont on peut retirer un esprit ardent ; mais si on le laisse fermenter trop long-tems, il s'aigrit & se corrompt : le suc des feuilles du fraisier rougit légèrement le papier bleu ; & celui des racines le rougit considérablement. Ces racines sont mises au nombre des remèdes diurétiques, apéritifs & vulnéraires ; leur saveur est styptique & amère. M. Geoffroi a remarqué que si l'on boit souvent de la décoction de racines de fraisier & d'oseille, les excréments se colorent en rouge, de sorte qu'on croiroit d'abord que le malade est attaqué d'un flux hépatique ; mais il suffit de changer cette boisson, pour que les excréments reprennent leur couleur naturelle. En général, les fraises sont rafraichissantes, repriment la chaleur de l'estomac, & excitent les urines : on les sert principalement au dessert, avec du sucre & arrosées d'eau : mêlées avec du vin, ou du lait, ou de la crème, elles sont plus difficiles à digérer dans l'estomac, elles s'y aigrissent plus facilement, & alors elles causent des crudités nuisibles au genre nerveux. Si on mange trop de fraises, elles portent à la tête & enivrent un peu. On remarque aussi, que les urines contractent assez souvent l'odeur des fraises. On ne peut trop recommander le soin de laver les fraises avant d'en manger, parceque les crapauds & les serpens, qui en aiment l'odeur, repairent souvent sous les fraisiers, & jettent leur haleine ou leur bave sur leurs fruits. Dans les pays chauds, & même dans nos Caffés, on fait une boisson avec le suc des fraises, le suc de limons & de l'eau, en quantité égale, mêlés ensemble avec un peu de sucre. Cette boisson qu'on appelle *Bavaroise à la Greque*, est fort agréable. En Italie on broie la pulpe des fraises avec de l'eau rose, & on en fait ensuite avec le suc de citron une conserve délicieuse. Dans les boutiques des Apotiquaires & des Parfumeurs, on trouve une eau distillée de

fraises , qui est un excellent cosmétique , & utile en gargarisme pour les ulceres de la gorge. Les Dames s'en servent volontiers à leur toilette , pour effacer les rousseurs & les lentilles du visage. On prétend que le fraisier bouilli dans du vin rouge & appliqué sur l'*os pubis* , arrête les fleurs blanches , les trop fréquentes pollutions qui arrivent la nuit , & les gonorrhées qui ne sont pas virulentes.

Les fraisiers , tant ceux qui portent des fraises rouges que ceux qui produisent des fraises blanches , se multiplient de plant enraciné. Quand on en veut transplanter , on préfère le plant tiré des bois à celui des jardins : on prend au printems les traînasses qui se forment en sortant du corps du fraisier , & qui rampent sur terre , ou bien on les enleve en motte : elles prennent aisément racines , & au bout de deux ou trois mois , en Octobre , on les transplante. On a soin d'en placer trois ou quatre dans chaque trou qu'on fait avec le plantoir sur les bordures , ou en planches , ou sur des à-dos contre un mur exposé au midi , dans une terre neuve & légère , qu'on a attention d'arroser & de sarcler de tems à autre. Il est utile de ne laisser à chaque pied , que quatre montans des plus forts , & trois ou quatre fleurs de celles qui sont le plus près du pied , & on pince les autres. Il faut , quand il n'y a plus de fruit , couper rez pied & rez terre les vieux montans , si on veut avoir beaucoup de belles & bonnes fraises. On doit renouveler le plant , tous les trois ou quatre ans , & ne conserver que les traînasses qui sont nécessaires au plant. On obtient des fraises hâtives , ou dans des terres chaudes , ou selon l'exposition du sol & l'abri qu'on donne au plant.

Les ennemis du plant du fraisier sont les taons qui , pendant les mois de Mai & de Juin , mangent le col de la racine entre deux terres , & font ainsi périr la plante ; il faut alors parcourir les fraisiers , & fouiller au pied de ceux qui commencent à se faner ; d'ordinaire on y trouve le gros ver , qui après avoir causé ce premier mal passe , si on n'a soin de le détruire , à d'autres fraisiers , & les fait pareillement mourir. Les Anglois qui sont jaloux de la culture du fraisier , ne cessent de sarcler , d'arroser , & de détruire la vermine de cette plante.

M. Frezier en revenant de son Voyage de la Mer du Sud , a le premier fait connoître en Europe le fraisier du Chili , *fragaria Chiliensis fructu maximo , foliis carnosiss , hirsutis*. Il differe de toutes les especes européennes par la largeur , l'épaisseur & le velu de ses feuilles. Son fruit , de couleur rouge blanchâtre , est communément de la grosseur d'une noix , & quelquefois aussi gros qu'un œuf de poule ; mais sa saveur n'a pas l'agrément & le parfum de nos fraises de bois. Cette plante a donné du fruit au Jardin Royal de Paris , & en porte depuis quelques années dans le Jardin de Chelsea près de Londres. On a observé qu'elle réussit le mieux à l'exposition du soleil du matin , & demande de fréquens arrosemens dans les tems de sécheresse.

FRAISIER EN ARBRE : voyez ARBOUSIER.

FRAMBOISIER : voyez l'article RONCE.

FRANCOLIN , *Attagen* , est un oiseau qui ne fréquente que les montagnes : on le voit rarement en plaine , mais communément dans les Alpes , en Italie , & dans la chaîne des Pyrénées. Belon dit que le francolin est semblable à la canne - petière , mais plus petit : ses pieds & ses jambes sont couverts de plumes comme ceux du coq de bois ; sa tête ressemble à celle de la perdrix grise ; son bec est de même , court & fort. Son plumage est de différentes couleurs. Il porte sur la tête une huppe jaune avec des taches blanches , & des taches noires. Il y a au dessous du bec une sorte de barbe , composée de plumes très déliées. Il se nourrit de graines & de vers : on en voit de tous blancs dans les montagnes de la Savoie. Les francolins font leurs nids en terre & pondent autant d'œufs que la perdrix.

On faisoit autrefois beaucoup de cas de la chair du francolin. Martial en fait l'éloge comme du mets le plus exquis de l'Ionie : elle convient aux estomacs foibles. Les Italiens n'ont nommé cet oiseau *Francolin* , que parce qu'il est franc dans ce pays , c'est-à-dire , qu'il est défendu au peuple d'en tuer : il n'y a que les Princes qui aient cette prérogative.

Quelques-uns ont donné aussi au francolin le nom *Coq de marais* ; mais ce dernier oiseau est différent de notre francolin , par les lieux qu'il habite. Albin en a parlé sous le nom d'*Ægocephale*. Il se tient communément sur les parages sablonneux des mers , y cherche sa nourriture , & n'est pas plus effrayé à la vue du monde que ne l'est la mouette.

FRANGIPANIER , *Plumeria*. Est un arbre de l'Amérique qui s'élève d'environ dix à douze pieds hors de terre : il pousse de longues branches d'un pouce de diamètre , & à-peu-près d'égale grosseur partout d'une extrémité à l'autre , & dénuée de feuilles dans toute leur longueur. Les feuilles , ainsi que les fleurs , viennent par gros bouquets aux extrémités des branches ; en sorte que le reste de l'arbre paroît extrêmement nud. Les feuilles sont trois fois plus grandes que celles du laurier rose , & ont la figure d'un glaive. Quant aux fleurs elles ressemblent beaucoup à celles du jasmin ; mais elles sont plus grandes. On en distingue de trois couleurs ; celles du *frangipanier blanc* sont blanches , mais bordées d'un filet rose sur un des bords seulement : celles du *frangipanier musqué* sont rouges , & la couleur en est plus foncée vers les bords : enfin celles du *frangipanier ordinaire* sont d'une belle couleur de jaune oranger , qui passant par différentes nuances , se termine par un beau rouge de carmin : l'odeur de ces fleurs est très suave. Pour peu qu'on écorche ou qu'on casse une branche , ou qu'on arrache soit une feuille , soit une fleur du *frangipanier* , il en découle aussi-tôt un lait abondant épais , dont quelques habitans se servent pour guérir les vieux ulcères. Nous oublions de dire que le pistil de la fleur devient dans la suite un fruit ou une filique qui est double pour l'ordinaire , qui s'ouvre d'un bout à l'autre , & qui renferme des semences oblongues , garnies de feuilles , placées comme des écailles , & attachées à un placenta.

FRAXINELLE : voyez DICTAME BLANC.

FRAY , ou FRAI , se dit des œufs du poisson , & du tems où cet animal

les dépose dans l'eau ; mais ce tems varie selon les poissons. On dit en terme de Vénérerie qu'un cerf fraye , quand il frotte sa tête contre un arbre pour faire tomber la peau velue de ses nouvelles cornes. On dit encore *frai de grenouille* & *frai de salamandre* : voyez aussi l'article POISSON.

FRAYE : voyez au mot GRIVE.

FREGATE : *Hirundo marina rostro adunco*. C'est de tous les oiseaux celui qui vole le plus haut , le plus long-tems , le plus aisément , & qui s'éloigne le plus de terre : on l'appelle *Oiseau fregate* , par allusion à la légèreté & à la rapidité de son vol , qui semble imiter la vitesse des vaisseaux qui portent ce nom , & qui communément sont les meilleurs voiliers de la mer. Il n'est pas rare de rencontrer cet oiseau à trois cens lieues de terre : il ne peut se reposer sur l'eau sans périr : ses jambes sont courtes , grosses & ramassées ; ses pieds ne sont pas palmés , mais armés de griffes crochues , fortes & aiguës ; ses ailes sont si grandes qu'elles ont neuf pieds d'envergure ; elles se meuvent peu sensiblement dans le vol , & ne le fatiguent point : on le perd quelquefois de vue. C'est à la grandeur de ses ailes qu'il doit la facilité de se soutenir si long-tems dans l'air : aussi ne descend-il guère à terre ; il auroit trop de peine à battre des ailes pour s'en élever ; il perche toujours sur des arbres ou sur des lieux élevés : sa grosseur égale celle d'une poule ; son col & sa tête sont proportionnés à sa grosseur. Il a le regard assuré , le bec fort & assez gros , la partie supérieure en est arquée ; les plumes du dos & des ailes sont brunes , celles du ventre grises. Les mâles ont une membrane rouge & boutonnée , à-peu-près comme les coqs d'inde , & qui leur pend jusqu'au milieu du col.

L'oiseau frégate met en usage son bec & ses griffes crochus , pour prendre les poissons volans & autres poissons qui sont poursuivis par les dorades. Il fond comme un éclair , & enleve sa proie , en rasant la superficie de la mer , avec une adresse admirable , sans presque jamais manquer son coup. Il poursuit aussi les goëlands ou mauves , & plusieurs autres oiseaux aquatiques , pour leur faire dégorger le poisson qu'ils ont pris & s'en saisir lui-même. Le P. Labat , dit que la chair de ces oiseaux sent un peu le poisson : elle est fort nourrissante & à-peu-près de la même saveur que celles des poules d'eau : sa graisse est fort estimée , en friction , pour les douleurs de la goutte sciatique. On lit dans l'*Histoire Naturelle de la France Equinox.* , pag. 134 , que comme la frégate suit ordinairement les vaisseaux , quand on voit un de ces oiseaux s'approcher de terre , on compte sur l'arrivée ou le passage d'un navire. On a donné le nom d'*Islette des Frégates* , à une Isle dans le petit cul-de-sac de la Guadeloupe , parcequ'on y trouvoit beaucoup de ces oiseaux , qui venoient y passer la nuit & pour y faire leur nid : mais on les a presque obligés de déserter en leur donnant la chasse pour avoir de leur graisse. On les frappe avec de longs bâtons , lorsqu'elles sont sur leur nid , & elles tombent à demi étourdies. On a vu dans une de ces chasses , que les *frégates* qui prenoient leur essor étant épouvantées , rejettoient chacune deux ou trois poissons , grands comme des harengs , en partie digérés.

Quelques Auteurs donnent aussi le nom de *frégate* à un insecte de mer, de la grosseur d'un œuf de poule, & de la forme d'une barque. Cet insecte est toujours sur l'eau, & s'y soutient par une espece de petite voile couleur de pourpre. On prétend que cette frégate, qui empoisonne la main quand on y touche, est un *Zoophyte*. Voyez ce mot.

FRÉLON. Nom donné à une grosse mouche piquante, qui ressemble à la guêpe, mais qui est beaucoup plus grosse & plus venimeuse. Voyez son article à la suite du mot GUÊPE.

FRÊNE, *Fraxinus*. Grand arbre de futaie, qui se plaît dans les lieux frais & humides; au bord des rivières & vers les prés. Ses racines sont grandes & s'étendent de tous côtés sur la superficie de la terre : son tronc est fort élevé, & forme une tige droite assez grosse, uniforme, couverte d'une écorce unie & cendrée; le bois en est blanc, lisse, dur, & ondulé : ses branches sont opposées; les plus jeunes d'entr'elles sont tendres, un peu noueuses, & contiennent une moëlle blanche & fongueuse; celles qui sont vieilles, sont généralement ligneuses. Ses feuilles sont oblongues, rangées par paires le long d'une côte, qui est terminée par une seule feuille dentelée, d'un goût amer & âcre, d'un verd gai : ses fleurs qui paroissent en Mai sont des étamines disposées en grappes, qui naissent avant les feuilles, & qui se dissipent en peu de tems; il leur succede une follicule membraneuse, oblongue, formée en langue d'oiseau *ornithoglossum*, plate, fort déliée en sa pointe, & renfermant dans sa base une semence presque ovale, blanche, moëlleuse, d'un goût amer, & d'une odeur de drogue.

L'écorce, le bois & les fruits du frêne sont d'usage. Le petit peuple d'Angleterre confit la graine ou plutôt le fruit de cet arbre, avant sa maturité, dans la saumure de sel & de vinaigre, & il en use dans les fausses. La décoction ou infusion de son écorce noircit la solution du vitriol, comme le fait la noix de galle : elle est un peu fébrifuge, & sa feuille un peu vulnérable. Son feuillage est excellent pour la nourriture des bœufs, des chèvres & des bêtes à laine. Tous ces animaux en sont très friands pendant l'hiver. Il faut pour cela couper les rameaux de cet arbre entre les mois d'Août & Septembre, & les laisser sécher à l'ombre. On prétend que le suc de ses feuilles ou la décoction de l'écorce de l'arbre buë à la dose de quatre onces, est un contre-poison contre la morsure des serpents. Cette idée vient sans doute de Plin, qui a dit gratuitement, que les serpents se jettent plutôt dans le feu, que de rester à l'ombre du frêne, ou de se cacher sous ses feuilles. Camerarius & Charas ont éprouvé plus d'une fois la fausseté de cette antipathie si surprenante. Il faut seulement convenir que le dégouttement du frêne endommage tous les végétaux qui en sont atteints.

Le sel tiré des cendres de l'écorce du frêne, est apéritif & sudorifique. Cette cendre, renfermée dans un nouet, est pyrotique, & tient lieu de caustere potentiel. Les fruits sont apéritifs. On vante ce fruit desséché & pris dans du vin, pour faire maigrir, ou pour exciter à l'acte de Venus. La manne découle d'une espece de frêne de l'Italie, appelé *ornus*. Voyez MANNE.

On

On élève le frêne de plant, qu'on prend dans les bois : il ne demande pas beaucoup de culture pour former une belle & haute tige, & une tête régulière. On en fait des haies; on pourroit l'employer pour l'ornement des jardins. Son feuillage léger, qui est d'un verd brun & luisant, contrasteroit agréablement avec la verdure des autres arbres; mais il est sujet à un si grand inconvénient, qu'on est obligé de l'écarter de tous les lieux d'agrément. Les mouches cantharides qui naissent particulièrement sur cet arbre, le dépouillent presque tous les ans de sa verdure dans la plus belle saison, & causent une puanteur insupportable. Le frêne, soit nain ou de la grande espèce, soit celui à feuilles de noyer ou celui de la nouvelle Angleterre, ou même le frêne blanc d'Amérique, &c. ne réussissent point dans les terres dures, argilleuses, crayonneuses; mais ils viennent vite, & s'élèvent prodigieusement en plaine, dans une terre légère & peu profonde. Rai rapporte dans son Histoire générale des Plantes, qu'on vendoit, de son tems, en Angleterre, des frênes de cent trente-deux pieds de hauteur. Le bois du frêne est facile à travailler : il est blanc, d'abord tendre & flexible; mais avec le tems, il devient compacte & très dur : on l'emploie pour les ouvrages d'artillerie, & pour les pièces de charroinage qui doivent avoir du ressort & de la courbure; on en fait des timons de carrosses, des charrues, des essieux, des perches & des échelas; & on s'en sert pour emmancher des outils. On le débite en grumes de plusieurs grosseurs, & depuis dix jusqu'à dix-huit pieds de long. Les Tourneurs & les Armuriers en font également usage. Mais une autre grande partie de service que l'on en tire, c'est qu'il est excellent à faire des cercles pour les cuves, les tonneaux & autres vaisseaux de cette espèce. Les Ebénistes recherchent les morceaux qui sont pleins de nœuds : il seroit seulement à désirer que ce bois fût moins sujet à être piqué des vers, quand il a perdu toute sa sève. On observe que le bois du frêne, lorsqu'il est verd, brûle mieux qu'aucun autre bois nouvellement coupé.

FRÉSAIE, ou EFFRAYE, ou HIBOU D'ÉGLISE ou DE CLOCHER, *Noctua Templorum alba*, aut *Aluco minor*. C'est cet oiseau de nuit, dont le cri épouvantable (*chouart*) qu'il pousse en volant, effraie ceux qui sont sujets à avoir peur. Bien des personnes l'appellent *oiseau sorcier* ou *oiseau de mauvais augure* : il est très commun en France.

La frésaye est à-peu-près de la grandeur du pigeon : elle a quatorze pouces de long, & trois pieds d'envergure; le bec long d'un pouce, & crochu par le bout; la langue un peu fourchue; les yeux & le menton entourés d'un cercle ou collier de petites plumes mollettes, blanches, ceintes de plumes jaunes plus roides. Ce collier ou fraise de plumes commence aux narines de chaque côté, & ressemble au voile d'une femme; en sorte que les yeux sont comme enfoncés dans une cavité profonde, formée par de petites plumes redressées tout à l'entour. La poitrine, le ventre & le dessous des ailes sont blancs marqués de taches obscures, quarrées & espacées. Le plumage de la tête, du col, du dos, & jusqu'aux grandes plumes, tout est orné & bariolé de belles couleurs, tacheté, ou en lignes fauves. Ses

jambes sont couvertes jusqu'aux pieds d'un duvet épais ; les doigts revêtus seulement de poils clair-femés : l'ongle du doigt du milieu est un peu moins dentelé que dans les hérons.

Dans cet oiseau & dans tous les autres de ce genre , l'œil est d'une structure rare & singulière ; car la partie saillante & qui paroît au dehors , n'est rien autre chose que l'iris seule , de manière que le globe de l'œil , étant ôté en entier de son orbite , représente un casque , l'iris ou la partie apparente répondant au couvre-chef , & la partie cachée , qui s'étend au-delà en tout sens , répondant aux bords. Les yeux de cet oiseau sont tout-à-fait fixes & immobiles : les bords intérieurs des paupières sont jaunes tout à l'entour.

La frésaye habite ordinairement dans les trous profonds & inaccessibles des tours & des clochers , dans les pertuis des rochers escarpés , & dans les creux des arbres. Son chant se fait entendre sur les onze heures du soir : elle ne fait point de nid ; elle pond seulement sur la pierre nue , ou tout au plus convertie accidentellement de quelques ordures. Sa ponte est de quatre à cinq œufs oblongs. Pendant le jour , la frésaye reste dans son trou , dormant droite sur ses pieds , la tête panchée en avant , le bec caché dans la plume , & ronflant comme un homme : elle attend ainsi que la nuit soit arrivée pour butiner ; alors elle sort & s'envole de travers ou en culbutant , à la manière des hiboux : son vol semble obéir au gré du vent ; il est si doux qu'on ne l'entend point. Elle va dans les greniers y faire la fonction du meilleur chat du monde : elle prend des souris , dont elle fait sa nourriture ; elle prend aussi , sur les branches des arbres , de petits oiseaux endormis. Il n'est pas rare d'en trouver le matin dans un appartement où il y a beaucoup de souris , ou encore quand il y a un malade tout gangrené ou même mort ; de telles émanations attirent volontiers cet animal , qui ne se fait point de peine de descendre par une cheminée. Ce sont de pareilles aventures & les lieux où repaire communément la frésaye , qui l'auront fait regarder comme un oiseau de mauvais augure.

On trouve dans le trou de la frésaye , des espèces de pelottes , de la forme & grosseur d'un œuf de poule. Ces pelottes ne sont autre chose que le résidu de ses aliments , qui consiste en peaux , poils , plumes , os , & autres matières grossières ; le tout artistement enveloppé comme dans une bourse , que l'oiseau a la facilité de revomir ensuite , c'est-à-dire après la digestion des chairs ; car en général les hiboux , ayant le gosier très large , peuvent avaler de gros morceaux de chair tout entiers , comme un rat , une souris & un oiseau : c'est ainsi que l'alcyon , le martinet pêcheur , & tous les oiseaux qui avalent des poissons entiers , rejettent par en haut les arrêtes & les vertèbres de ces poissons digérés.

La frésaye n'est pas d'usage en aliment ; mais quelques personnes estiment sa chair bonne pour la paralysie , sa graisse propre pour assoupir les nerfs , & son fiel desséché excellent dans les ophtalmies.

FREUX ou GROLLE , ou GRAYE , *Cornix frugilega*. Est une espèce de corneille des bois ou sauvage , qui se répand communément dans les cam-

pagnes, mais qui repaire dans les bois & les forêts, où elle fait son aire. Cet oiseau a une assez grosse corpulence : il est très charnu, & tient le milieu entre le corbeau & la corneille : il est fort criard, vole en troupes & en grand nombre. Son bec est très droit, long & pointu : il s'en sert pour tirer les grains & les vers de la terre ; il se nourrit aussi de fruits. On ne voit point cet oiseau en Italie ; il y en a une bonne quantité en Angleterre. Beaucoup de personnes le prennent pour une véritable corneille, mais les Laboureurs le distinguent facilement par la peau blanchâtre & farineuse qui recouvre la base du bec. Ils le chassent en faisant beaucoup de bruit avec des chauderons ou autres instruments bruyants, en jettant des pierres dans son nid, en attachant à des arbres des machines qui ont des aîles comme des moulins à vent, ou en plaçant, dans leurs terres labourées, des épouvantails habillés.

FRIGARD : voyez à la fin de l'article HARENG.

FRIMAT : est la même chose que le *Givre* : voyez ce mot.

FRIQUET, *Passer arboreus*. Petit oiseau, dont le bec est court, noirâtre, un peu gros. Il a les pieds, les jambes, les aîles & la tête, comme le moineau de muraille : on l'appelle aussi *moineau de noyer* ; & quelques-uns croient que c'est le même que le *moineau d'arbre*. Voyez ces mots. Le friquet ne fait que s'agiter & fretiller sur les arbres.

FRITILLAIRE, *fritillaria*. Cette plante liliacée est fort recherchée des Fleuristes. Sa racine est bulbeuse, solide, blanche, sans tuniques, composée de deux tubercules charnus, demi-sphériques, ayant en-dessous plusieurs fibres. Sa tige est haute d'un pied, grêle, ronde, purpurine, fongueuse en dedans ; portant six ou sept feuilles creuses, étroites, rangées sans ordre, un peu semblables à celles de la barbe du bouc, & d'un goût acide. Son sommet porte ordinairement deux fleurs à six feuilles, disposées en cloche, tachetées en tablettes d'échiquier, ou en façon de damier, émaillées de diverses couleurs incarnates, & très agréables à la vue : il leur succède un fruit oblong, triangulaire, & rempli de semences applaties.

La fritillaire croît dans les prés : on la cultive dans les jardins à cause de la beauté de ses fleurs. Elle fleurit en Mars : sa racine est résolutive. Si l'on consulte Miller on apprendra l'art de perfectionner la culture des différentes sortes de Fritillaires.

FROLE ou CHAMŒCERASUS : Voyez à la fin de l'article CERISIER.

FROID. Cette sensation, opposée au chaud, doit sa naissance à des causes purement naturelles, à des agens que l'art des hommes n'a point excités, mais qui obéissent simplement aux Loix générales de l'Univers. Tel est le froid qui se fait sentir en hiver dans nos climats : tel est celui qu'éprouvent les habitans des Zônes Glaciales pendant la plus grande partie de l'année. La plupart des hommes savent que quantité de pays sont, par leur situation & la nature de leur terrain, beaucoup plus froids que leur latitude ne semble comporter. En général, plus le terrain d'un pays est élevé, & situé vers le milieu des grands continents, plus le froid qu'on y éprouve est considérable. Moscou par cette raison est beaucoup plus froid qu'Edim-

bourg. C'est une chose constante dans tous les pays du monde , que le froid augmente à mesure qu'on s'éloigne de la surface de la terre : delà vient qu'au Pérou , dans le centre même de la Zone Torride , les sommets de certaines montagnes sont couverts de neiges & de glaces que l'ardeur du soleil ne fond jamais. Il paroît que la Sibirie , si on s'en rapporte aux rivières qui y prennent leur source , est peut-être le pays du monde le plus élevé. Je demande quel froid n'y éprouve-t-on pas.

Les vents ont une influence très marquée sur les vicissitudes des saisons : ils apportent souvent avec eux l'air de certaines régions plus froides que la nôtre , ce qui raffraîchit notre atmosphère. Ainsi le froid est plus général ou plus particulier , selon que le vent du Nord qui l'amène regne sur une plus grande ou sur une moindre étendue de Pays ; il est d'autant plus considérable que les régions d'où vient ce vent de Nord , sont plus voisines du Pôle , ou plus froides d'ailleurs par quelques causes locales. Le vent du Nord nous apporte en assez peu de tems l'air ou le froid des pays Septentrionaux. On trouve par un calcul fort aisé qu'un tel vent assez modéré qui parcourroit quatre lieues par heure , apporteroit l'air du Pôle à Paris en moins de onze jours. Ce même air arriveroit en cette Capitale en sept jours par un vent violent , qui feroit par heure jusqu'à six lieues. Un vent de Nord-Nord-Est viendrait de la Norwege ou de la Laponie en moins de tems. Quoi qu'il en soit , on est assuré qu'un vent n'est froid , que parcequ'il prend sa direction de haut en bas : les vents qui ont passé sur les sommets des montagnes , refroidissent beaucoup les plaines voisines , dans lesquelles ils se font sentir , principalement lorsque ces montagnes sont couvertes de neiges.

Depuis qu'on a rectifié la construction des thermometres , on a observé avec beaucoup d'exactitude certains froids excessifs en différens lieux de la terre. La table suivante fera connoître quelques-uns des principaux résultats de ces diverses observations ; elle est tirée d'une autre table un peu plus étendue , donnée par M. de Lisle , à la suite d'un mémoire très curieux du même Académicien , sur les grands froids de la Sibirie. Ce mémoire est imprimé dans le *Recueil de l'Académie des Sciences* , ann. 1749.

Table des plus grands degrés de froid observés jusqu'ici en différens lieux de la Terre.

Degrés au dessous de la congellation , suivant la division de M. de Réaumur.

A Astracan en 1746	24 $\frac{1}{2}$
A Petesbourg en 1749	30
A Quebec en 1743	33
A Torneao en 1737	37
A Tomsk en Sibirie , en 1735	53 $\frac{1}{2}$
A Kirenpa en Sibirie , en 1738	63 $\frac{2}{3}$
A Yeniseik en Sibirie , en 1735	70

Pour peu qu'on consulte cette table , on fera bien-tôt pleinement convaincu , qu'un froid égal à celui qui se fit sentir à Paris en 1709 (notre grand hiver) exprimé par $15 \frac{1}{2}$ degrés au-dessous de la congellation , est un froid très médiocre à beaucoup d'égards. Le froid qu'on a marqué le quatrième est celui qu'éprouverent en 1737 Messieurs les Académiciens qui allèrent en Laponie pour mesurer un degré de Méridien vers le cercle Polaire ; les thermometres d'esprit de vin se gèlerent par un tel froid , & quand on ouvroit une chambre chaude , l'air de dehors convertissoit sur-le-champ en neige la vapeur qui s'y trouvoit , & en formoit de grands tourbillons blancs ; lorsqu'on sortoit , l'air sembloit déchirer la poitrine. Pendant une opération qui fut faite sur la glace le 21 Décembre , le froid gèla les doigts de plusieurs ouvriers ; la langue & les lèvres se colloient & se gèloient contre la tasse , lorsqu'on vouloit boire de l'eau-de-vie , qui étoit la seule liqueur qu'on pût conserver assez liquide pour la boire , & ne s'en arrachoit que sanglantes. Qu'on juge de ce qu'a du produire le froid qu'on a ressenti au Spitzberg , à Yeniseik.

On n'a point d'observations du thermometre faites à la baye d'Hudson ; mais on fait que dans ces contrées , lorsque le vent souffle des régions Polaires , l'air est chargé d'une infinité de petits glaçons que la simple vue fait appercevoir. Ces glaçons piquent la peau de maniere à y exciter des ampoules , qui d'abord sont blanches & tendres , & qui deviennent ensuite dures comme de la corne. Chacun se renferme bien vite par des tems si affreux , & quelque précaution qu'on prenne , on ne sauroit s'empêcher de sentir vivement le froid. Dans les plus petites chambres , & les mieux échauffées , toutes les liqueurs se gèlent , sans en excepter l'eau-de-vie ; & ce qui paroîtra plus étonnant , c'est que tout l'intérieur des chambres & les lits se couvrent d'une croûte de glace épaisse de plusieurs pouces , qu'on est obligé d'enlever tous les jours.

Nous avons parlé aux articles *Arbres & Plantes* , des funestes effets que les fortes gélées qui accompagnent les grands froids produisent sur les végétaux : nous dirons ici quelque chose des effets du froid sur le corps des animaux. Les Auteurs disent qu'un air froid resserre , raccourcit les fibres animales , qu'il condense les fluides , les coagule & les gèle quelquefois ; qu'il agit particulièrement en desséchant , en épaississant considérablement le sang qui y coule , &c , delà les différentes maladies causées par le froid , les engelures des membres , les catharres , le scorbut , le sphacèle , la gangrène , l'apoplexie , la paralysie , & même les fluxions de poitrine. Le froid supprime quelquefois les regles des femmes , tue subitement les hommes , & plus souvent les autres animaux qui ne peuvent pas comme l'homme se mettre à l'abri des injures de l'air. Ceci doit paroître étonnant à ceux qui apprendront que la chaleur animale répond dans l'homme au trente-deuxieme degré au-dessus de la congellation du thermometre de M. de Réaumur : on seroit encore plus surpris si l'on voyoit les grands désordres & même les

effets posthumes qui arrivent dans l'économie animale préalablement attaquée d'un extrême froid.

Les Physiologistes, les Pathologistes, &c, ne cessent de s'occuper de la cause physique & morbifique du froid. Mais que l'on est éloigné des moyens de se garantir intérieurement des ravages qu'il cause trop communément, sur-tout dans les pays Septentrionaux. Quant à l'extérieur, le premier moyen que les hommes, nés nuds, & laissés à-peu-près sans défense à l'égard du froid, ont trouvé pour se mettre un peu à l'abri de cette impression désagréable, a été vraisemblablement de se mettre derrière un arbre, dans quelque creux de rocher, quelque caverne : le besoin de se nourrir ne pouvant attendre la durée des injures de l'air, il fallut passer d'un lieu dans un autre, ce fut alors qu'on s'aperçut que la nature avoit donné aux bêtes différents moyens attachés à leur individu, tels que les poils, les plumes, &c, dont le principal usage paroissoit être de couvrir la surface de leur corps, & de la défendre des impressions fâcheuses que pouvoient leur causer les corps ambiants : envier cet avantage & sentir que l'on pouvoit se l'approprier, ne furent presque une même réflexion. En effet, l'homme qui eut en partage l'intelligence nécessaire, ne tarda pas à se procurer par art les secours propres à braver les intempéries des saisons : il se détermina donc bien-tôt à sacrifier à ses besoins les bêtes, auxquelles il crut voir les couvertures les plus convenables qu'il pût convertir à son usage. Il n'eût pas à balancer pour le choix ; les animaux dont les fourrures sont les plus fournies, durent avoir tout de suite la préférence : c'est-là vraisemblablement le premier motif qui a porté les hommes à égorger les animaux : on avoit donc des fourrures, mais on n'avoit pas l'art de les appliquer bien intimement sur toutes les parties du corps : le tems & l'industrie ont perfectionné ces moyens : quelle différence du vêtement & du domicile d'un ancien Lapon avec nos habillemens & nos palais : le premier vivoit content dans une grotte glacée : & nous nous plaignons dans une région tempérée, dans un air échauffé par des poëles, ou par des feux domestiques ; ajoutons à cela les paravents, les rideaux, les alcoves, &c.

Il convient de dire ici que dans les cas où l'on ressentira des douleurs vives causées par le froid, on fera des frictions sur les parties affligées, avec des linges chauds. Les vieillards, qui ont une disposition si contraire à la génération de la chaleur, doivent en pareille occasion, faire usage de liqueurs spiritueuses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, afin de fournir aux organes vitaux des aiguillons pour exciter leurs mouvemens. Cet article exige qu'on lise les mots MONTAGNES, AIR, FEU, VENTS, GLACE, GELÉE, CHAUD.

FROMAGER ou SAAMOUNA. Arbre d'une figure extraordinaire, qui croît dans les Indes & dans les Antilles, à la hauteur du Pin ; c'est le *Gossampinus* des Botanistes, qui le désignent encore sous ce caractère *Ceyba viticis folio aculeata*, *Tournef.* Le haut & le bas du tronc de cet arbre sont de

la grosseur ordinaire aux autres arbres , mais son milieu est relevé de plus du double tout au tour ; les racines qui sont très grosses , sortent hors de terre de sept à huit pied , & forment comme des appuis ou arcs-boutans autour de la tige , le bout de ces racines s'étend beaucoup à la ronde. Le bois du fromager est fort difficile à couper quand il est vieux : il est pliant & souple , moëlleux , poreux , comme du liége très tendre , gris en dehors , blanc en dedans , & recouvert d'une écorce grise remplie de rugosités épineuses. On a appelé cet arbre *fromager* , parceque son bois ressemb'e à du fromage un peu mou ; sa tige est toujours verdâtre , ses rameaux sont étendus en large , droits , rangés par ordre , opposés les uns aux autres ; ses feuilles sont vertes , oblongues , veineuses & incisées très profondément , attachées cinq à cinq à des queues longues , comme celles de la quinte-feuille ; ses fleurs sont rouges , quelquefois blanches , suivies de fruits faits en tuyaux ou gouffes , larges de deux pouces ; sur fix à sept de longueur. Ces fruits étant mûrs contiennent des semences d'un rouge noirâtre , grosses comme un petit pois , & garnies d'une espece de coton gris de perle ou de laine blanchâtre , d'une extrême finesse , luisante , molette & foyeuse au toucher ; mais dont les filamens sont si courts , qu'elle ne peut être cardée ni filée , ou que très difficilement : ce fruit n'est pas plutôt mûr que sa coque crève avec quelque bruit , & le coton seroit aussitôt emporté par le vent , s'il n'étoit recueilli avec beaucoup de soin. Les Indiens en font l'usage que nous faisons du duvet pour garnir les oreillers , les coussins & les couvre-pieds : on en fait aujourd'hui des lits de plume , elle y est d'autant plus propre , qu'elle est bien molette , d'une grande légereté , & qu'elle procure une chaleur douce : on doit sur-tout prendre garde que quelque étincelle de feu ne tombe dessus : car cette sorte de coton ou ouatre s'allume très facilement , & seroit consumée avant qu'on eût pû l'éteindre. Aussi les Nègres & les Chasseurs du pays , l'emploient-ils au même usage que l'ainadou ; pour cet effet ils le portent dans de petites calebasses. On en garnit des pieces d'estomac pour exciter la chaleur dans les parties sur lesquelles on les applique : on prétend qu'on en pourroit fabriquer de beaux chapeaux. Il découle de l'arbre une gomme , qu'on néglige : peut-être pourroit-on en tirer parti. Le bois du fromager est de peu de durée , on ne s'en sert dans le pays qu'à faire des canots qu'il faut renouveler souvent : son écorce est employée avec succès dans les ptisannes contre la petite vérole.

Le fromager vient très bien de bouture , on le plante ordinairement devant les maisons pour jouir de la fraîcheur de son ombre , & on le choisit de préférence à un autre , parcequ'il devient gros en peu de tems , très feuillu , & qu'on fait prendre à ses branches la forme & la situation que l'on desire.

FROMENT ; *Triticum*. C'est un nom que l'on donne en général aux grains qui naissent dans un épi ; mais on le donne par excellence au bled , cette plante presque universelle. *Voyez* BLEU. Il y a des endroits où l'on ne met point l'orge & l'avoine au nombre des froments : on les appelle ordinairement

rement les *Mars*, parceque ce mois est la saison où l'on commence à les semer. Voyez l'article BLEU, pour la culture de ce grain, ses maladies, & la maniere de le préserver de la destruction occasionnée par la fermentation, ou par l'attaque des insectes.

Selon M. Adanson, on peut distinguer les froments du premier abord, en considérant la gaine de leurs feuilles qui est cylindrique, couronnée d'une membrane courte, & accompagnée de deux oreillettes latérales, qui se recourbent en demi-cercle pour embrasser la tige. Ces plantes ont depuis deux jusqu'à six fleurs hermaphrodites, rassemblées ensemble dans le même calice. La plûpart des fleurs supérieures des froments avortent.

FROMENTAL ou FAUX FROMENT, nommé improprement *faux seigle*, connu aujourd'hui le plus communément sous le nom de *Ray grass*. Voyez ce mot.

FROMENT LOCAR, FROMENT ROUGE ou EPEAUTRE, ou BLEU LOCULAR, (*Zea*). Espece de froment assez connu dans les endroits rudes & montagneux de l'Egypte, de la Grece, de la Sicile, & qu'on cultive cependant comme les autres especes de froment. Cette plante a une racine fibreuse : elle pousse, ainsi que le bled ordinaire, un nombre de tuyaux menus, à la hauteur d'environ deux pieds : ses feuilles sont étroites, ses épis sont disposés comme ceux de l'orge, & la semence en est menue, de couleur rougeâtre. La graine de cette espece de froment sert à faire de la biere, & même du pain au besoin, mais il est noir, d'un goût désagréable, un peu indigeste : les Anciens faisoient avec le grain de l'épautre leur froment.

FRONDIPORE : est le Madrepore dont les rameaux sont disposés en feuilles. Voyez MADREPORE.

FRUIT, *Fructus*. Est le nom qu'on donne à la substance reproductive de l'arbre ou de la plante : ainsi le gland est le fruit du chêne ; le fruit du poirier, est la poire ; celui du fraisier, est la fraise, &c. Le nom de fruit s'entend également de toutes sortes de graines, soit nues, soit renfermées dans une enveloppe ligneuse ou charnue ou membraneuse, ou épineuse, &c.

On remarque dans les fruits les mêmes parties essentielles que dans les plantes ; savoir les peaux & membranes, les pulpes ou chairs, & les fibres ou corps ligneux. Si l'on considère le fruit par sa substance, on trouvera qu'il n'y a presque pas de limites, dit M. Adanson, entre la baie du pêcher, la pomme, le grain de raisin ou de groseille : souvent le même fruit est d'abord charnu en baie, & ensuite devient une écorce ou une capsule, comme dans quelques brionnes & dans certaines verveines. La figure du fruit varie beaucoup, il est communément sphérique ou ovoïde ; mais il y en a d'aîlés, d'anguleux, d'enflés, d'articulés. Le même Auteur ne regarde pas comme fruit les écailles ou feuilles du calice ou le disque, ni aucune autre partie de la fleur, mais seulement celles de l'ovaire. Selon ce système il y a des plantes sans fruit, c'est-à-dire à graines nues ; d'autres à fruit sec, membraneux

braneux ou coriace , telle est la capsule ou silique ; le fruit d'abord charnu , ensuite sec comme une écorce , appelée *brou* ; le fruit charnu en entier , en baie ou pomme ; le fruit charnu en dedans & recouvert au dehors d'une écorce ou croûte , ou osselet , ou substance ligneuse ; enfin le fruit en osselet sans chair.

On doit encore faire attention au nombre des loges d'un fruit , & que la plupart des fruits charnus , en baie , en pomme , ou en écorce , ne s'ouvrent pas , à moins qu'ils ne soient un peu secs ; & l'ouverture se fait chez les uns par le sommet , chez d'autres par la base , ou transversalement , ou par des trous ou panneaux , ou par des valves comme articulées. Les cloisons des fruits sont placées assez différemment dans les différens fruits. *Voyez* l'article GRAINE.

Entre les fruits , on distingue : 1°. les fruits à noyaux , *durs* ; comme sont les prunes , cerises , pêches , abricots : 2°. les fruits à pépin , comme les fraises , framboises , groseilles , pommes , poires : 3°. on dit aussi les fruits d'été , les fruits d'automne , les fruits d'hiver , à cause des différentes saisons où on les mange. Les fruits à noyaux sont de la première saison ; quelques-uns des fruits à pépin , comme les poires , les pommes , sont communément de la dernière saison. On appelle fruits rouges ; ceux qui ont cette couleur , & qui viennent abondamment dans les mois de Juin , de Juillet : tels sont les fraises , les framboises , les groseilles , les cerises , les bigarreaux. D'autres fruits conservent long-tems leurs couleurs rouges sans sécher ni se gâter , ce qui fait qu'on les mêle parmi les bouquets de desserts. *Voyez* ces mots. La marque de la maturité & du point auquel on doit manger ces fruits , est lorsque leur queue ne tient pas beaucoup.

On appelle fruits de terre , ceux qui viennent à plate terre ; tels sont les *melons* , les *potirons* , les *concombres* , & autres *courges* : il y en a plusieurs autres qui appartiennent aux *légumes*. *Voyez ce mot*. L'on donne le nom de fruit ligneux à la noix , à l'amande , à l'aveline ; & celui de fruit à robe , au maron , qui sont eux-mêmes la racine qui les reproduit. On appelle fruit verveux , celui qui a été attaqué , habité & rongé par des vers , chenilles , fausses chenilles ou autres insectes. Moins l'année est abondante en fruit , plus le fruit est sujet à être verveux , & on ne manque pas de s'en plaindre.

Pour avoir de beaux fruits , il faut qu'ils soient greffés chacun selon son espèce. *Voyez* la culture de chacun des fruits en particulier , à l'article de l'arbre ou de la plante qui le produit. A l'égard de la maturation des fruits , on observe qu'en général les plantes qui fleurissent au printemps , fructifient en été ; celles qui fleurissent en été , fructifient en automne ; celles qui donnent leurs fleurs en automne , fructifient en hiver , lorsque les gelées ne les font pas périr , ou qu'on les tient dans les serres. Les plantes qui fleurissent pendant notre hiver , fructifient au printemps dans nos serres. Le terme de la maturation des fruits , & celui de la feuillaison ou de la germination des plantes , donnent l'espace ou la durée de leur vie , qui est d'autant plus

courte pour la même espece , que le climat où on l'éleve est plus chaud ; & il paroît en général , dit M. Adanson, que plus la chaleur est égale & continue , plus le tems , que les plantes annuelles mettent entre le moment où elles commencent à germer & celui où elles fleurissent , est égal à celui qui est entre leur floraison & leur maturation ou fructification , ou même leur entier dépérissément. Dans les arbres qui laissent un intervalle beaucoup plus grand que le commun des plantes , entre la floraison & la maturation des fruits , on peut hâter la maturité quand on veut ; pour cela il suffit d'ôter une partie des feuilles de l'arbre qui diminuent le mouvement de la sève : lorsqu'on ôte trop de ces feuilles avant que les fruits soient parvenus à leur grosseur , alors ils se fanent , & le soleil les desseche trop.

On ne doit faire la cueillette des fruits qu'au point de leur maturité. Les fruits pulpeux sont mûrs , lorsqu'en les tâtant avec la main , ils obéissent sous le pouce ; tels sont la pêche , l'abricot , & la plupart des prunes ; d'autres doivent se détacher d'eux-mêmes , ou à très peu de chose près ; tels sont le brugnon , le pavie , la pêche violette. Plus les saisons sont pluvieuses , plus tard les fruits mûrissent ; mais en quelque tems que les fruits mûrissent , il n'en faut faire la récolte que dans de beaux jours , & faire en sorte que toutes les poires aient leur queue : lorsqu'ils sont cueillis , on les porte à la fruiterie , où ils acquièrent une parfaite maturité à l'abri de l'air extérieur qui aggrit & affadit toujours le fruit. Une fruiterie , pour être bonne , doit être construite de murs épais , au rez de chaussée , dans un lieu sec , dont les fenêtres soient tournées au midi. Il faut aussi que la fruiterie soit boisée & garnie tout autour de tablettes de bois , disposées en pentes , & couvertes de mousse bien séchée au soleil. Consultez la Quintinie.

Les Cultivateurs expérimentés sont dans l'usage de retirer la terre d'autour des beaux arbres à fruit , jusqu'à huit à dix pouces de profondeur , & jusqu'à la distance de dix pieds de l'arbre de tous côtés , ensuite de substituer d'autre terre de bonne qualité , cependant un peu pierreuse : l'on fait cette opération tous les ans au mois d'Octobre , ou au moins tous les trois ans : il faut avoir soin de ne laisser croître aucune plante étrangere , qui ne sert qu'à appauvrir le terrain. Il faut élever les arbres fruitiers en buisson , ou en forme de vase : c'est la meilleure de toutes les méthodes pour donner également de l'air aux fruits. Le terrain un peu pierreux convient par bien des raisons aux arbres , 1°. les insectes y peuvent moins fouiller ; 2°. l'eau de la pluie ou de l'arrosoir y pénètre de façon à prendre différentes routes ; 3°. l'air & les influences y ont un peu plus d'accès.

Bien des personnes accélèrent la maturité des fruits , ou par la chaleur du fumier , ou par la chaleur du poêle. Ce moyen de présenter au dessert des especes de fruits dans une saison où l'on ne s'y attend pas , est le triomphe de l'art du Jardinier ; mais ce gouvernement des fruits hâtifs qui enjolivent nos tables , demande des précautions & des dépenses au dessus des facultés des Particuliers. Voyez l'Ecole du potager.

Pour conserver long-tems les fruits à queue , il faut les cueillir sur les deux

heures après midi. Pour cet effet on passe, entre le fruit & l'œil où tient la queue, un fil que l'on noue à double nœud, & avec des ciseaux on coupe la queue au-dessus du nœud : le fruit étant détaché & posé dans un cornet de papier la queue en haut, on doit faire tomber une goutte de cire à cacher sur le bout coupé de la queue, & faire passer le fil par l'ouverture de la pointe du papier, en sorte que le fruit demeure suspendu dans le cornet. On ferme la pointe du cornet avec de la cire molle : on doit en faire autant à la grande ouverture du papier ; on suspend ensuite le fil à une solive & dans un lieu sec & tempéré. Le fruit ainsi suspendu & ne touchant à rien, se conserve sain & entier jusqu'à deux ou trois ans. *Voyez* RAISIN à l'article VIGNE.

Les Indiens font présent aux Européens curieux, de très beaux & gros fruits dans des bouteilles, dont l'orifice est assez étroit, & dans lesquelles ils les ont fait passer lorsque ces fruits étoient encore jeunes & tendres ; par ce moyen les fruits grossissent & mûrissent dans ces bouteilles, après quoi on les détache & on les y conserve avec de l'eau-de-vie aromatisée. On conserve encore les fruits de plusieurs autres manières, dont nous parlerons à leur article ; il suffit de dire ici en général, que pour les fruits confits, quand le poids du sucre égale celui du fruit, la confiture est plus de garde : si l'on met moins de sucre, le fruit conservera mieux son goût naturel, mais il durera moins.

A l'égard des fruits que l'on veut garder secs ou demi confits, on choisit les plus beaux, on les range à côté l'un de l'autre sur des claies, & on les met dans un four d'où l'on vient de tirer le pain : le four étant refroidi, on les retire & on répète l'opération une seconde fois. On fait cette opération avec succès pour les cerises, les prunes, les abricots & les pêches dont on a ôté adroitement le noyau, même pour les raisins & les figues. Quant aux poires & aux pommes, il faut, avant de les mettre au four, les peler & les faire amollir dans l'eau bouillante, avec un peu de mélasse ou de sucre : par cette demi-cuisson, on donne à ces fruits une consistance qui les rend propres à être transportés d'une Province à l'autre, & même à travers les mers. Le commerce des fruits secs est considérable dans les pays chauds.

Dans les grandes maisons & chez les Confiseurs, on glace les fruits ; mais sur cette matière, nous devons renvoyer nos Lecteurs aux Traités de l'Art du Confiseur : nous dirons seulement qu'on glace les fruits rouges crus, en les trempant dans des blancs d'œufs battus avec un peu d'eau de fleur d'orange ou autres aromates liquides, puis on les fait passer dans du sucre en poudre fine, qu'on a fait chauffer dans un plat d'argent. Il y a des fruits qui ne se conservent que dans de la saumure ; tels sont les capres & les olives.

FRUIT À PAIN. *Voyez* ARBRE DU PAIN.

FRUIT DU BAUME. *Voyez* CARPOBALSAME, & le mot BAUME DE JUDÉE.

FRUIT DE LA CHINE. *Voyez* LETCHI.

FRUITS PÉTRIFIÉS, *Carpolithes*. Des Lithologistes font mention de

glands, de châtaignes, & de siliques pétrifiées. On trouve dans les environs de Besançon, de grosses noix devenues fossiles, & dont l'amande est pétrifiée.

FRUTEX TERRIBILIS ou ALYPUM. *Voyez* GLOBULAIRE.

FUCUS ou VAREC. Genre de plante qui naît au fond des eaux ou sur les bords de cet élément. Il y en a beaucoup de sortes dont Imperati parle : en général c'est une plante du genre de l'algue. *Voyez* ce mot. La plupart des fucus sont ramifiés en arbrisseau élevé, & quelques-uns rampent ou sont couchés sous la forme d'une lame ou d'une vessie. Ils tiennent un juste milieu, dit M. Adanson, entre les champignons & les hépatiques. Les fucus sont d'une substance ou membraneuse, ou gélatineuse, ou charnue, ou coriace ; ils poussent d'abord plusieurs petites tiges plates, étroites, mais qui s'élargissent par la suite, & se divisent en petits rameaux, portant des espèces de feuilles larges, oblongues, ordinairement lisses, attachées avec leurs tiges par une matière également tenace, pliante, membraneuse ; en un mot, empâtées sur des cailloux & autres corps durs, comme l'est le gui sur l'arbre. Cependant il y a de ces plantes marines & maritimes qui ont des racines chevelues, & d'autres un pied semblable à nos mousses. En général les *fucus* qui rampent ou qui forment une vessie, n'ont point de racines : les autres ont à leur place un large empatement. Sur les feuilles de quantité de *fucus*, s'élèvent des tubercules en forme de vessies fermées, plus ou moins grandes & plus ou moins arrondies. On soupçonne que ces vésicules sont toujours remplies d'air, ce qui maintient droit la plante debout dans l'eau, ou l'y fait flotter. Le fucus est souvent petit ; mais dans certaines mers, il croît quelquefois à la hauteur d'un pied & demi, & davantage. Lorsque cette plante est nouvellement ramassée, sa couleur est olivâtre ; & en séchant, elle devient noire. On s'en sert pour faire de la soude, & on en mange plusieurs espèces.

On rencontre aussi des *fucus* ou fucoïdes dont les couleurs variées de rose, de verd, de citrin, &c. flattent infiniment la vue. Les Curieux qui font des herbiers marins, ramassent ces sortes de plantes, & les font dessaler dans l'eau douce en sortant de la mer, ensuite les arrangent fort artistement pour les faire sécher, ou entre deux papiers, ou sur un carton qu'on couvre ensuite d'un verre ; ce qui produit des tableaux d'un aspect fort agréable.

On donne aux fucus des noms latins tirés des espèces de plantes auxquelles ils ressemblent : par exemple, *fucus quercina* ; *fucus lactuca* ; &c. par-là on détermine l'espèce de fucus varec, dont les feuilles ont de la ressemblance, ou à celles du chêne, ou à celles de la laitue. La plupart de ces plantes sont de l'ordre des cryptogames, qui cachent leurs fruits sous l'aisselle, ou dans la continuité de leurs feuilles. M. de Réaumur fit la découverte en 1711, des étamines & des graines des fucus (*Voyez les Mémoires de l'Académie*). Dans la plupart de ces sortes de plantes, les étamines sont des filets sans antères ; & M. Adanson dit que les tubercules qu'on a prétendu être les fleurs mâles du *fucus*, sont les fleurs femelles. *Voyez* aussi les ouvrages de Klein & de Donati, sur les *fucus*.

FUCUS. Nom qu'on donne encore aux *faux-bourbons*. Voyez ce mot à l'article de l'ABEILLE.

FUMÉE. Est cette vapeur non enflammée, plus ou moins sensible & plus ou moins épaisse, qui s'élève de la surface des corps qui brûlent. Elle est composée des parties les plus grossières qui servent à l'aliment du feu dans le corps combustible. On donne aussi le nom de *fumées* aux fientes des bêtes fauves. On appelle *fumet*, cette vapeur particulière qui s'exhale de l'animal crud ou cuit, & qui désigne sa bonté à l'odorat du connoisseur en gibier. On appelle *fumeux*, le vin mal-faisant qui porte à la tête, quelque peu qu'on en boive.

FUMETERRE ou FIEL DE TERRE, *fumaria*. Plante qui croît naturellement dans les champs & dans les endroits cultivés. Sa racine est peu grosse, légèrement fibreuse, blanche & très pivotante : elle pousse des tiges hautes d'un pied ou environ, anguleuses, creuses, en partie de couleur de pourpre, & en partie d'un blanc verdâtre. Ses feuilles sont découpées menu, attachées à de longues queues, anguleuses, de couleur de verd de mer. Ses fleurs qui paroissent en Mai, sont petites, ramassées en épi, oblongues, de plusieurs pièces, irrégulières, semblables aux fleurs légumineuses, composées chacune de deux feuilles, communément purpurines, & quelquefois blanches & éperonnées. A chaque fleur succede une capsule membraneuse, arrondie, qui renferme une petite graine sphérique, d'un verd foncé, & d'une saveur amère, désagréable.

Toutes les parties de la fumeterre sont fort amères & savonneuses : leur suc rougit le papier bleu, & dépose des cristaux nitreux octaédres qui pétillent au feu. On emploie cette plante pour purger la bile, donner de la fluidité au sang ; exciter les règles & les urines : elle convient très fort pour la fièvre, la jaunisse, le scorbut & les maladies de la peau.

FUMIER. Cette substance, quoique commune, est précieuse & recherchée pour fertiliser les terres stériles, ou rendues maigres par l'épuisement des récoltes qu'elles ont produites. Les fumiers sont en général le principal ressort de l'agriculture ; & ce mot par lequel on désigne métaphoriquement ce qu'on juge méprisable, l'exprime réellement la vraie source de la fécondité des terres & des richesses sans lesquelles les autres ne sont rien. Tout système d'agriculture dans lequel les fumiers ne seront pas mis au premier degré d'importance, peut être regardé comme suspect : or l'état de l'agriculture dépend de la quantité du bétail, les terres ne pouvant emprunter que des fumiers cette fécondité non interrompue qui enrichit les Propriétaires & les Cultivateurs. Aussi les Laboureurs n'ignorent pas que l'emploi continu des fumiers est d'une nécessité absolue pour le succès de leurs travaux. Leur degré de bonté consiste en leur degré de fermentation ; alors ils exhalent une odeur assez forte d'alkali volatil.

Le Fumier est composé principalement des excréments du bétail avec la paille qui lui a servi de litière. Ces matières étant foulées par les animaux & macérées dans leur urine, sont dans un état de fermentation dont la

chaleur se communique aux terres sur lesquelles on les répand : ainsi le fumier se tire des écuries , des étables , des bergeries , & de la retraite de tous les animaux domestiques.

On distingue différentes sortes de fumiers , comme produits par divers animaux. Les uns conviennent à une certaine terre , & les autres à une autre.

Le *fumier de vache* convient aux terres seches , maigres & sablonneuses. On doit l'enterrer dans ces sortes de terre , avant l'hiver & par un tems couvert , afin qu'il agisse davantage.

Le *fumier de mouton* est fort chaud , contient plus de sels. Il est bon pour les terres froides & maigres , & peut se conserver jusqu'à trois ans de tems.

Le *fumier de cheval* , de *mulet* & d'*âne* , quoique moins gras que les précédens , n'a pas de moindres qualités. Il convient beaucoup dans les terres labourables , notamment à celles qui sont fortes & humides , & pour les potagers ; mais non pour les arbres , parcequ'il est fort sec & fort chaud : on doit l'employer de bonne heure.

Celui de *porc* est froid & le moins estimé de tous ; mais mêlé avec d'autres , il devient propre aux terres brûlantes & aux arbres qui ont jauni par trop de sécheresse.

Les boues des rues & des grands chemins , les balayures des cuisines , & quantité d'autres fanges meurtieres , après qu'on les a fait sécher par tas , font un grand bien au pied des arbres , ainsi qu'au fond des terres usées. Il en est de même des cendres , sur-tout pour les figuiers , & des pailles ou chaumes brûlés avec toutes sortes de mauvaises herbes de jardin , des feuillages inutiles , des cosses & sur-tout des écorces , de la suite de cheminée , des chiffons d'étoffes , des poils des animaux , de la raclure des cornes , des bouts de cuir & de toutes sortes de peaux de bêtes , du marc du vin , des restes des huileries , des brasseries , des tanneries , des teintures , & même des laineries , des savonneries. La *colombine* ou fiente de pigeon & celle des autres volailles , sont aussi d'excellens fumiers. Voyez à l'article PIGEON.

Les habitans des Ardennes n'ont d'autres ressources pour fertiliser leurs terres , que dans les cendres de leurs brossailles , mousses , fougères , bruyères , ronces , épines , menues branches , en un mot de tout ce qui contribueroit à rendre naturellement un pays stérile. Ils enlèvent le gazon & tout ce qui y tient , pour le brûler par petits tas ; ils sement ensuite la cendre qui en résulte sur leur terre pelée , & font de leurs terrains incultes & incommodes , des campagnes labourables & utiles.

Les terres neuves , & particulièrement celles qui touchent à la surface , sont excellentes pour amander celles qui sont usées. Leur engrais est plus stable que les précédens , qui , en quelque sorte , sont passagers. Un engrais très durable , est la marne , qu'on trouve par lits à différents degrés de profondeur , & qui , répandue sur nos champs , s'incorpore peu-à-peu avec

l'autre fol. Voyez MARNE. Il y a des argilles ou glaïfes blanches qui n'en-graiffent pas moins. Le fable de mer, l'algue de mer, les étoiles marines, & quantité d'autres matieres, peuvent auffi fervir à féconder les terres : l'industrie humaine fait les mettre en ufage felon les différentes circonftances.

Observations fur l'usage des fumiers.

On doit faire pourrir le fumier qu'on tire de deffous les bestiaux, à côté des écuries & des étables, dans un trou creufé fur une terre ferme qui ne boive point l'humidité : il ne faut pas que l'endroit creufé foit proche des puits ou des mares, ni qu'il ait de la pente, de peur que l'eau qui y tombe, n'emporte tout le fel du fumier & le meilleur de la fubftance ; il ne faut pas non plus que la foffe foit trop profonde, à moins qu'on y puiffe pratiquer quelques faignées pour écouler les eaux amaffées par les pluies, parceque les eaux venant à croupir formeroient un fumier aigre où l'on verroit bientôt croître de mauvaises herbes capables d'étouffer le grain : cependant cette eau n'est pas tout-à-fait à rejeter, fur-tout lorsqu'elle est colorée, & qu'elle a une faveur urineufe ; elle convient beaucoup pour arrofer des terres qu'on laiffe repofer.

En général, les *fumiers d'étable* les plus pourris, comme de la troisieme année, font les meilleurs ; autrement ils empêchent la végétation plutôt que de la faciliter. Les excréments doivent être entierement confondus avec la paille & l'urine des bestiaux. Il n'y a point d'inconvénient à jeter deffus l'eau de favon dont on s'est fervi pour nétoyer le linge, de même que toutes les urines de la maison : c'est un moyen de faire changer le fumier de nature, & de le rendre plus gras. Le mélange des fumiers convient encore en quantité de circonftances, soit dans les terres humides, soit dans les terres fèches. Cette théorie est déduite de l'usage qu'ont la plupart des Laboureurs, de changer d'année en année ces diverses efpeces d'engrais :

Toutes les terres n'ont pas également befoin de fumier : celles qui font froides & humides en demandent davantage que les chaudes ; mais l'excès y est toujours pernicieux, sinon dans celles qui doivent rapporter des légumes. Le meilleur tems pour fumer est le printems & l'automne ; encore faut-il enterrer le fumier peu profondément.

Lorsqu'on veut fumer amplement pour corriger le défaut d'un fond, on ne doit pas mettre le fumier au fond des tranchées ; mais il faut le répandre au haut du talus qui se fait par les terres que l'on jette à mefure que l'on fait les tranchées, & par-là le fumier se trouve mêlé dans la terre. C'est ainfi qu'on doit fumer tant les quarrés pour les potagers, que les tranchées pour les efpaliers.

L'expérience a appris aux Cultivateurs que les engrais qui ne valent rien pour les jardins, font les curures de colombier & de poulailler. Les excréments de porc, ceux des animaux aquatiques, même ceux de lapins & ceux de l'homme. Ces matieres font trop chaudes, & ne conviennent qu'aux

terres humides & aux vieux arbres. On peut cependant les exposer sur terre à l'air, ou les mêler avec toutes les especes de fumiers, pour les laisser jeter leur feu; autrement elles brûleroient les semences.

FURET, *Furo aut Viverra*. Joli petit quadrupede du genre des belettes, que quelques Auteurs ont confondu avec le Putois, parcequ'il a quelque ressemblance avec lui pour la couleur; cependant le putois, naturel aux pays tempérés, est un animal sauvage comme la fouine; & le furet, originaire des climats chauds, ne peut subsister en France que comme animal domestique: d'ailleurs, une preuve certaine qu'ils sont d'especes différentes, c'est qu'ils ne se mêlent point ensemble.

Le furet a le corps plus allongé & plus mince, la tête plus étroite, le museau plus pointu que le putois; la longueur de son corps jusqu'à l'origine de sa queue, est d'environ quatorze pouces. Quoique facile à apprivoiser, & même assez docile, il ne laisse pas d'être fort colere: il a une mauvaise odeur en tout tems, qui devient plus forte lorsqu'il s'échauffe ou qu'on l'irrite; il a les yeux vifs & rouges, le regard enflammé, tous les mouvements très souples; il est l'ennemi juré des lapins; & il est en même tems si vigoureux, qu'il vient aisément à bout d'un lapin qui est quatre fois plus gros que lui.

On croit le furet originaire d'Afrique, d'où il fut transporté en Espagne. On s'en est servi pour y détruire les lapins, qui s'étoient singulierement multipliés dans ce pays, qui paroît être leur vrai climat naturel. On ne peut point se servir du putois comme du furet, pour la chasse aux lapins, parcequ'il ne s'apprivoise pas si aisément.

La femelle est, dans cette espece, sensiblement plus petite que le mâle: lorsqu'elle est en chaleur, elle le recherche avidement, & l'on assure qu'elle meurt, si elle ne trouve pas à se satisfaire; aussi a-t-on soin de ne les pas séparer. On les élève dans des tonneaux, où on leur fait des lits d'étoupes: ils dorment presque continuellement; ce sommeil si fréquent ne leur tient lieu de rien, car dès qu'ils s'éveillent, ils cherchent à manger: on les nourrit de son, de pain & de lait. Ils produisent deux fois par an: les femelles portent six semaines: quelques-unes dévorent leurs petits aussi-tôt qu'elles ont mis bas; alors elles deviennent de nouveau en chaleur, & font trois portées, qui sont ordinairement de cinq ou six.

Lorsqu'on présente un lapin, même mort, à un jeune furet, qui n'en a jamais vu, il se jette dessus & le mord avec fureur; s'il est vivant, il le prend par le col & lui suce le sang. Lorsqu'on le lâche dans les trous des lapins, on le musèle, afin qu'il ne les tue pas dans le fond du terrier, & qu'il les oblige seulement à sortir, & à se jeter dans le filet dont on couvre l'entrée. Si on laisse aller le furet sans museliere, on court risque de le perdre, parcequ'après avoir sucé le sang du lapin, il s'endort. La fumée que l'on fait dans le terrier, n'est pas toujours un sûr moyen de le ramener, parcequ'il peut sortir, sans qu'on le voie, par la bouche d'un autre terrier, qui communique avec celui dans lequel on l'a fait entrer.

FURIA INFERNALIS. Nom donné par Solander à un insecte qui, selon
M.

M. Linnaeus, forme un genre nouveau. Ce célèbre Naturaliste dit que c'est un ver : il paroît tous les ans sur les frontieres de la Laponie , & fait périr beaucoup d'hommes & d'animaux. Il se jette d'en haut sur les parties du corps qui sont à nud , pénétre les chairs en un instant , & fait souvent mourir dans l'espace d'un quart-d'heure au milieu des douleurs les plus vives.

FUSAIN. *Voyez* BONNET DE PRÊTRE.

FUSEAU. On donne ce nom à l'espece de buccin qui a les deux extrémités en pointe : le *fuseau* à dents est fort rare.

FUSTET. *Voyez* BOIS DE FUSTET.

FUTAIE. Nom qu'on donne à un bois qu'on a laissé croître au-delà de quarante ans , & qu'il n'est pas permis aux usufruitiers de faire abattre , parcequ'il fait partie du fond. Un bois de quarante ans se nomme *futaie sur taillis* ; entre quarante & soixante , c'est *demi futaie* ; entre soixante & cent vingt , c'est *jeune & demi-futaie* ; au dessus de deux cents ans , c'est *haute futaie sur le retour* : ce dernier terme est celui par lequel on désigne tous les vieux bois ; on l'appelle aussi *vieille futaie*. On peut avec succès laisser croître plusieurs especes de bois , sur-tout ceux dont on tire le plus d'usage , tels sont le chêne , le châtaignier , le hêtre , le sapin , &c. Pour avancer ou hâter l'accroissement des principaux arbres d'une futaie , il faut retrancher peu-à-peu les brins foibles des sèpées qui ne manqueroient pas d'être étouffées. Pour ne point s'y méprendre , l'on ne doit couper que ceux qui languissent d'une maniere marquée. Par ce moyen , les brins que leur vigueur naturelle aura distingués , auront plus de nourriture & plus d'air ; ils s'élèveront & grossiront plus promptement. L'économie n'indique pas d'autres moyens d'avancer les futaies : la Nature fait le reste. Mais il faut avoir attention que les arbres des futaies ne soient point trop élagués ; & l'on ne devroit jamais faire une suppression totale des branches , le tronc étant alors dans le cas de souffrir beaucoup. C'est le genre de déprédation le plus ordinaire & le plus dangereux.

Les futaies sont l'ornement des forêts : la hauteur des arbres qui les composent , leur vieillesse , le silence & une sombre fraîcheur y pénètrent l'ame d'une émotion secrete qui a porté plusieurs peuples à y célébrer les cérémonies religieuses ; mais leur utilité doit encore les rendre infiniment plus recommandables. Les futaies seules peuvent fournir la charpente aux grands édifices , & les bois si précieux à la navigation. *Voyez* les articles ARBRE , BOIS , FORÊT , TAILLIS , &c.

G A A

G A L

GAAR, poisson de l'Isle de Tabago, & qui est le même que l'*aiguille*. Voyez *ce mot*. Selon la grandeur de ce poisson, les Espagnols le nomment *grand-gaar*.

GABIRA. Espece de singe cercopithèque ou à queue, noir, de la grandeur d'un renard : voyez SINGE.

GABOT ou JAVOT. Poisson saxatile, assez commun sur nos côtes de l'Océan, & que les Anciens ont nommé *exocetus*, parcequ'il se met à sec parmi les pierres pour dormir, ou *adonis*, parcequ'il semble avoir pour amies la mer & la terre. Ce poisson est long d'un pied & demi, de couleur d'or en quelques endroits, rouge en d'autres. Depuis les ouies jusqu'à la queue il a une ligne blanche : ses ouies sont petites ; c'est ce qui fait qu'il reste long-tems à sec, parcequ'il respire très peu d'air, & qu'il n'en est pas suffoqué : il se trouve dans des trous, sous les rochers, avec les *orties de mer*, où il se plaît beaucoup. Les pêcheurs, avant le flux de la mer, vont remuer les pierres pour en prendre & en garnir les hameçons dont ils se servent à la pêche des congres & des chiens de mer. Quelquefois les pêcheurs trouvent le gabot dormant fort tranquillement, mais ils ne le prennent pas imprudemment avec la main, car il a des dents fort aiguës & qui font beaucoup de mal. Sur les côtes de Marseille on voit une espece de gabot crêté, qui a la figure du goujon : sa couleur est tannée, marbrée : il est glissant comme une anguille & de la grosseur du doigt index ; les nageoires des côtés sont à l'envers, celles du ventre sont des especes de filets : il peut rester trois ou quatre jours hors de l'eau, il se nourrit de *cannes* & d'*orties de mer*. Voyez *ces mots*.

Les Ichthyologues font mention d'autres especes de ces poissons qui ne varient que par les couleurs ou par la grandeur.

GAGOU. Grand arbre de la Guyane que les habitans regardent comme une espece de cédre : voyez *ce mot*. Son bois ressemble pour la couleur, à la pierre à fusil : il est difficile à fendre, & l'on s'en sert pour faire des canots.

GAÏGAMADOU. Les Indiens prétendent que c'est une espece différente de l'*arbre à suif* ou de l'*ouarouchi*. Voyez *ces deux mots* : à Cayenne on les confond.

GALACTIT, *galaxias*. Est une sorte d'argille blanchâtre, endurcie, remplie de veines rouges, & qui a la propriété de rendre l'eau un peu mousseuse & savonneuse. En quelques contrées de l'Allemagne on s'en sert pour les ulcères & les fluxions des yeux : elle conviendrait mieux pour dégraisser les étoffes. Le galactit est la même terre ou pierre si fameuse chez les anciens Egyptiens sous les noms de *galaricide* & *galaricte*, dont on se servoit pour produire des enchantemens, &c. Voyez Hill, *Hist. nat. des Foss.* & Boëc de Boët.

GALANGA ou **GRENOUILLE PÊCHEUSE**, ou **PÊCHEUR MARIN**, *ranâ piscatrix*. C'est un poisson cartilagineux, appelé des Italiens *diavolo di mare*; on le nomme à Marseille *baudroi* & à Montpellier *pescheteau*. Il a une sorte de ressemblance avec la grenouille de marais; il semble n'être que tête & queue. Quand ce poisson est caché dans le sable ou dans l'eau troublée, il leve ses barbillons pour attirer les petits poissons qui les touchent & les mordent, les prenant pour une proie de leur compétence, mais aussi-tôt le galanga rusé & vorace courbe ses barbillons très près de sa bouche, alors il s'élance sur eux & les dévore. *Voyez* **DIABLE DE MER**.

GALANGA. Sous ce nom on trouve dans les boutiques deux especes de racines qui viennent séchées de l'Inde, & qui different beaucoup par la grosseur : on les distingue en grande & en petite especes.

Le **GROS** ou **GRAND GALANGA**, *galanga major*. Est une racine tubereuse, noueuse, genouillée, tortue, repliée & recourbée comme par articulation de distance en distance; divisée en branches; entourée comme par des bandes circulaires; inégale, dure, solide, de la grosseur d'un pouce, d'une odeur aromatique, d'un goût âcre de poivre & un peu amer; d'un brun rougeâtre en dehors & pâle en dedans : on nous l'apporte de l'Isle de Java & des côtes de Malabar, où il vient de lui-même : on le cultive aussi en Chine : la plante dont on tire cette racine se nomme *bangula*.

Le **PETIT GALANGA**, *galanga minor*, aut *galanga sinensis*, est d'une forme semblable au précédent, mais en morceaux beaucoup plus menus & plus courts; il est également genouillé, brun en dehors, rougeâtre en dedans : il est d'un goût & d'une odeur bien plus vifs & plus aromatiques que le gros galanga : sa saveur piquante tient du poivre & du gingembre. Le petit galanga vient d'une plante que les Indiens nomment *lagundi* : cette plante est composée de feuilles graminées comme le gingembre : ses fleurs sont blanches & comme en casque : le fruit a trois loges pleines de petites graines arrondies. Le lagundi vient avec ou sans culture en Chine & dans les grandes Indes, où ces racines se nomment *lavandou*. On nous apporte ces racines par morceaux desséchés : on s'en sert pour fortifier l'estomac lorsqu'il est relâché. Le galanga est un puissant carminatif, il provoque les règles & facilite la digestion. Les Indiens en assaisonnent leurs alimens : les Vinaigriers l'emploient dans la confection du vinaigre, au moins pour en augmenter la force.

L'huile pure des fleurs de galanga, qu'on tire aux Indes Orientales, est aussi rare que précieuse. M. Tronchin en reçut en 1749 du Gouverneur de Batavia une très petite quantité, mais d'une qualité si parfaite, qu'une goutte suffit pour embaumer admirablement deux livres de thé.

GALAXIE. Nom que quelques Naturalistes ont donné au *galactit* ou à la *pierre de lait* : voyez ces mots. Les Astronomes se sont long-tems servis du mot *galaxie* pour désigner cette longue trace blanche & lumineuse qui occupe une grande partie du ciel, & qui se remarque aisément dans une nuit

claire & sereine , sur-tout quand il ne fait point de lune : c'est ce que nous nommons aujourd'hui *la voie lactée* ; voyez *ce mot*.

GALBANUM. Gomme résine dont on nous apporte deux especes dans le commerce : l'une est en larmes pures , & l'autre en pains visqueux remplis d'impuretés. C'est une substance grasse , d'une consistance de cire , peu transparente , brillante , demi inflammable , & demi soluble dans l'eau froide , totalement dissoluble dans le vin , dans le vinaigre , & à peu de chose près dans l'eau chaude , mais difficilement dans l'huile & dans l'esprit de vin : elle blanchit la salive. Sa couleur est jaunâtre extérieurement , blanchâtre dans l'intérieur , quelquefois brunâtre ou roussâtre selon qu'elle est plus ou moins récente & pure : d'un goût amer , âcre , d'une odeur forte & puante.

Le galbanum nous vient de Syrie , de la Perse & de quelques autres endroits du levant par la voie de Marseille , où il en arrive quelquefois 30 ou 40 quintaux pour l'usage de l'Europe. Cette gomme résine découle avec ou sans incision du métopion , plante ferulacée ou ombellifere ; connue sous le nom latin *ferula Africana galbanifera* , laquelle croît en Afrique & sur-tout dans la Mauritanie : on la trouve aussi dans les grandes Indes. La quantité de gomme résine qui découle des jeunes tiges est modique ; il faut que les tiges aient quatre ans pour en produire beaucoup. Si l'on ne fait pas d'incision , le suc découle de lui-même des nœuds des tiges ; mais pour en accélérer l'écoulement on a coutume de couper la tige à deux ou trois travers de doigt de la racine , & le suc découle goutte à goutte. Quelques heures après il s'épaissit , se durcit , & on le recueille.

La racine du *galbanifere* est grosse , ligneuse & fibreuse ; ses tiges sont de la grosseur du pouce ; elles s'élèvent à la hauteur de cinq pieds ; elles sont fongueuses en dedans , rondes , genouillées & partagées en quelques rameaux : chaque espace qui est entre les nœuds est couvert d'un feuillet membraneux d'où sortent les feuilles qui sont semblables à celles de l'anis ou à celles du persil , mais plus grandes & plus découpées , verdâtres , d'une faveur & odeur âcres : les tiges , les rameaux & les feuilles sont couvertes d'une liqueur de la couleur de la plante : ses fleurs naissent en ombellies ou parasols de couleur jaune. Lorsque la fleur est passée le calice devient un fruit composé de deux semences applaties , d'un brun roussâtre , cannelées & bordées d'une aîle mince & membraneuse , telles qu'on en peut voir dans les masses du *galbanum* qui en contiennent toujours beaucoup. Telle est la description du *galbanifere* que quelques Curieux font venir dans des serres , & qui a réussi durant quelques années dans le Jardin Royal de Paris.

Toute cette plante abonde en un suc visqueux , laiteux ; clair , qui se condense en une larme semblable à tous égards au *galbanum* , & que les Arabes ont appelé *chéné*.

Le galbanum , pris intérieurement , dissout la pituite qui est tenace , c'est pourquoi il est utile pour l'asthme & la toux invétérée : il dissipe les vents &

purge les lochies , il soulage les maladies hystériques qui viennent d'obstruction de la matrice : on le recommande aussi contre les poisons coagulans : la fumigation est utile dans la suffocation de la matrice & dans les redoublemens épileptiques : appliqué extérieurement il amollit & fait murir les bubons & les tumeurs squirrheuses : étendu sur une peau de chamois apprêtée & appliquée ensuite sur l'ombilic , il adoucit les mouvemens spasmodiques & les convulsions des membres. On emploie du galbanum dans plusieurs onguens & emplâtres & dans la grande thériaque : cette substance étoit autrefois employée pour tant de maux , qu'il arrivoit souvent que l'effet ne répondoit pas à l'attente ; c'est de-là qu'est venu le proverbe , *donner du galbanum* , pour signifier , amuser par des paroles peu effectives.

Malgré la puanteur qu'exhale le galbanum , cette gomme-résine entroit dans la composition du parfum qui devoit être brûlé sur l'autel d'or. *Exod. ch. xxx. vers. 34.* Ce parfum ne déplairoit point aujourd'hui à nos femmes hystériques & à nos hommes hypocondriaques ; peut-être ne seroit-il pas difficile de trouver les mêmes causes analogiques qui le rendoient autrefois agréable ou nécessaire au peuple Juif , par son influence : mais cette discussion nous meneroit trop loin. La réflexion de ce paragraphe est de M. le Chevalier de Jaucourt.

GALBULES. Nom donné à la tête ou noix de cyprès. *Voyez* CYPRES.

GALE ou GALÉ , ou PIMENT ROYAL. *Voyez* à l'article MIRTHÉ BARTARD , & le mot ARBRE DE CIRE.

GALEGA. Plante dont il est parlé sous le nom de *Rue de chevre*. *Voyez* ce mot.

GALÈNE , *Galena Plumbi*. C'est la mine de plomb la plus commune & la plus brillante : elle est en cubes , & toujours minéralisée par le soufre. *Voyez* le mot GALÈNE à l'article du PLOMB.

GALÈNE DE FER. Espece de *Wolfram*. *Voyez* ce mot & l'article FER.

GALEOPSIS. Nom par lequel les Botanistes désignent diverses especes d'*Ortie*. *Voyez* ce mot.

GALERE. C'est une espece de zoophyte , qu'il est utile de connoître. Il est ovale : sa grosseur égale celle d'un œuf d'oie : il paroît sur la surface de la mer comme un amas d'écume transparente , remplie de vent , ou comme une vessie peinte de vives couleurs , où le blanc , le rouge & le violet dominant. C'est un animal dont le corps est composé de cartilages , & d'une peau très mince & remplie d'air qui le soutient sur l'eau & le fait flotter perpétuellement au gré du vent & des lames , qui le jettent souvent sur le rivage , où il demeure échoué sans se pouvoir remuer , jusqu'à ce qu'une autre onde le reporte dans l'eau : il a huit especes de jambes faites comme des lanieres , dont quatre lui servent de jambes pour nager , & les quatre autres de voiles , puisqu'il s'élève en l'air pour prendre le vent & se soutenir mieux sur l'eau : c'est ce qui lui a fait donner le nom de Galere. Ce zoophyte ne s'enfonce jamais dans l'eau , même en le frappant ; mais il s'at-

tache à ce qu'il rencontre par le moyen de ses jambes qui sont comme gluantes. On a de la peine à observer de près les mouvemens de cet animal : si on le touche , il cesse de remuer , & embrasse fortement le corps sur lequel il est posé , de maniere qu'il faut faire effort pour l'en arracher : peut-être que cette adhérence est dûe en partie à l'humeur gluante dont ses jambes paroissent être entierement couvertes. Si l'on vient à marcher dessus , lorsqu'il est à terre , il rend un bruit semblable à celui d'une vessie de carpe qu'on écrase d'un coup de pied,

On trouve des galeres sur toutes les côtes des Isles de l'Amérique , & particulièrement dans le golfe du Mexique , après les coups de vents & les grosses marées. On l'appelle *Velette* ou *Vessie de mer* , sur la Méditerranée ; & *Moucieu* , au Brésil. Son apparition vers les côtes est un présage infaillible d'une prochaine tempête.

Cet animal porte un poison si subtil , si caustique , si violent , que s'il touche la chair de quelqu'autre animal , il y cause une chaleur extraordinaire , avec une inflammation & une odeur aussi pénétrante , que si cette partie avoit été arrosée d'huile bouillante. La douleur que cause son attouchement croît à mesure que le soleil monte sur l'horison , & elle diminue à mesure qu'il descend , enforte qu'elle cesse tout-à-fait un instant après qu'il est couché. Pour dissiper ces douleurs , on se sert d'eau-de-vie battue avec un peu d'huile d'acajou. Ce qu'il y a de surprenant , c'est qu'il corrompt & empoisonne la chair des poissons qui en ont avalé , sans cependant les faire mourir.

GALERES. Nom qu'on donne aux *Ephemeres* , especes de mouches aquatiques , & à une espece de crustacée marin qui a quantité de rames.

GALET, *Siliculus*. On donne ce nom à des pierrailles ovales , ou applaties , ou arrondies , & de différentes couleurs , qu'on trouve au fond des rivières & sur la grève des mers & des fleuves , sur-tout dans les ports & havres , & souvent en si grande abondance , qu'ils les gâtent & les combrent , à cause que la mer les pousse d'un côté , & le courant de l'autre. Ces sortes de pierres varient beaucoup pour la composition , étant ou de quartz ou de marbre , ou de jaspe , ou de granite , ou d'autres cailloux , en un mot , selon les especes de masses pierreuses qui bordent ou servent de sol aux eaux ; les galets n'en sont que les débris. Il est aisé de comprendre que la figure & le poli des galets leur viennent d'avoir été long-tems battus , agités par les flots & par les coups de vent , & usés les uns contre les autres. À l'égard des galets qu'on trouve dans les terres , les vallées & les montagnes , il faut soupçonner qu'ils y ont été portés de main d'hommes , ou déposés lors d'une alluvion très considérable , qui a baigné de tels endroits. Quand un *Galet* de riviere ou de mer a une sorte d'écorce , l'on peut dire qu'il est encore dans son état naturel ; mais plus un galet est lisse , sans écorce & petit , plus il a roulé , c'est-à-dire qu'il a souffert un frottement long & violent.

GALIOTE. C'est un lézard d'Arabie , de différentes couleurs , & qui

court comme les chats dans les maisons & sur les toits : il se nourrit d'araignées & de rats. Cet animal a le dessus du corps varié magnifiquement de roux & de jaune foncé , le ventre d'un cendré jaune , la tête plate & couverte de petites écailles d'un jaune pâle , qui regnent aussi le long du col jusqu'à l'extrémité de la queue.

GALIPOT. *Voyez aux articles PIN & SAPIN , &c.*

GALIPOT D'AMÉRIQUE. Nom donné à la résine chibou , dont il est parlé à l'article *Gommier d'Amérique*. Voyez ce mot.

GALLE, *Galla*. On a donné le nom de *Galle* à ces excroissances singulières , à ces tubérosités qui s'élèvent sur les différentes parties des plantes , des arbres , & qui doivent leur naissance à des insectes qui ont crû dans l'intérieur , ou qui y logent leurs œufs. Elles imitent si bien les productions naturelles des plantes , qu'au premier coup d'œil on est porté à en prendre plusieurs pour leurs fruits , & d'autres pour leurs fleurs. Mais ces fruits apparens ont pour noyau ou pour amande un insecte , & au-dessous de ces especes de fleurs on trouve également un insecte au lieu de graines.

Ces galles nous font voir une prodigieuse variété qui est dûe en partie aux différentes especes d'insectes qui ont occasionné leur formation. Une mere insecte qui , pour l'ordinaire , est une mouche à quatre aîles , ou quelquefois une mouche à deux aîles , un papillon , un scarabée , &c. a été pourvue d'un instrument propre à percer , ou à entailler le bois , l'écorce ou les feuilles ; elle le porte au derriere , c'est une tariere ou un aiguillon : ceux des meres de différentes classes sont ordinairement faits sur différens modèles. Nous ne pouvons pas voir tout ce qu'il y a dans la structure de ces instrumens , mais nous en voyons assez pour l'admirer : (on peut voir au mot MOUCHE A SCIE , la description d'une de ces tarieres d'une structure tout-à-fait étonnante.)

Dans des insectes très petits , tels que sont les différentes especes de mouches à quatre aîles qui font naître les différentes especes de galles du chêne , l'aiguillon est très grand par rapport à la grandeur de l'insecte ; la Nature a cependant trouvé moyen de le loger dans le corps même ; il y est recourbé & contourné. Quand la mouche veut , elle fait sortir cet instrument de son corps ; avec la pointe elle perce tantôt une feuille , tantôt un bourgeon , tantôt un jet d'arbre , & elle dépose un œuf dans le trou qu'elle a formé. Quelquefois la même mouche perce ainsi plusieurs trous les uns après les autres , dans chacun desquels elle laisse un œuf.

Les endroits de l'arbre qui ont été blessés , ou , ce qui est la même chose , ceux à qui un ou plusieurs œufs ont été confiés , végètent plus vigoureusement que le reste ; la plaie se ferme très vite , & l'endroit où elle est se gonfle. Il y paroît bientôt une nouvelle production , qui n'est autre chose que la galle dont nous parlons. De ces galles les unes sont à-peu-près sphériques , petites , de la grosseur d'un grain de groseille ; d'autres deviennent grosses comme des noix ; & d'autres comme de petites pommes : quelques-

unes sont colorées comme les plus beaux fruits , & l'œil les prend même pour de vrais fruits : les unes sont lisses , les autres sont épineuses ; les unes ont une chevelure bien surprenante , telle que le bedeguar qui se trouve sur le rosier ; d'autres semblent de petits artichaux ; d'autres pourroient être prises pour des fleurs. La substance de quelques-unes est spongieuse : il y en a même certaines qu'on mange en quelques pays , & qu'on porte au marché. Les Voyageurs nous rapportent qu'à Constantinople on vend au marché des galles ou pommes de fauge. Sans aller chercher des exemples si loin , des payfans des environs du bois de S. Maur (près de Paris) se sont avisés de manger de ces galles en pommes , prises sur le lierre terrestre : ils les ont trouvées très bonnes : leur saveur est aromatique. Il faut les cueillir de bonne heure avant qu'elles soient trop sèches & trop filamenteuses ; cependant il n'y a pas lieu de penser qu'elles parviennent jamais à être mises au rang des bons fruits : d'autres sont plus dures que le bois. Enfin parmi les galles , il y en a plusieurs dont les Arts font un grand usage ; telles sont les *Noix de Galle*. Voyez ce mot.

L'œuf qui a été enfermé dans une galle naissante , y croît lui-même ; & ce n'est qu'après que cet œuf a pris un assez grand accroissement , que l'insecte en sort , ordinairement sous la forme de ver. Ce ver , par la suite , se métamorphose , soit en une mouche à deux ailes , soit en une mouche à quatre ailes , soit en un scarabée , selon l'espece dont il est lui-même. Après avoir subi sa dernière transformation , il quitte ce logement , où il a été si bien défendu contre toutes les intempéries de l'air , & qui lui a donné à vivre. Il y a quelques insectes de galles , qui sont de fausses chenilles , & des vers de scarabées , qui sortent de leurs galles , lorsqu'ils sont prêts à se transformer pour la première fois.

Dans l'institution de la Nature , ces insectes eux-mêmes doivent servir à nourrir d'autres insectes. Des mouches carnassières , & qui donnent naissance à des vers carnassiers , sont munies de tarières qui valent bien celles des mouches qui font naître les galles. La mouche carnassière va percer une galle ; elle dépose un œuf dans sa cavité ; il en naît un ver qui mange celui qui sembloit devoir être en sûreté dans un logement environné de murs solides & épais.

La quantité de vers étrangers ; introduits dans les galles , les variétés de leurs espèces & des belles mouches qu'ils donnent , sont encore de véritables merveilles. Il sort des galles plus de mouches qui doivent leur naissance aux vers étrangers , qu'il n'en sort de celles qui la doivent aux habitants naturels.

Entre ces diverses espèces de galles , les unes ne nous offrent qu'une grande cavité , dans laquelle plusieurs insectes vivent & croissent ensemble ; ou diverses cavités plus petites , entre lesquelles il y a des communications. L'intérieur de quelques autres est rempli de plusieurs cellules , quelquefois au nombre de plus de cent , & quelquefois seulement au nombre de trois ou quatre , qui toutes sont séparées les unes des autres par une cloison.

cloison. Enfin d'autres, quoiqu'assez grosses, ne sont occupées, dans leur cavité, que par un seul insecte. On reconnoît qu'une galle est encore habitée par les insectes, lorsqu'on ne voit point qu'elle soit percée nulle part. Les insectes de certaines galles sont si petits, qu'on ne peut les appercevoir qu'avec une loupe.

GALLES DE CHÊNE OU FAUSSES GALLES. Les pommes de chêne & les raisins de chêne sont, selon les Naturalistes, des excroissances produites par la piqure de certains moucheron qui y déposent leurs œufs, & qui y produisent des vers : ces excroissances sont astringentes. *Voyez* NOIX DE GALLE.

GALLES DE LA GERMANDRÉE. M. de Réaumur a observé que tandis que les galles des autres plantes sont produites sur les feuilles, celles de la germandrée le sont sur la fleur ; & pour surcroît de singularité, par une punaise, le seul insecte connu de sa classe, qui se forme & croît dans ces sortes de tubercules monstrueux. Cet insecte est niché en naissant dans la fleur toute jaune du *chamadris* (germandrée), & il la suce avec sa trompe. La fleur succée croît beaucoup sans pouvoir s'ouvrir ; parceque sa levre qui devoit se dégager du calice fait par les autres pétales, y reste retenue à cause qu'elle a pris trop de volume, & la petite nymphe de punaise y conserve son logement clos. *Voyez* GERMANDRÉE & PUNAISE.

GALLE RÉSINEUSE DU PIN. Cette galle se rencontre sur les jeunes branches du pin dans toutes les saisons de l'année. Elle a une forme ovale, & est longue d'un pouce environ, d'une couleur blanchâtre sale : elle devient brune en vieillissant. Cette galle est de substance résineuse, car elle est dissoluble dans l'esprit-de-vin. On trouve dans son intérieur une petite chenille qui fait sa nourriture de la substance résineuse de la partie de la branche renfermée sous la galle. Elle s'accommode de cette résine, & résiste à l'odeur de l'huile essentielle qu'on en retire ; tandis que toute autre chenille en périt au bout de deux ou trois minutes. Ces observations sont de M. Géer, & sont inférées dans le Tome II des Mémoires présentés à l'Académie.

GALLINASSE ou GALLINAZA. Nom que les Espagnols donnent à une espèce de corbeau du Pérou, que les habitants du pays nomment *Suyanta*. Cet oiseau, qui est d'une odeur désagréable, est très goulé, très carnassier : il vit de corps morts, & enlève les immondices des chemins.

Le gallinaza se rencontre aussi dans le Mexique, où il y est appelé *Aura* & *Tropillot*. *Voyez* le mot AURA.

GALLINSECTES. Les Naturalistes modernes donnent ce nom à des insectes qui ressemblent fort à des galles ; mais qui n'ont de commun avec elles que la ressemblance extérieure. C'est sur les arbres, sur les arbrisseaux, & communément sur des plantes qui passent l'hiver, que naissent & croissent les gallinsectes : il faut à ces sortes d'animaux, une plante qui les nourrisse près d'un an ; terme auquel est fixée la durée de leur vie.

Il y a peu d'arbres & d'arbrustes, dans notre pays, qui n'en nourrissent différentes espèces : on les y reconnoît à leur figure & à leur couleur. Elles naissent toutes d'assez petits animaux. Après leur accroissement, les unes

semblent être de petites boules attachées contre une branche par une très petite partie de leur circonférence : elles sont ordinairement grosses comme un grain de poivre ; d'autres sont comme sphériques , excepté la partie plate par où elles sont attachées à l'arbre. Il y en a qui ont la figure d'un rein ou d'un bateau renversé ; & elles sont toutes appliquées aux petites branches par la partie la plus échancrée ou enfoncée de leur corps. Les couleurs des gallinfectes n'ont rien de bien frappant : communément elles en ont une qui tire plus ou moins sur le maron ; il y en a aussi de rougeâtres , de violettes , & d'un beau noir ; d'autres dont le fond est jaune , avec des ondes brunes. M. de Réaumur en a trouvé de brunes veinées de blanc.

Les pêchers & les orangers ont des gallinfectes , faites en bateau renversé ; & ce sont de tous les arbres , ceux desquels on est plus attentif à les ôter. Les Jardiniers les appellent improprement *Punaises d'orangers* : ces gallinfectes sont les plus communes , & celles sur lesquelles on a fait des observations dont on peut faire l'application aux autres especes.

Les gallinfectes sont presque toujours nuisibles aux arbres : il y en a cependant de très utiles , & dont on desire la multiplication ; telle est celle du kermès , appelée *Coccus* ou *Graine d'écarlate*. Voyez au mot KERMÈS.

Ces sortes d'animaux parviennent à leur dernier terme d'accroissement à la fin de Mai & au commencement de Juin. Il faut observer les gallinfectes dans tous les tems pour les bien connoître : sans cette exactitude , on les prend aisément pour des coques où divers insectes renferment leurs œufs. L'insecte a six jambes , qu'il tient appliquées contre son corps : il y en a quatre plus aisées à distinguer que les autres. La dernière paire de celles-ci est immédiatement au-dessus du premier des cinq anneaux. Au-dessus de la première paire de jambes , on apperçoit une espece de petit mamelon , qui est la partie par le moyen de laquelle l'insecte se nourrit. La gallinfecte couvre ses œufs de son corps , qui leur tient lieu d'une coque bien close. La ponte étant finie , l'insecte meurt bientôt , & à la même place où il s'étoit fixé depuis long-tems : son corps se dessèche , & semble transformé en une espece de coque qui couvre les œufs. Selon M. de Réaumur , les petites gallinfectes sont douze jours à éclore , & ne prennent l'essor que plusieurs jours après leur naissance : il y a des Auteurs qui ont compté depuis mille jusqu'à deux mille œufs sous certaines especes de gallinfectes. Celles qui sont nouvellement nées sur les pêchers , commencent à sortir de dessous le squelette de leur mere au commencement de Juin. Les fourmis qui , comme nous l'avons dit , indiquent les pucerons , indiquent aussi les gallinfectes des pêchers. Ces insectes tirent des feuilles , sous lesquelles ils se fixent , la substance propre à leur nourriture & à leur accroissement : ils ne rongent point les feuilles ; ils en pompent le suc avec leur trompe , qui ne se laisse distinguer que dans les grosses gallinfectes.

L'expérience a appris aux Jardiniers-fleuristes à nétoyer de leur mieux , leurs arbres fruitiers des gallinfectes , & sur-tout les orangers & les pêchers ; sans quoi elles épuisent , en quelque sorte , la sève de ces arbres ; ce qui les fait languir , & même périr.

Les gallinsectes tombent en automne avec les feuilles sur lesquelles elles sont attachées ; mais elles regagnent bientôt l'arbre , & s'y fixent. C'est en Avril qu'elles se défont de leur vieille peau ; après quoi , elles croissent très vite , & prennent la figure de galles : arrivées au dernier terme d'accroissement (en Mai) , elles sont en état de pondre.

De petites mouches fort jolies , à deux aîles , dont la tête , le corps , le corselet & les six jambes sont d'un rouge foncé , sont les mâles qui fécondent , sur la fin d'Avril , les gallinsectes. Ces mâles ont une forme bien différente de leur femelle , & une grandeur bien disproportionnée. On voit un même mâle aller successivement sur plusieurs femelles , les parcourir chacune d'un bout à l'autre , d'un côté à l'autre , tenant toujours la partie en forme d'aiguillon , inclinée vers leur corps. Il s'arrête , il se fixe , il introduit cette partie , quand il s'est placé sur la fente d'une femelle toute prête à le recevoir.

Différentes especes de nos chênes fournissent aussi des gallinsectes , arrondies , grosses comme de petits pois , qui y tiennent par une base circulaire assez étroite , & qui ressemblent beaucoup au kermès. L'épine , la charmille , la vigne sont aussi voir des gallinsectes , dont les œufs paroissent être dans une coque de soie. Enfin M. de Réaumur cite une espece de gallinsecte brunâtre , lisse , & semblable à une valve de la moule de mer.

Pro - Gallinsectes.

On donne ce nom à de petits animaux qui tiennent beaucoup des caracteres des gallinsectes , mais qui en ont pourtant qui leur sont particuliers. Les pro-gallinsectes passent une grande partie de leur vie , attachées contre l'écorce des arbres , sans changer de place & sans se donner de mouvements sensibles ; cependant on les reconnoît en tout tems pour des animaux ; si on les regarde avec la loupe , on distingue toujours leurs anneaux : on a étudié encore peu cette espece d'animaux. La cochenille est peut-être la pro-gallinsecte la plus importante à examiner. *Voyez COCHENILLE.*

On connoît une pro-gallinsecte qui se tient volontiers sur l'orme : elle est petite & peu allante. On la trouve dans les bifurcations des petites branches qui n'ont qu'un an ou deux ; on en trouve quelquefois contre les branches & les petites riges. Leur dernier terme d'accroissement est fait en Juillet. La vue ne peut néanmoins distinguer qu'une petite masse ovale & convexe , d'un assez mauvais rouge brun , entourée d'un cordon blanc & cotonneux. La partie ovale est le dessus du corps de l'insecte ; on y reconnoît , avec la loupe , des anneaux ; du reste , l'animal est parfaitement immobile : il ne montre ni tête ni jambes , tout est caché par un bourrelet cotonneux , qui ne laisse à découvert que la partie ovale. Cette matiere cotonneuse fait une espece de nid , en forme de corbeille & comme goudronné , dans lequel l'insecte est logé en grande partie. Son ventre , qui pose sur le fond de ce nid , se trouve séparé de l'arbre par une couche de coton. Ce nid est non-seulement destiné

à mettre le corps de l'insecte plus à son aise, mais aussi à recevoir les petits qui doivent naître en Juin ou en Juillet. En retirant alors la pro-gallinsecte de son nid, on trouve dans le fond & dans les inégalités des côtés, un grand nombre de petits vivants, dont la couleur est d'un blanc jaunâtre. Ils portent devant eux deux petites antennes; leur corps est assez semblable à celui des gallinsectes nouvellement nées. Ils marchent sur six jambes, assez courtes: on a de la peine à reconnoître leur trompe ou suçoir. Quand la mere pro-gallinsecte met ses petits au jour, ils sortent par l'anús, ou par une ouverture qui en est proche: ils passent sous le corps de la mere, qui s'applatit à mesure qu'elle se vuide. L'enfantement fini, la mere périt: elle se dessèche; & par la suite, elle tombe du nid. On est encore incertain si les mâles des pro-gallinsectes sont ailés.

La *Graine de Pologne*, dont nous avons parlé à l'article *Cochenille du Nord*, est encore une pro-gallinsecte ou un ver à six jambes, qui porte également sur la tête deux antennes, & qui a d'ailleurs une ressemblance générale avec la gallinsecte & la pro-gallinsecte. Ce ver du Nord pond des œufs: de très petites mouches à deux ailes blanches & bordées de rouge, qui sortent de la graine d'écarlate, en font les mâles. *Voyez* au mot *COCHENILLE DU NORD*.

GALLIOTE ou GALIOT. *Voyez* BÉNOITE.

GALIPOT ou BARRAS. C'est une résine plus ou moins concrete, qui découle du *Pin* & du *Térébinthe*. *Voyez ces mots*.

GAMAICU. Nom que les Indiens donnent, tantôt à un morceau de madrepore fossile, tantôt à une concrétion pierreuse, ronde, protubérancée, semblable aux *Stalagmites* ou *Oolites*: voyez *ces différents mots*. Les Indiens attribuent au gamaïcu des vertus merveilleuses.

GAMMA DORÉ, *Gamma aureum*. On donne ce nom à un phalène ou papillon nocturne, dont les aîles sont agréablement variées, & d'un brun nébuleux. On distingue sur chaque aîle supérieure le *gamma* ou *lambda* des Grecs bien marqué de couleur d'or. Ce papillon se trouve sur la matricaire, sur la bourrache & sur la laitue.

GAMMAROLITE, *Gammarolitus*. Les Lithologistes donnent ce nom aux fossiles congénères aux *astacolites*, c'est-à-dire, à des crustacées ensevelis dans la terre, & qui y sont devenus très durs, ou qui y ont changé de nature: tels sont les cancre, les crabes, les hommars, &c. *Voyez ces mots*. On voit dans les cabinets des Curieux, de ces fossiles que l'on trouve abondamment sur les côtes de Coromandel & de Malabar.

GANDS DE NOTRE-DAME. Quelques-uns donnent ce nom à la *Digitale*, à la *Gantelée* & à l'*Ancolie*. *Voyez ces mots*.

GANGUE, *Matrix mineralium & metallorum*. Ce nom qui est allemand, & qui signifie en cette langue *filon* ou *veine métallique*, se donne à des terres endurcies ou à des pierres de roches qui contiennent ou renferment des matières minérales & métalliques. Ces pierres, étrangères à la nature des minéraux mêmes, sont tantôt du quartz, tantôt du spath, ou du schiste, &c.

Elles se réduisent en scories dans la fusion des métaux ou demi-métaux.

GANTELÉE ou GANTS DE NOTRE-DAME. *Voyez* CAMPANULE.

GARAGAY. Oiseau de proie de l'Amérique : il est de la grandeur & de la grosseur du milan. Sa tête est blanche, de même que les extrémités de ses aîles : sa nourriture consiste en œufs de crocodiles & de tortues, qu'il fait trouver aux bords des rivières, dans les sables où ils sont cachés. Les oiseaux Aura & Gallinasses poursuivent les garagays pour leur enlever leur proie. *Voyez* GALLINASSE & AURA.

GARANCE, *Rubia*. Il y a plusieurs espèces de garance, qui toutes fournissent de la teinture. L'azala ou izari de Smirne, que l'on emploie à Darnetal & à Aubenas pour faire les belles teintures incarnates à la façon d'Andrinople, est une vraie garance. Il en croît naturellement quelques espèces dans les haies, dans les bois, & dans les joints des pierres de murailles des jardins, dont les racines, lorsqu'elles sont séchées avec précaution, fournissent d'aussi belle teinture que l'azala de Smyrne. M. Dambournay, des Académies des Sciences & d'agriculture de Rouen, a cultivé une espèce de garance qui s'est trouvée sur les rochers d'Oizel en Normandie : les racines de cette plante lui ont donné une aussi belle teinture que l'azala. Suivant les expériences de M. Guettard, on peut tirer aussi une couleur rouge des caillelaits.

Le grand Colbert, qui ne négligeoit rien de tout ce qui pouvoit faire valoir les avantages naturels du Royaume, regrettant les sommes immenses qui en sorroient tous les ans pour le commerce de cette racine, est le premier Ministre qui ait entré dans le détail de tout ce qui regarde la culture & la préparation de la garance. *Voyez l'Instruction générale pour les teintures, du mois de Mars 1671.*

L'espèce de garance que l'on cultive le plus ordinairement pour la teinture, est le *Rubia Tinctorum sativa*. Cette plante pousse des tiges qui se soutiennent assez droites, longues de trois ou quatre pieds, quarrées, noueuses, rudes au toucher ; chaque nœud est garni de cinq ou six feuilles qui font l'anneau autour de la tige. Ces feuilles sont longues, étroites, garnies à leurs bords de dents fines & dures qui s'attachent aux habits. Les fleurs sont d'un jaune verdâtre ; elles naissent vers les extrémités des branches, & sont d'une seule pièce en godet. Il leur succede un fruit composé de deux baies attachées ensemble, d'abord verdâtres, puis rouges, enfin noirâtres quand elles sont tout-à-fait mûres. Chaque baie contient une semence presque ronde. Les racines de cette plante sont longues, rampantes, de la grosseur d'un tuyau de plume, ligneuses, rougeâtres, & elles ont un goût astringent.

C'est cette même espèce de garance dont on fait des plantations en Zélande & aux environs de Lille. On la dessèche, on la pulvérise, & on l'envoie vendre en France sous le nom de *garance, grappes de Hollande*. Il n'est pas possible de faire un aussi bel incarnat sur le coton avec cette garance, qu'avec l'azala de Smyrne. Au reste, il n'y a pas lieu de penser que cette

différence provienne de la plante ; car la graine tirée du Levant sous le nom d'azala , a produit au Jardin du Roi la même espece de garance , que celle de Lille. Ces différences proviendroient-elles du degré de maturité ou de l'exsiccation de la plante , ou de la main-d'œuvre , &c. Quant à la garance d'Oïfel , elle pousse plutôt au printemps que celle de Lille : ses tiges menues se penchent jusqu'à terre ; ses racines sont moins grosses , moins vives en couleur , moins garnies de nœuds & de chevelu que celles de la garance de Lille. La garance d'Auvergne , celles des dehors de Carcassonne , & des environs des étangs de Montpellier , donne des couleurs aussi vives que celles que fournit la garance des Indes.

Culture de la Garance.

La garance subsiste dans toutes sortes de terres , mais elle ne pousse point par-tout d'aussi belles racines : elle aime les terres fortes , douces , humides en dessous ; cependant elle périt quand elle est submergée. Les garancieres ou les terrains les plus favorables pour la garance , sont les marais desséchés , bien exposés au soleil , & dont le terrain est un peu salé.

On peut multiplier la garance de trois manieres différentes , soit par la graine , soit par les racines , soit en la provignant. La premiere maniere est la plus longue , mais cependant nécessaire lorsqu'on est éloigné des garancieres. On doit semer la graine de garance depuis Mars jusqu'en Mai ; & le plant qui en provient , n'est bon à transplanter dans les champs , qu'après la seconde année. La garanciere est bien plutôt formée , lorsqu'on plante des racines. Quand on arrache des racines de garance pour les livrer aux Teinturiers , on peut se procurer beaucoup de plant , qui ne diminue que très peu le produit de la vente ; car il est d'expérience , qu'un bout ou tronçon de racine , pourvu qu'il soit garni d'un bouton ou d'un peu de chevelu , produira un pied de garance. On peut aussi avoir recours aux provins , en couchant les tiges de garance , qui prennent racine , & que l'on replante ensuite. Il faut un certain tems pour que ces branches , converties en racines , puissent être aussi abondantes en couleur , que les vraies racines : on doit avoir grand soin d'arracher les mauvaises herbes , de donner des labours à la garanciere , & de recouvrir les racines de terre , afin qu'elles deviennent plus belles.

Dans le mois de Septembre , on peut faucher l'herbe de la garance. Cette herbe fournit un excellent fourrage pour les vaches ; l'usage de cette nourriture leur procure beaucoup de lait , qui est d'une couleur tirant un peu sur le rouge , & dont le beure est jaune & de bon goût.

La récolte des racines se fait en Octobre & en Novembre. L'état le plus favorable où elles puissent être pour la teinture , c'est lorsqu'elles sont de la grosseur d'un tuyau de grosses plumes. Si on les laisse trop vieillir , elles donnent moins de teinture ; si on les arrache trop menues , elles ne font point de profit.

A mesure que les racines sont arrachées , on les étend sur le pré pour les

faire sécher. Il faut éviter de les laver pour les débarrasser de la terre qui leur reste attachée ; car on apperçoit bien à la couleur que l'eau contracte , qu'elle a un peu dissous la partie colorante. La racine de garance est difficile à faire sécher ; son suc est visqueux , & elle perd à l'étuve sept huitiemes de son poids. En Flandre , on fait dessécher la garance dans une étuve , dont la chaleur est bien ménagée. Quelques essais faits en petit donnent lieu de croire que la qualité de la garance seroit meilleure , si on pouvoit la dessécher au soleil , ou même à l'ombre , & par la seule action du vent , comme on prétend qu'on le fait à Smyrne , où l'air est bien plus sec qu'en Flandre. Pour cet effet il seroit avantageux d'arracher les racines au printems , & non point en automne , comme on le fait.

Il ne suffit pas que la garance soit assez seche pour ne se point gâter , il faut encore qu'elle puisse se pulvériser , ou comme l'on dit se grapper. On reconnoît que la garance est suffisamment desséchée , lorsqu'elle se rompt en la pliant. On bat les racines de garance à petits coups de fléau , pour les débarrasser du chevelu , d'une partie de l'épiderme , & d'une portion de terre fine , que l'action de l'étuve a fait dessécher ; toutes ces matieres pourroient rendre la teinture moins belle.

Pour avoir une belle teinture de garance , suivant les épreuves qu'en a faites M. Pagne de Darnétal ; il faut tirer les bonnes racines séchées & épluchées , les mettre dans un grand sac de toile rude , les secouer violemment ; le frottement du sac & celui des racines les unes contre les autres , détachent presque entièrement l'épiderme , qui acheve aisément de se séparer au moyen du van. On a , dit-il , par cette méthode , de belles racines de garance robée , dont l'effet prévaut sur l'azala , autant que celle-ci a d'avantage sur la plus belle garance de Hollande , mais cette garance devient nécessairement plus chere.

Les terres substancielles & légères donnent de meilleures racines que les terrains fort gras & marécageux ; mais ces derniers en donnent en plus grande abondance. On ne peut guère compter que sur quarante-cinq ou quarante-six milliers de garance verte par arpent : huit milliers de racines vertes ne donnent au sortir de l'étuve , qu'un millier de racines seches. On fait passer la garance séchée sous les pilons ou sous la meule. On voit dans les *Elémens d'Agriculture de M. Duhamel* , dont nous avons tiré une partie de cet article , la description de l'étuve & du moulin à grapper la garance qui sont à Lille en Flandre ; ainsi que celle du moulin à pulvériser la garance , qui a été construit à Corbeil.

M. Dambournay a fait sur la garance une découverte d'autant plus importante , qu'elle tend singulierement à l'économie. L'expérience lui a appris que quatre livres de garance fraîche , font le même effet dans un bain de teinture , qu'une livre de garance seche & réduite en poudre. D'où il est aisé de conclure qu'en employant la garance en verd , on épargne une moitié de racine , puisque huit livres de vertes n'en donnent qu'une livre de seches.

Les racines de garance , pour être bonnes , doivent avoir une odeur forte , tirant un peu sur celle de la réglisse ; l'écorce doit être unie & adhérente à la partie ligneuse : c'est la partie la plus utile ; car c'est dans l'écorce que l'on apperçoit , à l'aide du microscope , des molécules rouges : on remarque aussi une substance ligneuse de couleur fauve ; qui probablement altère la couleur rouge. M. de Tourniere croit que les lessives & l'avivage ne donnent de l'éclat à la teinture de garance , que parcequ'elles emportent ce fauve. Ce seroit une découverte bien utile , que de trouver le moyen d'extraire la partie rouge , sans aucun alliage de la partie jaune ou fauve ; je crois , dit M. Duhamel , que ces tentatives devroient être faites sur des racines vertes , afin que la partie rouge , qui est en dissolution , fût plus aisée à extraire. On doit bien distinguer l'écorce , de l'épiderme , qui ne peut qu'altérer l'éclat du rouge.

La garance en poudre doit être onctueuse , se peloter lorsqu'on la manie entre les doigts. Lorsqu'elle est vieille , elle perd son onctuosité , & produit une poudre sèche.

La racine de garance est un des meilleurs ingrédiens qu'on puisse employer pour la teinture des laines ; elle donne un rouge , à la vérité peu éclatant , mais qui résiste sans altération à l'action de l'air , du soleil , & à l'épreuve des ingrédiens qu'on emploie pour éprouver la ténacité des couleurs ; elle contribue aussi à procurer de la solidité à plusieurs autres couleurs composées : on s'en sert pour fixer les couleurs déjà employées sur les toiles de coton. Enfin il y a un grand nombre de cas où le succès des opérations demande qu'on fasse le *garancage*. On appelle sa teinture *rouge de garance*.

La meilleure manière de connoître la qualité de la garance , est d'en faire des essais sur des morceaux d'étoffe que l'on a fait tremper dans un bain d'alun , & prendre pour objet de comparaison , de l'étoffe teinte avec de la belle garance de Zélande , ou avec de l'azala.

Les tiges & les feuilles de la garance sont très bonnes pour nettoyer la vaisselle d'étain , à laquelle elles donnent le plus beau lustre. La racine de garance est mise au rang des cinq petites racines apéritives , (qui sont celles de l'Arrête-bœuf , de Caprier , de Garance , de Chiendent , & de Chardon-roland.) Elle résout puissamment les humeurs épaisses : on lui attribue aussi la vertu de dissoudre le sang coagulé ; elle donne aux urines une couleur rouge ; elle est d'un usage familier en Hollande (sous le nom de *Krapp*) étant cuite dans le vin , l'eau & la bière , & prise intérieurement pour les chûtes considérables. Elle convient dans l'hydropisie naissante , dans la jaunisse & dans les obstructions du bas ventre. Quelques Médecins du Nord s'en servent pour procurer les regles aux femmes. M. Duhamel a aussi reconnu (d'après Belchier) dans cette plante la propriété de teindre en rouge les os des animaux qui en ont été nourris quelque tems. Trois jours suffisent pour un pigeon : il est digne de remarque que ni tous les os dans un même animal , ni les mêmes os en différens animaux ne prennent pas la même

même nuance. Les cartilages qui doivent s'ossifier, ne se teignent qu'en s'ossifiant. Si on cesse de donner en nourriture les particules de garance, les os perdront peu-à-peu leur teinture. Les os les plus durs se coloreront le mieux, ils soutiendront les débouillis : ils ne sont cependant pas tout-à-fait intacts à l'action de l'air ; les plus rouges y perdent de leur couleur. La moëlle de ces os teints, & toutes les autres parties molles de l'animal, conservent leur couleur naturelle. Une autre remarque, c'est que la garance que prend la volaille agit aussi sur leur jabot & sur leurs intestins ; ils en sont colorés pour peu qu'on les tienne à ces alimens, ils tombent en langueur & meurent ; on leur trouve quand ils sont morts, les os les plus gros, plus moëlleux, plus spongieux & plus cassans. Mais pourquoi les parties colorantes ne se portent-elles qu'aux os ? Ne seroit-il pas sage de présumer, d'après les expériences précédentes, que l'usage de la garance est tout au moins mal-sain. On voit dans le *Recueil de l'Académie des Sciences*, ann. 1746, qu'elle n'est pas la seule plante qui ait la propriété de teindre en rouge.

GARANCE PETITE, *Rubeola*. Cette plante, que l'on appelle aussi *herbe à l'equinancie*, ressemble à un petit plant de garance. Ses fleurs sont rouges ; quelquefois blanches & d'une odeur de jasmin. Ses tiges se couchent la plupart à terre.

GARDE-ROBE : voyez à l'article **AURONE**.

GARDON, *Leuciscus*. Petit poisson d'eau douce, qui est au rang des poissons blancs, & peu estimé ; il est semblable au meunier par la figure des écailles, par le nombre & par la figure des nageoires ; il a le corps large, le dos bleu, la tête verdâtre, le ventre blanc, & les yeux grands : sa chair est semblable à celle du *Dard*. Voyez ce mot. On l'appelle *Gardon*, parcequ'il se garde plus long-tems que les autres poissons dans un vase plein d'eau : il peuple beaucoup.

GARENNE. Nom donné à un espace de terrain, rarement cultivé, mais toujours peuplé d'une grande quantité de *lapins*. Voyez ce mot.

GARGOULETTE DU MOGOL : voyez à l'article **BOLS**.

GAROU : voyez **BOIS GENTIL**.

GAROUPE : voyez **CAMELÉE**.

GAROUTTE : voyez **LAUREOLE**.

GARROT : c'est le canard de mer que les Italiens appellent *Quattro-ochi* : (*clangula*) voyez à l'article **CANARD**.

GARSOTTE, c'est la *cercelle* ; voyez ce mot.

GARUM étoit, chez les Anciens, une espece de saumure fort délicate ; qu'ils faisoient avec les entrailles d'un petit poisson saxatile nommé *Garrus*. Cette saumure friande est encore autant en usage chez les Turcs, que le vinaigre parmi les Aubergistes à Constantinople, pour conserver plusieurs poissons, &c. Voyez aux mots **PICAREL**, & **ANCHOIS**.

Plusieurs personnes recommandent le *Garum* pour nettoyer les vieux ulcères, pour la morsure du chien enragé, & pour résister à la gangrene. On en

fomente les parties malades ; on en mêle aussi dans les lavemens pour l'hydropisie.

GAS. Nom donné à des exhalaisons plus ou moins visibles , & produites dans des souterrains profonds , comme les galeries des mines : quelquefois elles sortent de certains creux , grottes , ou fentes de la terre : il y en a qui sont accompagnées d'une odeur forte & suffocante. Le prétendu esprit des eaux minérales est une sorte de *Gas* : Vanhelmont donne aussi ce nom aux vapeurs invisibles & incoercibles qui s'élèvent des corps doux actuellement fermentans , du charbon embrasé , du soufre brûlant , &c. Aujourd'hui on donne aussi le nom de gas à toute espèce de vapeurs invisibles qui sont capables de détruire l'élasticité de l'air , qui altèrent la respiration des animaux au point même de les suffoquer quelquefois , qui éteignent la flamme , qui se décelent d'ailleurs par une odeur plus ou moins fétide , & souvent en irritant les yeux jusqu'à en arracher des larmes : toutes les vapeurs qui résultent des substances végétales & animales en combustion , celles des corps pourrissans & des latrines , sont encore des espèces de *Gas*. Voyez l'article EXHALAISONS.

GASCANEL, est un *Maquereau bâtard*. Voyez **MAQUEREAU**.

GAUDE ou **HERBE A JAUNIR**, *Luteola herba salicis folio*. On cultive cette plante avec soin en Espagne & en France pour la teinture. Elle croît naturellement dans presque toutes les Provinces du Royaume ; mais la gaude cultivée lui est bien supérieure pour la teinture.

La racine de cette plante est ligneuse , & pousse des tiges qui s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre pieds : elles sont garnies de feuilles longues , étroites , douces au toucher ; le haut des rameaux porte en Mai de longs épis de petites fleurs jaunes qui sont formées par des pétales de grandeur inégale ; le fruit est une capsule qui contient de petites semences sphériques , noirâtres , & mûrissent en Juin & en Juillet.

Cette plante , qui est le *Réseda foliis simplicibus lanceolatis integris* de Linnaeus , vient parfaitement bien dans les terrains propres au chanvre. Sa culture est la même que celle du chanvre. Voyez ce mot.

On sème la gaude en Mars ; & comme la graine de cette plante est extrêmement fine ; pour la semer plus également , il faut la mêler avec de la cendre. Dans le mois de Juillet ou d'Août , on arrache la gaude ; on la bat pour recueillir la graine , & on la met en botte ; la plante est alors d'un jaune verdâtre. Dans les pays chauds comme en Languedoc elle est souvent assez sèche lorsqu'on la recueille ; mais dans les pays tempérés , comme la Normandie , la Picardie , &c. il est essentiel de la faire sécher exactement. Il faut encore observer de ne la point couper qu'elle ne soit mûre , & d'empêcher qu'elle ne se mouille quand elle est cueillie : en la cueillant il faut la couper à fleur de terre.

Les Teinturiers regardent la gaude la plus menue & la plus rouffette comme la meilleure ; ils la font bouillir , pour teindre les laines & les étoffes en couleur jaunée & en couleur verte ; savoir , les blanches en jaune d'un

bon teint , & en verd les étoffes qui ont été préalablement mises au bleu. Suivant les réglemens de France , les céladons , verd de pomme , verd de mer , verd naissant & verd gai , doivent être *alunés* , ensuite *gaudés* & puis passés sur la cuve d'inde. Voyez INDE & INDIGO. La gaude est estimée en médecine pour résister au venin. Sa racine est apéritive prise en décoction : on l'applique aux bras des fébricitans pendant le paroxysme , pour chasser la fièvre.

GAUDRON ou GOUDRAN. Voyez à l'article PIN.

GAYAC ou BOIS SAINT , *gayacum* , aut *guajacum* , seu *lignum sanctum*. Arbre qui donne un bois très compacte & très dur , & qui croît naturellement à la Jamaïque , dans presque toutes les Isles des Antilles , & généralement dans la partie de l'Amérique qui est située sous la Zone Torride. Il y a deux especes de gayac ; l'un à *fleurs bleues* , l'autre à *fleurs blanches dentelées*. La premiere espece de gayac devient un arbre très grand , lorsqu'il est dans un bon terrain. Le tronc de cet arbre a peu d'aubier , qui est pâle ; le cœur est de couleur verte d'olive , foncée & brune : son bois est très solide , huileux , pesant , d'une odeur qui n'est pas désagréable , d'un goût amer & un peu âcre. Ses branches ont beaucoup de nœuds , ainsi que les petits rameaux qui en portent. Ses feuilles sont compactes , d'un verd pâle , & ont en dessous cinq petites nervures : elles n'ont point de queue , si ce n'est la côte commune , sur laquelle elles sont arrangées. Ses fleurs bleues sont en rose : il leur succede un fruit charnu , de la grandeur de l'ongle , qui a la figure d'un cœur , un peu creusé en maniere de cuiller , & qui est de couleur de vermillon. Ce fruit contient une seule graine de la forme d'une olive.

L'arbre du gayac à fleurs blanches croît moins haut que le précédent ; son bois est aussi solide , mais de couleur de buis. Les fruits de cet arbre sont quadrangulaires , comme ceux de notre fusain , & de couleur de cire. Cette seconde espece de gayac est très fréquente dans l'Isle Saint Domingue aux environs du Port de paix.

Le gayac à fleurs bleues & le gayac à fleurs blanches , fleurissent au mois d'Avril , & donnent des fruits murs au mois de Juin. On ne peut les élever que dans nos serres ; encore faut-il que la graine ait été semée dans leur pays natal , & qu'on transporte ici le jeune plant. Le gayac ne croît qu'avec une extrême lenteur , même dans son pays natal : il ne donne point de résine dans nos climats. Ses racines sont jaunes & sortent beaucoup hors de terre.

Le gayac a été connu en Europe à-peu-près dans le même tems que la maladie vénérienne , par les secours que l'on en tira contre cette maladie , avant que l'on eût trouvé le secret de la traiter plus efficacement par le mercure. On assure que dans l'Amérique Méridionale , le gayac est un spécifique aussi éprouvé contre la vérole , que le mercure l'est dans nos climats. Nous ne nous servons de la décoction du bois ou de l'écorce de gayac rapé , que dans le traitement des maladies vénériennes légères , qui sont censées

n'avoir point infecté la masse entière des humeurs , ou du moins n'y avoir répandu qu'une petite quantité de virus qui peut être évacué par les couloirs de la peau : alors ce remède est un sudorifique très actif : il convient aussi dans les traitemens de diverses maladies chroniques , comme dartres , tumeurs froides , œdèmes , fleurs blanches , rhumatisme , vieux ulcères humides & sanieus.

Le bois de gayac est très résineux , & contient une petite quantité d'extrait proprement dit , que l'on peut retirer par décoction ; ce qui rend ce bois un excellent sudorifique. L'extrait qu'il donne est en petite quantité , en comparaison de la résine qu'il contient ; car à l'aide de l'esprit-de-vin , on peut retirer deux onces de résine par livre ; au lieu qu'il ne donne qu'un ou deux gros d'extrait.

La résine que l'on retire ainsi par le moyen de l'esprit-de-vin , est toute semblable à celle qui découle naturellement ou par incision de cet arbre dans le pays , & que l'on nomme improprement , *gomme de gayac*. Cette résine doit être luisante , transparente , brune en dehors , blanchâtre en dedans ; tantôt roussâtre , tantôt verdâtre ; d'une odeur agréable quand on la brûle , d'un goût âcre : elle excite puissamment la transpiration insensible , & est très utile dans les maladies de la peau.

Le bois de gayac réduit en copeau & distillé à feu nud , donne beaucoup d'air , qui briseroit le recipient , si l'on n'avoit soin de lui donner issue ; par cette opération on obtient une huile empyreumatique devenue fameuse , comme étant une des premières qu'on ait enflammées par le moyen de l'esprit de nitre. Cette huile qui est aussi fort âcre est recherchée pour faciliter l'exfoliation des os cariés. *Voyez* l'analyse du gayac dans le *Dictionnaire de Chimie*.

GAZELLE , ANTILOPE OU ANIMAL DU MUSC , en latin *gazella*. C'est un joli quadrupède à pied fourchu , d'une taille fine , bien prise , & des plus légers à la course. Il se trouve communément en Afrique & aux Indes Orientales. Il y en a de plusieurs espèces qui ont des différences entr'elles. Il y a des gazelles d'Afrique qui approchent du chevreuil pour la taille & pour la figure . Ces gazelles ont les oreilles grandes & pelées en dedans , où la peau est noire & polie comme de l'ébène. Leurs cornes sont noires , cannelées en travers , creuses jusqu'à la moitié de leur longueur ; elles se rapprochent , par le bout , comme les branches d'une lyre. Les cornes des femelles sont rondes ; mais un peu applaties dans les mâles , & plus recourbées en arrière. On remarque à l'origine de ces cornes une touffe de poil plus long que celui du reste du corps , qui est court & de couleur fauve. Les Arabes donnent à ces animaux le nom de *chevre*.

Les gazelles ruminent : elles n'ont point de dents incisives à la mâchoire supérieure : elles n'ont que deux mamelles. En général ces animaux ont les yeux noirs , grands , très vifs & en même-tems si tendres , que les Orientaux en ont fait un proverbe , en comparant les beaux yeux d'une femme à ceux de la gazelle. Les jambes de devant de cet animal sont moins longues que

celles de derriere, ce qui lui donne comme au lièvre, plus de facilité pour courir en montant qu'en descendant. La plupart sont fauves sur le dos, blanches sous le ventre avec une bande brune, qui sépare ces deux couleurs au bas des flancs; leur queue est plus ou moins grande & toujours garnie de poils assez longs & noirâtres. On va à la chasse de ces animaux avec une gazelle mâle & apprivoisée, qu'on mene dans les lieux où il y a des gazelles sauvages; on lui entrelasse dans les cornes, une corde lâche dont les bouts sont attachés sous le ventre; aussi-tôt que cet animal approche d'un troupeau de gazelles, le mâle s'avance pour faire face à ce rival, il présente ses cornes pour l'attaquer tête contre tête, mais dans les divers mouvemens qu'il fait il ne manque pas de prendre ses cornes dans les cordes, dont la tête de son rival est garnie; le Chasseur arrive à l'instant & s'en fait sans peine. On prend à-peu-près de même les gazelles femelles.

On voit au Sénégal & sur la Gambra de grands troupeaux de gazelles. Ce sont, dit Bosman, les plus charmantes créatures du monde: elles ne sont gueres plus grandes qu'un lapin; leurs jambes sont de la grosseur d'un tuyau de pipe; leurs cornes sont aussi très petites, & d'un noir luisant: elles sont si légères, qu'elles paroissent voltiger au milieu des buissons; cependant les Negres en prennent quelquefois pour en manger la chair qu'ils trouvent assez bonne. Ces animaux qui ne sont que des chevrotins sont trop délicats pour pouvoir être transportés dans ce pays-ci: lorsqu'on veut les faire venir, on les couvre avec du coton; mais ordinairement à peine ont-ils passé la ligne qu'ils meurent; on dit cependant qu'il y en a eu deux vivans au Palais Royal à Paris, il y a quelques années. Voyez CHEVROTIN.

La gazelle des Indes, celle qui donne le bézoard, est de la grandeur de la chevre domestique, ou, suivant d'autres Auteurs, de la grandeur du cerf: son poil est court, & d'un gris mêlé de roux: elle a une barbe sous le menton comme notre chevre: ses cornes sont rondes, assez longues, droites, comme garnies d'anneaux presque du haut en bas, excepté le bout qui est lisse. Les femelles ont les cornes beaucoup plus courtes que les mâles. On trouve ces gazelles dans la Province de Laar, en Perse. Quant à la nature des bézoards que l'on retire de ces animaux, voyez BÉZOARD.

L'animal qui donne le *musc*, & qui a été regardé par plusieurs personnes comme une *gazelle*, a des caracteres qui lui sont particuliers. Cet animal a le poil rude & long, le museau pointu & des défenses à-peu-près comme le cochon, mais ce qui le distingue de tous ces animaux, c'est une espece de petite bourse placée près du nombril, & qui contient la substance appelée *musc*. Cette bourse a près de trois pouces de long & deux pouces de largeur, & s'élève au-dessus du ventre d'environ un pouce: elle est garnie de poils extérieurement, & intérieurement d'une pellicule qui renferme le musc, & qui est garnie de glandes, qui, selon les apparences, servent à faire la sécrétion: chaque vessie pèse depuis deux gros jusqu'à quatre gros.

Le meilleur musc est celui que donnent les mâles, car les femelles ont aussi une poche semblable près du nombril, mais l'humeur qui s'y filtre n'a

pas la même odeur ; il paroît de plus que cette tumeur du mâle ne se remplit de musc que dans le tems du rût ; dans les autres tems la quantité de cette humeur est moindre & l'odeur en est beaucoup plus foible. Le musc le plus pur & le plus estimé par les Chinois est celui que l'animal laisse couler sous une forme grainelée & onctueuse sur les pierres ou les troncs d'arbres contre lesquels il se frotte , lorsque cette matiere devient irritante ou trop abondante dans la bourse où elle se forme. Le musc qui se trouve dans la poche même , est rarement aussi bon , parcequ'il n'est pas encore mûr , ou bien parceque ce n'est que dans la saison du rût qu'il acquiert toute sa force & toute son odeur , & que dans cette même saison l'animal cherche à se débarrasser de cette matiere trop exaltée qui lui cause alors des picotemens & des démangeaisons.

Le musc nous vient des Indes Orientales , & principalement du Tonkin : on le trouve , dans le commerce ou séparé de son enveloppe , ou renfermé dedans. Cette drogue est sujette à être falsifiée par les Indiens. Celle qui est sans enveloppe , doit être sèche , d'une odeur très forte , d'une couleur tannée , d'un goût amer ; étant mise sur le feu , elle doit se consumer entièrement si elle n'est point falsifiée avec de la terre.

L'enveloppe qui contient le musc , doit être couverte d'un poil brun ; c'est la peau de l'animal même. Lorsque le poil est blanc , il indique que c'est du musc de Bengale , qui est inférieur en qualité à celui de Tonkin. Lorsque les Chasseurs ne trouvent pas cette vessie bien pleine , ils pressent le ventre de l'animal pour en tirer du sang dont ils la remplissent : les Marchands du pays y mêlent ensuite des matieres propres à en augmenter le poids. Les Orientaux savent distinguer cette falsification par le poids sans ouvrir la vessie , car l'expérience leur a fait connoître , combien doit peser une vessie non altérée ; ils en jugent ensuite au goût , & leur dernière épreuve est de prendre un fil trempé dans du suc d'ail & de le faire passer au travers de la vessie avec une aiguille ; si l'odeur d'ail se perd , le musc est bon ; si le fil la conserve , il est altéré.

Le musc est un parfum extrêmement fort , mais peu agréable s'il n'est tempéré par un mélange d'autres parfums , ou de poudre de sucre & d'un peu d'ambre. Sa couleur est rousâtre : il est d'un goût amer. Les Parfumeurs , les Distillateurs & les Confiseurs s'en servoient beaucoup plus autrefois qu'à présent. En médecine , on emploie le musc pour fortifier le cœur & le cerveau , pour rétablir les forces abbatues : on l'estime aussi alexipharmaque & prolifique. La dose en est depuis demi-grain jusqu'à quatre grains.

GAZON , *cespes* , est une motte , plus ou moins considérable , de terre fraîche , molle , garnie d'une herbe courte & rouffue. Le gazon est un des objets de la campagne le plus agréable aux yeux : c'est aussi l'un des plus grands ornemens des parterres & des jardins de propriété. Il naît de lui-même dans un terrain favorable , ou bien il vient par culture qui se fait de graine ou de placage. Parlons de ces deux manieres de culture.

On fait que le beau gazon vient des graines de bas pré, & que la graine qui vient d'Angleterre est la plus estimée, parcequ'elle provient d'herbes fines & peu mêlées. Le petit trefle de Hollande, l'herbe à chat & autres petites herbes fines, sont, après la graine de bas pré, les plus propres à former un beau gazon. Le trefle, le fain-foin, la luzerne, servent aussi à avoir du gazon ordinaire. Avant de semer les graines à gazon; on doit ôter toutes les mottes & pierres, labourer le terrain avec un fer de bêche, le niveller, passer la terre au rateau fin, & répandre uniment sur la surface un ou deux pouces de bonne terre ou terreau, pour faciliter encore mieux la levée du gazon; ensuite on sème la graine fort dru en automne, par un tems couvert & calme, & on la recouvre avec le rateau. Heureux quand après la semailson, la pluie vient à tomber, parcequ'elle épargne la peine des arrosements, de plus elle plombe la terre, & fait lever la graine beaucoup plutôt; aussi choisit-on pour semer le gazon, les mois de Mars & de Septembre, avant & après les grandes chaleurs de l'été. On doit faucher le gazon quatre fois l'année, & même plus, & le tondre de près, afin que l'herbe soit toujours épaisse, raze, pure, & d'un beau verd; il faut aussi avoir soin d'y semer tous les ans de bonnes graines, pour le renouveler, le raffraîchir & l'épaissir, sur-tout dans les endroits où il est trop clair. Il faut en outre l'arroser dans les tems de sécheresse, le battre quand il s'élève trop, & faire passer dessus un rouleau de pierre ou de bois, afin d'affaîsser l'herbe & d'empêcher qu'un brin ne passe l'autre.

L'autre maniere de gazonner est plus couteuse, à la vérité, mais beaucoup plus agréable, & elle peut être mise en pratique avec un succès tout-à-fait surprenant. Voici en quoi consiste cet art de faire le *gazon plaqué*.

On choisit pour cela, dans certains endroits de la campagne, comme sont les bords des chemins & les pâturages, les plus belles pelouses de gazon le plus fin & le plus raz: on le leve à la bêche, en le coupant par quarrés, de deux à trois pouces d'épaisseur, d'un pied & demi de longueur, sur un pied de largeur, & on enleve la même épaisseur de terre sur le terrain où on veut les mettre: on arrange au cordeau ces quarrés, en les ferrant l'un contre l'autre; ensuite des Plaqueurs applatissent uniment le placage avec des battes, & on l'arrose amplement.

Tous ces moyens font que le gazon s'attache inébranlablement à la nouvelle terre, s'incorpore avec elle, y jette ses racines de toutes parts, & s'en nourrit. Il ne s'agit plus, pour la conservation d'un tel gazon, que de le tondre, le rouler, & l'entretenir avec soin & intelligence. C'est ainsi que les Anglois gazonnent non-seulement des bordures, des rampes, des talus, des glacis, mais des boulingrins, des parterres, des allées, des promenades entières: c'est un spectacle enchanteur que ces beaux tapis raz & unis de verdure qu'on voit dans toutes leurs campagnes.

GAZON D'OLYMPE ou DE MONTAGNE. Voyez STATICE.

GEAI, *Gracculus*. Est un bel oiseau, fort connu dans tous les pays, & qui est du genre des pies: on en distingue de plusieurs especes.

Le geai diffère de la pie, en ce qu'il est plus petit, & par la diversité de son plumage : des taches bleues traversent ses aîles. L'ouverture de son gosier est si ample, qu'il avale des glands tout entiers, ce qui l'a fait appeller *Pica glandaria* : c'est la nourriture qu'il prend l'automne & l'hiver, car il en fait provision; le printems & l'été il va chercher les pois verts, les groseilles, les fruits de la ronce & les cerises qu'il aime beaucoup. Cet oiseau a le bec noir, fort & robuste, long de deux doigts; les yeux bleus. Le champ de son plumage est diversifié : il a le derriere de la tête composé de roux & couleur de perse; le dos plus pâle & tirant sur le cendré; les plumes proche du croupion sont blanchâtres; & sa queue riquettée de blanc, & beaucoup plus courte que celle de la pie : il a la poitrine & le ventre d'un cendré pâle, ainsi que les pieds & les doigts; les ongles sont noirs & un peu crochus.

Le geai mâle est un peu plus gros que la femelle : les plumes de sa tête sont plus noires, & celles de ses aîles sont d'un plus beau bleu. On dit que cet oiseau est sujet au mal caduc. Elevé en cage, il apprend à parler, à siffler; il contrefait plusieurs sortes d'oiseaux, & se rend fort familier, mais pour cela il le faut prendre niais. Sa femelle pond quatre ou cinq œufs cendrés avec des taches plus apparentes, & va faire son nid dans les chênes & autres arbres. Cet oiseau est aussi voleur que la pie : il se plaît à dérober, & à chercher les lieux les plus secrets pour cacher ce qu'il a pris.

Le geai d'Alsace ou de Strashourg se nourrit, dans le tems de la moisson, de grains & d'insectes qui se trouvent dans les champs : ses couleurs sont si vives & si agréables, qu'elles lui ont mérité le nom de *cornille bleue*, ou de *perroquet d'Allemagne*. Après la moisson, il nourrit ses petits de fruits d'arbres sauvages, & de différentes sortes d'insectes.

Le geai de Bengale est plus grand que le geai commun : le dessus de sa tête est tout bleu, ainsi que le dessous de son ventre & de ses cuisses; le dos & le croupion sont d'un verd obscur; la queue est noire & bleue, les pieds fauves & les ongles noirs.

Le geai de Bohême est un oiseau de passage, qui aime beaucoup le raisin, & qui fréquente les lieux limitrophes de la Bohême. Il y en a aussi beaucoup en Italie, où on en voit par centaines voler ensemble autour de Plaïfance & de Modène. Klein croit que c'est une espèce de grive. Il est de la grandeur d'un merle. Sa tête est ornée d'une huppe fauve qui se renverse en arriere : ses yeux sont d'un beau rouge & environnés de noir. Cet oiseau est friand de raisin.

Le geai du Cap de Bonne-Espérance a le bec long & rouge; d'ailleurs il ressemble au geai de l'Europe : il aime beaucoup les amandes sauvages; il apprend facilement à parler. On le trouve perché sur le haut des rochers ou dans les arbres de haute futaie.

Le geai de montagne est le *casse-noisette*. Voyez ce mot.

On donne aussi le nom de geai à *pieds plats* au petit corbeau d'eau, espèce de plongeon. Voyez PETIT CORMORAN.

GEANT. On entend par ce mot un homme d'une grandeur excessive.

La

La question de l'existence des géants a été souvent agitée : toute l'Antiquité fait mention de plusieurs hommes d'une taille démesurée, qui ont paru en divers tems ; & tous les Ecrivains, tant sacrés que profanes, même les Navigateurs, s'accordent à en dire des choses étonnantes. Des Modernes, pour donner du poids à cette opinion, rapportent des découvertes de squelettes ou d'ossements si monstrueux, qu'il a fallu que les hommes auxquels ils ont appartenu, aient été de vrais colosses. Cependant quand on vient à examiner de près tous ces témoignages, à prendre dans leur signification la plus naturelle les paroles du texte sacré, à réduire les exagérations orientales ou poétiques à un sens raisonnable, à peser le mérite des Auteurs, à ramener les Voyageurs d'un certain ordre aux choses qu'ils ont vues eux-mêmes ou apprises de témoins non suspects, à considérer les prétendus ossements de squelettes humains, à apprécier l'autorité des Navigateurs dont il s'agit ici, & à suivre la sage analogie de la Nature, le problème en question ne paroît plus si difficile à résoudre. M. le Chevalier de Jaucourt a discuté tous ces faits dans l'Encyclopédie : il fait voir que ces sortes de narrations sont pleines de contradictions & d'anachronismes ; en un mot, qu'elles se trouvent détruites par les seules circonstances dont les Auteurs les ont accompagnées. Plusieurs nous disent que d'abord qu'on s'est approché des cadavres de ces géants, ils sont tombés en poussière ; & ils le devoient, pour prévenir la curiosité de ceux qui auroient voulu s'en éclaircir : ailleurs on voit que la simplicité d'un Auteur a pris pour vrai un conte forgé dans un siècle d'ignorance : ici c'est un défaut de traduction ou d'interprétation qui rend un mot par un autre, dont le sens n'est pas le même, &c.

Pour ce qui regarde les découvertes de dents, de vertèbres, de côtes, de fémurs, d'omoplates, qu'on donne, attendu leur grandeur & leur grosseur, pour des os de géants, que tant de Villes conservent encore, & montrent comme tels, les Naturalistes ont prouvé que c'étoient de véritables ossements d'éléphant, de vraies parties de squelettes d'animaux terrestres, ou de veaux marins, de baleines, & d'autres animaux cétacées, enterrés par hasard & par accident dans les différents lieux de la terre où on les trouve. Ces os, par exemple, qu'on montroit à Paris en 1613, & qui furent ensuite promenés en Flandre & en Angleterre, comme s'ils eussent été de Teutolochus dont parle l'Histoire Romaine, se trouverent des os d'éléphants. Cette fourberie n'est pas nouvelle : Suétone remarque dans la Vie d'Auguste, que dès ce tems-là l'on avoit imaginé de faire passer des ossements de grands animaux terrestres pour des os de géants ou des reliques de Héros. Tout concouroit à tromper le peuple à ces deux égards. Il est donc contre toute vraisemblance qu'il existe dans le Monde une race d'hommes composée de géants : ceux qui, comme les Paragons (habitans du Chily vers les terres Magellaniques), ont une taille gigantesque, n'excèdent point six pieds & demi de hauteur. Ainsi les géants, de même que les nains, doivent être regardés comme des variétés très rares, individuelles & accidentelles. Au reste, le Lecteur peut consulter l'excellente *Giganthologie physique* du Chevalier Hans-Sloane,

insérée dans les *Transactions philosophiques*, n^o. 404 ; ainsi que la récente & futile *Giganthologie* (1756) du P. Joseph Tarrubia, Espagnol.

GEHUPH. C'est un arbre très estimé dans l'Inde : son écorce est jaune, safranée ; ses branches sont courtes, ses feuilles petites ; son fruit est rond & gros comme une balle de jeu de paume : les Indiens de l'Isle de Sumatra appellent ce fruit *Pêche de Trapobana*. Il contient une noix, dont le dedans est fort amer, & a le goût de la racine d'angélique : on en tire de l'huile qui a de grands usages dans le pays ; elle apaise la soif, guérit les maladies d'obstruction, &c. Il découle encore de cet arbre une gomme qui a les mêmes propriétés que l'huile.

GEKKO. C'est le *Cordyle*. Voyez ce mot.

GELÉE, se dit du froid qui congèle l'huile grasse, qui convertit naturellement l'eau & les liqueurs aqueuses en glace, dans un certain canton, ou dans toute une région déterminée. La gelée est opposée au *dégel*. Voyez ce mot. On sait que la gelée a un rapport marqué à la température de l'air & à la constitution de l'atmosphère, c'est-à-dire, que l'eau se gele par-tout au même degré de froid, & qu'elle ne se convertit naturellement en glace, que quand la température du milieu quelconque qui l'environne, est parvenue à ce degré. On a observé que lorsqu'il gele très fortement, le soleil paroît un peu pâle, l'évaporation des liquides est considérable, l'air est médiocrement agité ; cependant il est moins serein que dans certains jours d'hiver, où l'on n'a que des gelées médiocres. Les effets de la gelée sur les végétaux méritent une attention particulière : plus leurs racines abondent en sève, & mieux ils résistent au froid. Une forte gelée ne produit jamais de plus funestes effets sur les plantes & sur les arbres, que quand elle succede tout-à-coup à un dégel, à de longues pluies, à une fonte de neiges. Voyez les articles ARBRE & PLANTE. Les fruits se durcissent par la gelée : dans cet état ils perdent ordinairement tout leur goût ; & lorsque le dégel arrive, on les voit le plus souvent tomber en pourriture. On observe quelque chose de semblable sur les animaux qui habitent les pays froids : il n'est pas rare d'y voir des gens qui ont perdu le nez ou les oreilles, pour avoir été exposés à une forte gelée. Voyez les autres effets de la gelée sur le corps humain, & en général dans l'économie animale, à l'article FROID. Il ne gele jamais sous la Zone torride, ni aux extrémités des Zones tempérées voisines des Tropiques ; mais dans les Zones glaciales la gelée dure pendant presque toute l'année. Les Zones tempérées ont des vicissitudes de gelées & de dégels presque régulières. Dans la Nature, dit à ce sujet M. de Mairan, tout tend à une espèce d'équilibre & d'uniformité, & on ne peut douter que l'inconstance même n'y ait ses loix. Voyez l'article GLACE.

GELÉE BLANCHE, *Pruina autumnalis*. C'est une espèce de rosée qui tombe le matin vers la fin de l'automne, dans le commencement & à la fin de l'hiver, & quelquefois même dans le printemps, & qui a la propriété de s'attacher étroitement aux feuilles des végétaux ou à d'autres corps, & de s'y congeler. Les Physiciens expliquent d'une manière différente la formation

de cette gelée blanche contre les vitres des édifices. *Voyez leurs ouvrages sur cette matière, & les mots GIVRE & FRIMAT de ce Dictionnaire.*

GELÉE DE MER. *Voyez* ORTIES ERRANTES.

GELÉE MINÉRALE. Nous donnons ce nom à une espèce de *guhr* rougeâtre, brillant, très tendre, ou comme gélatineux, que l'on trouve adossé sur les parois des puits de mines, ou près des bures métalliques. On en rencontre assez souvent dans les mines de plomb, de cuivre, mais notamment dans celles d'or & d'argent. La *gelée minérale* analysée, paroît différer peu de la *Pierre écumante*, qui est une espèce de *xéolite*. *Voyez* ces mots.

GELINE, *Gallina junior*. C'est une jeune poule engraisée dans une basse-cour : on l'appelle aussi *Gélinote*. *Voyez* le mot POULE à l'article COQ.

GÉLINOTE DES BOIS, *Gallina rustica*. Cet oiseau, très estimé des premiers Romains, est moins gros que le francolin. Il a les jambes à moitié garnies de plumes, & les pieds faits comme ceux de la perdrix grise : les plumes du dos sont comme celles de la bécasse ; celles du ventre & de l'estomac sont noires, tiquetées de blanc ; celles du col sont semblables à celles de la faisande. Sa tête & son bec sont de même que ceux de la perdrix : les grosses plumes des ailes sont mardées comme celles du hibou ; c'est ce qu'on appelle, en terme de Fauconnerie, *Pennage chathuanné*. Belon dit très bien, que ceux qui s'imagineront voir une perdrix métive, qui tiendrait le milieu entre la perdrix rouge & la grise, & qui auroit quelque chose des plumes du faisan, pourront se figurer la gélinote de bois.

Cet oiseau fréquente les lieux où il y a beaucoup de coudriers & d'épines. On en voit en hiver, dans la Lorraine, dans la forêt des Ardennes, dans les montagnes du Forez & du Dauphiné, au pied des Alpes. Il y a dans la mer de Gênes, une île nommée l'*Île des Gélinotes*, parcequ'on y en trouve une grande quantité. Les gélinotes sont deux petits, l'un mâle & l'autre femelle. Quand ces petits sont un peu grands & élevés, le père & la mère les mènent hors de leur pays, & les abandonnent. On les prend, en Mars & en automne, avec un appeau, qui sert à contrefaire leur chant, & on leur tend des filets, des lacets ou des colets. Leur chair, qui devient blanche par la cuisson, est plus délicate & plus saine que celle de la perdrix. La rareté de cet oiseau fait aussi qu'il est très recherché. On a fait, par ordre de Louis XIV, des essais pour multiplier les gélinotes dans ce pays-ci, comme les faisans ; mais on n'a pu y réussir. Les gélinotes du Nord & du Mexique sont différentes des nôtres, & sont ou des faisans, ou des canards, ou des poules.

GEMARS. *Voyez* JUMART ; *voyez* aussi les articles ANE & MULET.

GENEPI. *Voyez* ABSINTHE.

GÉNÉRATION, *Generatio*. La génération des corps en général, est un mystère dont la Nature s'est réservé le secret. Par *génération*, nous entendons la faculté de se reproduire qui est attachée aux êtres organisés, qui leur est affectée, & qui est par conséquent un des principaux caractères par lequel les animaux & les végétaux sont distingués des corps appelés *minéraux* :

c'est donc par le moyen de la génération que se forme la chaîne d'existences successives d'individus, qui constitue l'existence non interrompue des différentes espèces d'êtres.

Les opérations mécaniques qui disposent & servent à la reproduction des végétaux & des animaux, sont de différente espèce, par rapport à ces deux genres d'êtres, & à chacun d'eux en particulier. Généralement les animaux ont deux sortes d'organisations, essentiellement distinctes, destinées à l'ouvrage dont il est question. Cette organisation constitue ce qu'on appelle les *sexes* : c'est par l'union des deux sexes que les animaux se multiplient le plus communément ; au lieu qu'il n'y a aucune sorte d'accouplement sensible des individus générateurs, dans le genre végétal. Voyez les mots PLANTE, ARBRE, BOTANIQUE. Nous venons de dire que l'union des sexes, dans les animaux, est le moyen le plus commun par lequel se fait la multiplication des individus ; ce qui suppose qu'il n'est par conséquent pas l'unique. En effet, il y a des animaux qui se reproduisent comme les plantes & de la même manière. Voyez à l'article ANIMAL.

La génération de l'homme, entre tous les animaux, étant celle qui nous intéresse le plus, est par conséquent celle qui doit nous servir d'exemple ; & c'est un objet dont nous rendrons compte à l'article HOMME, d'autant plus que ce qui peut être dit sur ce sujet par rapport à l'espèce humaine, convient presque entièrement à toutes les autres espèces d'animaux, pour la reproduction desquels il est nécessaire que se fasse le concours de deux individus, c'est-à-dire, qu'un mâle & une femelle exercent ensemble la faculté qu'ils ont d'en produire un troisième, qui a constamment l'un ou l'autre des deux sexes. Le Lecteur doit présumer qu'en traitant une matière si difficile & si délicate, on s'est borné à faire un exposé simple des moyens extérieurs que la Nature a voulu employer pour préparer ce travail secret. Au reste, on peut consulter la *Vénus physique* de Maupertuis ; les Observations d'Harvey, de Wallisnieri & de Malpighi, sur les *premiers faits de la génération* ; l'*Histoire Naturelle générale & particulière* de M. de Buffon ; la *Physiologie* de M. Senac ; l'*Anatomie* d'Heister ; l'ouvrage intitulé, *Idée de l'homme physique & moral* ; les *Institutions médicales* de Boërhaave, avec leur Commentaire & les Notes savantes de M. Haller : voyez encore le *Recueil* d'une bonne partie des *systèmes sur la génération*, & de ce qui y a rapport, dans la *Bibliothèque anatomique de Manget* : Enfin, les Œuvres fort détaillées de Schurigius, sur le même sujet. Voyez aussi l'article ANIMALCULES de ce Dictionnaire.

GENESTROLE ou HERBE AUX TEINTURES, *Genista tinctoria*. Le port de cette plante herbeuse est le même que celui du genêt, dont elle est la plus petite espèce. La genestrole devient beaucoup moins haute : ses feuilles, ses fleurs & ses gousses sont aussi plus petites.

Cette plante croît naturellement & sans culture, ce qui la fait nommer aussi *Herbe de pâturage*. Elle a l'odeur fétide du sureau. Les Teinturiers en font usage pour teindre en jaune les choses de peu de conséquence, c'est pourquoi on l'a appelée le *Genêt des Teinturiers*. On ne peut conserver cette

herbe, que lorsqu'elle a été cueillie dans son état de maturité. On peut s'en servir dans son état de verdure.

GENÊT, *Genista*. Il y a plusieurs especes de genêts, dont quelques-uns sont remarquables par leur usage, par l'admirable odeur de leurs fleurs, ou par quelqu'autre propriété.

Les fleurs de genêts sont légumineuses, de couleur jaune; il leur succede des siliques longues & applaties, où l'on trouve plusieurs semences qui ont la forme de reins. Les branches de genêts sont vertes, flexibles, & peu garnies de feuilles, qui sont posées alternativement. Leurs racines sont profondes.

Le GENÊT COMMUN, *Genista vulgaris*. Cet arbrisseau, qui s'élève quelquefois à la hauteur d'un homme, croît par-tout, en Italie, en Espagne, en Portugal & en France : on le cultive aux environs de Paris, parceque ses tiges flexibles sont d'un grand débit pour faire des balais. Quelques-uns ont l'art de tirer de ses fleurs une belle laque jaune, qui est recherchée des Peintres & des Enlumineurs.

On lit, dans le Journal Economique du mois de Novembre 1758, que cette plante est employée d'une maniere bien plus utile dans le territoire de Pise. On recueille dans ce pays cette espece de genêt : on le fait sécher au soleil, on le met rouir ensuite, pendant trois ou quatre jours, dans l'eau d'une source chaude, située dans le lieu appelé *Bagno ad aqua*, & dont la chaleur fait monter le thermometre de M. de Réaumur à huit degrés. Lorsque le genêt a été roui dans cette fontaine, on sépare la partie ligneuse d'avec les étoupes : la poudre cotonneuse qui tombe, sert à rembourrer les chaises, parcequ'elle a un peu d'élasticité : on file l'étoupe, qui donne un fil aussi beau que celui du chanvre, & qui prend bien la teinture. Ce travail paroît exiger des eaux naturellement chaudes. Dans le mois de Juin 1763, on a fait voir, à l'Académie Royale des Sciences, de la toile faite avec le genêt : cette toile a paru bonne, mais grossiere.

Le GENÊT CYTISE, *Cytiso Genista*. Cette plante differe du genêt & du cytise, en ce qu'elle a des feuilles seules, & d'autres qui sont trois ensemble.

Le GENÊT D'ESPAGNE, *Genista Juncea*, s'élève en un buisson de huit & même de douze à quatorze pieds de haut. Sa grandeur le distingue des autres genêts, ainsi que l'odeur suave de ses fleurs, qui sont aussi très agréables au goût.

Ce genêt croît naturellement en Italie, en Espagne, en Portugal, en Languedoc. Il a de particulier, que ses branches sont très remplies d'une moëlle fongueuse, & que ses feuilles ne sont point posées au nombre de trois sur une même queue, comme dans les autres genêts. Cet arbruste est un de ceux qui ont le plus de peine à reprendre, lorsqu'on les transplante. Déjà parvenu à une certaine grosseur, il produit tous les ans une grande quantité de fleurs, qui ont une qualité purgative. Ses graines ont une saveur de pois. Il résiste aux froids d'Angleterre, & y perfectionne sa graine. Consultez *Miller*.

Tous les genêts s'élevent aisément de semence , & ils peuvent se greffer les uns sur les autres ; par approche & en écusson ; c'est la seule façon de multiplier le genêt à fleurs doubles , qui ne porte point de graines , & qui fait un joli effet dans les bosquets printaniers. Les fleurs de toutes ces sortes de genêts , peuvent , ainsi que celles de la gènes-trole , fournir une teinture jaune.

On confit , au vinaigre , les boutons de genêt comme les câpres ; mais ils n'ont point un goût aussi relevé.

Le genêt est estimé apéritif. En faisant brûler de jeunes branches de genêt , sur une assiette , il en découle une huile caustique , bonne pour les dartres.

On dit que si l'on arrose les plantes dévorées par les chenilles , avec une eau dans laquelle on a mis du genêt ; cette eau fait périr les chenilles , sans faire aucun tort aux arbres. La lessive des cendres de genêt sur-tout de la gènes-trole , s'emploie , dans certains cas , contre l'hydropisie , avec beaucoup de succès. Les Médecins de Montpellier s'en servent beaucoup dans ce cas.

GENÊT ÉPINEUX , *Genista spinosa*. Le genêt épineux est connu aussi sous les noms de *Jonc marin* ou d'*Ajonc* ; il porte le nom de *Landes* en Bretagne , & le nom de *Brusque* en Provence. Cet arbrisseau est toujours verd , & donne des fleurs jaunes , légumineuses. Il diffère du genêt par ses épines , & par ses gousses , qui sont plus courtes. Les tiges de ce genêt sont garnies de petites feuilles ovales , & de longues épines vertes , d'où il en part d'autres plus petites , qui sont encore garnies de plus petites épines.

Le grand & le petit genêt épineux sont communs dans les montagnes & bruyères d'Angleterre , & l'on en voit de cultivés dans leurs jardins , qui y font une belle figure , & qui ne le cedent point aux meilleurs arbrisseaux toujours verts. On les tond comme l'if ; mais ils le surpassent à tous égards , car ils fleurissent dans toutes les saisons de l'année , & gardent long-tems toutes leurs fleurs. Quand ils sont bien taillés & soignés , ils forment des haies impénétrables. Leur culture est la même que celle du genêt d'Espagne : ils se plaisent dans une terre sèche & sablonneuse : on les multiplie de graine.

En Normandie , dans une partie du Poitou & en Bretagne , on en sème des champs entiers , parceque dans ces lieux , où les bois sont rares , on en fait des fagots pour chauffer les fours & cuire la chaux. En Provence on s'en sert à caréner les bâtimens de mer. On le sème avec de l'avoine & du blé de Mars , & l'on prétend que cet arbrisseau n'épuise point la terre. On fait usage de ce genêt , dans les pays où il croît naturellement , pour nourrir le bétail , quand les autres fourrages sont rares : pour cet effet on bat le genêt pour en rompre les épines , & les bestiaux le mangent très bien. En Bretagne , on le fait pourrir , & il en résulte d'excellens fumiers : ou bien on distribue ce genêt desséché , par poignée continue sur les champs ; on y met le

feu , & il en résulte une cendre saline qui produit de très bons effets dans le sol où l'on fait cette préparation , & qu'on mélange avec la terre au moyen des labours.

GENÊT DES TEINTURIERS. *Voyez* GENESTROLE.

GENET. On donne ce nom à une espèce de petit cheval , qui vient d'Espagne , & dont la taille est bien proportionnée. *Voyez* CHEVAL.

GENETTE. *Voyez* au mot CIVETTE.

GENEVRIER , *Juniperus*. Cet arbrisseau , qui , quelquefois s'élève à la hauteur d'un arbre , est connu de tout le monde , parcequ'il croît dans toute l'Europe , dans les pays Septentrionaux , & dans ceux du Midi , dans les forêts , dans les bruyères , & sur les montagnes. Il est sauvage ou cultivé , plus grand ou plus petit , stérile ou portant des fruits , domestique ou étranger.

Entre les espèces de genévriers que comptent nos Botanistes , il y en a deux générales & principales ; le *Genévrier commun en arbrisseau* , & le *Genévrier commun qui s'élève en arbre*.

Le GENEVRIER ARBRISSEAU , *Juniperus vulgaris fruticosa* , se trouve par-tout : son tronc s'élève quelquefois à la hauteur de cinq ou six pieds ; son écorce est rougeâtre ; son bois est tendre , léger ; lorsqu'il est bien sec , il est d'un rouge-clair , il donne une odeur agréable de résine. Les Ebénistes en font quantité de jolis ouvrages. Ses feuilles sont pointues , étroites , roides , piquantes , toujours vertes , placées le plus souvent , trois à trois , autour de chaque nœud : on reconnoît aisément cet arbrisseau à l'odeur de ses feuilles écrasées dans les doigts. Les fleurs mâles & les fleurs femelles viennent sur des individus différens ; on voit sur les uns de petits chatons au mois d'Avril & de Mai : les fleurs femelles , formées d'un calice sans étamines , s'observent sur d'autres pieds ; il leur succède des baies sphériques , contenant une pulpe huileuse , aromatique , d'un goût résineux. Ces baies portent le nom de *Genievre*. Cette espèce de genévrier peut réussir même dans les endroits les plus arides.

Les Allemands emploient fréquemment dans leur cuisine les baies de genievre comme un assaisonnement ; nous n'en faisons guère usage qu'à titre de médicament. Les vertus du genievre les plus évidentes , sont une qualité stomachique , carminative & diurétique ; il donne à l'urine une odeur de violette. Quelques-uns ont appelé l'extrait des baies de genievre , la *Thériaque des gens de la campagne* , à cause de sa vertu alexipharmaque. D'autres remplissent un petit baril de baies de genievre & de pruneaux , & ils prétendent que l'eau que l'on tire de cette espèce de rapé , est très propre à soulager les asthmatiques.

On peut faire , avec le genievre , une boisson très salutaire & très peu couteuse , c'est le vin de genievre ; on pourroit l'appeller le *Vin des pauvres* , & il pourroit être un bon médicament pour les riches. Il se fait avec six boisseaux de graines de genievre & trois ou quatre poignées d'absinthe : on laisse infuser & fermenter le tout durant un mois dans cent pintes d'eau ; on

tire ensuite la liqueur à clair ; ce vin est d'autant plus agréable qu'il est vieux. Cette liqueur , déjà connue sous le nom de *Genevrette* , seroit , je crois , bien meilleure , dit M. Duhamel , si l'on y ajoutoit de la mélasse , & si on la traitoit comme on fait l'épinette au Canada. Voyez EPINETTE ou SAPINETTE DU CANADA , & l'article SAPIN.

Le ratafia préparé par l'infusion des baies de genievre dans l'eau-de-vie , est un excellent cordial stomachique.

On brûle , dans les hôpitaux & dans les chambres des malades , le bois & les baies de genievre pour en chasser le mauvais air.

La décoction légère du bois de genievre se prend pour fortifier l'estomac : on l'emploie aussi comme celle du saffraas pour exciter les sueurs & purifier le sang ; quelquefois on y mêle de l'antimoine crud pour guérir les maladies vénériennes où il paroît des pustules ulcérées sur le visage.

Le GENÉVRIER EN ARBRE , *Juniperus vulgaris arbor* , aut *celsior* , differe de celui dont nous venons de parler , par sa hauteur , qui , au reste , varie beaucoup suivant les lieux où il croît. On dit qu'en Afrique il égale en hauteur les arbres les plus élevés : son bois , dur & compacte , est employé pour les bâtimens. On distingue cet arbre d'avec le cedre , non-seulement par son fruit , mais encore par ses feuilles , qui sont simples & plates , au lieu que les feuilles du cedre ressemblent davantage à celles du cyprès.

On cultive le grand genevrier dans les pays chauds , comme en Italie , en Espagne , en Afrique. Il en découle naturellement , ou par des incisions faites au tronc pendant la chaleur , une résine que l'on nomme le *Vernix* ou la *Sandaraque des Arabes*. Toutes les especes de genevriers ne donnent pas une résine aussi belle : la plus estimée est celle qui est en larmes claires , luisantes , diaphanes , blanches & nettes ; en la faisant dissoudre dans de bon esprit-de-vin , elle donne un vernis. Ce vernis est très blanc & brillant ; mais il est fort tendre & s'égratigne aisément. Pour lui donner plus de corps , on y mêle de la laque & un peu de gomme élemi : le vernis est alors plus solide , mais il perd une partie de sa blancheur. La sandaraque en poudre sert aussi à vernir le papier , à lui donner plus de consistance & à l'empêcher de boire , sur-tout dans les endroits où on a été obligé de gratter pour enlever l'écriture.

Il y a une espece de genévrier commun en Languedoc , qui porte des baies rougeâtres , & d'un goût peu savoureux : *Juniperus major, bacca rubescens*. On distille son bois dans la cornue , & on en retire une huile fétide , que les Maréchaux emploient pour la galle & les ulcères des chevaux. On la nomme *Huile de cade* ; *Cedraleum*. Cette sorte d'huile essentielle est usitée dans plusieurs de nos Provinces méridionales pour les maladies extérieures des bestiaux , & sur-tout dans la maladie éruptive des moutons , appelée *Petite vérole* ou *Picote*. Voyez CADE & CÉDRIA. Cette huile est véritablement caustique ; si l'on en touche l'intérieur d'une dent creuse , elle

elle cautérise le nerf & calme la douleur ; mais si l'on continue à l'appliquer , elle fait bientôt tomber la dent en pièces. Quelques-uns ont osé la donner intérieurement , contre la colique & les vers ; mais on ne peut avoir recours à ce remède sans témérité.

Le GENEVRIER D'ASIE A GROSSES BAIES , *Juniperus Asiatica latifolia* , *arborea* , *cerasi fructu* , n'est qu'une variété du genévrier précédent.

On cultive , avec succès , en Angleterre , les genévriers de Virginie & des Bermudes : ils s'élèvent jusqu'à vingt-cinq pieds de haut , & croissent fort vite , lorsque les quatre premières années sont passées , & qu'on en a pris bien soin. Ces arbres résistent au plus grand froid de ce climat. On les multiplie de graine qu'on retire de la Caroline. Le bois de ces espèces de genévriers tire sur le rouge , & abonde en résine d'une odeur exquise.

On honore communément le bois de genévrier , sur-tout celui des Bermudes , du nom de *Bois de cedre* , quoiqu'il y ait dans la Grande Bretagne d'autres bois de ce même nom , qui viennent d'arbres bien différens & originaires des Indes occidentales ; cependant c'est du bois de ces espèces de genévriers , qu'on fait en Angleterre des boiseries , des escaliers , des lambris , des commodes & autres meubles. La durée de ce bois l'emporte sur tous les autres , ce qu'il faut peut-être attribuer à l'extrême amertume de sa résine , qui le défend contre l'attaque des vers. On l'emploie en Amérique à la construction des vaisseaux marchands ; c'est dommage qu'il ne convienne pas à la bâtisse des vaisseaux de guerre , parcequ'il est si cassant , qu'il se fendrait au premier coup de canon.

GENICE ou GENISSÉ , *Juvenca*. Est la petite & jeune vache , qu'on appelle ainsi jusqu'à deux ou trois ans , ou jusqu'à ce qu'elle soit livrée au tau-reau : voyez son article au mot TAUREAU.

GENIEVRE : voyez GENÉVRIER.

GENIEVRE DOUX , est une espèce de *camarigine* : voyez ce mot.

GENIPANIER : voyez JANIPABA.

GENISTELE , *Genistella*. Plante qui diffère du genêt en ce que ses feuilles naissent l'une de l'autre , & sont comme articulées ensemble : voy. GENÊT.

GENS-ENG , ou GINS-ENG , ou GING-SENG. Les Naturalistes & les Botanistes n'ont point encore décidé , si le gens-eng & le ninzin sont deux plantes différentes ou une seule & la même : peu de Voyageurs qui ont été en Chine & au Canada , où ces plantes croissent , se trouvent d'accord entr'eux. M. Geofroi , dans sa Matière Médicale , Tome II , pag. 192 , dit que ces plantes sont de différent genre , & qu'elles ne se ressemblent que pour la figure & les vertus. Il dit aussi que les Médecins de l'Europe font peu d'usage de ces plantes ; & que la racine du gens-eng coûte beaucoup plus que celle du ninzin. Nous avons consulté tout ce qu'on a écrit à ce sujet , & nous présenterons au Lecteur l'extrait de ce qu'on lit dans les *Lettres édifiantes & curieuses* , Tome X , pag. 172 ; dans le petit *Ouvrage du P. Lafiteau* , adressé au Régent de France en 1718 ; & dans la *Thèse de Médecine de M. Vander-*

monde , soutenue dans les Ecoles de la Faculté de Paris en 1736. Nous joindrons donc , à la suite du gens-eng , la description du ninzin , afin que le Lecteur puisse les comparer & en porter son jugement. Nous y ajouterons la maniere d'en préparer les racines , les lieux où elles croissent , l'ordre & la méthode qu'observent ceux qui vont les ramasser.

Description du Gens-Eng.

Cette plante , que les Chinois nomment *Pet-Si* , & les Iroquois *Garen-toguen* (ces mots signifient dans les deux Langues *cuisse d'homme*) est connue en France depuis que les Ambassadeurs de Siam en apportèrent à Louis XIV. Le *gens-eng* a une racine de deux pouces de longueur , & à-peu près de la grosseur du petit doigt , un peu raboteuse , brillante , & comme demi transparente , le plus souvent partagée en deux branches , quelquefois , en un plus grand nombre , fibreuse vers la base , roussâtre en dehors & jaunâtre en dedans ; d'un goût légèrement âcre , un peu amer & aromatique ; d'une odeur d'aromate , qui n'est pas désagréable. Le collet de la racine est un tissu tortueux de nœuds où sont imprimés obliquement & alternativement , tantôt d'un côté & tantôt de l'autre , les vestiges des différentes tiges qu'elle a poussées chaque année. La tige du *gens-eng* est haute d'un pied : elle est unie , & d'un rouge noirâtre. Au sommet de la tige naissent trois ou quatre queues creusées en gouttière , & disposées en rayons , chargées chacune de cinq feuilles inégales & dentelées ; la côte qui partage chaque feuille , jette des nervures qui s'entrelacent. Du lieu où les feuilles prennent naissance , s'élève un pédicule simple , nud , d'environ cinq à six pouces de long , terminé par un bouquet de petites fleurs , dont le calice est très petit ; les pétales & les étamines sont au nombre de cinq ; le style de la fleur est surmonté d'un stygmate , & posé sur un embryon arrondi , qui en murissant devient une baie sphérique , cannelée , couronnée & partagée en trois ou quatre loges , qui contiennent chacune une semence aplatie & en forme de rein.

Si l'on en croit l'ouvrage Chinois intitulé , *Pen Sau Kam-Mou Li-Tchi-Sin* , les vertus de la racine du *gens-eng* sont admirables : les Asiatiques croient qu'elle est une panacée souveraine , & les Chinois y ont recours dans toutes leurs maladies , comme à la dernière ressource : leurs Médecins ont écrit des volumes entiers sur ce spécifique , qu'ils décorent du titre de *Simple spiritueux* , d'*Esprit pur de la terre* , & de *Recette d'immortalité*. Mais citons quelques-unes des propriétés de cette racine : point de diarrhée , de foiblesse d'estomac , de dérangement d'intestins , d'engourdissemens , de paralysie , de convulsions , qui ne cedent au *gens-eng* : cette racine , selon eux , est merveilleuse pour réparer , d'une maniere surprenante , les forces affoiblies , augmenter la respiration , ranimer les vieillards , & même les agonisans , retarder la mort , affermir la moëlle des os & tous les membres , enfin , pour réparer dans un instant la perte que procurent les plaisirs de l'a-

mour , & les inspirer aussi-tôt , pourvu qu'on mange & boive sobrement : cette restriction nous paroît assez judicieuse & être de tous les pays. Il est étonnant qu'on n'ait pas aussi ajouté à ce panégyrique du gens-eng la propriété de guérir les maladies vénériennes. Les Médecins Hollandois le recommandent dans les convulsions , la syncope , les vertiges , & pour fortifier la mémoire : mais il faut prendre garde d'en faire trop d'usage , car il allume le sang : c'est pourquoi on l'interdit aux jeunes gens & à ceux qui sont d'une constitution chaude : au reste la cherté & rareté de cette racine font qu'on en use peu.

Description du Ninzin.

Le ninzin differe du gens-eng en ce qu'il naît au Japon & dans la Corée , qu'il est plus épais , plus mol , creux en dedans , & beaucoup inférieur en propriétés.

Kämpfer dit que la plante du ninzin étant encore jeune , n'a qu'une petite racine simple , semblable à celle du panais , de trois pouces de long , de la grosseur du petit doigt , garnie de quelques fibres chevelues , charnue , blanchâtre , entrecoupée de petits anneaux , & partagée quelquefois en deux branches , d'où lui est venu le nom de *Nin-zin* , qui signifie plante , dont la racine a dans la terre la figure des cuisses d'un homme : cette racine a le goût du chervi & l'odeur du panais. Cette plante , devenue plus forte , est haute d'un pied ; sa racine est souvent double , bien nourrie : du collet de ses racines naissent des bourgeons qui par la suite deviennent des tiges , & des tubercules qui se changent en racines : la tige s'élève à la hauteur de deux pieds ou environ , & est presque grosse comme le petit doigt , cannelée , geniculée & pointillée tout au tour comme dans le roseau : de chacun de ses nœuds il sort des rameaux. Cette tige est solide dans sa base ; mais elle est creuse dans le reste ainsi que ses rameaux : les feuilles qui embrassent les nœuds sont légèrement cannelées & creusées en gouttière , fort semblables à celles de la berle & du chervi : dans le dernier accroissement de la plante , elles sont découpées en trois lobes. Les bouquets de fleurs qui terminent les rameaux , sont garnis à leur base de petites feuilles étroites & disposées en parasol. A chaque fleur succede un fruit qui , en tombant , se partage en deux graines cannelées , applaties d'un côté , nues , semblables à celles de l'anis , d'un roux foncé dans leur maturité , ayant le goût de la racine , avec une foible chaleur. Dans les aisselles des rameaux naissent des bourgeons arrondis , de la grosseur d'un pois , verdâtres , charnus , d'un goût fade & douceâtre , lesquels lorsqu'on les plante ou qu'ils tombent d'eux-mêmes sur la terre , produisent des plantes de leur genre.

Le ninzin est , après le gens-eng & le thé , la plus célèbre de toutes les plantes de l'Orient , à cause de sa racine qui a beaucoup d'utilité. La plante ninzin , qu'on a apportée de Corée dans le Japon , & que l'on cultive dans les jardins de la ville de Meaco , y vient mieux que dans sa propre patrie , mais elle est presque sans vertu : il en est à-peu-près de même du gens-eng.

Le ninzin qui naît dans les montagnes de Kataja (dans la Province de Siam-fai) & dans celles de Corée , où l'air est plus froid , dure plus long-tems , sa racine est vivace , mais ses feuilles tombent en automne : dans le Japon elle produit plutôt des tiges chargées de graines , & elle meurt le plus souvent en un an. Dans le Canada où elle est appelée *Garent ogen* , elle est assez nourrie. Les Japonois & les Chinois prétendent que les principales vertus de la racine ninzin sont de fortifier & d'engraisser ; ils en font entrer dans tous leurs remèdes au défaut du gens-eng , principalement dans tous les cordiaux ; mais avant que d'en faire usage , on le prépare comme le gens-eng.

Récolte du Gens-Eng , & son débit en Chine , &c.

On ramasse le ninzin & le gens-eng au commencement de l'hiver. Lorsque ces tems approchent , on met des gardes dans toute l'entrée de la Province de Siam-fai , pour empêcher les voleurs d'en prendre.

Les lieux où croissent les racines du gens-eng sont entre le trente-neuvième & le quarante-septième degré de latitude septentrionale , & entre le dixième & le vingtième degré de longitude orientale , en comptant depuis le méridien de Pekin : c'est dans ce vaste intervalle qu'on découvre une longue suite de montagnes , que d'épaisses forêts dont elles sont couvertes & environnées , rendent comme impénétrables ; c'est sur le penchant de ces montagnes , & dans ces épaisses forêts , sur le bord des rivières , autour des rochers , au pied des arbres , & au milieu de toutes sortes d'herbes , que se trouve la plante de gens-eng. Cette plante est ennemie de la chaleur & croît toujours à l'ombre. Il n'est pas étonnant qu'on en trouve en Canada , dont les forêts & les montagnes sont assez semblables à celles de la Chine , principalement vers le cinquante septième degré. Les endroits où croît le gens-eng sont tout-à-fait séparés de la Province de Cantong , appelée Leao-tong dans les anciennes cartes Chinoises , par une barrière de pieux de bois qui renferme toute cette Province , & aux environs de laquelle des gardes rodent continuellement pour empêcher les Chinois d'en sortir & d'aller chercher cette racine. Cependant quelque vigilance qu'on y apporte , l'avidité du gain fait trouver à des Chinois le secret de se glisser dans ces déserts , quelquefois jusqu'au nombre de deux ou trois mille , au risque de perdre la liberté & le fruit de leurs peines s'ils sont surpris en sortant de la Province ou en y rentrant. Dix mille Tartares sont commandés pour faire la récolte du gens-eng , & après que cette armée d'Herboristes s'est partagé le terrain sous divers étendarts , chaque troupe , au nombre de deux cens , s'étend sur une même ligne jusqu'à un point marqué , en gardant de dix en dix une certaine distance ; ils cherchent ensuite avec soin la plante dont il s'agit , en s'avancant insensiblement sur un même rhombe , & de cette manière ils parcourent pendant un certain nombre de jours l'espace qu'on leur a marqué. Dès que le terme est expiré les Mandarins , placés avec leurs tentes dans les lieux propres à faire paître leurs chevaux , envoient visiter chaque troupe

pour lui intimier leurs ordres & pour s'informer si le nombre est complet : en cas que quelqu'un manque , comme il arrive assez souvent , ou pour s'être égaré dans ces affreux déserts , ou pour avoir été dévoré par les bêtes , on le cherche un jour ou deux , après quoi on recommence de même qu'auparavant. Ces Tartares ont beaucoup à souffrir dans cette expédition , ils ne portent ni tentes , ni lits , chacun d'eux étant assez chargé de sa provision de millet roti au four , dont il se doit nourrir tout le tems du voyage. Ainsi ils sont contraints de prendre leur sommeil sous quelques arbres , se couvrant de branches ou de quelques écorces qu'ils trouvent. Les Mandarins leur envoient de tems en tems quelques pieces de bœuf ou de gibier qu'ils dévorent après les avoir montrées un moment au feu. C'est ainsi que ces dix mille hommes passent six mois de l'année , depuis le commencement de l'automne jusqu'à la fin du printems , pour la recherche d'une racine , dont la principale vertu est vraisemblablement de produire un grand revenu à l'Empereur de la Chine. On conserve pour ce Prince celui qui a été ramassé sur les montagnes de *Tsu-Toang-Seng* , comme le meilleur. Quelques tentatives qu'on ait faites chez nous , pour faire venir le gens-eng de graine , l'on n'a pu y réussir.

Tout le gens-eng qu'on ramasse en Tartarie chaque année , & dont le montant nous est inconnu , doit être porté à la Douane de l'Empereur de la Chine , qui en préleve deux onces pour les droits de Capitation de chaque Tartare employé à cette récolte : ensuite l'Empereur paye le surplus une certaine valeur , & fait revendre tout ce qu'il ne veut pas à un prix beaucoup plus haut dans son Empire , où il ne se débite qu'en son nom , & ce débit est toujours assuré : c'est par ce moyen que les Nations Européennes trafiquantes à la Chine , s'en pourvoient , & en particulier la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales , qui vend presque tout le gens-eng qui se consomme en Europe.

Le prix du gens-eng est tel chez les Chinois qu'ils en vendent une livre de poids trois livres pesant d'argent. Les Hollandois en vendent aussi au poids de l'or , qu'ils distribuent aux Européens sous le nom *Ging-geng* , & aux Japonnois sous celui de *Nisi* ; c'est pourquoi le gens-eng est toujours si rare. Celui des Marchands de l'Europe est souvent mêlé de ninzin , qui est plus commun , ce qui produit alors un gain plus considérable & un débit plus sûr. On prétend que les Hollandois en ont planté au Cap de bonne Espérance. Parlons maintenant de sa préparation.

Préparation du Gens-Eng.

Les Tartares appellent le GENS-ENG , *Orotha* , ce qui signifie la *Première des Plantes*. Pour en conserver la racine ils enterrent dans un même endroit tout ce qu'ils peuvent en amasser durant dix , douze & quinze jours : ils ratifient & nettoient soigneusement ces racines , dès qu'elles sont tirées de terre , avec un couteau fait de bambou , car ils évitent religieusement de

les toucher avec le fer ; quelquefois ils en retirent la terre avec une brosse : ils les trempent ensuite dans une légère décoction presque bouillante de graines de millet & de ris , puis ils les font sécher avec soin à la fumée d'une espèce de millet jaune qui est renfermé dans un vase avec un peu d'eau ; les racines sont alors couchées sur de petites traverses de bois au dessus du vase & se séchent peu-à-peu sous un linge ou sous un autre vase qui les couvre. Quelquefois on fait sécher ces racines en les suspendant à la vapeur d'une chaudière couverte & placée sur le feu , laquelle contient de l'eau de millet jaune & de ris. Par ces procédés , les racines acquièrent en se séchant , une couleur jaune ou rousse , avec une sorte de dureté , & elles paroissent comme résineuses & demi transparentes. Après avoir bien séché ces racines , on en retranche les fibres ; & lorsque le vent du Nord souffle , on a soin de les placer à sec dans des vases de cuivre bien propres , qui ferment bien : on fait un extrait des plus petites racines , & on conserve les feuilles de la plante pour en faire usage comme du thé.

GENTIANE, *Gentiana*. Est une plante qui croît par-tout , mais principalement sur les montagnes des Alpes , des Pyrénées & de l'Auvergne : on en distingue de plusieurs sortes sous le nom générique de *gentianelle* ; nous parlerons d'abord de celle qui est la plus en usage , & qui est la *grande gentiane vulgaire*.

Sa racine est grosse comme le poignet , & longue de plus d'un pied , rameuse , fongueuse , brune en-dehors , d'un jaune roussâtre en-dedans , d'un goût fort amer : elle pousse plusieurs tiges droites , fermes , hautes de deux à trois pieds. Ses feuilles sont semblables à celles de l'hellebore blanc , lisses , de couleur verte pâle , ayant cinq nervures comme celles du plantain : les unes naissent en grand nombre près des racines , les autres sont placées vis-à-vis l'une de l'autre , à chaque nœud des tiges qu'elles embrassent en se réunissant par leur base. Les tiges portent des fleurs verticillées ou rangées par anneaux & par étages dans les aisselles , & qui sont de couleur jaune : chacune de ces fleurs est une cloche fort évasée , découpées en cinq quartiers. Il leur succède un fruit membraneux , ovale , qui s'ouvre en deux panneaux , & qui contient des semences applaties , comme feuilletées & de couleur rougeâtre. On peut consulter la charmante description poétique de la gentiane , par M. de Haller.

Nous ne pouvons nous dispenser de dire un mot sur la *petite gentiane d'Amérique à fleur bleue* , dont les capsules servent d'étui pour garantir ses grains des injures de l'air & de la terre , jusqu'à l'approche du tems le plus propre à les faire sortir. Alors , dès que la moindre humidité touche le bout des capsules , il se fait une explosion des graines qui vont çà & là se semer naturellement : cette observation est du Chevalier Hans-Sloane , qui la fit pendant son séjour à la Jamaïque ; observation qui se trouve vérifiée par d'autres exemples semblables. Il y a aussi la gentiane croisetée , *gentiana cruciata* , dont la vertu est également fébrifuge.

La racine de grande gentiane est la seule partie de cette plante en usage

dans la Médecine ; elle est vulnéraire , fébrifuge , très stomachique , & d'un très grand secours dans la morsure des chiens enragés : elle leve les obstructions ; elle provoque les menstrues , chasse les vers , excite l'appétit & facilite la digestion comme les autres amers ; non-seulement elle résiste aux poisons , mais encore à la gangrene & même à la peste : dans l'usage extérieur elle mondifie les plaies ; c'est un fort bon dilatant pour aggrandir un ulcère fistuleux & en entretenir l'ouverture. Elle détruit les chairs fongueuses & calleuses. Elle est la base de la poudre cordiale des Maréchaux.

GEODES, *Lithotomi cavernosi*. On donne ce nom à des pierres de différentes figures , soit sphériques , soit triangulaires , intérieurement caverneuses , & qui contiennent dans leur cavité centrale , ou une crySTALLISATION , ou de la terre , ou du sable , en un mot un noyau mobile , même une matière fluide comme de l'eau ; substances qu'on n'apperçoit pas à l'extérieur , mais qu'on reconnoît , lorsqu'en agitant la pierre fortement , on entend du bruit , ou un son sourd ou creux. Les geodes les plus communs sont ceux qui tiennent de la nature des mines de fer , & qu'on appelle *pierres d'aigles* ou *étites*. Voyez ce dernier mot.

GÉOGRAPHIE. On appelle *Carte de Géographie* , une coquille univalve qui est une espèce de *porcelaine* ; & *Table de Géographie* , une espèce de *rouleau*. Voyez ces mots.

GERANION ou GERANIUM. Nom latin qu'on donne vulgairement , avec une épithète , au *bec de grue* , à l'*herbe à Robert* ou *pied de pigeon*. Voyez BEC DE GRUE.

GERBOISE. Animal singulier pour la forme , & dont il y a plusieurs variétés sous les noms de *tarsier* , de *gerbo* , d'*alagtaga* , de *daman Israël* , ou *agneau d'Israël* ; ces animaux n'ont pas les pattes de devant plus grandes que les mains de la *taupe* , & celles de derrière ressemblent aux pieds d'un oiseau ; ces quadrupèdes ont la tête faite à-peu-près comme celles du *lapin* , ils ont les dents construites de la même manière. Leurs pieds de derrière n'ont que trois doigts ; celui du milieu est un peu plus long que les deux autres , & tous trois sont garnis d'ongles. Leur queue est trois fois plus longue que leur corps , & couverte de poils rudes. On voit de ces animaux en Égypte , en Arabie , en Barbarie , en Tartarie , & jusqu'en Sibérie. Ils se servent de leurs pattes de devant comme de mains , pour porter à leur bouche ce qu'ils veulent manger ; ils se soutiennent droits sur leurs pieds de derrière , & cachent ordinairement ceux de devant dans leurs poils , en sorte qu'ils ne paroissent pas en avoir : lorsqu'ils veulent aller d'un lieu à un autre , au lieu de marcher , ils sautent légèrement & très vite , toujours debout comme les oiseaux ; ils avancent à chaque saut de trois ou quatre pieds de distance. Lorsqu'ils se reposent , ils s'assient sur leurs genoux ; ils ne dorment que le jour & jamais la nuit : leur nourriture est le grain & les herbes. Ils se creusent des terriers comme les lapins , & ils ont la prévoyance d'y faire provision d'herbes pour passer l'hiver.

GERCE, *teredo*. Est la petite vermine qui ronge les habits & les meubles. Voyez TEIGNE.

GERFAUT, *gyrofalco*. Oiseau de proie & de leurre, qui tient du vautour, & qui sert à la volerie : voyez FAUCON GERFAUT.

GERMANDRÉE ou PETIT CHÊNE, *chamedrys officinar*. Cette plante croît aux lieux incultes, pierreux, montagneux & dans les bois. Ses racines sont ligneuses, fibrées, fort traçantes, & jettent de tous côtés des tiges couchées sur terre, quadrangulaires, branchues, hautes d'environ demi pied, grêles, rougeâtres & lanugineuses. Ses feuilles naissent deux à deux, opposées; elles sont d'un verd gai, fermes, velues, dentelées comme celles du chêne, longues d'un demi pouce, d'un goût amer, un peu âcre & aromatique : ses fleurs naissent dans les aisselles des feuilles le long des tiges, elles sont de couleur purpurine, & d'une odeur agréable; chacune d'elles est un tuyau évasé par le haut en forme de gueule. A cette fleur succèdent quatre graines arrondies & formées de la base du pistil.

Les Botanistes comptent une vingtaine d'espèces de germandrées : on en cultive en Angleterre quelques-unes. Voyez ce qu'en dit Miller. Voyez aussi, à l'article GALLES de ce Dictionnaire, le siège bizarre des galles de Germandrée.

Les feuilles & les fleurs de la germandrée sont d'usage en Médecine, & sont rangées dans la classe des amers aromatiques, elles sont incisives, fortifient le ton des parties relâchées, provoquent les urines, les menstrues & les sueurs, levent les obstructions des viscères, & sont bonnes contre les premières attaques de l'hydropisie, du scorbut & de la goutte. Bien des personnes en Egypte en font une espèce de thé, dont elles se servent avec succès dans les maladies scrophuleuses & dans les différentes fièvres.

GERMANDRÉE D'EAU ou CHAMARRAS, ou VRAI SCORDIUM : *scordium off.* Plante qui croît aux lieux humides & marécageux, le long des fossés remplis d'eau. Sa racine est rampante, fibrée & vivace; elle pousse plusieurs tiges hautes d'un pied ou environ, quarrées, velues, rameuses & serpentantes. Ses feuilles sont oblongues, ridées, dentelées, velues, opposées, d'une odeur d'ail & d'un goût amer. Ses fleurs sont petites & formées en gueule, elles naissent en Juin & Juillet dans les aisselles des feuilles le long des tiges & des branches : il leur succede quatre semences menues & arrondies.

Le scordium est amer, aromatique, rougit un peu le papier bleu : il est estimé vulnéraire, alexipharmaque, détersif, vermifuge & diurétique : on en fait usage en infusion théi-forme pour procurer les sueurs, pour guérir les fièvres continues; sur-tout pour les ulcères internes, pour résister à la gangrene & rendre la vie aux parties demi-mortes.

On donne aussi le nom de faux scordium ou de chamarras à la sauge sauvage ou des bois (*chamedris fructicosa*, *sylvestris*, *melissæ folio*) dont l'odeur tire également sur celle de l'ail : elle est stomachique, & convient en topique dans les ulcères gangreneux. La germandrée en arbre est une espèce de *teucrium*.

GEROFLE. Voyez GIROFLE.

GEROFLIER.

GEROFLIER. *Voyez* GIROFLIER.

GESSE, *Lathyrus*. Plante qu'on cultive dans quelques jardins. Sa racine est menue & fibrée ; elle pousse plusieurs tiges rampantes , comme relevées d'une côte en dos-d'âne , & qui se subdivisent en plusieurs rameaux. Ses feuilles naissent deux à deux ; elles sont oblongues , étroites & pointues. Ses fleurs sont légumineuses , blanches , tachées au milieu d'une couleur de pourpre brun , & soutenues chacune par un calice formé en godet dentelé : il succede à chaque fleur une gouffe courte & large , blanche , composée de deux cosses qui renferment des semences anguleuses , blanches en dehors , jaunes en dedans.

Dans les pays méridionaux on mange ces semences comme les pois , les fèves & autres légumes ; elles sont fort nourrissantes & très prolifiques : le bouillon en est un peu relâchant & apéritif.

Il y a une autre espece de gesse qu'on appelle *gesse d'Espagne* , & qui est plus feuillée. Les branches de l'une & l'autre espece sont terminées par des filaments qui s'accrochent & s'entortillent autour des plantes voisines ou des rames posées exprès. On mange les racines charnues de l'espece de gesse , appelée *makoïse* ou *macjon*. On multiplie les gesses , de graine ou de racine : elles sont très propres à être plantées contre des haies mortes , qu'elles couvriront , si l'on veut , dans un été , donneront quantité de fleurs , & subsisteront plusieurs années. La petite *gesse* à grande fleur , orne très bien un jardin , parcequ'elle ne s'élève pas au-dessus de cinq pieds , & qu'elle produit des bouquets de larges fleurs & d'un beau rouge foncé. Mais la *gesse* , que les Anglois appellent *the swetscenter peas* , mérite le plus d'être cultivée à cause de la beauté & de l'agréable odeur de ses fleurs pourpres : au reste , pour bonnifier toutes les variétés de *gesse* , il faut les semer au mois d'Août près d'un mur ou d'une haie exposée au midi ; alors elles poussent en automne , subsistent en hiver , commencent à fleurir en Mai , & continuent jusqu'à la fin de Juin : par cette méthode elles produisent une très grande quantité de fleurs & d'excellentes graines.

GEUM ou SANICLÉ DE MONTAGNE, *Geum rotundi-folium majus*. Plante qui croît aux lieux montagneux & ombrageux : sa racine est écailleuse en haut & grosse , mais garnie de fibres blanchâtres dans le reste ; ses tiges sont hautes d'un pied , tortues , velues & rameuses. Ses feuilles sont larges , arrondies & dentelées : ses fleurs sont composées de cinq pétales oblongs , disposées en rose , blancs , tiquetés de plusieurs points rouges. A ces fleurs succedent des capsules membraneuses remplies de semences menues. Cette plante est un bon vulnéraire.

GHIAMALA. Est un grand animal qui se retire particulièrement à l'Est de Bambuck dans les cantons de Gadda & de Jaka : on prétend qu'il est plus haut de la moitié que l'éléphant , mais il n'approche pas de sa grosseur ; il a beaucoup plus de ressemblance avec le chameau par la tête & par le col : il a deux bosses sur le dos comme le dromadaire. Ses jambes qui sont d'une longueur extraordinaire , contribuent beaucoup à le faire paroître encore

plus haut ; il n'est jamais fort gras : il se nourrit , comme les chameaux , de ronces & de bruyeres : les Negres en aiment assez la chair.

Cet animal pourroit devenir propre à porter les fardeaux les plus lourds , si les Negres étoient capables de l'appriivoiser , car sa marche se soutient longtemps & est très prompte ; mais il est extrêmement féroce. On dit qu'il a sept cornes fort droites , longues chacune d'environ deux pieds : la corne de son pied est noire , & semblable à celle du bœuf.

GIACOTIN. C'est le faisan de l'Isle de Sainte-Catherine : sa chair est bien moins délicate que celle de nos *Faisans*. Voyez ce mot.

GIAM-BO. Arbres des Indes orientales , dont le Voyageur Boin a donné la figure & la description dans sa *Flora Sinensis*. On distingue deux especes de *giam-bo*. La premiere porte des fleurs pourpres : ses feuilles sont lisses , longues de huit pouces & larges de trois ; son fruit est moitié rouge & moitié blanc , gros comme nos petites pommes de reinette , & contenant une pulpe à-peu-près du même goût : on en fait dans le pays d'excellentes conserves. Ce fruit est mûr au commencement de Décembre : il n'a point de pepins , mais un noyau rond , dont l'amande est verte & coriace : l'arbre qui le donne , offre en même tems à la vue des fleurs , des fruits verts & des fruits mûrs. L'autre espece de *giam-bo* croît à Malaca , à Macao , & dans l'Isle de Hiam-Xam : ses fleurs sont jaunâtres ; son fruit qui sent fort la rose , est jaune , & a une couronne comme la grenade ; il mûrit en Mars & en Juillet : son noyau est séparé en deux , mais sa chair est aussi douce , que celle de la premiere espece de *giam-bo* est acide.

GIARENDE, GERENDE ou GORENDE. C'est un magnifique serpent , dont on distingue trois especes.

La premiere est un serpent tortueux qui se met en divers plis & replis : sa peau est très agréablement maculée ; elle est couverte de petites écailles minces , jaunâtres , entre-mêlées de très jolis rubans , comme brodées , d'un roux enfumé : sa tête est oblongue , cendrée , couverte d'écailles en chaînons : les bords des levres sont tournés en dehors & plissés ; ses dents sont petites , ses yeux brillants , & ses narines larges. Cette espece de serpent est fort honorée des Samagetes & des Japonnois , parcequ'ils nuisent aux hommes. Les habitants de Calecut lui portent aussi beaucoup de respect , & s'imaginent que l'Être tout puissant n'a créé ces animaux , que pour punir les hommes ; cependant ils ne font aucun mal à l'homme , si on ne les irrite point ; mais ils attaquent constamment les loirs , les rats , les pigeons , & les poules : ils se cachent sous les toits des maisons pour guetter ces animaux.

Le second *Serpent Gerende* se trouve en Afrique ; il est d'une grandeur prodigieuse : les habitans idolâtres lui rendent aussi un culte divin. On en a apporté de la côte de Mozambique en Afrique ; le tiqueté de sa peau est jaune , cendré & noir , mais moins agréable que le premier ; sa langue est fourchue , rougeâtre , & sa queue pointue.

Le troisieme *Serpent Gerende* est appelé *Jauca Acanga* par les Brasiiliens ;

ce nom signifie *serpent qui porte un habit à fleurs*. Les Portugais le nomment *Fedagofo* : les Hollandois établis au Bresil l'appellent *Serpent chasseur*, parcequ'il court avec une vitesse incroyable sur les chemins de côté & d'autre, à la maniere d'un chien de chasse. Lorsque ce serpent se met à la poursuite d'un homme, le meilleur parti qu'il ait à prendre, est de le caresser, le flatter, & l'adoucir en lui donnant quelque chose à manger. Les Brasiliens lui donnent gracieusement l'hospitalité dans leurs maisons & sous leurs toits : par ce moyen, loin d'en être incommodés, ils se trouvent délivrés d'autres petits animaux incommodes, dont il se nourrit. Ce serpent est paré superbement ; sa tête est oblongue, ses yeux grands ; ses écailles sont d'un beau blanc, ombrées de rouge & marbrées d'un jaune doré : sa gueule est liserée d'une jolie bordure : ses deux mâchoires sont garnies de dents crochues, sa langue est rouge & fendue. *Voyez Seba, Thes. II. Tab. 102. n. 1.*

GIBIER. Nom donné généralement à ce qui est la proie du Chasseur ; ainsi les renards & les loups sont gibier pour ceux qui les chassent ; les buzes, les corneilles sont gibier, dans la Fauconnerie. Cependant on appelle plus particulièrement du nom de *gibier* les animaux sauvages qui servent à la nourriture de l'homme. Une terre *giboyeuse* abonde en *lievres*, *lapins*, *perdrix*, *cailles*, &c. Dans une forêt bien peuplée de gibier, il se trouve beaucoup de *cerfs*, de *daims*, de *chevreuils*, de *sangliers*, &c. *Voyez ces mots.*

GIBOULÉE. On appelle ainsi une ondée de pluie froide & très agitée. *Voyez PLUIE.*

GIBOYA. C'est le plus grand de tous les serpens du Bresil ; il a jusqu'à vingt pieds de longueur, & est fort beau : il a sous le ventre & sous la queue des bandes écailleuses, la tête couverte de petites écailles, & la queue sans appendices : ce serpent est si grand qu'on lui a vu engloutir d'assez gros animaux entiers ; ses dents sont fort petites, eu égard à la grandeur de son corps. Lorsqu'il veut surprendre des bêtes sauvages, il se tient à l'écart & auprès des sentiers, puis se jettant sur celles qui passent, il les entortille de maniere qu'il leur casse les os ; après quoi, à force de les mâcher, il les amollit assez pour pouvoir avaler l'animal tout entier. Ce serpent n'est point venimeux. On soupçonne que ce serpent differe peu du *Boiguacu* de Marcgrave, du *Constrictor* ou *Etouffeur* de Kempfer, du *Jaboya* de Laët, & peut-être du *Pimperah* de Seba, & même de ceux désignés sous les noms de *Reine des Serpens*, d'*Anacandaia* & de *Serpent stupide*.

GIFT-MEHL. Nom que les Mineurs Allemands donnent à la *farine empoisonnée* (substance arsenicale) qui se dégage du cobalt, lorsqu'on le grille pour en faire du safre. *Voyez ARSENIC & COBALT.*

GINGEMBRE, *Gingiber*. Dans le commerce de l'épicerie, on donne ce nom à une racine seche que les Indiens appellent *Zingibel*, & qui est tuberculaire, noueuse, branchue, un peu applatie, longue & large comme le petit doigt ; la substance en est résineuse, un peu fibrée, recouverte d'une écorce grise, jaunâtre ; la chair de la racine est rousâtre, brune, d'un goût

très âcre , brûlant , aromatique , comme le poivre , d'une odeur forte , assez agréable. On nous l'apporte sèche des Isles Antilles , où elle est présentement cultivée ; mais elle est originaire de la Chine , du Malabar , & de l'Isle de Ceylan : le gingembre de la Chine passe pour le meilleur.

La plante que cette racine porte , a , selon le P. Plumier , une espece de rapport avec le roseau ; elle pousse trois ou quatre petites tiges rondes & grosses comme le petit doigt d'un enfant , renflées & rouges à leur base , verdâtres dans le reste de la longueur. Parmi ces tiges , les unes sont garnies de feuilles , les autres se terminent en une masse écailleuse ; celles qui sont feuillées ont environ deux pieds de hauteur , & ne sont formées que par la partie des feuilles qui s'embrassent : les feuilles sont en grand nombre , alternes , épanouies en tous sens , & semblables à celles du roseau , mais plus petites. Les petites tiges qui se terminent en masse , ont à peine un pied de hauteur : elles sont entourées & couvertes de petites feuilles verdâtres , & rougeâtres à leur pointe. La masse qui termine chaque tige , est d'une grande beauté ; car elle est toute composée d'écailles membraneuses , d'un rouge doré , ou verdâtres & blanchâtres ; de l'aisselle de ces écailles , sortent des fleurs qui s'ouvrent en six pieces aiguës , en partie pâles , & en partie d'un rouge foncé & tacheté de jaune : les fleurs durent à peine un jour , & s'épanouissent successivement l'une après l'autre. Le pistil , qui s'élève du milieu , se termine en massue , ce qui a donné lieu à quelques Botanistes d'appeller la plante du gingembre , *petit roseau à fleur de massue*. La base du pistil devient un fruit coriace , oblong , triangulaire , & à trois loges remplies de plusieurs graines.

Les masses ont une vive odeur. Cette plante ne vient en Europe , que dans les jardins où on la cultive. Elle naît également par la culture dans les deux Indes. Nous avons déjà dit qu'elle n'est point naturelle à l'Amérique ; elle a été apportée des Indes Orientales ou des Isles Philippines dans la Nouvelle Espagne & dans le Brésil : ceux qui la cultivent en laissent toujours quelques rejettons , afin qu'elle multiplie de nouveau : au défaut de ces rejettons , on en sème la graine dans une terre grasse , humide & bien cultivée.

On ramasse tous les ans une immense quantité de racines de gingembre , sur lesquelles les fleurs ont séché , ou quatre mois après qu'on a planté des morceaux de sa racine ; & en ayant ôté l'écorce extérieure , on les jette dans une saumure , pour y macérer pendant une ou deux heures (on les fait bouillir dans les environs de Cayenne) : on les retire de cette lessive , & on les expose autant de tems à l'air & à l'abri du soleil ; ensuite on les place à couvert sur une natte , jusqu'à ce que toute l'humidité soit dissipée ; quelquefois on les met à l'étuve.

Les Indiens rapent la racine de gingembre dans leurs bouillons , leurs ragoûts & leurs salades : ils en font une pâte pour le scorbut. Les Madagascariens , les Hottentots & les Philippiniens en mangent en salade les racines vertes , coupées par petits morceaux , avec d'autres herbes assaisonnées

de sel, d'huile & de vinaigre. A Cayenne, ces racines fraîchement cueillies, se servent sur table comme des raves : il n'y a d'autre apprêt que de les bien laver. Les Bresilois en usent en masticatorie, comme d'un puissant prolifique : ils ont aussi coutume de les confire avec du sucre, lorsqu'elles sont fraîches, pour les servir au dessert, & sur-tout pour réveiller l'appétit aux convalescens. On en fait aujourd'hui des marinélades & des pâtes. On nous en envoie en Europe de préparées ainsi ; leur couleur est jaune, & le goût en est assez agréable. Cette confiture est d'usage sur mer.

Les Indiens regardent le gingembre récent, comme un spécifique pour les coliques, la lienterie, les vieilles diarrhées, les vents, les tranchées, & les autres maux de cette nature : ils en mâchent pour faciliter le crachement, quand les rhumes sont opiniâtres. Il est reconnu que cette racine réchauffe les vieillards, donne ce que les Médecins appellent pudiquement la *magnanimité*, fortifie l'estomac, aide la digestion, & qu'elle fortifie la mémoire & le cerveau. C'est un bon carminatif & alexipharmaque, qui excite puissamment à l'amour ; mais il faut en modérer l'usage, lorsque l'on a le sang trop bouillonnant, car il allume plutôt le sang que de l'apaiser.

Le gingembre est la base des épices : on dit que plusieurs Epiciers s'en servent pour falsifier le poivre. On donne le nom de *Gingembre sauvage* à la *Zédoire*. Voyez ce mot.

En général, les plantes de la famille des gingembres, telles que le *costus*, le *curcuma*, le *pacocero*, le *karatas*, l'*ananas*, le *musa*, &c. sont toutes, comme les palmiers, étrangères à l'Europe, & particulières aux climats les plus chauds : elles sont vivaces seulement par leurs racines, qui sont charnues, traçantes, fibreuses, comme geniculées ou annelées. Les jeunes pousses forment aux extrémités des racines une espèce de tubercule conique, couvert d'écailles imbriquées, & qui ne sont, comme dans les palmiers & les gramens, que des appendices de feuilles imparfaites. Leur tige est ordinairement simple & sans ramifications, leurs feuilles sans dentelures. Leurs fleurs sont hermaphrodites, disposées en ombelle ou en épi, ou en panicule, portées sur un pédicule écailleux, accompagnées d'écailles fort différentes de la spathe ou graine des palmiers. Leur poussière fécondante est composée de globules assez gros, blanchâtres & luisans.

GINGLIME : voyez à la suite de l'article COQUILLE.

GINSENG : voyez GENS-ENG.

GIRAFFE, *Giraffa*. La plupart des Auteurs ont donné ce nom au *Caméléopard* & au *Panthere*. Voyez ce que nous en disons à l'un & à l'autre articles.

GIRARD-ROUSSIN : voyez CABARET.

GIRASOL, *Solis gemma*. C'est une pierre précieuse, demi-transparente, toujours laiteuse ou calcédonieuse, plus ou moins resplendissante, donnant un éclat foible de bleu & de jaune, ou des couleurs de l'arc-en-ciel, ou de jaune doré ; réfléchissant, lorsqu'elle est taillée en globe ou demi-

globe , les rayons de la lumiere de quelque côté qu'on la tourne , mais plus foiblement que l'opale. On est incertain si la pierre girasol est une espece de *Cristal laiteux* , ou une espece d'*Opale* , ou une espece de *Chalcedoine*. Voyez ces mots.

Les pierres de girasol varient par la dureté & par la beauté des couleurs qu'elles chatoient. Les plus belles , dont la teinte est d'un blanc laiteux , mêlé de blanc & de jaune bien distribués , sont réputées Orientales : elles sont aussi plus dures que l'opale. Celles qui sont tendres , inégales & foibles en couleur , sont Occidentales. Ces sortes de pierres précieuses se trouvent en Chypre , dans la Galatie , dans la Hongrie & dans la Bohême. On les trouve quelquefois , avec les opales , dans une pierre tendre , rousâtre & tachetée de noir. On a nommé cette pierre *Girasol* , des mots Italiens *girare* (porter) & *Sol* (Soleil) , comme qui diroit *Pierre qui porte les rayons du Soleil*. La *Pierre du Soleil* des Turcs (*Gusgunèche*) , est une espece d'*Œil de chat* , chatoyant , d'une couleur verdâtre & foncée. Voyez *ŒIL DE CHAT*.

GIRAUMONT. Voyez CALALOU.

GIRAUPIAGARA ou AVALEUR D'ŒUFS. On donne ce nom à un serpent des Indes Occidentales , noir , long , & dont la poitrine est jaune : il saute très lestement sur les arbres , & y dépeuple les nids des oiseaux.

GIRELLA ou POISSON DEMOISELLE, *Julia*. On le nomme aussi *Poisson gourmand*. C'est un poisson faxatile , qui vit en troupe , & dont il est parlé à l'article DONZELLE. Voyez ce mot.

GIROFLADE DE MER. Rondelet dit que c'est une espece de zoophyte , qui vient dans les rochers : il est d'une substance dure ; sa peau est rouge , trouée comme un crible , & imitant les feuilles frisées de la laitue pommée. Gesner pense que c'est une *Escaré*.

GIROFLE ou GÉROFLE, ou CLOU DE GÉROFLE, *Cariophyllus aromaticus*. Ce sont de petits fruits aromatiques de l'Inde , ou plutôt ce sont les embryons des fleurs desséchées du giroflier. Ces especes de fruits sont longs de six à huit lignes , presque quadrangulaires , ridés , d'un brun noirâtre , ayant la figure d'un clou ; leur sommet est garni de quatre petites pointes en forme d'étoiles , ou représentant une espece de couronne à l'antique : il s'élève au milieu de ces pointes , une tête de la grosseur d'un très petit pois ; cette tête est formée de petites feuilles appliquées les unes sur les autres en maniere d'écailles , qui , étant écartées & ouvertes , laissent voir plusieurs fibres rousâtres , au centre desquelles il s'élève , dans une cavité quadrangulaire , un style droit , de même couleur , qui n'est pas toujours garni de sa petite tête , parcequ'elle se détache souvent lorsqu'on transporte les clous de girofle : c'est ce bouton que quelques-uns appellent le *fust du clou de girofle*. On apperçoit facilement toutes ces particularités en laissant macérer pendant quelques heures un clou de girofle dans de l'eau tiède : alors on reconnoît que les clous de girofle sont tout à la fois le calice , le bouton des fleurs , & les embryons des fruits.

Les clous de girofle sont pesants , gras , d'une odeur excellente , & d'une

faveur si mordicante , qu'elle brûle les papilles nerveuses & la gorge. Si on les met en presse , il en sort une humidité huileuse.

L'arbre qui porte les clous de girofle , s'appelle *Giroflier des Moluques*, *Caryophyllus aromaticus fructu oblongo*. Cet arbre qui croît dans les Isles Moluques , situées près de l'Equateur , est de la forme & de la grandeur du laurier ; son tronc a un pied & demi d'épaisseur ; il est dur , branchu , & revêtu d'une écorce , comme celle de l'olivier : ses branches , qui s'étendent fort au large , sont d'une couleur rousse-claire , & garnies de beaucoup de feuilles alternes , semblables à celles du laurier , & pleines de nervures , avec des bords un peu ondes : les feuilles sont portées sur une queue longue d'un pouce : les fleurs naissent en bouquet à l'extrémité des rameaux ; elles sont en roses à quatre pétales bleues , & ont une odeur très-pénétrante. Le milieu de ces fleurs est occupé par un grand nombre d'étamines purpurines , garnies de leurs sommets : le calice des fleurs est cylindrique , partagé en quatre parties en son sommet , de couleur de suie , d'un goût fort aromatique , lequel après que la fleur est séchée , se change en un fruit ovoïde ou de la forme d'une olive , creusé en nombril , n'ayant qu'une capsule , de couleur verte , blanchâtre d'abord , puis rousâtre , ensuite brun-noirâtre , contenant une amande oblongue , dure , noirâtre , creusée d'un sillon dans sa longueur.

Dans les Boutiques , ou chez les Droguistes , on appelle ce fruit mûr , *Antofle de girofle*, *Antophillus* : les Indiens le nomment *Mere des fruits* , & les Européens l'appellent *Clou matrice*. Comme on le laisse sur l'arbre , il ne tombe de lui-même que l'année suivante , & quoique sa vertu aromatique soit foible , il est dans l'état requis pour servir à la plantation , car étant semé , il germe , & , dans l'espace de huit ou neuf ans , il forme un grand arbre qui porte du fruit. Les Hollandois ont coutume de confire sur le lieu même ces clous matrices récents , avec du sucre ; & dans les voyages sur mer , ils en mangent après le repas pour rendre la digestion meilleure & pour prévenir le scorbut.

Récolte & débit du Girofle.

On cueille les clous de girofle avant que les fleurs s'épanouissent ; la saison est depuis le mois d'Octobre jusqu'en Février. La cueillette s'en fait en partie avec les mains : on fait tomber le reste avec de longs roseaux ou verges ; on reçoit ces especes de fruits sur des linges que l'on étend sous les arbres ; quelquefois on les laisse tomber sur la terre , dont on a coutume de couper toute l'herbe avec un grand soin dans le tems de cette récolte. Dans ces premiers instants , les clous de girofle sont rousâtres ; mais ils deviennent noirâtres en se séchant & par la fumée ; car on prétend qu'on les expose pendant quelques jours à la fumée sur des claies , & qu'ensuite on les fait bien sécher au soleil. Personne n'est plus instruit sur cette matiere , que les Hollandois établis à Ternate & à Amboine ; ce sont eux seuls qui cultivent , récoltent & préparent avec soin les clous de girofle , & qui les portent par

toute la terre. Le girofle , la canelle & la muscade sont pour eux un objet des plus importants. Leurs magasins Orientaux de girofle sont à Amboine , dans le Fort de la victoire : c'est là que les habitants portent leur récolte , dont on a fixé le prix à soixante réales de huit la barre , qui est de cinq cents cinquante livres de poids. Les habitants sont obligés de planter un certain nombre de girofliers par an ; ce qui les a multipliés au point qu'on l'a désiré pour le débit annuel qu'il n'est guere possible d'évaluer sans être dans le secret. Il suffira de dire que la France seule en achete cinq ou six cents quinquaux par année. Il est incroyable combien tous les clous de girofle contiennent d'huile quand on les rapporte des Indes , & qu'on vient à les débaler : pour peu qu'on y touche , les mains en sont teintes. Par quelle singularité en trouve-t-on , dans celui qu'ils nous distribuent , si peu qui ait sa première qualité ! j'ai cru remarquer que dans seize onces de girofles , il y en a près de trois onces de fort sec , noirâtre , presque sans goût , & qu'il n'a d'odeur que celle que lui communiquent les treize autres onces avec lesquelles il se trouve mêlé. *Voyez* la réflexion qui est à la fin de l'article MUSCADE.

Usages du Girofle.

Les clous de girofle récents donnent par expression une huile épaisse , rousâtre & odorante ; mais dans la distillation il sort beaucoup d'huile essentielle aromatique , qui est d'abord claire , légère & jaunâtre , ensuite rousâtre , pesante , & qui va au fond de l'eau ; enfin , une huile empyreumatique , épaisse , avec une liqueur acide. Souvent on tire l'huile du girofle *per descensum* ; mais l'huile de girofle qui se débite dans le commerce , n'est pas toujours pure. Combien y en a-t-il de mêlée avec l'huile de *coulilawan* ! *Voyez ce mot*. La bonne huile de girofle récente est d'un blanc doré : elle rougit en vieillissant.

On fait principalement usage des clous de girofle dans les cuisines : il n'y a point de ragoût , point de sausse , point de mets , peu de liqueurs spiritueuses , ni de boissons aromatiques , où l'on n'en mette. Aux Indes on méprise presque toutes les nourritures qui sont sans cette épicerie : on l'emploie aussi parmi les odeurs.

Bien des Médecins disent que le girofle a la vertu d'échauffer & de dessécher : on le recommande contre le vertige , la pamoison , la foiblesse d'estomac & de cœur , l'impuissance , la suppression du flux menstruel & les maladies hystériques : on en use en masticatorie ou en fumigation , pour se préserver de la contagion de l'air : il excite utilement la salive dans la paralysie de la langue & le mal de dents. On fait avec le girofle une poudre dont on remplit de petits sacs , que l'on plonge dans du vin de Canaries , & qu'on porte ensuite en amulette sur l'estomac pour le scorbut & la peste. Quelquefois on y joint de l'angélique sèche , de la noix muscade , de l'iris & des fleurs de lavande , avec du storax & de l'encens oliban , & on en met une quantité entre deux pieces de coton , qu'on enveloppe ensuite d'une étoffe de soie piquée ,

piquée, & on s'en fait une espece de bonnet, qui est utile dans les maladies de la tête, qui viennent de vieilles douleurs catharreuses.

L'huile de girofle, si en usage parmi les Parfumeurs, est excellente pour la carie des os & le mal de dents; il suffit d'en imbiber un peu de coton, & de l'appliquer adroitement sur la partie affligée : dans l'apoplexie, on en frotte le haut & le bas de la tête. Elle convient aussi dans les maladies froides & pituiteuses, dans la stupidité accidentelle & les affections soporeuses. Dissoute dans l'esprit-de-vin bien rectifié, c'est un excellent topique pour arrêter les progrès de la gangrene. Le grand secret des Charlatans Arracheurs de dents, consiste à dissoudre un peu de camphre & d'opium dans l'huile éthérée du girofle; mais l'abus de ce remède a quelquefois causé la surdité.

GIROFLE, CLOU MATRICE. *Voyez* l'article GIROFLE.

GIROFLE ROND. C'est l'*amome* ou graine de girofle : on donne aussi ce nom au *piment* ou *poivre de la Jamaïque*. *Voyez ces mots*.

GIROFLE ROYAL, *Caryophyllus Regius ramosus vel dentatus*. Les Auteurs font mention d'une autre espece de clous de girofle, que celle dont nous avons parlé ci-dessus. Ce clou de girofle royal qu'on ne trouve point dans le commerce, est effectivement très rare & très précieux : c'est une espece de petit fruit qui imite la couleur, l'odeur & le goût du clou de girofle ordinaire; mais il est bien plus petit, il n'est pas étoilé, il n'a point de tête; il est comme partagé depuis le bas jusqu'en haut en plusieurs panicules ou écailles, & il se termine en pointe.

Les Hollandois disent que les Rois & les Grands des Isles Moluques l'estiment jusqu'à la superstition, non pas tant pour son goût & sa bonne odeur, que pour sa figure singulière, ou plutôt parcequ'il est infiniment rare; car ils soutiennent qu'on n'en a trouvé jusqu'à présent qu'un seul arbre, & dans la seule Isle de Makian. Ils prétendent encore que le Roi de cette Isle fait garder cet arbre à vue par ses Soldats, de peur que quelqu'autre que lui n'en recueille le fruit. Les Naturels du pays disent que quand l'arbre est chargé de ce petit fruit, les autres arbres voisins s'inclinent devant lui, comme pour lui rendre leurs hommages; mais nos Voyageurs sont-ils la dupe de tels contes? Les Indiens nomment le girofle royal *tinca* ou *tshinka-popona*. Ils ont coutume de passer un fil dans la longueur de ces clous, afin de les porter à leurs bras pour en sentir souvent la bonne odeur : c'est un talisman parfumé que les Princes des Moluques consacrent à leurs Divinités. Il faut être chez eux une *courtisane à prétention*, pour avoir le plaisir d'en respirer l'odeur de près : il faut être un *Wouli-Haga* (Ministre), pour avoir l'honneur d'en porter deux attachés & pendants ou aux oreilles, ou aux narines, ou aux lèvres, ou au menton, ou au bras; de sorte que l'on dit en ce pays-là un *Wouli-Haga à deux tshinka* (girofles), comme l'on dit en Turquie un *Bacha à deux queues*. On voit par-là que chaque nation a des étiquettes qui lui sont particulières. Tous les ans on présente un de ces girofles au Fétiche ou Dieu du pays, afin de

se le rendre propice , soit à la pêche , soit dans d'autres expéditions.

GIROFLIER ou **VIOLIER JAUNE** , *leuconium luteum*. Est une plante fort commune qui vient assez ordinairement sur les vieilles murailles , sur les décombres , sur les rochers , & qu'on cultive aussi dans les jardins , le long des murs. Ses racines sont nombreuses , blanchâtres , ligneuses ; ses tiges sont hautes d'un pied & demi ; elles poussent beaucoup de rameaux , pareillement ligneux & blanchâtres : ses feuilles sont nombreuses , oblongues , pointues , d'un verd blanchâtre , & d'un goût un peu âcre , herbueux , amer ; leur suc rougit le papier bleu ; ses fleurs qui paroissent en Avril & Mai , sont jaunes , d'une bonne odeur , mais d'une faveur peu gracieuse , disposées en croix , agréables à la vue : on les appelle *giroflées* : il leur succede des siliques longues & applaties , qui se divisent en deux loges remplies de semences larges , rousâtres , d'un goût âcre & amer.

L'on compte trente-quatre especes de girofliers , connues des curieux. Leur fleur est seul l'objet qui engage les amateurs à cultiver les plantes qui la donnent ; elle leur a même enlevé leur nom dans la plupart des langues modernes ; le *girofler* ne se dit plus en françois que de celui des mœurs : les Anglois ne l'appellent également que *walflower* , tandis que celui de leurs jardins se nomme par excellence la *fleur de Juillet* (*Stock July flower*). Enfin les Flamands laissant à la plante sauvage la dénomination de violier , *violier-boomte-je* , caractérisent celle des jardins par le nom de *nagel bloem*.

Ceux qui s'occupent de la culture des fleurs , savent qu'il y a des giroflées doubles & de simples de toutes couleurs , blanches , bleues , violettes & jaunes , pourpres , écarlates , marbrées , tachetées , jaspées. Les doubles sont les plus recherchées ; elles viennent de graine , excepté la jaune. On la sème sur couche au mois de Mars & à claire voie : on couvre les plants pendant les froids ; elles commencent à marquer à la fin de Septembre : on met celles qu'on a remarqué être doubles , dans des pots ou des caisses remplies moitié de terreau , moitié de terre à potager , pour les garantir du froid pendant l'hiver ; ensuite on peut les transporter dans les plattes bandes d'un parterre : on peut aussi les semer en pleine terre. Les giroflées doubles & simples se multiplient par marcottes : on en choisit les plus beaux brins qu'on couche en terre en les y assujettissant avec de petits crochets de bois : on les arrose pour faciliter la reprise , & on les plante en plattes bandes. On présume qu'une giroflée sera double (& c'est ce qu'on cherche) par son bouton gros & camard qui pointe. On marcotte la giroflée quand la fleur est passée , ce qui arrive au plus tard dans l'été.

Dans le nombre des giroflées doubles , il y en a qui sont principalement recherchées des amateurs : telle est la grande giroflée de couleur d'écarlate , nommée à Londres la *giroflée de Brompton* ; les Fleuristes l'aiment beaucoup à cause de sa grandeur & de son éclat : elle a cependant le désavantage de produire rarement plus d'un jet de fleurs. En échange la giro-

flée des Alpes , à feuilles étroites & à doubles fleurs , d'un jaune pâle , est très curieuse par le touffu de ses jets de fleurs , qui néanmoins sont étroites & d'une foible odeur. Il semble que la grande giroflée double , jaune en dedans , rougeâtre en dehors , que les Anglois nomment *the double ravenat flower* , l'emporte sur toutes par le contraste des deux couleurs opposées , la grandeur des fleurs & leur odeur admirable.

La plupart des Fleuristes prétendent que la plus sûre méthode pour multiplier les giroflées doubles , est de le faire par marcottes ou par boutures ; & cela est très vrai ; mais les giroflées doubles qui s'élevent de marcotte , sont toujours moins apparentes que celles de graine , & ne produisent jamais ni de si belles ni de si grandes fleurs : il vaut donc mieux en semer chaque année de nouvelles , & troquer en même-tems ses graines avec celles d'un autre amateur qui cultive ailleurs de semblables giroflées. Cette découverte dûe au hasard , & dont on a long-tems douté est actuellement reconnue de tout le monde.

Les fleurs du violier jaune appaisent les douleurs : elles excitent les règles & chassent le fœtus & l'arrière-faix ; on en fait une conserve dont le sucre constitue le plus grand mérite , un syrop plus vanté pour sa bonne odeur que pour ses vertus. On prétend que la graine , prise intérieurement en grande dose , facilite beaucoup l'accouchement , mais qu'aussi elle tue quelquefois le fœtus. Les Auteurs de l'*Herbier d'Embrun* disent à-peu-près la même chose du suc de cette plante , & ils avertissent prudemment qu'il ne faut le donner que dans une nécessité très pressante : on prépare une huile par l'infusion de ses fleurs , qui est fort résolutive , & qui appaise les douleurs de rhumatisme & d'hémorroïdes , étant mêlée avec un jaune d'œuf dur. En Italie , on frotte la région du pubis avec cette huile pour faciliter l'accouchement.

GIROFLIER DES MOLUQUES. Voyez GIROFLE.

GIVRE ou FRIMAT. Le givre est une sorte de gelée blanche , qui en hiver , lorsque l'air est froid & humide tout ensemble , s'attache à différens corps , aux arbres , aux herbes & aux cheveux. On ne donne proprement le nom de *gelée blanche* qu'à la rosée du matin congelée ; au lieu que le givre ne lui doit point son origine , mais à toutes les autres vapeurs aqueuses , quelles qu'elles soient , qui , réunies sur la surface de certains corps , en molécules insensibles , distinctes & fort déliées , y rencontrent un froid suffisant pour les glacer.

Le givre s'attache aux arbres en très grande quantité : il y forme souvent des glaçons pendans , qui fatiguent beaucoup les branches par leur poids , parceque les arbres attirent , avec beaucoup de force , l'humidité de l'air & des brouillards. Communément le givre est cette blancheur qui couvre la surface supérieure des feuilles ; de manière qu'elles en paroissent plus épaisses , plus pesantes , plus opaques & comme sales. Le houblon sur-tout & le melon y sont très sujets , & quantité de plantes qui croissent dans les vallons abrités. Les plantes qui sont attaquées du givre produi-

sont ordinairement des fruits mal formés, rabougris & d'une crudité défectueuse.

Les poils des animaux sont, ainsi que les végétaux, très sujets à s'humecter considérablement à l'air libre; c'est pourquoi on voit le givre s'attacher aux cheveux, au menton, aux habits des Voyageurs, aux fourrures, & aux crins des chevaux. Il est bon d'observer que dans ce cas les particules d'eau, auxquelles le givre doit son origine, ne viennent pas toutes de l'atmosphère, une partie est due aux vapeurs qui s'exhalent du corps de l'homme ou des animaux, puisque le givre s'amasse autour de la bouche & des narines en plus grande quantité que par-tout ailleurs. Dans les villes l'on a occasion de faire cette remarque sur les personnes qui viennent de la campagne.

On doit encore rapporter au *givre* cette espèce de neige qui s'attache aux murailles après de longues & fortes gelées. Les réseaux de glace qu'on observe quelquefois aux vitres des fenêtres, sont aussi une espèce particulière de givre. Voyez les articles GELÉE BLANCHE, GLACE & FROID.

GLACE, *glacies*. Est une eau terrestre, congelée, & devenue compacte, par l'action du froid, c'est-à-dire, par l'absence de la chaleur. Les phénomènes de la glace sont remarquables, & en très grand nombre; aussi ont-ils excité dans tous les tems la curiosité des Naturalistes & des Physiciens. Tous à l'envi se sont empressés de les examiner avec soin pour en reconnoître les causes: voici un court exposé de cette multitude de phénomènes.

L'eau & tous les liquides simplement aqueux se gèlent naturellement, quand la température de l'air répond au zéro, ou à un degré inférieur du thermomètre de M. de Réaumur, ce qui arrive souvent en hiver dans nos climats. Mais les liquides, sujets à se glacer, n'offrent pas tous à beaucoup près dans leur congélation les mêmes phénomènes: nous nous bornerons à considérer la glace commune, ou celle qui résulte de la congélation de l'eau; sans celle exposée aux regards curieux des Savans & aux yeux du vulgaire, on a dû l'examiner avec plus de soin & la soumettre à un plus grand nombre d'épreuves. La glace se forme d'autant plus promptement, que l'eau, qui est soumise au froid, est plus pure. Elle ne se corrompt pas facilement: on remarque que, selon le degré & la durée du froid, qui a rendu l'eau solide, la glace est d'autant plus épaisse, poreuse, transparente & pesante. La quantité d'air qui s'y trouve interposée, concourt également à donner à la glace ces qualités, ainsi que celles dont nous allons parler. Il est de fait que plus il gèle, plus la glace augmente de volume, & cependant plus elle diminue de poids; ce qui est le contraire de ce qui arrive dans les autres corps. La gelivure des arbres, les tuyaux des fontaines qui crevent, les rochers qui contiennent de l'eau & qui se fendent, sont des suites nécessaires de la dilatation & de la force expansive dont nous venons de parler. L'eau exposée près du feu, augmente de volume; tandis

que la glace y diminue. Celle-ci peut nâger & demeurer suspendue dans l'eau même, ce qui démontre son peu de pesanteur. Avant la congélation de l'eau & pendant qu'elle se gele, il en sort une grande quantité d'air en bulles plus ou moins grosses & qui viennent crever à sa surface. On distingue facilement à l'aide du microscope, celles qui sont interpolées dans la glace.

La glace a la propriété de réfléchir & de réfracter les rayons du soleil, comme feroit un morceau de cristal : quoique la glace soit un corps très solide elle est sujette à s'évaporer considérablement : elle se fond plus vite sur le cuivre que sur aucun autre métal. Elle se divise souvent dans le dégel en colonnes cannelées, irrégulières & enclavées, quoique formée en apparence par feuillets ou par couches horizontales, appliquées les une sur les autres à la surface de l'eau.

La figure de la glace dépend de la pureté de la liqueur, & des circonstances de la congélation. Lorsqu'elle se fait régulièrement, elle forme des aiguilles qui se croisent ou s'implantent les unes sur les autres, en formant des angles aigus de trente ou de soixante, ou de cent vingt degrés. *Voyez* l'Explication Physique des principaux phénomènes de la congélation de l'eau, &c. dans le Traité de la Glace de M. Mairan. Paris 1749.

Au reste, lorsque la glace est fondue, elle possède les mêmes propriétés que l'eau de pluie ou de neige. Par ce qui précède, on voit combien la *congélation* est différente de la *coagulation*, celle-ci n'étant que l'épaississement spontanée de certains liquides. *Voyez* l'article GELÉE & ceux de GRELE, NEIGE, GIVRE, FROID, GLACIERE NATURELLE, DECEL, GLACIERS. Il est bon d'observer que le mouvement translatif de l'eau apporte toujours du changement à sa congélation. On fait qu'une eau dormante, comme celle d'un étang, gele plus facilement & plus promptement que l'eau d'une rivière qui coule avec rapidité ; il est même assez rare que le milieu d'une grande rivière, & ce qu'on appelle le *fil de l'eau*, se glace de lui-même. Si une rivière se prend entièrement, c'est presque toujours par la rencontre des glaçons qu'elle charrioit, & que divers obstacles auront forcés de se réunir : ces glaçons s'entassant & s'ammoncelant les uns sur les autres ne forment jamais une glace unie comme celle d'un étang : les glaces du Spitzberg & d'Islande sont précisément dans ce cas : *voyez* MER GLACIALE. C'est à tort qu'on croit vulgairement que les rivières commencent à se geler par le fonds ; il est démontré que, comme les autres eaux, elles se gèlent toujours par la surface. Un petit vent sec est toujours le plus favorable à la formation de la glace, & la dureté en est quelquefois si grande qu'elle surpasse celle du marbre. Il paroît que la glace est d'autant plus forte pour résister à sa rupture ou à son applatissement, qu'elle est plus compacte & plus dégagée d'air, ou qu'elle a été formée par un plus grand froid & dans des pays plus froids. Les glaces du Nord sont souvent si dures qu'il est très difficile de les rompre avec le marteau : voici une

preuve bien singulière de la fermeté & de la tenacité de ces glaces Septentrionales.

Pendant le rigoureux hiver de 1740, on construisit à Petersbourg suivant les regles de la plus élégante architecture, un palais de glace de 52 pieds & demi de longueur, sur 16 pieds & demi de largeur & 20 de hauteur, sans que le poids des parties supérieures & du comble qui étoit aussi de glace, parût endommager le pied de l'édifice : la Neva rivière voisine, où la glace avoit deux à trois pieds d'épaisseur, en avoit fourni les matériaux. Pour augmenter la merveille, on plaça au devant du palais six canons de glace avec leurs affuts de la même matiere & deux mortiers à bombes dans les mêmes proportions que ceux de fonte. Ces pieces de canon étoient du calibre de celles qui portent ordinairement trois livres de poudre : on ne leur en donna cependant qu'un quarteron : on les tira, & le boulet d'une de ces pieces perça à soixante pas une planche de deux pouces d'épaisseur. Le canon dont l'épaisseur étoit au plus de quatre pouces, n'éclata point par une si forte explosion. Ce fait peut rendre croyable ce que rapporte Olaus Magnus des fortifications de glace dont il assure que les Nations Septentrionales savent faire usage dans le besoin. Un Physicien d'Angleterre, fit en 1763, où le froid fut assez considérable, une autre expérience fort curieuse ; il prit un morceau de glace circulaire de deux pieds neuf pouces de diametre & de cinq pouces d'épaisseur ; il en forma une lentille qu'il exposa au soleil & enflamma à sept pieds de distance de la poudre à canon, du papier, du linge & autres matieres combustibles.

On sent bien que la glace étant plus légère que l'eau, elle peut supporter des poids considérables, lorsqu'elle est même portée & soutenue par l'eau. Dans la grande gelée de 1683, la glace de la Tamise n'étoit que de onze pouces ; cependant on alloit dessus en carosse. On sent bien aussi qu'une glace adhérente à des corps solides, comme celle d'une rivière l'est à ses bords, doit supporter un plus grand poids que celle qui flotte sur l'eau, ou qui est rompue & fêlée en plusieurs endroits.

Des Auteurs font mention de la glace d'Islande & de celle de quelques endroits des Alpes, qui ont une odeur mauvaise, & qui brûlent dans le feu au lieu de l'éteindre ; mais ces sortes d'eaux concretes ne donnent le phénomène de l'inflammabilité, qu'à cause du bitume qu'elles contiennent.

GLACIERE NATURELLE. C'est une des curiosités que la Franche-Comté offre aux Naturalistes : c'est une espece de glacier formée par la Nature. Voyez ce qui en est dit vers la fin de l'article GROTTES.

GLACIERS ou GLACIERES. Il n'est peut-être point de spectacle plus frappant dans la Nature, que celui des glaciers de la Suisse : on en voit dans plusieurs endroits des Alpes. Leurs sommets si élevés, que quelques-uns ont, suivant Sceuchzer, deux mille brasses de hauteur perpendiculaire au-dessus du niveau de la mer, sont plongés dans une région froide, & sont perpétuellement couverts de neiges & de glaces : près de ces sommets se

trouvent des lacs ou réservoirs immenses d'eaux qui sont gelées jusqu'à une très grande profondeur ; mais qui par les vicissitudes des saisons , sont sujets à se dégeler & à se geler ensuite de nouveau ; alternatives qui produisent quantité de phénomènes des plus curieux.

De tous les *glaciers* qui se trouvent dans les Alpes , le plus remarquable est peut-être celui de Grindelwald ; on le voit à vingt lieues de Berne , près d'un village qui porte son nom. M. Altmann , dans son *Traité in-8°. sur les montagnes glacées & glaciers de la Suisse* , dit que le village de Grindelwald est situé dans une gorge de montagnes , longue & étroite ; de-là on commence déjà à appercevoir le glacier ; mais en montant plus haut sur la montagne , on découvre entièrement un des plus beaux spectacles que l'on puisse imaginer : c'est une mer de glace ou une étendue immense d'eau congelée. En suivant la pente d'une haute montagne par l'endroit où elle descend dans le vallon & forme un plan incliné , il part de ce réservoir glacé un amas prodigieux de pyramides , formant une espèce de nappe qui occupe toute la largeur du vallon , c'est-à-dire environ cinq cents pas ; ces pyramides couvrent toute la pente de la montagne : le vallon est bordé des deux côtés par deux montagnes fort élevées , couvertes de verdure & d'une forêt de sapins jusqu'à une certaine hauteur ; mais leur sommet est stérile & chauve. Cet amas de pyramides ou de montagnes de glace ressemble à une mer agitée par les vents , dont les flots auroient été subitement saisis par la gelée ; ou plutôt on voit un amphithéâtre formé par un assemblage immense de tours ou de pyramides hexagones , d'une couleur bleuâtre , dont chacune a trente ou quarante pieds de hauteur ; cela forme un coup d'œil d'une beauté merveilleuse. Rien n'est sur-tout comparable à l'effet qu'il produit lorsqu'en été le soleil vient à darder transversalement ses rayons sur ces groupes de pyramides glacées ; alors tout le glacier commence à fumer , & jette un éclat que les yeux ont peine à soutenir. C'est proprement à la partie qui va ainsi en pente en suivant l'inclinaison de la montagne , & qui forme une espèce de toit couvert de pyramides , que l'on donne le nom de *glacier* ou de *gletscher* en langue du pays.

On voit à l'endroit le plus élevé d'où le glacier commence à descendre , des cimes de montagnes perpétuellement couvertes de neige : elles sont plus hautes que toutes celles qui les environnent ; aussi peut-on les appercevoir de toutes les parties de la Suisse. Les glaçons & les neiges qui les couvrent , ne se fondent presque jamais entièrement ; cependant les annales du pays rapportent qu'en 1540 on éprouva une chaleur si excessive pendant l'été , que le glacier disparut tout-à-fait ; alors ces montagnes furent dépouillées de la croute de neige & de glace qui les couvroit , & montrèrent à nud le roc qui les compose ; mais en peu de tems toutes choses se rétablirent comme dans leur premier état.

Ces montagnes glacées qu'on voit au haut du glacier de Grindelwald , bordent de tous côtés le lac ou réservoir immense d'eau congelée qui s'y trouve. M. Altmann présume qu'il est d'une grandeur très considérable , &

qu'il peut s'étendre jusqu'à quarante lieues, en occupant la partie supérieure d'une chaîne de montagnes qui occupe une très grande place dans la Suisse. La surface de ce lac glacé paroît unie comme un miroir, à l'exception des fentes qui s'y trouvent : dans les grandes chaleurs cette surface se fond jusqu'à un certain point. Ce qui semble favoriser la conjecture de M. Altmann sur l'étendue & l'immensité de ce lac, c'est que deux des plus grands fleuves de l'Europe, le Rhin & le Rhône, prennent leurs sources aux pieds des montagnes qui font partie de son bassin, sans compter le Tessin & une infinité d'autres rivières moins considérables, & des ruisseaux. Dans le tems où ce lac est entièrement pris, les habitants du pays se hasardent quelquefois à passer par dessus pour abréger le chemin; mais cette route n'est point exempte de danger, soit par les fentes qui sont déjà faites dans la glace, soit par celles qui peuvent s'y faire d'un moment à l'autre, par les efforts de l'air qui est renfermé & comprimé au dessous de la glace : lorsque cela arrive, on entend au loin un bruit horrible; & des passagers ont dit avoir senti un mouvement qui partoît de l'intérieur du lac, fort semblable à celui des tremblements de terre : peut-être ce mouvement venoit-il aussi réellement de cette cause, attendu que les tremblements de terre, sans être trop violents, ne laissent pas que d'être assez fréquents dans ces montagnes.

La roche qui sert de bassin à ce lac, est d'un marbre noir veiné de blanc, au sommet des montagnes du Grindelwald; la partie qui descend en pente, & sur laquelle le glacier est appuyé, est d'un beau marbre varié; les eaux superflues du lac & des glaçons qui sont à la surface, sont obligées de s'écouler & de rouler successivement par le penchant qui leur est présenté : voilà, selon M. Altmann, ce qui forme le glacier, ou cet assemblage de glaces en pyramides, qui, comme on a dit, tapissent si singulièrement la pente de la montagne.

On a observé que le glacier du Grindelwald est sujet à augmentation & à diminution, quoiqu'il gagne toujours plus dans le vallon qu'il ne perd. Ce glacier est creux par dessous, & forme comme des voutes d'où sortent sans cesse deux ruisseaux; l'eau de l'un est claire, & l'autre est trouble & noirâtre, ce qui vient du terrain par où il passe : ils sont sujets à se gonfler dans de certains tems, & ils entraînent quelquefois des fragments de crystal de roche qu'ils ont détachés sur leur passage. On regarde les eaux qui viennent du glacier comme très salutaires pour la dyssenterie & plusieurs autres maladies : il est de fait que la glace de ces glaciers est beaucoup plus froide & plus difficile à fondre que la glace ordinaire; & il paroît que c'est la solidité de cette glace, sa dureté extraordinaire, & la figure hexagone des pyramides dont les glaciers sont composés, qui ont donné lieu à l'erreur de Plin & de quelques autres Naturalistes, & leur ont fait prétendre que par une longue suite d'années, la glace se changeoit en crystal de roche. M. Altmann, dans l'ouvrage que nous avons cité ci-dessus, parle encore d'un autre glacier situé en Savoie dans le Val d'Aost; il cite aussi

aussi le glacier du Grimselberg en Suisse, qui semble donner naissance à la rivière d'Aar. C'est dans les cavités des roches voisines du glacier, que l'on trouve le plus beau crystal de roche; on en a tiré une fois une colonne de crystal qui pesoit huit cents livres. Le Docteur Langhans nous a donné en 1753 la description du glacier de Siémenthal dans le canton de Berne: on y distingue des pyramides de glace, dont les unes sont hexagones, les autres pentagones, ou quadrangulaires, &c. au sommet de ces montagnes, le spectateur étonné voit une étendue immense de glace, & tout à côté un terrain couvert de verdure & de plantes aromatiques. Une autre singularité, c'est que tout auprès de ce glacier il sort de la montagne sur laquelle il est appuyé, une source d'eau chaude très ferrugineuse, qui forme un ruisseau assez considérable.

Tous ces glaciers, ainsi que les lacs d'où ils dérivent, sont remplis de fentes qui ont quelquefois quatre ou cinq pieds de largeur, & une profondeur très considérable; cela fait qu'on n'y peut point passer sans péril & sans beaucoup de précautions, attendu que souvent on n'apperçoit ces fentes que lorsqu'on a le pied dessus, & même elles sont quelquefois très difficiles à appercevoir par les neiges qui sont venues les couvrir. Cela n'empêche pas que des Chasseurs n'aillent fréquemment au haut des montagnes pour chasser les chamois & les bouquetins qui se promènent quelquefois sur les glaces par troupeaux de douze ou quinze. Il n'est pas rare que des Chasseurs se perdent dans ces fentes; & ce n'est qu'au bout de plusieurs années que l'on retrouve leurs cadavres préservés de corruption, lorsque ces glaciers, s'étendant dans les vallons, & en se fondant successivement, les laissent à découvert. Ces fentes de glaciers sont sujettes à se refermer, & il s'en forme de nouvelles en d'autres endroits; ce qui se fait avec un bruit semblable à celui du tonnerre ou d'une forte décharge d'artillerie: on entend ce bruit effrayant quelquefois jusqu'à six lieues. Outre cela les glaçons qui composent les glaciers, s'affaissent parcequ'ils sont creux par dessous; ce qui cause un grand fracas qui est encore redoublé par les échos des montagnes des environs: cela arrive sur-tout dans les changements de tems & dans les dégels; aussi les gens du pays n'ont pas besoin d'autres thermometres & barometres pour savoir le tems qu'ils ont à attendre.

L'Islande nous fournit encore des exemples de glaciers à-peu-près semblables à ceux qui viennent d'être décrits: il n'est pas surprenant que la Nature présente ce phénomène dans un pays aussi septentrional. *Voyez le Tome 13 du Magasin d'Hambourg.* Mais ce qui est digne d'admiration, c'est que les montagnes voisines des glaciers sont toutes couvertes de plantes: quand on va visiter le *gletscher* de Grindelwald en Suisse, on est étonné que les différentes expositions des montagnes voisines du Village, y font trouver dans la même saison, des fraises, des cerises, des pommes, des poires, des pêches, des prunes, des fleurs de printems & des fleurs d'automne; les plus nourissants pâturages s'étendent ici jusqu'aux som-

ments, couverts d'une glace perpétuelle. Tous ces objets forment une sorte de théâtre, dont l'aspect frappe d'admiration ceux qui ne sont pas accoutumés à ce grand spectacle. *Voyez* à la suite du mot NEIGE, l'article LAVINES; ce sont des pelottes de neige qui en roulant de ces montagnes, font des ravages des plus redoutables.

GLAIS. *Voyez* GLAYEUL.

GLAISE, *Terra pinguis*. La glaise est une terre grasse, qui tient le milieu entre l'argille, le bol, l'ochre & la marne. Les Naturalistes distinguent la glaise d'avec l'argille, en ce qu'elle ne contient que peu ou point de parties sableuses. Elle n'est point aussi grasse & aussi savonneuse que le bol; elle n'est point friable & aride comme l'ochre; elle ne fait point d'effervescence avec les acides, comme la marne; elle ressemble à une argille fine, qui seroit privée de sable. Les parties qui composent la glaise sont très ductiles, étant fort liées & tenaces: il y en a de différentes couleurs, qui varient encore pour les substances étrangères qu'elles peuvent contenir. Elles s'amolliissent dans l'eau, & ont la propriété de prendre corps, & de se durcir considérablement dans le feu; plus elles sont blanches, plus elles sont réfractaires, & plus elles conviennent dans la fabrication des porcelaines. Lorsqu'elles sont colorées, feuilletées, & douées d'une saveur styptique, elles tendent, selon les circonstances locales, à devenir ardoise, ou des schistes de différentes natures. *Voyez* les mots ARGILE & ARDOISE.

La glaise sert à faire des ouvrages de poterie & des tuiles; on l'emploie aussi pour retenir l'eau dans les canaux, les étangs & les réservoirs, & pour faire des modèles de sculpture.

Les terres absolument glaiseuses ne sont pas bonnes à favoriser la végétation des plantes: en général elles forment des terrains stériles, mais elles sont excellentes pour dégraisser les étoffes. On prétend qu'en Angleterre on se sert avec le plus grand succès du sable de mer pour fertiliser les terrains glaiseux. C'est à la propriété que la glaise a de retenir les eaux & de ne point leur donner passage, que sont dûes la plupart des sources & des fontaines que nous voyons sortir de la terre. La glaise ne se rencontre pas seulement à la surface de la terre, mais même à une très grande profondeur: on la trouve ordinairement par lits ou par couches qui varient pour l'épaisseur & les autres dimensions: on y trouve souvent beaucoup de pyrites: *voyez* les articles, ARGILLE & BOLS.

GLAITERON ou petit GLOUTERON ou petite BARDANE ou GRAPPELLES, *Xanthium*. Plante, qui croît dans les terres grasses, contre les murailles, le long des ruisseaux, dans les décombres des bâtimens, & dans les fossés dont les eaux sont tarées. Sa racine est fibreuse, blanche & annuelle: sa tige est haute d'un pied & demi, anguleuse, velue, assez rameuse, marquée de points rouges. Ses feuilles sont plus petites que celles de la Bardane, alternes, d'un verd tirant sur le jaune, velues, légèrement découpées, attachées à de longues queues, d'un goût peu âcre & aroma-

rique : ses fleurs naissent dans les aisselles des feuilles : chaque fleur est un bouquet à fleurons semblables à de petites vessies ; ces fleurons tombent facilement , & ne laissent aucune graine ; mais il naît sur le même pied , au-dessous de ces fleurs mâles ou stériles , d'autres fleurs femelles ou fertiles , qui laissent après elles de petits fruits oblongs , hérissés de piquans qui s'attachent aux habits des passans , & qui contiennent dans deux loges des semences oblongues & rougeâtres. Les fleurs de cette plante naissent en Juillet , & les semences meurent en automne.

On ne se sert , en Médecine , que de ses feuilles & de ses fruits : on tire le suc des feuilles pour guérir les écrouelles , les dartres , la gratellé & pour purifier le sang. Sa semence , infusée dans le vin blanc fait un bon remède pour débarrasser le gravier des reins.

On a encore appelé le Glaïteron *plante à jaunir* , parceque les Anciens s'en servoient pour teindre les cheveux en jaune ou blond ; cette couleur de cheveux étoit autrefois la plus estimée.

GLAMA. Nom qu'on donne à un animal ruminant & sans cornes , appelé par quelques-uns *Mouton du Pérou* ou *chameau du Pérou*. Cet animal a six pieds de longueur , sa hauteur est de quatre : il ressemble presque au chameau par la tête , le col , & par la levre supérieure , fendue & non dentée , & par la partie naturelle ; mais il n'a point de bosse : son dos est uni ; ses pieds sont fourchus , armés d'ongles pointus & épais : il a à la poitrine une espèce de bourse ou de grosseur , de laquelle il sort une espèce d'ordure. Le glama est fort doux & s'apprivoise facilement ; mais si on l'irrite , ou qu'on l'outrage , il vomit au nez de ceux qui l'insultent tout ce qu'il a mangé , ou quelque liqueur puante qu'il dégorge avec impétuosité. Cet animal est fort lubrique , il entre en amour dans le printemps & dans l'automne.

Le glama se trouve au Pérou , où il est d'un grand usage pour porter des fardeaux ; il porte ordinairement 150 livres pesant , & quelquefois 250 livres. Lorsque cet animal est fatigué , il succombe sous le fardeau , & il est impossible de le faire relever , quand même on le frapperait ou qu'on lui feroit les testicules ; ce qui est le dernier moyen dont on se sert pour le faire relever.

Les individus de ce genre d'animaux varient comme nos brebis : les uns sont blancs , d'autres noirs , d'autres bruns ou variés de toutes les couleurs. Voyez les mots , ALPAGNE , PACOS & VIGOGNE.

GLAND & GLANDÉE. Voyez aux mots , CHENE & LIEGE.

GLAND DE MER , *balanus* , seu *glans marina* , est un genre de coquillage de la classe des multivalves , & qui s'attache en forme de petit vase sur les rochers , sur les cailloux , les coquillages & sur les crustacés , même sur les plantes marines , sur les litophytes , sur les coraux , sur le dos des poissons cétaqués & sur celui de la tortue : on en trouve encore dans les fentes & sur les bois des vieux vaisseaux qui séjournent longtemps dans le port. Rarement le gland de mer est seul : on les trouve pres-

que toujours groupés en grand nombre , & unis par la même matiere qui forme la coquille.

Le gland de mer est composé d'une douzaine de pieces ou lames collées intimement ensemble : ceux qu'on trouve attachés sur les vaisseaux sont plus évasés dans leur forme & dans leur calice : les autres ont communément la bouche rétrécie : leur couleur est , ou blanche , ou rose , ou violette.

Lorsque l'animal , qui est renfermé dans cette coquille , sort de son trou pour prendre des alimens , il présente quatre battans de forme triangulaire qui sont attachés à sa bouche : ces battans forment une croix au centre , d'où il sort un panache de poils , semblable à celui des conques anatifères & des poullepieds. C'est par ces quatre battans que ce testacée ferme son ouverture , & l'ouvre dans le besoin. Ces especes de coquillages ont deux battans ferrés l'un contre l'autre , avec les bords édentés pour se joindre mieux , & des especes de charnières en dedans , avec deux croix saillantes par en bas : ces battans sont raboteux en dehors & coupés de stries qui répondent à la dentelure des côtés. Ces vers polypiers ont douze pieds , ou bras longs & crochus , garnis de poils , qu'ils levent en haut , avec huit autres plus petits , & qui sont inférieurs. Anderson dit qu'il est plaisant de les voir ouvrir de tems en tems la porte de leur habitation & allonger le col pour respirer : cette partie est formée de plusieurs anneaux élastiques & d'une infinité de valvules , qui sont sans doute les ouies , par le moyen desquels ils séparent l'air de l'eau : ils retirent leur col avec la même agilité , & referment leur porte. Leur corps est cartilagineux ; leur chair est glaireuse & mauvaise ; cependant , Macrobe , dit , que dans le festin que Lentulus donna , quand il fut reçu parmi les Prêtres du Dieu Mars , il en fit servir de blancs & de noirs. Ces sortes de coquillages multivalves sont connues des Amateurs sous les noms suivans ; savoir , le *turban* , la *tulipe* ou *clochette* , le *gland rayé* , la *côte de melon* , &c. suivant leur forme & leur couleur. Leur grosseur est peu constante ; il y en a d'aussi gros que des oranges , & d'autres qui ne sont pas plus gros qu'un grain de poivre. M. Linnæus en donne trois especes ; la premiere s'attache sur les rochers & sur les cailloux ; la seconde sur les coquilles ; la troisieme entre des planches de vaisseaux & d'autres bois. Quelques-uns mettent de ce nombre le *pou de baleine*. Voyez ce mot.

M. Anderson dit , en effet , que les glands de mer entrent bien avant dans la graisse des baleines ; ceux qu'on y a trouvés étoient habités par des vers , & fermés en dessus par une petite pellicule jaunâtre : ces sortes de coquillages ne s'attachent qu'à des poissons fort vieux , dont la peau , s'étant endurcie par le nombre des années , est devenue insensible. Ce qu'on dit ici du gland de mer , peut s'appliquer aux conques anatifères.

On trouve ce coquillage sur les côtes d'Espagne , de Bretagne , de Normandie & ailleurs.

GLAREOLA. Espece de pluvier , qui fréquente les bords des rivières ,

des étangs & des lieux marécageux. Les Cuisiniers Allemands en font grand cas : leur chair est délicate & a un peu le goût de poisson ; leur bec est menu , luisant comme de la corne , conique & étroit. Ces oiseaux ont les pieds élevés , les jambes longues ; leur corps est lisse ; ils ont le col assez long & rond , & la tête petite ; ils courent très rapidement , & volent par paires ou en troupes sur les rivages ou dans les campagnes où ils vont se reposer : jamais ils ne sont tranquilles : ils ne se cachent pas comme les bécasses : ils les suivent , & ont comme elles la queue courte. Klein en donne la notice de plusieurs especes , qu'il dit avoir eues entre les mains.

GLAUCUS. Bien des Ichthyologues donnent ce nom à trois sortes de poissons , 1^o. au *derbio* , 2^o. au *liche* , 3^o. au véritable *glaucus*.

Le *derbio* est un poisson de haute mer , & dont les nageoires sont épineuses : sa couleur est blanche , mêlée de bleu plus ou moins foncé : il a le corps long de quatre pieds , & le ventre plat ; ses écailles sont extrêmement petites ; ses mâchoires sont rudes , garnies d'aiguillons ; ses nageoires sont dorées ; sa chair est grasse & de bon goût.

Le *liche* est la *pélamide* des Languedociens : ce poisson est plus petit que le *derbio* : il a sept aiguillons sur le dos. Depuis le haut de ouies , jusqu'au milieu du corps , il y a un trait fort tortueux , qui devient ensuite droit jusqu'à la queue. Son corps est encore plus étroit que celui du *derbio* ; du reste il lui est tout semblable.

Le vrai *glaucus* a les dents fort pointues : il a la couleur du *derbio* , & la même ligne que le *liche* sur le dos : sa chair est grasse & de bon goût , mais dure. On mange beaucoup de ces poissons sur les bords de la Méditerranée. La grande especes de *glaucus* crété est un *chien de mer*. Voy. ces mots.

GLAYEUL ou GLAIS , *gladiolus major bysantinus*. Plante qui croît aux lieux herbeux , dans les prés & entre les bleds , dans les champs : on en distingue deux especes. La première ressemble beaucoup à l'iris bulbeux ; sa racine est tubéreuse , charnue & soutenue par une autre racine , sous laquelle il y a des fibres menues & blanches ; ses feuilles sont longues , étroites , pointues , dures , fortes , rayées , ayant la figure d'un glaive ou d'une épée , embrassant & renfermant la tige comme dans un fourreau ; c'est d'où lui est venu son nom latin. La tige du glayeul est haute de deux pieds ou environ , noueuse , un peu purpurine en son sommet ; où sont attachées , par ordre & seulement d'un côté , six ou sept fleurs , grandes , rougeâtres , quelquefois blanches ou bleuâtres ; chaque fleur est composée d'une feuille à six découpures , retrécie en tuyau par le bas , & évasée en haut en manière de gueule. Il succède à chaque fleur , un fruit gros comme une aveline , relevé de trois coins , & renfermant dans trois loges des semences sphériques , rougeâtres , & revêtues d'une coiffe jaune.

La seconde especes n'en differe , que parceque ses fleurs sont plus petites & dispersées sur les deux côtés de la tige.

Leurs racines sont digestives , apéritives , & propres à exciter la sup-
puration.

GLAYEUL PUANT ou ESPATULE , *xylis*. Plante qui croît par toute la France , aux lieux humides , le long des haies , entre les vignes , dans les bois taillis , dans les brossailles & dans les vallées ombrageuses ; on la cultive aussi quelquefois dans les jardins. Sa racine est bulbeuse & ronde à-peu-près comme un oignon : étant encore jeune , elle n'est que fibreuse ; mais elle grossit à mesure que la plante s'élève ; elle devient genouillée , garnie de fibres longues entrelacées , d'un goût fort âcre , comme la racine de l'iris ordinaire : elle pousse beaucoup de feuilles , longues d'un pied & demi , pointues comme un poignard ou une épée , d'un verd noirâtre & luisant , d'une odeur puante de punaise quand on les frotte ou qu'on les rompt : il s'élève d'entre ses feuilles plusieurs tiges de grosseur médiocre , droites , unies , portant chacune en leur sommet une petite fleur semblable à celle de l'iris , composée de six pétales , d'un pourpre sale , tirant sur le bleuâtre : il succède à ces fleurs , des fruits oblongs , anguleux , qui s'ouvrant dans leur maturité , laissent paroître des semences arrondies , grosses comme de petits pois , rougeâtres , d'un goût âcre ou brûlant.

Cette plante fleurit en Juillet , & ses fruits sont murs en automne. La vertu principale du glayeul puant consiste dans sa racine , qui est propre à évacuer puissamment les eaux , & à fondre les matieres tenaces qui engluent souvent les viscères.

GLETTE : nom que les Monnoyeurs donnent quelquefois à la *litharge*.
Voyez ce mot.

GLINMER : c'est ainsi que les Minéralogistes Allemands nomment la pierre talqueuse que l'on désigne communément par le nom de *mica*.
Voyez ce mot.

GLOBE. Nom qu'on donne , 1°. à la masse totale de l'eau & de la terre , *globus aut orbis terraqueus* , 2°. à la vaste étendue du ciel : de sorte que l'on dit le *globe terrestre* & le *globe céleste*. La terre est convexe par rapport au ciel : & le globe céleste , qui renferme la terre , est concave par rapport à nous. Tout le globe terrestre en général est recouvert à sa surface de plusieurs couches ou lits crevaissés de terre ou de pierre , qui en vertu de leur parallélisme , font l'office de siphons propres à rassembler l'eau , à la transmettre aux réservoirs des fontaines , & à la laisser échapper au-dehors. Plusieurs ont donné ou proposé des plans pour faire voir l'œconomie naturelle du globe terrestre : c'est ainsi que le Naturaliste décrit , range par classe & par ordre de collection , ce que le Géographe prend pour base de ses descriptions topographiques. Voyez l'article TERRE.

GLOBE DE FEU. Phénomène qui paroît quelquefois dans les airs , mais avec des variétés. C'est une boule ardente , qui pour l'ordinaire se

meut fort rapidement en l'air , & qui traîne le plus souvent une queue après elle. Lorsque ces globes viennent à se dissiper , ils laissent quelquefois dans l'air un petit nuage de couleur cendrée : ils sont souvent d'une grosseur prodigieuse. En 1686 , Kirch en vit un à Leipsik , dont le diamètre étoit aussi grand que le demi-diamètre de la lune ; il éclairoit si fort la terre pendant la nuit , qu'on auroit pû lire sans lumière ; & il disparut insensiblement. En 1676 , Manatti vit un globe lumineux qui traversa la mer Adriatique & l'Italie , cette masse de lumière fit entendre du bruit dans tous les endroits où elle passa , sur-tout à Livourne & en Corse. Balbus vit aussi un globe de feu à Boulogne en 1719 , dont le diamètre paroissoit égal à celui de la pleine lune ; sa couleur étoit comme celle du camphre ardent ; il jettoit une lumière aussi éclatante au milieu de la nuit , que celle que donne le soleil , lorsqu'il est prêt à paroître sur l'horison. On y remarquoit quatre gouffres qui vomissoient de la fumée , & l'on voyoit au-dehors de petites flammes qui reposoient dessus , & qui s'élançoient en haut. Sa queue étoit sept fois plus grande que son diamètre : il creva en faisant un bruit terrible. Celui qu'on avoit observé au Quesnoi , en 1717 , parut dans un nuage au milieu de la place publique , alla , avec l'éclat d'un coup de canon , se briser contre la tour de l'Eglise , & se répandit ensuite sur la place , comme une pluie de feu. L'instant d'après la même chose arriva encore au même lieu.

On voit quelques-uns de ces globes qui s'arrêtent dans un endroit , & d'autres qui se meuvent avec une grande rapidité : ils répandent par-tout où ils passent une odeur de soufre brûlé : il y a de ces globes qui ne font point de bruit , & d'autres en font. On a plusieurs observations de globes de feu , tombés avec bruit dans le tems qu'il faisoit des éclairs , accompagnés de tonnerre ; & souvent ces globes ont causé de grands dommages. Ces phénomènes paroissent , ainsi que ceux du tonnerre , tenir à ceux de l'Electricité. *Voyez* TONNERRE.

GLOBOSITES ou CONQUES SPHÉRIQUES ou TONNITES , *globosita*. Les Conchyologues donnent ce nom à des coquilles univalves , globuleuses , presque sans volutes , & ordinairement sphériques comme de petits tonneaux. La bouche en est large , quelquefois dentée , d'autrefois éventée , c'est-à-dire , que leur opercule laisse quelquefois une petite ouverture. Le sommet a un nœud ou mamelon , qui se trouve assez souvent dans l'endroit où se terminent les spirales. Le *fût* est souvent lisse , quelquefois ridé ou strié ; d'autrefois le corps est garni de côtes : on trouve toutes ces particularités dans celles que l'on appelle la *Couronne d'Ethiopie* , la *Harpe* , la *Bulle d'eau* , &c.

On rencontre plusieurs de ces coquilles devenues fossiles , fort peu de pétrifiées ; on en trouve plus communément les noyaux. M. d'Argenville fait de ces coquilles un genre , sous le nom de *tonnes* ; & M. Adanson les a rangées sous le nom générique de *pourpres*. *Voyez ces mots.*

GLOBULAIRE ou **BOULETTE**. Ce nom se donne à deux sortes de plantes : la première est le *globularia vulgaris* de Tournefort. Elle est haute d'un pied. Ses feuilles ressemblent à celles du *bellis carulea*. Ses fleurs sont à fleurons, bleues, disposées en globe : la deuxième espèce qui est la plus curieuse, est le **TURBITH BLANC** ou le **SENNÉ DES PROVENÇAUX**, *alypum*, aut *frutex terribilis* de J. Bauhin. C'est un petit arbrisseau fort agréable à voir dans le tems de la fleur. Il croît à la hauteur d'une coudée en Provence & en Languedoc, dans les lieux voisins de la mer : on en trouve beaucoup auprès de Montpellier & principalement sur le mont de Cette. On n'a point encore pu parvenir à le naturaliser dans nos jardins : voici la description de ce petit arbuste. Sa racine est fibreuse, grosse comme le pouce & longue de quatre, couverte d'une écorce noirâtre : ses branches déliées & cassantes, sont couvertes d'une pellicule rougeâtre. Ses feuilles sont placées sans ordre, tantôt par bouquet, tantôt isolées, ayant quelque ressemblance à celles du myrthe. Chaque branche porte pour l'ordinaire une seule fleur à demi-fleuron, d'un beau violet, & d'un pouce de large. Toute cette plante a beaucoup d'amertume. Son goût est aussi désagréable que celui du lauréole, & son amertume augmente beaucoup pendant six ans. L'*alypum* est non-seulement un très violent purgatif, mais encore un émetique puissant & même dangereux. Des Charlatans d'Andalousie en ordonnoient autrefois la décoction dans les maladies vénériennes : aujourd'hui que l'on connoît la violence de ce remède, on n'en fait usage, ainsi que du *iithymale*, qu'avec grande prudence.

GLORIEUSE. Voyez **PASTENAQUE**.

GLOSSOPETRES, *glossopetra*. Nom qu'on a donné improprement par une suite d'erreurs populaires, à des dents pétrifiées ou fossiles, & qu'on croyoit être des langues de divers animaux ou de serpens, changées en pierre.

Les glossopètes, qu'on devoit nommer *odontopètes* ou *ichthyodontes*, sont des dents de plusieurs poissons marins. Leur grandeur est assez différente : on en trouve qui ont jusqu'à quatre pouces de hauteur, & qui ont appartenu à une *lamie* ou au *carcharias* ; d'autres sont celles d'un poisson de la Chine, du genre des raies. Les moins grandes, qui sont triangulaires ou en faulx, sont crenelées par les angles, avec une base fourchue : elles sont reconnues pour les dents de la mâchoire du requin ; les pointues, qui ressemblent aux dents de chien, sont reconnues pour celles de la mâchoire inférieure du même animal. Quelquefois elles sont quarrées, & appartiennent au cheval marin ; d'autrefois elles sont hémisphériques, pour lors elles sont les dents molaires du poisson nommé *grondeur* ou de la *dorade*. Voyez ces mots, celui de **CRAPAUDINE** & celui de **TURQUOISE**.

La croute des glossopètes est mince, polie & luisante, communément grisâtre ou jaunâtre, & renferme un noyau fibreux & osseux, qui est de la substance

substance des dents. On les trouve en divers pays , dans la terre ou dans des bancs de toutes sortes de pierres.

Les Lithographes ont donné à ces corps fossiles figurés , des noms tirés des choses qu'ils représentent ; c'est ainsi qu'ils ont nommé *ornithoglossum* la dent conique , qui imite la langue d'une pie , &c. Cette multitude fatigante & inutile de différens noms barbares , ne sert qu'à embrouiller l'étude de l'Histoire Naturelle ; c'est pourquoi nous les épargnerons au Lecteur.

GLOUTERON. Voyez BARDANE. Le petit glouteron est le *glaiteron* : voyez ce mot.

GLOUTON ou GOULU , *gulo*. Quadrupede qui se trouve dans les grandes forêts de la Dalékarlie , de Laponie & dans toutes les terres voisines du Nord , tant en Europe qu'en Asie. Cet animal est un peu plus long , plus haut & plus gros qu'un loup , il a la queue plus courte : sa peau est extrêmement noire & comme lustrée : cependant le poil en réfléchit une certaine blancheur luisante , comme celle des satins & damas à fleurs : aussi cette fourrure est-elle très estimée & fort chère en Suede. Les Naturels de Kamtschatka la préfèrent à celle de la zibeline & du renard noir. La chair du *glouton* est fort mauvaise , & ses ongles sont très dangereux ; comme cet animal est très vorace , on lui a donné le nom de *vautour des quadrupedes*, quoiqu'on le regarde comme une espèce de carcajou. Voyez ce mot. Le glouton déterre les cadavres comme l'hyène , les dévore & s'en remplit à l'excès. Cet animal , qui n'est pas rare à Kamtschatka se sert d'un moyen assez singulier pour tuer les daims : il grimpe sur un arbre , emportant un peu de la mousse que les daims aiment davantage ; lorsqu'un daim passe près de l'arbre , le glouton laisse tomber sa mousse ; si le daim s'arrête pour la manger , le glouton se jette sur son dos , & s'attachant fortement entre ses cornes lui déchire les yeux & lui cause des douleurs si vives que ce malheureux animal , pour se débarrasser de son cruel ennemi , va se frapper la tête contre les arbres jusqu'à ce qu'il tombe sans vie. Alors le glouton partage avec ses dents fortes & pointues la chair en morceaux qu'il cache dans la terre pour se la réserver. Le glouton tue les chevaux de la même manière sur la rivière de Lena. On peut apprivoiser cet animal & lui apprendre plusieurs tours. Voyez la *nouv. Hist. de Kamtschatka*, & l'article GOULU de ce Dictionnaire.

GLU , *viscum* , est une substance visqueuse , tenace , résineuse , que l'on tire de l'écorce du houx , de la racine de viorne , quelquefois du fruit du gui & des sebestes. On nomme la glu du houx , *glu d'Angleterre* ; celle du gui , *glu des Anciens* ; & celle des sebestes , *glu d'Alexandrie*. Voyez leur préparation & leur utilité aux mots GUI , HOUX & SEBESTES. Ce que l'on nomme *glu d'Acajou* est une gomme. Voyez au mot ACAJOU.

Comme les espèces de glu , notamment celle de houx qui passe pour la meilleure , perdent promptement leur force , & qu'elles ne peuvent servir à l'eau , on en a inventé une sorte particulière qui a la propriété de

souffrir l'eau sans dommage. Voici comme il faut la préparer : joignez à une livre de glu de houx bien lavée & bien battue , autant de graisse de volaille qu'il est nécessaire pour la rendre coulante ; ajoutez-y encore une once de fort vinaigre , demi-once d'huile & autant de térébenthine ; faites bouillir le tout quelques minutes à petit feu , en la remuant toujours : & quand vous voudrez vous en servir , rechauffez-le : enfin pour prévenir que votre glu se gèle en hiver , vous y incorporerez un peu de pétrole. Cette glu est non-seulement propre à prendre les oiseaux , mais elle sert aussi à sauver les vignes des chenilles & à garantir plusieurs plantes particulières de l'attaque des insectes : on trouve aussi une forte glu dans les branches de sureau , dans les racines de narcisses & d'hyacinthe : si l'on prend les entrailles de chenilles pourries , qu'on les mêle avec de l'eau & de l'huile , on en formera une espèce de glu tenace.

GLUTEN : mot latin que les Naturalistes ont adopté pour désigner la matière , le lien qui sert à unir les parties terreuses dont une pierre ou roche est composée , ou à joindre ensemble plusieurs pièces détachées pour ne faire plus qu'une seule masse : il est très difficile de déterminer en quoi cette matière consiste , & à quel point elle est variée : au reste chaque pierre , chaque terre , &c. donnant des produits différens , on y doit trouver des *glutens* de différente nature.

GOBE-MOUCHE , est une espèce de petit lézard des Antilles , très joli , & fort adroit à prendre les mouches & les ravets ; c'est de-là que les Européens lui ont donné ce nom ; les Caraïbes l'appellent *oulla ouna*. Il n'est guère plus gros & plus long que le doigt ; les mâles sont ordinairement verts , & les femelles grises & plus petites : on en voit qui sont ornés de toutes les plus belles couleurs. On les trouve non-seulement dans les forêts , mais encore sur les arbres des vergers & dans les maisons : ils y sont fort familiers & ne font point de mal. Rien n'est aussi patient que ce petit animal : il se tient une demi-journée entière , comme immobile , en attendant sa proie ; mais quand il la voit , il la poursuit avec tant d'avidité qu'il se précipite du haut des arbres pour la saisir. Il fait de petits œufs , gros comme des pois , qu'il couvre d'un peu de terre , les laissant éclore au soleil. Dès qu'on tue ces animaux , ils perdent aussi-tôt leur lustre , & deviennent pâles & livides. Cette espèce de gobe-mouche prend , ainsi que le caméléon , la couleur des objets auprès desquels il se trouve : il paroît vert à l'entour des feuilles des jeunes palmes ; près d'une orange , il devient jaune , &c.

GOBERGE , *gobergus*. Est la plus grande & la plus large espèce de morue de l'Océan : sa chair est dure & un peu gluante ; elle est en certains pays la nourriture des pauvres gens & des payfans. Dans quelques parages le goberge n'est qu'une espèce de *merlus* qu'on apporte de Terre-Neuve tout salé : son ventre est arqué en dehors , sa bouche est petite , mais ses yeux sont grands : ses écailles sont cendrées , il n'a point de dents. Voyez MORUE.

GOBEUR DE MOUCHES , ou BOUVIER, ou MOUCHEROLLE, *musci-capæ*. Petit oiseau, qui a le bec d'un brun roussâtre, la tête & le dos de couleur plombée, mêlée de jaune, la poitrine blanchâtre, les pattes noirâtres. Les ongles de ses doigts de derrière sont fort grands, comme dans les alouettes, & un peu courbes. On distingue plusieurs espèces de ces oiseaux : ils suivent les bœufs & les vaches, à cause des mouches qu'ils trouvent à leur suite, & dont ils sont fort avides ; ce qui leur a fait donner les noms de *bouvier*, de *moucherolle* & de *gobeur de mouches*.

GOELAND : espèce de LARE ou MOUETTE, qu'on voit dans l'Isle de Cayenne, & que les Bresilois appellent *taya-taya* : quelques-uns croient que c'est le même que le *coupeur d'eau* & le *bec en ciseau*. Quoi qu'il en soit, Ray dit que le goëland est un oiseau maritime & palmé : son bec est un peu arqué ; ses ailes sont grandes & fortes : il a les jambes basses & les pieds petits : son corps est léger, couvert d'un épais plumage : il plane dans l'air avec fracas, jette de grand cris en volant, & vit principalement de poisson : on en distingue deux espèces, qui chassent sur terre & sur mer : les plus beaux goëlands se trouvent dans les mers du Pérou & du Chili. Ces fortes d'oiseaux nichent sur la roche & pondent deux œufs riquetés de rouge & un peu plus gros que ceux de perdrix : il paroît par le récit des Voyageurs, que la famille des goëlands est plus étendue qu'on ne pense.

GOEMON ou GOUESMON. Les Marins donnent ce nom à certaines plantes, noueuses & longues, qui croissent en grande quantité dans le fond de la mer, jusqu'à une demi lieue du rivage : elles sont souvent entrelassées les unes aux autres par le mouvement des eaux, de manière à former une barrière formidable : on a vu plus d'une fois des vaisseaux arrêtés par cette raison sur la pointe du Cap de Bonne-Espérance ; aussi les Pilotes tâchent-ils d'éviter ces fortes d'écueils : d'autres fois la mer, par le mouvement de ses vagues, arrache ces plantes & les rassemble sur les côtes, où on les prend pour fumer les terres : ces plantes sont des espèces de *varec* ou de *fucus*, ou d'*algue*, ou de *sargazo*. Voyez ces mots.

GOITREUX. Nom donné à plusieurs espèces de lézards de l'Amérique.

Le premier qui se trouve au Mexique, porte une espèce de peigne, lequel s'étend sur le col, sur le dos & sur une partie de la queue : il porte aussi une espèce de sac qui lui pend de la mâchoire inférieure, & lui sert de poche pour y retenir ses aliments jusqu'au tems convenable pour en faire l'entière déglutition : ce sac, de même que les pieds, la queue, l'espèce de peigne & tout le reste du corps, est couvert de petites écailles en lozange, & qui sont d'un bleu clair nuancé de verd : le col & la tête sont marqués de taches blanchâtres ; la couleur du dos est variée de gris & de blanc pâle.

La seconde espèce de *lézard goitreux* se trouve à Saint Iago de Chili,

près du fleuve Mexo à Cadix. Le dessous de sa mâchoire inférieure est garni d'un long & gros goître, creux en dedans, & qu'il enfle prodigieusement quand il est irrité; sa tête & notamment sa mâchoire inférieure sont couvertes de grandes écailles d'un verd de mer & quelquefois tiquetées de points rouges: sa queue est cerclée de bords jaunâtres, piqués de noir; ses yeux sont grands & vifs, ses oreilles rouges & précédées de tubercules oblongs: tout le dessus du corps, les cuisses & les jambes colorés d'un verd d'herbe avec des taches de ponceau de diverses figures: ses pieds sont revêtus de grosses écailles, & se partagent en cinq doigts longs, armés d'ongles crochus; la peau de l'entre deux des cuisses est garnie de vingt tubercules ovales: la grosse queue de ce lézard, qui dans quelques-uns est fourchue, semble pousser sur le côté quelques rameaux, le bout supérieur est couvert de petites écailles, & formé d'anneaux environ jusqu'à la longueur d'un doigt, mais le bout inférieur est fort menu, & c'est de ce bout que naissent les excroissances obtuses dont nous venons de parler. La femelle ressemble au mâle pour la couleur, la figure & les taches, mais son goître est plus petit, & sa queue toute formée par anneaux ne présente aucune excroissance. Comme ces lézards varient pour la couleur, la madrûre & la figure du goître, on les désigne à l'Amérique sous différens noms tels qu'*ayamaka*, *cordyle*, *leguana* ou *iguane*, ou *jenembi*, &c. Voyez ces mots. Quelques Naturalistes ont aussi donné le nom de *goîtreux* à l'oiseau *onocrotale*. Voyez ce mot.

GOLANGO ou **GOULONGO**: espece de *daim* de la Basse-Ethiopie. Sa peau est rousâtre & tachetée de blanc: il a des cornes fort pointues, & est de la grosseur d'un mouton, il lui ressemble beaucoup pour la figure & pour le goût de la chair. Les Negres le comptent au nombre des meilleurs alimens; mais les habitans de Congo, & une partie de ceux d'Ambundos, tiennent par une tradition fort ancienne, que la chair de cet animal est une chose sacrée; de sorte qu'ils aimeroient mieux mourir, non-seulement que d'en manger, mais encore que de mettre aucuns alimens dans un vase où l'on en auroit fait cuire.

GOLPHE, *Sinus*. Nom donné à un bras ou à une étendue de mer qui s'avance dans les terres, & qui est plus grand que la *Baie*. Voyez ce mot. Les golphes d'une étendue considérable sont appelés mers. Tels sont la Méditerranée, la mer de Marmara, la mer noire, la mer rouge, la mer vermeille. Les petits golphes des Isles Françoises de l'Amérique sont appelés *cul-de-sac*. Voyez **MER**.

On distingue les golphes *propres* & *médiats*, & les golphes *impropres* & *immédiats*: les golphes propres sont séparés de l'Océan par des bornes naturelles, & n'ont de communication avec la mer à laquelle ils appartiennent, que par quelque détroit, c'est-à-dire, par une ou plusieurs ouvertures moins larges que l'intérieur du golphe. Telle est la Méditerranée, qui n'a de communication à l'Océan que par le détroit de Gibraltar; telle est la mer Baltique, qui a pour entrée les détroits du Belt & du Sond. Les

golpes impropres sont plus évasés à l'entrée, & plus ouverts du côté de la mer dont ils font partie ; tels sont les golpes de Gascogne & celui de Lyon. Le golpe immédiat est celui qui est séparé de l'Océan par un autre golpe ; soit qu'il en fasse une partie, comme le golpe de Venise ; soit qu'il forme une mer à part, resserrée dans ses propres limites que la Nature lui a marquées, comme la mer de Marmara qui communique avec l'Archipel. Le golpe médiat est celui qui communique à l'Océan, sans autre golpe entre deux, comme la mer Baltique, la mer rouge & le golpe Persique.

Les golpes sont en si grand nombre, qu'il seroit très difficile d'en donner une liste exacte. Nous exposerons seulement ceux qui sont les plus connus dans les quatre parties du monde, & dont il est mention dans l'Encyclopédie. Savoir :

1°. En Europe, les golpes de Bosnie, de Finlande, Adriatique, de Lyon, de Tarente & de Lepante.

2°. En Asie, les golpes de Perse & de Bengale.

3°. En Afrique, les golpes Arabique & d'Arguin.

4°. En Amérique, les golpes du Mexique, & ceux appelés improprement, baies d'Hudson & de Baffin.

GOMBAUT. Voyez CALALOU.

GOMME, *Gummi*. Selon M. Geofroi (Mat. Médic.), c'est un suc végétal, concret, assez transparent, & d'une saveur douceâtre, qui se dissout facilement dans l'eau, qui n'est nullement inflammable, mais qui pétille & fait du bruit dans le feu. La gomme, selon cet Auteur, est composée d'une petite portion de soufre unie avec de la terre, de l'eau & du sel ; de sorte que ces choses étant jointes ensemble, elles forment un mucilage, un corps muqueux qui est nourrissant & susceptible de la fermentation vineuse, étant étendu dans de l'eau : telles sont la *gomme adragante*, celle de *Bassora*, celle de *notre pays*, la *gomme arabique*, &c. Voyez ces mots.

On donne encore en droguerie & en pharmacie, le nom de gomme à des sucs résineux : c'est ainsi que l'on dit improprement *gomme animé*, *gomme lacque*, *gomme copale*, *gomme élémi*, *gomme caragne* ; au lieu du mot gomme, &c. il faut donc dire ici *résine animé*, &c. Voyez ces mots.

On donne aussi le nom de *gomme résine* aux substances peu ou point transparentes, qui participent tout à la fois des propriétés de la *gomme*, & de celles de la *résine* proprement dite. Voyez l'article RÉSINE.

Les gommes résines ordinaires du commerce sont, la *gomme ammoniacque*, l'*assa fœtida*, le *bdellium*, l'*euphorbe*, le *galbanum*, la *myrrhe*, l'*opopanax*, le *sagapenum* & la *jarcocolle*. Ces sucs, qui suintent naturellement, ou par incision, à travers l'écorce de certains arbres dont il est parlé dans ce Dictionnaire sous les noms qui leur sont propres, mis dans des menstrues aqueux produisent une dissolution laiteuse. Cette liqueur éclaircie par le repos, fournit un dépôt où la résine pure domine, & qu'on peut retirer par le moyen de l'esprit-de-vin. On peut dissoudre entièrement

les gommés résines avec un menstree partie aqueux & partie spiritueux, tels que l'eau-de-vie, le vin & le vinaigre : il est bon d'observer que plusieurs de ces fucs contiennent les uns plus de mucilage ou gomme, & les autres plus d'huile ou résine. Il n'est pas encore bien décidé si l'écoulement de ces fucs est une maladie de l'arbre qui les produit, ou une simple surabondance de la sève.

GOMME D'ABRICOTIER. *Voyez* GOMME DE PAYS.

GOMME D'ACAJOU. *Voyez* à l'article ACAJOU.

GOMME ADRAGANTE. *Voyez* BARBE DE RENARD.

GOMME ALOUCHI. On donne ce nom à une substance friable, grise-roussâtre, qui participe plus de la nature résineuse, que de la gommeuse. Elle découle d'un arbre appelé *fimpi* à Madagascar ; il s'en trouve aussi dans les terres Magellaniques. Les Indiens l'emploient dans leurs parfums : elle est fort rare. *Voyez* le mot CANELLE BLANCHE.

GOMME AMMONIAQUE : est une gomme résine. *Voyez* au mot AMMONIAQUE.

GOMME ANIMÉ. *Voyez* RÉSINE ANIMÉ.

GOMME ARABIQUE. *Voyez* ACACIA VÉRITABLE.

GOMME DE BASSORA, *Gummi Bassora*. On donne ce nom à une gomme d'un blanc sale, de la nature de la gomme adragante, & qu'on nous apporte, depuis quelques années, des Echelles du Levant. Cette gomme peu transparente, mais solide, est en morceaux de la grosseur du pouce : on dit que pendant les fortes chaleurs de l'été, elle découle abondamment, sans incision artificielle, d'un petit arbre épineux ; fort semblable à celui qui donne la gomme adragante.

La gomme de Bassora est adoucissante & pectorale : les Teinturiers & les Confiseurs du midi de l'Europe s'en servent pour les mêmes vues & avec le même succès, que des gommés arabique & adragante. Comme la couleur & la propriété de ces gommés sont à-peu-près les mêmes, on ne doit pas être surpris que la gomme de Bassora soit si communément mélangée avec ces deux autres gommés, sur-tout dans le tems où leur prix ordinaire éprouve quelque augmentation : tout ce qu'on en peut déduire, c'est qu'il doit se faire dans le pays une grande récolte de cette sorte de gomme.

GOMME CANCAME, *Cancamum*. Est une gomme résine très rare : elle paroît être formée d'un amas fortuit de plusieurs espèces de gommés & de résines, agglutinées les unes contre les autres : il y en a des parties qui, comme le succin, ont une couleur jaunâtre, une odeur de résine laque, & qui se liquéfient sur le feu, ou s'enflamment à la lumière d'une bougie. Une autre portion est noirâtre, impure, & se liquéfie en partie en exhalant une odeur assez suave. Une troisième & quatrième parties sont blanchâtres, jaunâtres, & se dissolvent dans l'eau. On y trouve des particules de bois ou de pierres comme enclavées. Comme la récolte du cancame ne se peut faire que quand le hasard en fait rencontrer à des Mariniers qui remontent les fleuves en Afrique & en Amérique, on en doit

présumer qu'elle provient de différentes especes d'arbres qui bordent ces rivières, & que les différents suc qui en ont exudé, sont tombés dans l'eau, & se sont accidentellement rencontrés & conglutinés ensemble avant que de se durcir. On estime fort la gomme résine cancame pour les maux de dents. Cette substance quoiqu'impure, est fort chere & très recherchée pour les Droguiers à cause de sa singularité.

GOMME CARAGNE. *Voyez* CARAGNE ou CAREGNE.

GOMME DE CEDRE. *Voyez* RÉSINE DE CEDRE.

GOMME DE CERISIER. *Voyez* GOMME DE PAYS.

GOMME CHIBOU. *Voyez* à l'article GOMMIER.

GOMME ELEMI. *Voyez* RÉSINE ELEMI.

GOMME DE FUNERAILLES ou GOMME DE MUMIE, *Gummi funerum*. C'est le nom que l'on donne quelquefois au Bitume de Judée ou Asphalte. *Voyez* ASPHALTE.

GOMME DE GAYAC. *Voyez* RÉSINE DE GAYAC *au mot* GAYAC.

GOMME DE GOMMIER. *Voyez* GOMMIER.

GOMME DE GENEVRIER. C'est la *Sandaraque* : on l'appelle aussi *Vernix*. *Voyez* GENEVRIER.

GOMME GUTTE. *Voyez* CARCAPULLI.

GOMME LACQUE. *Voyez* RÉSINE LACQUE, à l'article FOURMIS DE VISITE.

GOMME DE LIERRE. *Voyez* RÉSINE DE LIERRE, *au mot* LIERRE.

GOMME MONBAIN. Elle est jaunâtre, rougeâtre, transparente, fort agglutinante : elle découle du tronc de l'Acaja, du fruit duquel on tire une liqueur vineuse. *Voyez* ACAJA.

GOMME OLAMPI. *Voyez* RÉSINE OLAMPI.

GOMME D'OLIVIER. Elle découle de certains oliviers sauvages qui bordent la Mer Rouge : elle est astringente & détersive, sa couleur est jaune, & sa saveur un peu âcre.

GOMME OPPOPANAX. C'est une gomme résine : *Voyez* OPPOPANAX, *au mot* GRANDE BERCE.

GOMME D'OXICEDRE : *voyez* SANDARAQUE.

GOMME DE PAYS, *Gummi nostras*. On donne ce nom aux différentes gommes qui découlent d'elles-mêmes des bifurcations de plusieurs arbres, tels que le *Pommier*, le *Pêcher*, le *Prunier*, le *Cerisier*, l'*Abricotier*, l'*Olivier*, &c. *Voyez* ces mots. La gomme de pays est plus ou moins pure : d'abord blanchâtre, ensuite jaunâtre, puis rouge & brunâtre : elle a une forte d'élasticité. Les Chapeliers s'en servent dans leurs teintures.

GOMME-RÉSINE : *voyez* à l'article GOMME.

GOMME DU SÉNÉGAL, *Gummi Senegalense*. C'est la gomme qui découle de plusieurs especes d'acacias, dont les uns sont nommés *gommiers blancs*, & les autres *gommiers rouges*, parcequ'on en recueille deux sortes de gommes, la blanche & la rouge. Ce sont ces especes de gommes que l'on appelle dans le commerce *gomme d'Arabie* ou *Arabique*, ainsi nom-

mée de ce que l'on nous a apporté la première de l'Arabie heureuse , ensuite d'Egypte , &c. mais le grand commerce s'en fait aujourd'hui au Sénégal , parce que ces espèces d'acacias sont très communs dans les forêts qui avoisinent ce pays. Les Maures de l'Afrique en viennent faire la traite : c'est un objet de commerce d'autant plus important , qu'il y a peu de manufactures qui n'emploient beaucoup de gomme arabique. On choisit pour l'usage intérieur celle qui est blanche ou d'un jaune pâle , transparente , brillante ; & l'on réserve pour les autres usages celle qui est roussâtre. Les Negres se nourrissent souvent de cette gomme bouillie avec du lait.
Voyez ACACIA & GOMMIER.

GOMME SÉRAPHIQUE. C'est la gomme résine appelée *Sagapenum*. Voyez ce mot.

GOMME TACAMAQUE. C'est la résine *Tacamahaca*. Voyez TACAMAQUE.

GOMME TURIS , ou TURIQUE , ou VERMICULAIRE : voyez à l'article ACACIA VÉRITABLE.

GOMMIER , *Arbor Chibou*. C'est un grand arbre de l'Amérique , ainsi nommé à cause de la grande quantité de gomme qu'il jette : on en distingue deux espèces ; l'un se nomme *gommier blanc* , & l'autre *gommier rouge*.

Le *gommier blanc* est un des plus hauts & des plus gros arbres de nos Isles. Son bois est blanc , dur , difficile à mettre en œuvre ; on en fait des canots. Ses feuilles ressemblent à celles du laurier ; mais elles sont beaucoup plus grandes. Ses fleurs sont petites , blanches , disposées par bouquets au haut des rameaux ; son fruit est gros comme une olive , presque triangulaire , verdâtre d'abord , & ensuite brunâtre : sa chair est tendre & remplie d'une matière gluante & blanchâtre.

Le *gommier rouge* , qui croît aux lieux secs & arides dans la Guadeloupe , porte un bois également blanchâtre , mais tendre , de peu de durée , & qui se pourrit promptement. Il est revêtu d'une écorce épaisse & verdâtre , & d'une peau mince & roussâtre qui se sépare aisément : ses branches sont fort étendues , & portent en haut des feuilles disposées par touffes , ressemblant à celles du frêne , sans dentelures & d'un verd foncé : ses fleurs sont , comme les précédentes , par bouquets & blanches : il leur succède un fruit charnu , semblable à la pistache , résineux , & contenant un noyau dur.

Le P. Plumier prétend que ces gommiers ne diffèrent de nos térébinthes , que par la structure de leurs fleurs , qui ne sont pas à étamines.

Une observation très importante à faire , est que les gommiers du Sénégal ne donnent effectivement pendant l'été qu'une gomme , que l'on vend dans le commerce sous le nom de *gomme du Sénégal* ; voyez ce mot : tandis que les gommiers de l'Amérique ne distillent qu'une résine. Peut-être ces arbres gommiers n'ont-ils qu'une ressemblance apparente , & que ceux de l'Amérique devroient être plutôt nommés *Résiniers*. En effet , le
prétendu

prétendu gommier d'Amérique donne , avec ou sans incision , depuis trente jusqu'à cinquante livres d'une résine blanchâtre & gluante comme la térébenthine , qu'on nous apporte quelquefois dans des barils , enveloppée dans de grandes & larges feuilles qui naissent sur un grand arbre nommé *Cachibou* , lequel croît dans le pays : c'est d'où est venu le nom de *gomme chibou* , ou *résine cachibou*. Les Américains & les Sauvages emploient ces feuilles à plusieurs ouvrages , & principalement à garnir les paniers d'aromates , afin d'empêcher que l'air n'y pénètre : ils brûlent quelquefois cette résine au lieu d'huile. On prétend que quelques Négocians mêlent cette résine , dont l'odeur est pénétrante , dans la résine élémi , même avec la résine aimé & la tacamaque. Si la résine du gommier d'Amérique étoit une gomme , ce mélange frauduleux feroit impossible.

La résine du gommier d'Amérique est bonne pour la dysenterie & la néphrétique : on la prend intérieurement comme la térébenthine , en bolus , & au poids d'un demi gros : appliquée extérieurement , elle est nerveuse. Les feuilles du gommier de l'Amérique sont estimées vulnéraires.

GONDOLE. On donne ce nom à plusieurs espèces de coquillages du genre des *Tonnes* & de la classe des *Univalves* : voyez ces mots. M. Adanson fait un genre particulier de ce coquillage , & le place à la tête des univalves , à cause de la simplicité de sa structure.

GORDIUS. C'est un ver aquatique qui se trouve dans les lacs & dans les fontaines. Si on le coupe par morceaux , alors chaque morceau coupé conserve son mouvement , reprend , de même que le Polye , une tête , un corps & une queue , quand on le remet dans l'eau. Voyez POLYPE.

M. Linnæus , qui parle de ce ver sous le nom de *Gordius pallidus* , *caudâ capiteque nigris* , dit que les Naturalistes ont regardé ce qu'on disoit de ce ver , comme une fable si ridicule & si contraire à la Nature , qu'ils n'ont pas même fait une seule expérience pour le vérifier. Gesner , Aldrovande & Jonston ont parlé de ce ver sous le nom de *Seta* ou *Vitulus marinus*. Les Smolandois l'appellent *Onda-Betel*.

GORGE ou GOZIER , *Gula plumbea*. C'est un petit oiseau de la figure & de la grosseur de la *Gorge-rouge* : voyez ce mot. Cet oiseau a une tache jaune près des yeux , la poitrine couleur de plomb. Son col , son dos , & sa queue sont bruns , son bec est noir & ses pieds sont roux : on lui donne aussi le nom de *Véron*.

GORGE BLANCHE , *Albecula*. C'est un oiseau qui vient en Angleterre au printemps , & qui quitte ce pays en hiver : son bec est noir en partie , son plumage est presque tout blanc , particulièrement à la gorge : il fréquente les haies & les jardins , se nourrit de cerfs volans , de mouches & d'autres insectes ; il se tapit & saute de côté & d'autre dans les buissons , où il fait son nid fort près de terre : le dehors en est construit de petites tiges d'herbes & de brins de paille sèche , le milieu de joncs fins

& d'herbes molles , & le dedans de crins & de poils fins : il pond cinq œufs de couleur brune-noire , mêlée de blanc & de verd.

GORGE BLEUE, *Rubecula carulea*. Cet oiseau a la gorge bleue & le ventre rouge.

GORGE ROUGE ou ROUGE-GORGE , *Erithacus aut Rubecula*. C'est un petit oiseau facile à distinguer , à cause de sa poitrine d'un rouge-orangé. Il a le dos d'un cendré-obscur , comme les grives. Pendant l'hiver , il cherche sa nourriture dans les maisons , sans avoir peur des personnes qu'il y rencontre. Cet oiseau ne paroît que l'hiver : il se retire dans les bois pendant l'été. En Septembre , il commence à se montrer dans les villes & dans les villages , où il chante si mélodieusement , qu'on estime son ramage presque autant que celui du rossignol. Sa corpulence est un peu inférieure ; son bec est grêle , délié & noir ; sa langue est fourchue : il a le ventre blanc ; les jambes & les pieds rougeâtres ; tout le reste tire sur le cendré un peu verdâtre. On observe une ligne d'un bleu-pâle , qui sépare la couleur rouge de la cendrée sur la tête. Sa queue a deux pouces & demi de longueur ; il la tient élevée & la remue continuellement ; l'iris de ses yeux est de la couleur d'une noisette. On connoît le mâle aux mêmes marques qui font distinguer le rossignol mâle d'avec la femelle. On élève en cage le gorge-rouge , en lui donnant de la pâtée. Quand les petits sont élevés , ils mangent de tout , comme les autres oiseaux. L'âge & le pays causent de grandes variétés dans ces sortes d'oiseaux : ils font leur nid dans le printems , parmi les épines & les arbrisseaux : ils le couvrent de feuilles de chêne , & y font , d'un côté seulement , une entrée disposée en voûte. La femelle ne pond pas moins de quatre œufs , & jamais plus de cinq. Si elle sort de son nid pour aller chercher sa nourriture , elle bouche ce passage avec des feuilles. Quelquefois elle fait son nid dans des creux d'arbres , avec de la mousse , de l'herbe fauchée , & de menues broussailles. Ces oiseaux aiment beaucoup la solitude , d'où vient le proverbe qui dit :
» Deux gorges-rouges ne vivent pas sous le même arbruste «.

Unicum arbutum non alit duos erithacos.

On a donné le nom de *Gorge-rouge de rocher* au *Merle bleu*. Voyez ce mot.

Dans la Jamaïque , on trouve aussi une espèce de *Gorge-rouge* , dont le haut de la tête , le dos & les ailes sont verts ; le tour du gozier est marqué d'une tache couleur de pourpre , ou d'un rouge éclatant ; le ventre est d'un jaune-blanc ; la poitrine est verte ; les pieds sont noirs , & les ailes couleur de cerise.

Le *Gorge-rouge de l'Isle de Cayenne* , est un petit oiseau de Savane , & qui est appelé , au Brésil , *Itirana*.

GOSSAMPIN. Arbre des Indes , d'Afrique & d'Amérique , dont le fruit mûr produit une espèce de coton , connu sous le nom de *Froma-*

ger dans nos Isles Françoises. Il tire son nom des deux mots latins , *gossipium* , coton , & *pinus* , pin ; parcequ'il a quelque ressemblance avec le pin , & qu'il porte une espece de coton. Voyez FROMAGER.

GOUDRON ou GAUDRON. Voyez à l'article PIN. On donne le nom de *Goudron des Barbades* à la Pétrole d'Amérique : voyez PÉTROLE.

GOUFFRE. Nom donné à ces tournoiemens d'eau causés par l'action de deux ou de plusieurs courans opposés. L'Euripe , si fameux par la mort d'Aristote , absorbe & rejette alternativement les eaux sept fois en vingt-quatre heures. Ce gouffre est près des côtes de la Grece. Le plus grand gouffre que l'on connoisse est celui de la mer de Norwege. Voyez les articles COURANS , MER & VENTS.

GOUJON ou BOUILLEROT , *Gobius fluvialis*. C'est un petit poisson de rivage , de rocher , de riviere & d'étangs de mer , qu'on confond souvent , mais à tort , avec l'*Able*. Voyez ce mot.

On distingue plusieurs sortes de goujons : il y en a de blancs , de noirs , de jaunâtres , de grands , de petits & de moyens. Nous ne parlerons ici que du goujon de riviere , qui est le *Goiffon* du Lyonnais. C'est un poisson à nageoires molles , couvert d'écailles , & qui est connu par-tout. Il a deux petits barbillons à la bouche : il est garni d'une nageoire au dos , de deux au-dessous des ouies , & de plusieurs sous le ventre. Il vit dans la fange & l'ordure. Sa longueur ordinaire est de cinq pouces : il a la mâchoire supérieure plus longue que l'inférieure. Sa chair étant frite est assez agréable à manger.

Ruisch , dans sa Collection des Poissons d'Amboine , parle de plusieurs especes de goujons de rivières , dont les habitans de ce pays se nourrissent. On voit à Ausbourg , en Allemagne , un goujon de riviere qui a le corps plus ferré & plus pâle que le nôtre. La saison de pêcher le goujon , est depuis Novembre jusqu'en Avril. On le prend à la nasse dans les rivières , quelquefois aussi dans des filets , dont les mailles sont étroites. On peut en faire une pêche abondante en jettant dans un endroit une tête de cheval ou de bœuf , car ils s'y assemblent aussi-tôt en très grand nombre.

GOULU , *Gulo*. Animal quadrupede , qui a cinq doigts aux pieds , & que M. Brisson regarde comme l'*Hyene* des Anciens , mais que M. Linnæus met dans le genre des *Belettes*. Voyez ces mots.

Le goulou , que Scaliger appelle *Vantour quadrupede* , parcequ'il se nourrit de cadavres , est le même animal que le *Glouton*. Voyez ce mot.

Pavius , qui a autrefois fait , en présence de Jean Laët , l'anatomie d'un goulou , dit y avoir remarqué trois choses singulieres , qu'il a communiquées à Thomas Bartholin. La premiere est qu'il n'a point de cordon ombilical. La seconde est que le foie du goulou est fortement lié avec le ligament du diaphragme ; & en cela , il a rapport avec la constitution intérieure du foie de l'homme ; car dans les brutes , le foie est suspendu par un

ligament. La troisième est que l'intestin , depuis un bout jusqu'à l'autre , est de la même figure : il n'a point d'intestin cœcum , & les autres sont droits. On conserve , dans le Cabinet Royal de Dresde , deux paux de ces animaux.

GOULU. Espèce de *Cormoran apprivoisé*. Voyez ce mot.

GOULU DE MER. Espèce de mouette , oiseau qui se trouve en grand nombre au Cap de Bonne-Espérance : on en voit de verts , de gris & de noirs. Leurs plumes sont d'excellens lits. Leurs œufs sont délicats. Les mouettes ressemblent beaucoup aux canards , à l'exception du bec qui est pointu.

GOULU DE MER. Poisson anthropophage , qui se trouve au Cap de Bonne-Espérance , & l'un des plus voraces de tous les animaux aquatiques. On en distingue deux espèces. La première a jusqu'à seize pieds de longueur. Son dos est bleuâtre & son ventre blanc. L'expérience a malheureusement fait voir que sa gueule & son gozier sont si dilatables , qu'il peut avaler un homme tout entier : ses dents sont crochues, fortes & pointues ; & il en a trois rangées à chaque mâchoire. Il a deux nageoires sur le dos & quatre sous le ventre. Sa peau est dure , rude & sans écailles. Divers petits poissons s'attachent ordinairement à ses côtés. La plupart des vaisseaux qui doivent aller près de la ligne , ou la passer , se pourvoient de tout ce qui est nécessaire pour prendre ces goulus de mer. Pour cela , ils ont un gros croc de fer , qui est ordinairement attaché à une forte chaîne d'environ une douzaine de chaînons ; l'autre extrémité est liée à une corde d'une longueur considérable. L'amorce dont on se sert , est une grosse pièce de lard ou de bœuf. Dès que les Matelots découvrent ce poisson , ils lui jettent l'hameçon. Le goulou amorcé suit cet appas ; & se jetant dessus tout d'un coup , l'engloutit avec beaucoup d'avidité. Quelques Matelots le tirent à bord , tandis que d'autres sont tout prêts avec des haches pour le tuer au moment qu'il arrive sur le tillac. Sans cette précaution , il briserait & renverserait tout par les mouvemens furieux de sa tête & de sa queue.

Le goulou de mer de la seconde espèce , est plus large que le premier , mais moins long : il a six rangées de dents crenelées : la rangée d'en dehors est courbée ; la seconde est droite ; les quatre autres penchent du côté du gozier. Sa peau est rude comme une lime , & sa queue se termine en demi-lune ; d'ailleurs il ressemble en tout au grand goulou. Cette sorte d'animaux nage avec beaucoup d'ardeur , de vitesse & de force. Ils sont extrêmement voraces , & très avides de chair humaine : ils suivent volontiers & long-tems les vaisseaux. Il paraît que les goulus sont des espèces de *Chiens de mer*. Voyez ce mot.

GOUPIL : voyez RENARD.

GOURDE. Nom donné au fruit d'une plante cucurbitacée , dont la racine branchue périt toutes les années ; c'est la callebasse de France. Voyez à l'article COURGE.

GOURGANES. Espèces de petites fèves, qui sont d'une fort bonne qualité. *Voyez au mot FEVES.*

GOUSSE : se dit d'une partie de l'oignon de la plante appelée *Ail*. *Voyez ce mot, & l'article GOUSSE, dans le Tableau alphab. du mot PLANTE.*

GOUTTE DE LIN : *voyez CUSCUTE.*

GOYAVE & GOYAVIER : *voyez GUAYAVIER.*

GRABEAU. C'est, chez les Epiciers-Droguistes, les fragmens, pousfieres, criblures & autres rebuts de matieres fragiles, comme *sené, quinquina*, &c.

GRAINE, *Semen*. C'est la semence que la plupart des plantes produisent : chaque graine contient en soi le germe de la plante qui en doit naître. *Voyez ce détail à l'article PLANTE.* La fécondité des végétaux offre quelque chose de remarquable. Il y a des plantes qui portent plusieurs centaines de graines, comme le chanvre & le millet. On a compté jusqu'à 3 à 4000 graines dans un seul calice de *soleil-vosakan*, 40000 dans un épi de *typha*, espece de roseau, appelé *masse-d'eau* ; mais tout cela n'est que le produit d'un pareil nombre d'ovaires ou de fleurs : il est bien plus extraordinaire qu'un seul fruit de tabac rapporte 1000 graines ; & celui du pavot blanc, & du nénuphar blanc, appelé *volant*, 8000. Ray rapporte qu'ayant pesé & compté de la graine de tabac, il avoit trouvé que 1012 ne pesoient qu'un grain ; & qu'ayant retiré d'un seul pied de tabac six gros de graine, il avoit conclu que ce pied avoit produit plus de 360000 graines. Il estime de même qu'un seul pied de scolopendre rend annuellement plus d'un million de graines.

Il n'y a point de proportion constante entre la graine & la plante qui en provient, puisque les plus grands arbres portent souvent les plus petites graines, qui toutes contiennent une matiere farineuse, & plus huileuse que les autres parties de la plante. Le haricot & le melon ont les graines plus grosses que le platane, le saule & le figuier.

En général, les animaux qui vivent le plus, sont ceux qui portent le plus long-tems leurs petits, mais il n'en est pas de même dans les végétaux. L'orme vit long-tems, & sa graine mûrit en moins de trois mois, souvent même avant qu'il ait repris ses feuilles.

Quand on étudie les plantes, il est essentiel d'observer dans les fruits, quels sont les endroits où les graines sont attachées. Dans certains végétaux, les graines sont nues & attachées sur le réceptacle ; telles sont les labiées : dans les autres, elles sont renfermées dans une capsule, un osselet, ou une baie, & attachées aux parois de ce fruit ; comme dans les brionnes, les pavots, les cruciferes, les légumineuses, &c. ; ou à un placenta ; ou enfin à une colonne, ou à un axe vertical.

On doit recueillir exactement toutes les graines, pour savoir l'âge & la qualité de ce qu'on sème : pour cet effet, on laisse monter un peu de toutes les plantes, & on en sème les graines dans les saisons propres à chacune. Dans les jardins, on n'emploie que des graines d'un ou deux

ans au plus ; cependant celles des fèves , des melons & des pois , durent jusqu'à huit ou dix ans , lorsqu'elles ont été bien conservées.

Les graines des fleurs veulent être cueillies quand elles sont prêtes à tomber , & conservées à sec. Lorsque les tiges qui les portent commencent à jaunir , & que l'on juge que les graines sont mûres , on coupe le haut des tiges , & on laisse les graines dans les enveloppes naturelles qui les renferment ; ensuite on les expose quelque tems au soleil , afin que l'écorce en devienne plus dure : Après quoi , on les suspend au plancher dans des sacs étiquetés. Il faut excepter de cette règle les graines de giroflée & d'anémone , qu'il faut semer presque aussitôt qu'on les a cueillies.

On sème les graines sur couche , lorsque le fumier a perdu sa grande chaleur ; ou en pleine terre , dans des rayons espacés de quatre ou cinq doigts , ou dans des caisses portatives , dont le fond est percé de plusieurs trous & couvert d'un pouce de charbon de terre. On doit semer les graines à fleur de caisse , en les couvrant d'un demi doigt de terre , qu'on y laisse tomber au travers d'un crible : il faut ensuite étendre un peu de paille par-dessus , pour empêcher que l'eau des arrosements n'emporte les graines. Quelques personnes, pour hâter la germination, mettent tremper la graine de la plante pendant huit jours dans du marc ou de l'huile d'olive , puis la mettent dans de la mie de pain chaud.

Nous avons dit que le plus grand nombre des plantes porte des graines qui germent & levent étant mises en terre , & produisent , selon les circonstances , beaucoup de variation dans les générations suivantes : mais parmi les plantes qui portent des graines , il y en a qui ne les amènent jamais à une maturité parfaite , comme sont celles dont les fleurs hermaphrodites ont le pistil stérile ; & la plupart des fleurs doubles , ou triples , ou multipliées , appelées semi-doubles , qui conservent au moins une partie des étamines ou des pistils , tels que le mirthe , le grenadier , le pommier , le poirier , la mauve , l'ancolie , & quelques espèces de renoncules. Il y a encore des graines qui ne levent jamais , quoique fécondées & bien conditionnées en apparence ; comme sont celles de quelques liliacées , de quelques aristoloches , &c. D'autres n'ont jamais de graine , tels sont la plupart des byssus , les plantes qui ont les fleurs pleines , c'est-à-dire dont les étamines & les pistils sont métamorphosés en pétales , tels que la fritillaire , le lys , le narcisse , la tulipe , le colchique , la tubereuse , le safran , l'œillet , le rosier , le fraisier , le pêcher , le cerisier , le prunier , l'amandier , la capucine , la violette , la giroflée , la juliane , l'anémone , quelques espèces de renoncules , &c. Enfin dans d'autres , les graines sont plusieurs années à lever , ou du moins les plantes qu'elles produisent sont très long-tems à croître & à porter fleurs & fruits ; tels sont le tilleul , le saule , le figuier , le peuplier , la vigne , &c.

Parmi les graines qui levent , il y en a qui demandent à être semées presque aussitôt qu'elles sont mûres ; telles sont celles du café. D'autres conservent leur faculté germinative jusqu'à trente & même quarante ans ;

telles sont la plupart des légumineuses , & sur-tout la sensitive. Mais combien de plantes sont dans le cas de lever rarement ou très-difficilement , pour avoir été enfouies à une trop grande profondeur.

Les graines , dont il semble que le vent se joue , aussi bien que des feuilles , se trouvent encore dispersées çà & là , soit par les eaux courantes , soit par les animaux , soit par une force élastique qui leur est propre , en un mot , par divers artifices de la Nature , qui se sert de ces moyens pour perpétuer les landes , les forêts , & les autres plantations qu'elle a soin de faire dans tous les lieux où le terrain se trouve propre à la végétation.

On voit combien la dissémination des plantes présente de particularités remarquables. Celles que le vent emporte sont , 1°. ou aîlées , comme dans plusieurs liliacées , nombre d'ombellifères , quelques personnées , comme la linairé , le tulipier , le bouleau , les pins ; ou aigrettées , ou à crochet , ou cotonneuses & veloutées , comme le saule , le peuplier , le coton , l'anémone , la pulsatille : 2°. ou dans un calice aigretté , comme dans quelques gramens , plusieurs scabieuses , &c. Nombre d'oiseaux avalent les graines de l'avoine , du millet & d'autres espèces de gramens , de la vanille , du gui , du genievre , &c. qu'ils rendent entières , & qu'ils dispersent çà & là , même jusques sur les arbres. Quelques petits quadrupèdes , tels que l'écureuil , le hérisson , la taupe , le rat , &c. emportent & ouvrent quantité de fruits pour en manger les graines , dont ils laissent échapper quelques-unes , ce qui donne lieu à ces graines de germer. Quantité d'insectes , tels que le ver de terre , la fourmi , &c. sont dans le même cas : le cousin emporte involontairement les graines qui ont des poils en crochet , telles que le daucus. A l'égard des graines qui se dispersent d'elles-mêmes par une force élastique , on en trouve des exemples dans la plupart des fougères & des tithymales , &c. Voyez aussi ce qui est dit de la graine du *guayavier* , à l'article GUAYAVIER.

L'anatomie des graines , leur variété extrême , les voies dont la Nature se sert pour les semer , & le secret de leur végétation , seront à jamais l'objet des recherches & de l'admiration des Physiciens , & sur-tout des Observateurs microscopiques : voici quelques exemples de leur structure interne. La graine de l'angélique est une des plus odorantes ; ôtez-en la première pellicule , & vous découvrirez au microscope ce qui produit sa charmante odeur ; c'est une petite substance ambrée , couchée par filets sur toutes les cannelures de cette semence. Faites une section longitudinale à la graine de paradis , vous découvrirez en son centre un petit morceau de camphre parfait pour la saveur & la figure. La graine du grand érable présente au microscope une figure d'insecte qui a ses aîles étendues ; après avoir ôté la pellicule brune qui y est fermement attachée , on découvre une plante toute verte , & singulièrement repliée. La substance farineuse des fèves , des pois , du froment , de l'orge & autres grains , est enfermée dans de petites membranes , qui sont comme autant de pe-

tits sacs percés de trous , à travers desquels on peut voir la lumière , & qui paroissent des restes de vaisseaux coupés ; en sorte que probablement chaque particule de farine est nourrie par des vaisseaux dont on ne voit plus que des extrémités tronquées. L'huile des amandes & de toutes les graines oléagineuses , est contenue dans de petits vaisseaux , qui , vus au microscope , naissent des membranes dont ils font partie. Au reste le Lecteur trouvera un nombre infini d'autres belles choses de ce genre , recueillies & décrites exactement par le Docteur Parsons dans son ouvrage intitulé : *A microscopie theatre of seeds*. Avant de finir cet article , nous devons faire connoître une observation de M. Bradley , qui dit que les graines des arbres de forêts , &c. dégénèrent si on les sème sur le même terrain où on les a recueillies ; de sorte que pour remédier à cet inconvénient , il conseille de troquer chaque année les graines des arbres forestiers avec des Correspondans des Provinces différentes , comme cela se pratique pour les fleurs & pour les grains.

GRAINE D'AVIGNON. Fruit d'une espèce de Nerprun. *Voyez* NERPRUN.

GRAINE DE CANARIE ou ALPISTE , *Phalaris*. Plante originaire des Canaries , & qu'on cultive en Espagne , en Toscane , & dans tous les pays chauds de l'Europe. Elle pousse trois ou quatre tiges ou tuyaux , noués & hauts d'un pied & demi. Ses feuilles sont semblables à celles du blé : elle porte des épis courts , garnis de petites écailles blanchâtres , & soutenant des fleurs blanches à étamines courtes. Il succède à ces fleurs des semences de différentes couleurs , oblongues , luisantes comme le millet , & à-peu-près semblables à celles de la graine de lin. Cette semence est apéritive , & propre pour la pierre du rein & de la vessie , étant prise en poudre ou en infusion.

GRAINE D'ÉCARLATE. *Voyez* KERMÉS.

GRAINE DE GIROFLE. On ne comprend pas , sous cette dénomination le girofle même , mais l'amome , qui est la graine du girofle rond ou le piment des Anglois. *Voyez* GIROFLE & POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

GRAINE JAUNE ou GRAINETTE. C'est la graine d'Avignon. *Voyez* à l'article NERPRUN.

GRAINE DE MUSC : *voyez* AMBRETTE.

GRAINE DE PARADIS : *voyez* CARDAMOME.

GRAINE DE PERROQUET : *voyez* à l'article CARTAME.

GRAINS , *Granum*. On entend par ce mot tout ce qui sort des épis de quelque espèce qu'ils soient. On distingue les grains en gros & en menus. Les *gros grains* sont le blé & le seigle : les *menus grains* sont l'orge , l'avoine , les pois , le millet , les vesces , le maïs. On sème les gros grains en automne , & les menus au mois de Mars.

Il y a plusieurs causes principales de la destruction des grains ; savoir , 1^o. la corruption occasionnée par la fermentation ; 2^o. celle qui est produite par les insectes ou par d'autres animaux destructeurs , tels que les rats ,

rats , les fouris , dont on ne peut se préserver qu'avec de grandes précautions. Parmi les insectes , les plus communs sont les charançons , qu'on appelle en certains pays *cadelle* ; & les *teignes* ou *vers* , qui se changent en petits papillons , après s'être nourris de la farine du grain. La conservation des grains a paru un objet de la dernière importance à M. Duhamel ; il a cherché & trouvé des moyens dont nous avons donné une idée à l'article BLED : *voyez ce mot*. Nous renvoyons cependant nos Lecteurs à l'Ouvrage même de ce savant Académicien.

Dans plusieurs pays on tire une eau-de-vie des grains macérés & fermentés : on la nomme *Eau-de-vie de grain*.

GRAINS DE TILLI ou DES MOLUQUES : *voyez à l'article RICIN*.

GRAINS DE ZÉLIM : *voyez POIVRE D'ÉTHIOPIE*.

GRAIS ou GRÈS ou PIERRE DE SABLE , *Lapis arenarius*. Est une pierre vitrescente , composée de grains de fable quartzeux , plus ou moins atténués , de différentes figures , & liés ensemble d'une manière plus ou moins intime à l'aide d'un gluten particulier. Plus les grains de fables , qui constituent la masse de grais , ont été rapprochés & fortement liés entre eux , plus le grais est dur , compacte & pesant , mieux il étincelle avec le briquet , & mieux il se divise à l'aide du marteau. Le grais se trouve soit en masses ou roches informes , soit par bancs ou couches plus ou moins épaisses , & d'autant plus dures qu'elles sont plus éloignées de la surface de la terre.

Il peut y avoir du grais d'une très grande antiquité ; mais nous avons des preuves qu'il s'en forme sensiblement tous les jours. A l'inspection des grésières , & de la diversité des formes de cette pierre , on conçoit sans peine la cause ou l'origine de la pierre meulière , du grais à bâtir , &c.

Par exemple , qu'une grande quantité de fragmens de quartz grossiers soit chariée par l'eau dans une cavité où il stîle un *gluten vitreux & argileux* , & que le mélange ou l'aggrégation s'en fasse grossièrement , il en résultera bien une espèce de concrétion très dure ; mais inégale , comme vermoulue : tel est ce que les Lithologistes appellent *quartz carié* ou *pierre meulière* ou *pierre à moudre* : *voyez ces mots*.

La PIERRE A FILTRER , *Filtrum* , est communément un grais poreux , d'un tissu lâche & raboteux , composé de particules de fable grossières , arrangées de manière à donner passage aux gouttes d'eau troubles , & à les rendre limpides après leur infiltration. On trouve cette pierre dans les Isles Canaries , & sur les côtes du Mexique. (Quelques Auteurs ont cru , mais à tort , que c'étoit une concrétion tophacée ou une espèce de champignon de mer qui s'attache à des rochers). Les Japonais qui s'en servent très fréquemment , la regardent comme une éponge pétrifiée. On compte deux espèces de pierre à filtrer ; l'une est bleuâtre & comme de l'ardoise ; l'autre est grise , & ressemble à du grais grossier. Au reste il paroît que plusieurs pierres de différente nature , & surtout les grès dont on fait les meules à repasser les couteaux , ont la propriété de donner

passage à l'eau épurée au travers de leurs pores. On trouve aussi en Allemagne, aux environs d'Upsal, des pierres à filtrer, qui ressemblent beaucoup à la pierre ponce grise. Le Palais de Peters-hof en est bâti. Les pores de ces pierres ressemblent à ceux du bois rongé : on en a aussi découvert depuis quelques années en Saxe.

Quand on destine ces sortes de pierres à filtrer l'eau, afin de la dégager des saletés & ordures qu'elle peut avoir contractées, on les taille pour leur donner la forme d'un mortier ou d'un autre vase ; à l'extérieur on leur donne la figure d'un œuf par son côté le plus pointu ; on laisse en haut un rebord, qui sert à soutenir en l'air la pierre sur une bâtisse de bois quarré ; on verse l'eau dans le filtre, elle passe au travers de la pierre, & les gouttes d'eau qui se sont filtrées, viennent se réunir à la pointe de l'œuf, & tombent dans un vaisseau de terre qu'on place au dessous. Mais cette filtration est très lente, car les pores de la pierre se bouchent de plus en plus au moyen des ordures & du limon : la filtration seroit même totalement suspendue, si l'on n'avoit soin de froter de tems en tems l'intérieur du filtre avec une brosse.

Le GRAIS GROSSIER, *Lapis arenarius viarum*, est celui dont on se sert en France pour paver les rues des villes & des grands chemins, & pour faire des marches d'escaliers & d'autres ouvrages dans les endroits humides : on en trouve des carrières & des blocs considérables dans la forêt de Fontainebleau. On le divise en cubes ou d'une autre manière selon l'usage ; pour cela il suffit de frapper ou d'étonner la masse de grès avec un marteau tranchant, sur-tout dans la direction où l'on veut qu'elle se morcele : un phénomène à observer, c'est que les Ouvriers qui travaillent pendant quelques années à ce pénible ouvrage, sont bientôt atteints d'une toux fâcheuse.

Le GRAIS A BATIR, *Cos ædificialis*, est une pierre composée de sable fin & d'argille. Il y en a de différentes couleurs & de différens degrés de dureté ; ce qui la rend plus ou moins facile à être travaillée. On en trouve en Normandie près de Caen. Il y en a qui sont tendres, lorsqu'on les tire de la carrière, & qui durcissent à l'air, c'est la meilleure espèce pour les bâtimens. Ceux qui se décomposent à l'air & à la pluie, sont de mauvaise qualité. On pique le grais pour en faire des ouvrages rustiques, qui s'appellent *Ouvrages de graisserie*. La pierre de gothie est un grais à bâtir.

Le GRAIS DES REMOULEURS, *Lapis cotarius*, est une pierre dont les particules sont d'une grosseur inégale, les unes petites, d'autres grosses, mais liées assez étroitement : l'eau peut néanmoins y pénétrer un peu. On s'en sert pour faire des pierres & des meules à aiguiser avec ou sans eau. Il y en a de blanches, qui sont faciles à tailler ; on en fait des figures très durables, des mortiers, de petites meules, &c. On en trouve aussi de grises, de jaunes & de rouges ; la plus grande quantité se trouve en Suede. Il en vient aussi de Lorraine.

GRAIS DE TURQUIE OU PIERRE A FAULX, *Cos Turcica*, c'est la pierre

qui ressemble à certaines especes de *filex* ou de *saxum* : elle est d'un grain plus fin que la précédente espece. Sa couleur est grise : si elle est seche & tendre , l'acier mord dessus en cet état ; mais quand elle a été humectée avec de l'huile elle durcit considérablement , acquiert au feu , de même que les pierres argilleuses , une couleur souvent blanchâtre , ensuite se demi-vitrifie. Les Marchands Merciers de Paris , &c. font venir cette sorte de pierre d'Ingermanie , de la Lombardie ou d'Angleterre. Nous en avons trouvé une carrière le long de l'étang & près du moulin de l'Abbaye royale du Relec , entre Morlaix & Carhaix , en basse Bretagne. La forme de ces pierres imite des quarrés longs & aplatis.

Le GRAIS FEUILLETÉ , *Cos fissilis*. Les particules de ce grais sont assez tendres & égales : on s'en sert en Piedmont pour couvrir les maisons.

Indépendamment de toutes ces sortes de grais , des Auteurs en citent une espece qu'on trouve en Finlande , & dont les parties sont de différentes natures : c'est à proprement parler un gravier , peut-être un *saxum* ou pierre composée. On y reconnoît effectivement des grains de spath, de *filex*, de quartz , de mica : voyez SAXUM ou ROCHE & GRAVIER.

Quant aux grais remplis de coquilles ou d'autres corps marins , qui forment quelquefois des couches sur la surface de certains endroits de la terre , ces couches doivent probablement leur naissance à des accidens ou à des inondations particulieres , c'est-à-dire , à des récessions de l'eau de la mer : souvent la couche supérieure est molle , & le lit , qui est au-dessous , se trouve dur. Il n'est pas même rare de rencontrer au-dessous de plusieurs lits les matieres non mêlées dont la pierre est composée , & celle qui sert à en lier les grains.

En Normandie , on donne le nom de *grais à pot* à une sorte de terre argilleuse qui se trouve près de Domfront , dont on se sert pour faire des pots à beurre. En examinant cette terre fort tenace , mais fusible en quelque sorte , on trouve qu'elle n'est qu'un mélange de terre glaise fort grasse , & de sablon blanc , semblable à celui d'Etampes. Une singularité , qui mérite l'attention des Naturalistes , c'est qu'on trouve dans les trous , d'où l'on a tiré cette terre , de petits poissons que les Ouvriers pêchent & qu'ils mangent. D'où viennent ces poissons ? Il n'y a dans les environs ni étangs , ni rivière , ni aucune eau courante.

GRAISSE , *Adeps*. Des Auteurs comprennent , sous ce nom , le lard , le suif , le sain-doux ou graisse , l'huile adipeuse , celle de la moëlle , &c.

La graisse proprement dite est une substance onctueuse , de consistance plus ou moins molle , qui se trouve non-seulement dans les cavités du tissu cellulaire , sous presque toute l'étendue des tégumens de la surface du corps de l'homme & de la plupart des animaux , mais encore dans les cellules des membranes qui enveloppent les muscles , qui pénètrent dans l'interstice des fibres musculaires , dans les paquets des cellules membraneuses , dont sont couverts plusieurs viscères , tels que les reins , le cœur , les intestins , & principalement dans le tissu cellulaire des mem-

branes qui forment le méfentère, l'épiploon & fes dépendances. La graiffe eft plus abondante dans certaines parties de l'homme, que dans d'autres : il y en a beaucoup au ventre, aux fesses, aux mamelles, aux reins, &c. moins fur les mains & fur les pieds, & peu ou point fur le bord des levres : elle fert à donner de la fouplesse aux mufcles, une molesse convenable dans la peau pour favoriser le jeu des vaisseaux & des nerfs de cette partie, à faciliter la sortie des excréments & la transpiration cutanée, en confervant aux pores leur perméabilité. La graiffe qui eft renfermée dans la membrane adipeuse sous la peau, contribue à défendre le corps des injures de l'air, & fur-tout du froid. Elle fert auffi à tenir la peau tendue, égale dans fa surface pour l'arrondissement des formes dans les différentes parties où il manqueroit fans ce moyen. C'est ainfi que la graiffe contribue beaucoup à la beauté du corps, en empêchant que la peau ne fe ride, en rempliffant les vuides dans les intervalles des mufcles, où il y auroit fans elle des enfoncemens défectueux à la vûe, particulièrement à l'égard du vifage, sous la peau des joues, des tempes, où il fe trouve, dans l'embonpoint, des pelotons de graiffe qui soulèvent les tégumens & les mettent de niveau avec les parties faillantes. La même chose a lieu par rapport aux yeux dont le globe eft auffi enveloppé dans la graiffe, (excepté dans fa partie antérieure.) Cette graiffe fert à en faciliter le jeu & le mouvement de fes mufcles, &c. La graiffe eft infensible par elle-même, mais elle tient lieu de coussinet dans certaines parties, & empêche qu'elles ne foient expofées à des preffions incommodes, douloureuses, & même à des contufions, comme aux fesses, au pubis, à la plante des piés : *voyez fur cet objet les Ouvrages des Physiologiftes.*

La graiffe eft communément d'une faveur peu agréable, & même fastidieuse. Elle eft évidemment de la nature des huiles grasses; elle ne fe mêle point avec l'eau, elle y furnage, & peut fervir d'aliment à la flamme. Prife intérieurement elle fatigue l'estomac; employée comme remède, elle convient contre l'action des poisons corrolifs; appliquée extérieurement, c'est un émollient & un adouciffant. On a attribué à quelques graiffes plusieurs vertus particulieres : telles font la graiffe humaine, celles d'ours, de viperes, &c. Nous expofons les propriétés des différentes graiffes, en parlant de chaque efpece d'animal. Quelque blanches que foient les graiffes, elles jauniffent, deviennent âcres, & ranciffent au bout d'un certain tems. Il y en a qui acquierent une forte de dureté, même fans froid; tel eft le fuif. D'autres fe liquéfient, fe fondent à une chaleur affez modérée, ou produifent de l'huile; telles font les graiffes de poiffons cétaées. En général on a obfervé que la graiffe des frugivores eft affez folide, & que celle des animaux carnaciers eft très molle, &c. Enfin on trouve des graiffes dont l'odeur eft toujours pénétrante.

Pour purifier la graiffe, on la monde des membranes & vaisseaux qui s'y trouvent mêlés, on la lave pour la dépouiller de la partie gélatineuse qu'elle peut contenir; après cela on la fait cuire pour la purger de l'eau

qui y resteroit , & qui gâteroit les pommades , les savons & les onguens qui auroient pour base la graisse même.

Le VIEUX-OING est de vieille graisse de porc , ou d'autres animaux , dont on enduit les extrémités de l'essieu des voitures. Quand cette sorte de graisse s'est chargée , par le frottement , des parties de fer de l'essieu & de la garniture des roues , alors elle prend le nom de *cambouis* , espece d'onguent noirâtre si estimé par quelques-uns pour résoudre les hémorrhoïdes , étant appliqué dessus : des Charlatans ont long-tems fait un secret de ce liniment épais.

GRAISSET : nom que l'on donne à une petite *grenouille verte* qui a la faculté de monter le long des corps les plus polis.

GRAMEN ou PLANTES GRAMINÉES. C'est le nom qu'on donne aux plantes de la famille des chiendents : tels sont les joncs , les roseaux , les froments , & quantité d'autres culmiferes.

La plupart des gramens forment des herbes annuelles ou vivaces , droites ou rampantes , & plus ou moins rameuses. Il y en a qui s'élèvent jusqu'à la hauteur de trente pieds , tel est le *bambou*. Dans le plus grand nombre de ces plantes , la principale racine ressemble à une tige qui trace & qui jette des fibres de chaque nœud. Tous les *gramens* ont une ou plusieurs tiges , rondes , ramifiées & traçantes dans presque toutes , triangulaires , droites & sans ramifications. Dans quelques autres , comme la plupart des fouchets , les feuilles sont simples , alternes , entières , étroites & fort allongées. Il n'y en a qu'un petit nombre qui aient un pédicule à l'origine des feuilles ; elles forment dans leur partie inférieure , autour de la tige , une graine qui est fendue d'un côté sur toute sa longueur dans le plus grand nombre , & qui est d'une seule piece dans quelques autres. La plupart des graminées ont les fleurs hermaphrodites : celles dont les fleurs mâles se trouvent séparées des fleurs femelles , sont toujours sur le même pied. Quelques-unes de ces plantes ont , outre le calice , une enveloppe qui accompagne les fleurs ou qui les enveloppe sous la forme d'une écaille ou d'une soucoupe , diversement découpée , & d'une structure fort différente de celle des feuilles. La poussiere féminale est composée de globules jaunes , luisans , très petits. Les racines de ces plantes sont apéritives. Celles qui ont une odeur aromatique sont stomachiques , leurs grains sont farineux & très-nourrissans. L'on supplée à leur disette par les racines tubereuses de quelques-unes. En général toutes les parties des *gramens* sont saines : les bestiaux mangent les feuilles de ceux qui ne sont pas trop rudes , ni trop tranchans. On trouve des exemples de ces divers détails aux articles SOUCHET , ROSEAU , appelé *Masse d'eau* , SCHÆNANTE ou JONC ODORANT , PANIZ , CHIENDENT , SORGO , MAÏS , AVOÏNE , NARD , CANNE A SUCRE , RIZ , BLÉ , SEIGLE , &c.

GRAMMATIAS ou GRAMMITES. Des Naturalistes donnent ce nom tantôt à un jaspe , & tantôt à une agate , &c. qui sur un fond rouge , sont marqués de raies blanches. On en voit dans tous les Cabinets des Cu-

rieux, sur lesquelles on voit des lettres bien formées, ou très approchantes. Ces lettres y sont figurées, ou par des lignes en forme de veines, ou par des rebords saillans, mais toujours d'une couleur différente du fond de la pierre : quelquefois elles sont toutes en relief; tantôt elles n'effleurent que la surface, & d'autres fois elles la coupent & la pénètrent intérieurement. M. de la Faille, qui a donné un Mémoire sur les pierres figurées du pays d'Aunis, dit que les cailloux qui servent au pavé de la Rochelle sont si riches en cette bizarrerie, qu'ils lui ont en quelque sorte fourni un alphabeth lapidifique. Les lettres *A, i, l, n, u, x*, s'y distinguent particulièrement.

GRANDE BERCE ou PANACÉE, *Sphondilium majus*. Plante qui croît dans la Macédoine, dans la Béotie & dans la Phocide d'Achaïe : elle est également connue des Botanistes sous le nom de *Panax d'Héraclée*. Sa racine est longue, blanche, pleine de suc, odorante, un peu amère, & couverte d'une écorce épaisse; sa tige est haute & cotoneuse; ses feuilles ressemblent à celles du figuier, elles sont rudes au toucher, & divisées en cinq parties; ses fleurs naissent en ombelles ou parasols au sommet des branches; elles sont petites, blanches, composées chacune de cinq feuilles inégales, disposées en fleur de lys : à ces fleurs il succede des semences jointes deux à deux, applaties, larges, ovales, échancrées par le haut, rayées sur le dos, jaunâtres, d'une odeur forte, & d'une saveur piquante.

Pour tirer de cette plante la gomme résine, qui porte le nom d'*Oppopanax*, on fait une incision au bas de la tige & de la racine : alors il en découle une liqueur blanchâtre, laquelle s'épaissit & se dessèche, & prend à sa superficie, une couleur jaunâtre, quelquefois roussâtre.

L'opopanax est un suc gommo-résineux, grumeleux, gras, cependant friable, fort amer, âcre, d'une odeur de fœnugrec, d'un goût qui excite un peu les nausées. Cette gomme résine est souvent remplie d'impuretés : elle est très chère & très recherchée; on nous l'apporte d'Orient. Elle s'enflamme en partie; l'autre partie se dissout dans l'eau, mais elle la rend laiteuse. L'opopanax pris intérieurement, incise & divise les humeurs visqueuses; il dissipe les vents, & purge lentement : il convient dans les maladies du cerveau, des nerfs, même pour les obstructions & la suppression des règles : extérieurement, il amollit les tumeurs, résoud les squirrhes, les nœuds & les ganglions : c'est un des ingrédients de la grande thériaque.

GRANDE ÉCAILLE. Poisson des Antilles, qui tire son nom de ce qu'il est couvert de grandes écailles : il nage en troupe; sa longueur est de cinq à six pieds : sa chair est grasse & d'un bon goût.

GRAND GOSIER ou ONOCROTALE : voyez PÉLICAN.

GRANIT ou GRANITE, *granitum*. Le granite est composé essentiellement de petites pierres opaques comme grenelées, très dures, liées ensemble par une espèce de ciment naturel, plus ou moins fort. Ce mê-

lange qui donne des étincelles , quand on le frappe avec le briquet , fait regarder le granite comme une pierre de roche plus composée , mais moins dure que le *porphyre* : voyez ce mot.

Les granites , dont la liaison est imparfaite , ou dont le ciment est trop tendre , ne peuvent être employés aux ouvrages qui exigent que la pierre soit pleine , ou qui demandent un poli vif. Ceux dans lesquels le ciment est d'une force & d'une dureté suffisantes , sont les plus solides & les plus beaux. Les grains du granite , & la matière qui les lie , varient de couleur : on en trouve dont le fond est blanc & quartzeux ; dans d'autres il est rouge , & de nature silicée ou de spath fusible ; dans d'autres enfin il est ou verd ou jaune , & très dur. Est-il tendre & spatheux , il est farineux & calcaire ; alors il se détruit promptement , & ce n'est qu'un *faux granite*.

Si l'on considère bien les granites & leur tissu , on distingue au premier coup d'œil une sorte de ressemblance avec les marbres ; ce qui les a fait placer dans cette classe par quelques Naturalistes. Ils en diffèrent cependant essentiellement par les parties constituantes. Le marbre est une pierre calcinable ; au lieu que le granite est composé , ordinairement , de petits grains durs , de matières vitreuses , & d'un ciment mêlé de paillettes de mica , qui résistent au feu sans passer à l'état de verre. Le ciment , qui unit ces pierres vitrescentes , étant plus ou moins terreux , doit , à la longue , être en prise à l'injure des tems : c'est effectivement ce qui arrive. M. de la Condamine a remarqué , que les faces de l'éguille de Cléopâtre , subsistante encore à Alexandrie , qui sont les plus exposées aux mauvais vents , se calcinent à l'air , de façon qu'on ne peut plus rien connoître aux caractères hiéroglyphes dont elles étoient chargées. A la vérité , cette destruction n'est produite qu'après un laps de tems considérable ; & peut-être l'énormité de la masse est-elle la seule cause qui ait fait crevasser & désunir les petites masses : par ce moyen , le ciment aura été en prise aux injures de l'air , & le granite aura perdu son poli ; mais d'ailleurs , le fond de ce granite est encore excellent : il n'en est pas de même des colonnes de granite , que l'on voit dans la place de Séville ; quoique élevées depuis peu de tems , elles sont prodigieusement altérées. Cette différence vient de la nature des pierres & du ciment.

Les carrières de l'Egypte ont fourni aux Egyptiens ces morceaux de granite , d'une grandeur prodigieuse , dont les Rois ont fait construire , à l'envi , de superbes monumens , qui , après la destruction de cette Monarchie , ont servi & servent encore à l'ornement des plus riches Capitales , tant de l'Europe que de l'Egypte même. Les fameux obélisques Egyptiens que l'on voit encore à Rome sont d'un rouge violet : c'est le *granito rosso* des Italiens. La grandeur énorme de ces pierres , & la diversité de nature que paroissent avoir entr'elles les parties dont le granite est composé , a fait croire à quelques-uns que ces pierres étoient l'ouvrage de l'Art & non de la Nature : mais , nous le répétons , tout l'art des Anciens ne

consistoit à cet égard qu'à chercher ces grosses masses de granite , & à détacher les morceaux très grands dont ils faisoient leurs colonnes & leurs obélisques.

On s'est imaginé, sans fondement, qu'il n'y avoit que l'Egypte qui pût fournir du granite. La plupart des Isles de l'Archipel sont couvertes d'un granite blanc ou grisâtre, pétri naturellement avec des morceaux de talc noirâtres & brillans. M. de Tournefort en a vu à Constantinople dont le fond est isabelle, piqué de taches couleur d'acier. Le granite violet oriental, qui est marqué de rouge & de blanc, vient de l'Isle de Chypre; celui de Corse qu'on tire près de San-Bonifacio, est rouge mêlé de taches blanches; celui de Monte-Antico près de Sienne, est verd & noir; celui de l'Isle d'Elbe sur la côte de Toscane, est roussâtre; les Romains l'aimoient & en tiroient une grande quantité de cet endroit là. Le granite Psaronien est ainsi nommé de ses taches qui imitent la couleur du fanfouet. Le granite de Saxe est pourpre. On trouve en abondance dans l'Isle de Minorque, de superbe granite rouge & blanc, marqueté de noir, de blanc & de jaunâtre, dont on fait à Londres de très beaux dessus de table. L'Angleterre, l'Irlande, &c. possèdent deux sortes de granites; du noir & blanc fort dur; & du granite rouge, blanc & noir, d'une grande beauté. Enfin M. Guettard nous apprend, dans un des Mémoires de l'Académie, que plusieurs Provinces du Royaume de France pourroient nous fournir des carrieres immenses de granite, & que quelques-unes enpeuvent donner des morceaux qui ne le céderoient ni en grandeur ni en dureté, à celui qu'on tiroit autrefois de l'Egypte. Dans les Voyages pour l'Histoire Naturelle, que nous avons faits en France, avec la protection & l'aveu du Gouvernement, nous avons examiné ces mêmes carrieres de granite; & dans la comparaison que nous en avons faite à l'aide du ciseau, du briquet, & par les expériences chimiques, nous avons jugé que celui des environs d'Agey, près la montagne de Sommerfet en Bourgogne, étoit le plus beau granite du Royaume; & qu'il pouvoit, par sa dureté, sa pesanteur, sa nature, contrebalancer à tous égards celui d'Egypte. Il se trouve de même en masses de roche d'une grandeur énorme.

On trouve le même ordre dans les fossiles & les différens terrains de l'Egypte, de l'Asie & de la France. Il paroît qu'il y a, comme en France, une bande marneuse, qui ne produit que des pierres blanches à bâtir, enveloppée d'une bande schisteuse, qui contient des marbres, des granites, & toutes sortes de productions métalliques, & qui enveloppe à son tour une bande purement sablonneuse; telle est la remarque de M. Guettard.

Dans plusieurs de nos Provinces, où bâtissent les maisons, & on pave les chemins avec du granite, capable d'être employé aux ouvrages les plus recherchés. Il y a déjà quelques années qu'on en fait des chambranles, des portes, des cheminées: toutes les colonnes qui passent pour être de pierre fondue, sont de granite de France. Nos granites les plus beaux, sont ceux
des

des environs d'Agey & du Mont Dauphin, ceux des environs d'Alençon, de Limoges & de Nantes. Il s'en trouve d'assez beaux près de la source de la Dordogne. Il y en a aussi aux environs de Saint-Sever en Basse Normandie, du côté de Granville; on le nomme dans le pays *carreau de Saint-Sever* ou du *gast*, parcequ'effectivement dans la forêt du *Gast*, il s'en trouve qu'on sépare facilement en tablettes avec des coins de fer. *Voyez Hist. de l'Acad. année 1751.*

GRAPPELLES: *voyez* GLAITERON.

GRAPPE MARINE, *uva marina*. Le dessus de ce faux végétal ou zoophyte, qui est oblong & qui a une sorte de pedicule, représente une grappe de raisin en fleur: elle est longue, d'une figure informe, & tient à une queue. Les parties de dedans sont confuses: on y trouve quelquefois de petites glandes; on rencontre la grappe marine dans l'Océan: il y en a de différentes couleurs; de bleues, de violettes & de rouges. On croit y remarquer un mouvement progressif, comme dans certaines espèces de polypes. *Voyez* ZOOPHYTE.

GRASSETTE: *voyez* ORPIN.

GRASSETTE, *pinguicula*. Cette plante, curieuse & utile à connaître, se nomme aussi *herbe grasse* ou *huileuse*: elle croît sans culture dans les prés & autres lieux humides & marécageux, & sur les montagnes arrosées des eaux qui proviennent de la fonte des neiges. Quoiqu'on la rencontre aux environs de Paris, elle aime mieux les pays froids. Elle est vivace, & se multiplie de graines sans être cultivée; car on a de la peine à la faire venir dans les jardins.

Sa racine consiste en quelques fibres blanches, assez grosses, eu égard à la petitesse de la plante: elle pousse six à huit feuilles, couchées sur terre, oblongues, obtuses en leur extrémité, luisantes comme si elles étoient frottées d'huile ou de beurre, unies, sans dentelures, & d'un verd pâle. Il s'élève d'entr'elles des pédicules hauts comme la main, qui soutiennent chacun en son sommet une fleur violette, ou blanche, ou purpurine, semblable à celle de la violette, mais d'une seule pièce, coupée en deux levres, & terminée dans son fond par un long éperon. A la fleur succède un fruit ou coque enveloppée d'un calice par le bas, laquelle s'ouvre en deux quartiers, & laisse voir un bouton qui contient plusieurs semences menues & arrondies.

La grassette est vulnérable, & si consolidante, que ses feuilles, froissées entre les doigts, & appliquées sur les coupures & autres plaies récentes, les guérissent promptement. Le suc onctueux & adoucissant qu'on en exprime, sert d'un liniment merveilleux pour les gerçures des mamelles: on en fait en quelques pays un vin médicamenteux, ou un sirop qui purge assez bien les sérosités. Il y a des personnes qui jettent une poignée de ses feuilles dans un bouillon de veau, ce qui le rend laxatif & propre dans les constipations. Mais le principal usage de cette plante est extérieur: sa racine pilée & cuite en cataplasme, soulage & même

guérit les douleurs sciaticques & les hernies des enfants. Dans le Nord, on se sert de ses feuilles écrasées pour rendre les cheveux blonds. Les Payſannes, en Dannemarck, se servent du suc gras de ses feuilles, au lieu de pommade : elles en frottent leurs cheveux, dont elles forment ensuite des boucles & des tresses. Cette espece de pommade donne de la consistance à leur frisure. M. Linnæus dit qu'il y a peu de Médecins qui connoissent les vertus singulieres de cette plante, & sur-tout du suc graisseux de ses feuilles : il ajoute que les Laponnes versent par-dessus ces feuilles fraîches le lait de leurs rennes récemment trait & encore tout chaud ; après quoi, elles le laissent reposer pendant un jour ou deux, pour qu'il s'aigrisse. Cette opération lui fait acquérir plus de consistance, sans que la sérosité s'en sépare, & le rend très agréable au goût, quoiqu'il ait moins de crème. Il suffit de mettre une demi-cuillerée de ce lait caillé sur de nouveau lait, pour le faire cailler de même, & ainsi de suite, sans que le dernier soit inférieur en rien au premier ; néanmoins si on le garde trop long-tems, il se convertit en sérosité. Les Anglois Méridionaux appellent la grassette *Whytroot*, ce qui signifie *tue brebis*, parcequ'elle fait mourir les moutons qui en mangent faute d'autre nourriture.

GRATECUL, est le fruit qui succede à l'églantine, c'est-à-dire, à la fleur de l'églantier. *Voyez* au mot ROSIER SAUVAGE.

GRATERON. Nom donné au *muguet des bois* & au glouteron, dont les fruits s'accrochent aux habits des passants. *Voyez* GLAITERON & MUGUET DES BOIS. Le véritable grateron est le RIEBLE, *aparine vulgaris*. Cette plante qui vient communément dans les haies & quelquefois parmi les bleds a une racine inenue, fibreuse. Ses tiges sont quarrées, rudes au toucher, genouillées, pliantes, grimpantes, branchues & fort longues. Ses feuilles, étroites, rudes & terminées par une petite épine, sont, au nombre de cinq, six ou sept, disposées en étoile comme celles de la garance autour de chaque nœud des tiges. Ses fleurs sont petites, blanchâtres, en cloche, découpées en quatre parties, & portées sur de longs pédicules attachés aux nœuds de la tige. Aux fleurs succede un fruit, dur, cartilagineux, noirâtre, contenant deux graines creusées en leur milieu. Cette plante est apéritive & un peu sudorifique. La racine de grateron engraisse la volaille, mais elle rougit ainsi que la garance les os des animaux. *Voyez* GARANCE.

GRATIOLE, ou HERBE A PAUVRE HOMME, *gratiola*, est une plante qui croît dans les prés & dans les marais. Ses racines sont blanches, noueuses, fibreuses & rampantes. Ses tiges sont droites, également noueuses & longues de plus d'un pied. Ses feuilles naissent deux à deux, opposées : elles sont longues, étroites, crenelées en leurs bords, veinées & fort amères. Ses fleurs naissent des aisselles des feuilles en Juin & Juillet : elles sont seule à seule, attachées à des pédicules menus : elles ont la figure d'un dé à coudre ; ordinairement elles sont purpurines ; quelquefois elles sont blanches. Il leur succede une petite coque ovale, divi-

fée en deux loges , qui contiennent des semences menues , rousâtres , qui mûrissent en Août & en Septembre.

Toute cette plante est sans odeur ; mais elle a une grande amertume mêlée d'astriktion. On la place parmi les purgatifs hydragogues ; en effet, elle purge fortement la pituite épaisse : elle est vermifuge & utile contre les vieilles douleurs du coxis & les fievres invétérées : elle ne convient qu'aux personnes robustes ; car elle cause souvent à ceux qui sont foibles des superpurgations. On prescrit cette plante fraîche à la dose de demi-poignée ; ou étant sèche , à la dose d'un gros après l'avoir fait macérer dans de l'eau ou dans du vin. L'infusion de cette plante purge davantage que son suc. On a observé que si dans certains climats la gratiole fraîche est un émetique dangereux & un purgatif puissant , dans d'autres , elle est , étant séchée , sans vertu.

GRAVELLE. On donne ce nom au *calcul* & à la lie de vin qui a passé à la presse. *Voyez CALCUL & le mot VIGNE.*

GRAVIER , *faburra mixta*. Nom qu'on donne vulgairement au gros sable , qui n'est souvent qu'un amas de petits cailloux & de petites pierres , c'est-à-dire , de fragments de spath dur , de quartz , de petits éclats de silex & de paillettes talqueuses. La grosseur & la proportion des parties de ce gravier , sont assez inégales. Les graviers se trouvent dans l'anse de certains rivages de la mer , sur le bord des rivières & au pied des montagnes arrosées par des torrens ; même dans quelques endroits de la campagne , où ils sont répandus par couches qui varient infiniment pour l'étendue , la profondeur & la nature des pierres qui les composent. Mais en général , dans quelque endroit que le gravier se trouve , il semble toujours y avoir été apporté par les eaux , attendu que les pierres qu'on y remarque sont toujours plus ou moins arrondies , ce qui a dû se faire par le roulement.

On se sert du gravier le plus fin pour sabler les allées des jardins , les parterres & les bosquets : on choisit le plus gros pour donner du corps aux ciments que l'on emploie dans les grands chemins , pour les chaussées & pour la grosse maçonnerie.

Les Anglois ont un gravier d'une nature excellente & qui surpasse tous les autres en bonté ; on l'emploie aussi aux grands chemins , & on en fait des routes très unies , & beaucoup plus commodes que le pavé pour les voitures : le gravier d'Angleterre le plus estimé est celui de Black-Heath ; il est entièrement composé de petits cailloux parfaitement arrondis. Louis XIV offrit à Charles II de lui fournir assez de grais taillé pour paver la ville de Londres , à condition que ce Prince lui donnât en échange la quantité de gravier nécessaire pour sabler les jardins de Versailles ; mais cet échange n'a point eu lieu.

GRAYE. *Voyez FREUX.*

GRAVISSANTE. On donne ce nom à la chenille qui se nourrit de l'absinthe verte qui croît sur les digues de la mer. Cette espèce de chenille

est farouche, & rue de la partie postérieure du corps pour peu qu'on y touche. Lorsqu'elle mange, elle s'enveloppe dans les feuilles, de façon qu'on a de la peine à l'apercevoir; en descendant, elle se couvre adroitement la tête de la partie postérieure de son corps: elle ronge aussi les branches d'absinthe qu'elle laisse tomber à terre, & s'y enveloppe pour attendre le tems de sa métamorphose. Il sort de sa chrysalide un papillon, dont la bigarrure & les couleurs sont admirables.

GRÊBE, *colymbus major cristatus & cornutus*. Oiseau aquatique du genre des colymbes qui n'ont point de queue & dont les doigts sont bordés d'une membrane qui ne les unit pas les uns aux autres. Le grêbe a près de deux pieds de longueur depuis l'extrémité du bec jusqu'au bout des ongles: la tête est petite, les aîles & les jambes très courtes, le bec étroit, droit, pointu, & long de deux pouces: les plumes du derrière de la tête sont un peu plus longues que les autres & forment une petite crête partagée en deux pointes; le plumage supérieur de la tête, du dos & du dessous des aîles est brunâtre: le plumage du col & du ventre est d'une couleur blanche, luisante & argentée. Les côtés de la poitrine & du corps sont tiquetés de teintes fauves: les pieds sont grisâtres & ont chacun quatre doigts garnis d'ongles qui ressemblent à ceux de l'homme.

La poitrine & le ventre du grêbe sont très recherchés à cause de la belle couleur blanche & brillante des plumes, & de leur finesse. On en fait des manchons, des parements de robes & d'autres parures de femmes: on trouve beaucoup de ces oiseaux sur le lac de Geneve: c'est même de cette ville qu'on tire le plus grand nombre des peaux de grêbe & les plus belles: il en vient aussi de Suisse: il s'en trouve en Bretagne & quelquefois en d'autres Provinces de France, mais elles ne sont pas si estimées; on les appelle dans le commerce *grêbes de pays*.

GRÊLE, *grando*, est une eau de pluie, qui s'est condensée & cristallisée par le froid, en passant dans la moyenne région, avant de tomber sur la terre. La grêle est en cristaux de différentes formes & grosseurs: on en voit en petits grains, qui sont également durs, de même nature que la glace ordinaire, & presque toujours anguleux; d'autres sont, d'un côté, demi-transparents, concaves ou à noyaux; & de l'autre part, farineux, comme si c'étoit de la neige conglomerée; d'autres enfin sont en grains ou arrondis, ou coniques & pyramidaux, ou en tablettes oblongues. Quelquefois on y trouve de petites pailles enfermées. Nous disons qu'on remarque dans les grains de grêle une assez grande variété, qu'ils diffèrent par la grosseur, par la figure, par la couleur. Examinons plus particulièrement toutes ces différences.

Il est constant que la grosseur de la grêle dépend beaucoup de celle des gouttes de pluie dont elle est formée; & tous les Naturalistes ont observé que la grêle & la pluie qui tombent sur le haut des montagnes, sont toujours plus petites, toutes choses d'ailleurs égales, que celles qui tombent dans les vallées: ainsi la pluie peut être fort menue à une certaine hau-

teur de l'atmosphère & devenir toujours plus grosse à mesure qu'elle tombe, parceque plusieurs petites gouttes s'unissent en une seule: de même un grain de grêle déjà formé par un degré de froid considérable gele toutes les parties d'eau qu'il touche dans sa chute, ce qui augmente considérablement son volume & son poids. C'est par ces causes ou par quelqu'autre semblable qu'il arrive quelquefois que la grêle est d'une grosseur prodigieuse: on en a vu dont les grains étoient aussi gros que des œufs de poules & d'oie: il y a quelques années qu'il tomba dans les environs du Périgord des cristaux de grêle plus gros que le poing & qui pesoient plus d'une livre. L'*Hist. de l'Acad. des Scienc.* parle d'une grêle semblable qui ravagea le Perche en 1703; les moindres grains étoient comme des noix, les moyens comme des œufs de poule, d'autres étoient comme le poing, & pesoient cinq quarterons. Tels étoient encore les grains qui tombèrent à Vienne le 7 Juin 1722, pendant la procession du St. Sacrement.

Nicephore Caliste, *Hist. Eccl. lib. c. 36, pag. 701*, rapporte qu'après la prise de Rome par Alaric, il tomba dans plusieurs endroits des morceaux de grêle qui pesoient huit livres. En 824 il tomba près d'Autun en Bourgogne parmi la grêle, un amas de glaçons, long de seize pieds, large de sept & de l'épaisseur de deux. Le premier Mai 1723, il y eut un violent orage autour de Londres, pendant lequel il tomba des morceaux de grêle de l'épaisseur de quatre pouces: celle qui tomba à Leicester avoit cinq pouces, & tua plus de vingt personnes. A la fin d'Août 1720, il s'éleva près de Creme en Italie, un orage, pendant lequel il tomba des morceaux de grêle qui pesoient six livres. A Boulogne en Picardie, dans le fameux orage qu'on y essuya au mois d'Août 1722, la plus petite grêle qui tomba accompagnée de la foudre, pesoit une livre, & la plus forte huit: tous les habitants crurent que la Ville alloit périr; plusieurs de ces grains étoient en aiguilles ou en fourchons. On est porté à croire qu'il ne grêle que pendant le jour, cependant les grêles nocturnes du fameux orage de Bâle en 1449; du 21 Juin & du 20 Août en 1574 dans la Val-teline; du 14 Juillet 1597 à Rosthembourg; du 11 Juillet 1689 à Vienne; du 4 Juillet 1719 à Trieste; du 25 & du 29 Juillet à Nuremberg & à Geneve, & quantité d'autres, fournissent des exemples trop frappants du contraire. La plupart des glaçons de ces grêles nocturnes étoient gros comme des œufs d'autruche. On trouva près de Cartinare, trois énormes grêlons aussi gros que les plus grosses bombes.

Une chose assez constante parmi toutes les variétés de la grêle, c'est que les grains qui tombent dans le même orage, sont tous à-peu-près de même figure.

La transparence & la couleur de la grêle ne sont pas plus exemptes de variations que sa grosseur & sa figure: la chute & la vitesse de ce météore sont accompagnées de plusieurs circonstances la plupart assez connues: en cet instant le tems est communément très sombre, & lorsque la grêle est

un peu grosse , l'orage qui la donne est excité d'ordinaire par un vent assez impétueux & qui continue de souffler avec violence pendant qu'elle tombe : dans ces cas le vent n'a quelquefois aucune direction bien déterminée , & il paroît souffler indifféremment de tous les points de l'horizon. Ce qu'on remarque assez constamment , c'est qu'avant la chute de la grêle , il y a toujours du changement dans les vents. Quand il grêle , & même avant que la grêle tombe , on entend souvent un bruit dans l'air causé par le choc des grains que le vent pousse les uns contre les autres avec impétuosité. La grêle tombe seule ou mêlée avec la pluie , & dans le premier cas , la pluie la précède ou la suit. On a observé que quand la grêle est un peu considérable , elle est presque toujours accompagnée de tonnerre ; jamais le tonnerre ne gronde & n'éclate avec plus de force que dans ces grêles extraordinaires dont nous avons parlé , dont les grains sont d'une grosseur si prodigieuse ; les éclairs , les foudres , se succèdent sans interruption ; le ciel est tout en feu , l'obscurité de l'air est d'ailleurs effroyable. Quoique les orages qui donnent la grêle soient quelquefois précédés de chaleurs étouffantes , on remarque néanmoins , que pour l'ordinaire aux approches de l'orage , & plus encore après qu'il a grêlé , l'air se refroidit considérablement. La grêle est plus fréquente à la fin du printemps & pendant l'été qu'en aucun autre tems de l'année.

Communément la grêle ne conserve pas long-tems sa forme & sa solidité : elle se resout en liqueur aussitôt qu'elle est tombée sur la terre dont la température est bien opposée à celle de l'atmosphère d'où elle nous parvient. Cela n'empêche pas que les ravages qu'elle produit sur la terre ne soient très considérables , & d'autant plus affreux & plus funestes , qu'on ne sait comment les prévenir , ni comment les réparer , surtout lorsque l'orage est impétueux. Lorsque les grains de grêle sont un peu gros , ils mettent en pièces tout ce qu'ils rencontrent , ils renversent les moissons , hâchent jusqu'à la paille des bleds , détruisent sans ressource les vendanges , brisent les branches , les feuilles & les fruits des arbres , cassent les vitres des habitations , tuent les oiseaux dans l'air , écrasent ou terrassent les troupeaux qui se trouvent dans la campagne ; les hommes même en sont quelquefois blessés mortellement. On a vu des grêles , dont la qualité étoit telle , qu'elle détruiroit pour plusieurs années l'espérance de la récolte. De-là vient que des Economes intelligents arrachent les arbres trop maltraités de la grêle , & en plantent d'autres à la place. Heureusement que tous les pays ne sont pas également sujets à la grêle : les nuages qui la donnent se forment & s'arrêtent par préférence , si l'on peut s'exprimer ainsi , sur certaines contrées ; rarement ces nuages parviennent jusqu'au sommet de certaines montagnes fort élevées , mais les montagnes les rompent , & les attirent sur les vallons voisins. L'exposition à de certains vents , les bois , les étangs , les rivières qui se trouvent dans un pays doivent être considérés. Indépendamment des variétés qui naissent de la situation des lieux , il en est d'autres d'un autre genre , dont

nous sommes tous les jours les témoins ; de deux champs voisins exposés au même orage , l'un , dit M. de Ratte , sera ravagé par la grêle , l'autre sera épargné : c'est que toutes les nues dont la réunion forme l'orage sur une certaine étendue de pays , ne donnent pas de la grêle ; il grêlera fortement ici , & à quatre pas on n'aura que de la pluie. Tout ceci , dit cet Auteur , est assez connu. Nous avons vu souvent la grêle se former au-dessus d'un vallon à une hauteur fort inférieure à celle des montagnes voisines , qui jouissoient pendant ce tems-là d'une douce température. Au reste , ce n'est pas dans les seuls écrits des Physiciens , qu'il faut chercher des détails sur ces sortes de phénomènes ; les Historiens dans tous les tems ont pris soin de nous en transmettre le souvenir. Aujourd'hui lorsqu'une de ces grêles extraordinaires désole quelque contrée , les nouvelles publiques ne manquent gueres d'en faire mention : (*Voyez la Dissertation sur la nature & la formation de la grêle , par M. Moncicler qui a remporté le prix de l'Académie de Bordeaux , en 1754.*)

GRÉMIL ou HERBE AUX PERLES, *litho spermum, aut milium solis*. Plante qui vient d'elle-même en certains pays aux lieux incultes , & qu'on cultive aussi dans quelques endroits , à cause de sa semence qui est d'usage en Médecine.

Sa racine est à-peu-près grosse comme le pouce , ligneuse & fibreuse : elle pousse plusieurs tiges à la hauteur d'un pied , droites , cylindriques , rudes & branchues. Ses feuilles sont nombreuses & alternes , longues , étroites , pointues , sans queue , velues , d'un goût herbeux , d'un verd plus ou moins foncé. Ses fleurs sont portées sur des pédicules courts , qui naissent aux sommets des tiges & des rameaux , dans l'aisselle des feuilles : elles sont petites , blanches , évasées en haut , découpées en cinq parties , & contenues dans un calice oblong & velu , qui est aussi fendu en cinq quartiers. Il succede à ces fleurs des semences dures , arrondies , polies , luisantes , de la forme & de la couleur des perles.

Cette graine a un goût de farine , visqueux & un peu astringent. Néhémie Grew dit qu'elle fait effervescence avec les acides : elle passe pour un grand diurétique & un anodin très doux : elle défend les reins & la vessie de l'âcreté des urines. Prise en émulsion , elle chasse le gravier , arrête la gonorrhée , facilite l'accouchement : elle est également bonne pour la colique venteuse & la néphrétique. On substitue souvent à la graine de l'herbe aux perles celle du grémil rampant , ou celle de la larme de Job. Voyez ces mots.

GRÉMIL RAMPANT , *litho spermum minus , repens*. Sa racine est tortueuse & noire. Ses tiges sont grêles , couchées à terre & noirâtres , ainsi que ses feuilles. Ses fleurs sont bleues , & ses graines ressemblent à celles de l'Orobe. Cette espèce de grémil a les mêmes vertus que la précédente.

GRENADE & GRENADIER , *malus punica*. Il y a plusieurs espèces de grenadiers , différents par leurs fleurs , & par la saveur de leurs fruits.

On les distingue en cultivés ou domestiques , & en sauvages. Le grenadier , qui donne la grenade , est cultivé ; c'est un petit arbre , dont les branches sont menues , anguleuses , revêtues d'une écorce rougeâtre ; ses rameaux sont armés d'épines roides ; ses feuilles sont placées sans ordre , ayant quelque ressemblance à celles de l'olivier ou du grand mirte : elles sont d'une odeur forte & désagréable , lorsqu'on les froisse entre les doigts. Les fleurs sont de couleur d'écarlate , disposées en rose à cinq pétales , contenues dans un calice qui représente une espece de petit panier à fleurs ; ce calice est oblong , dur , purpurin , large par en haut , & a , en quelque maniere , la figure d'une cloche : on l'appelle *cytinus*. Aux fleurs succedent des fruits à-peu-près de la grosseur des pommes , garnis d'une couronne , un peu aplatis des deux côtés. L'écorce de ces fruits est de couleur rouge en dehors : elle est ridée , épaisse comme du cuir , dure & cassante. Le fruit est jaune intérieurement : il a une saveur acide , ou douce , ou vineuse , suivant l'espece de grenadier : il contient un grand nombre de grains , assez semblables à ceux du raisin , dans lesquels est une amande amere & un peu astringente.

Les grenadiers croissent naturellement dans les terrains secs & chauds de l'Espagne , de l'Italie , de la Provence & du Languedoc. Pour les élever dans les climats froids de la France , il faut les tenir contre les espaliers , & les mettre dans des serres pour les garantir du froid pendant l'hiver. Il est essentiel de tailler les grenadiers ; le secret consiste à rogner ou à retrancher les branches qui naissent mal placées ; on conserve celles qui sont courtes & bien nourries , & on raccourcit les branches dégarnies , afin de rendre le grenadier plus touffu : c'est ce qui en fait la beauté. On a soin de les pincer après leur première pousse de l'année , quand on voit qu'il y a quelques branches qui s'échappent. Sur cela consultez les excellents préceptes de Miller.

Les pepins , & sur-tout l'écorce des grenades , sont très astringents. On donne , dans les boutiques , à l'écorce le nom de *malicorium* , comme qui diroit cuir de pommes ; on peut en faire usage , comme de l'écorce de chêne , pour préparer les cuirs : elle change en noir la solution du vitriol qui est verte , & est propre par conséquent à faire de l'encre , ainsi que la noix de galle.

Le suc de grenade est excellent pour précipiter la bile , pour appaiser l'ardeur de la soif dans les fièvres continues : dans le Languedoc on en fait un sirop , ou une espece de limonade , en y mêlant du sucre , qu'on estime cordial & astringent & qu'on boit avec plaisir ; on fait plutôt usage en Médecine des grenades aigres , que de celles qui sont douces. La grenade aigre contient un acide agréable , qui excite l'appétit , & nettoie la bouche. On voit dans les jardins , des grenadiers à fleurs doubles en caisse , que l'on regarde comme sauvages : ils sont l'ornement des jardins , par la quantité & l'éclat de leurs fleurs qui durent long-tems , & qu'on emploie fréquemment en Médecine pour la dyssenterie , pour la diarrhée ,

diarrhée, en un mot comme incrassantes, & un peu moins astringentes que l'écorce. Les Apothicaires & les Droguistes vendent ces fleurs doubles de grenadier, sous le nom de BALAUSTES; *balauſtia*: ils les font venir du Levant. Ces arbres en caisse ne donnent tant de fleurs, que parceque leurs racines sont resserrées; en pleine terre, ils ne pousseroient que du bois.

M. Duhamel desireroit que l'on multipliât davantage, dans les Provinces Méridionales, une espèce de grenadier nain d'Amérique, afin que l'on pût enter dessus de grosses grenades douces; ce seroit, dit-il, un ornement pour les orangeries: d'ailleurs, comme ces arbres seroient moins grands que les autres, leur fruit pourroit mûrir dans les étuves.

GRÉNADILLE ou FLEUR DE LA PASSION, *granadilla*, est une belle plante étrangere qui croît en la Nouvelle-Espagne dans la Vallée appelée *Lilé*: elle est nommée *grenadille*, de ce que l'intérieur de son fruit ressemble un peu à celui de la grenade, & *fleur de la passion*, parcequ'on prétend que le dedans de sa fleur représente une partie des instruments de la passion de Jesus-Christ. Les racines de cette plante sont rampantes, nouées, fibreuses, faciles à rompre, de couleur grisâtre, & d'un goût douceâtre: elle pousse des sarments longs, grêles, rampans, d'un verd rougeâtre, jettant des tenons ou mains, qui lui servent pour s'attacher aux murailles ou aux arbres voisins, comme le lierre. Ses feuilles sont lisses, nerveuses, dentelées en leurs bords, d'une belle couleur verte, un peu semblables à celles du houblon, rangées alternativement; d'une odeur d'herbe & d'un goût un peu âcre, ayant vers la queue deux petits appendices ou oreilles fort vertes. Ses fleurs sortent pendant tout l'été des aisselles des feuilles: elles sont grandes, à plusieurs feuilles; disposées en rose, blanches, soutenues par un calice divisé en cinq parties: du milieu de cette fleur s'élève un pistil garni de cinq étamines, & qui soutient un jeune fruit surmonté de trois petits corps, qui représentent en quelque maniere des clous. Entre les feuilles & le pistil, est placée une couronne frangée: le fruit, en croissant devient charnu, ovale, presque aussi gros qu'une grenade, & de même couleur quant il est dans sa parfaite maturité, mais ne portant point de couronne: il est empreint d'une liqueur aigrette, & renferme plusieurs semences ovales, plates, chagrinées & noires.

Les Indiens & les Espagnols ouvrent ces fruits, comme on ouvre des œufs, & ils en hument le suc visqueux avec délices: ils appellent ce fruit en langage du pays, *murucuja* ou *maracoc*. Cette espèce de grenadille se trouve aussi en plusieurs lieux de Saint Domingue.

Les Jardiniers-Fleuristes s'occupent à cultiver pour la fleur un grand nombre d'espèces de grenadilles; Miller dit que l'on en connoît aujourd'hui treize espèces en Angleterre. Le P. Feuillée a aussi décrit quelques espèces de grenadilles de la Vallée de Lima, & entr'autres celle qu'il surnomme *pomifère*.

Ce que les Marchands Ebenistes appellent *grenadille de marqueterie*, est une sorte d'*ebene rouge* : voyez EBENE.

GRENAT, *granatus gemma*, est une pierre précieuse d'un rouge de gros vin, & assez transparente : on en distingue de plusieurs especes & de différentes beautés par l'intensité des couleurs, par la régularité de la forme & par d'autres propriétés.

Il y en a d'un rouge foncé ou obscur ; d'autres sont jaunâtres, violets & d'un brun foncé, tirant sur le sang de bœuf : ce caractère joint à la dureté, intéresse beaucoup de Joailliers.

Le grenat n'affecte point de figure déterminée : on en trouve de rhomboïdaux, d'octaédres, de dodecaédres, d'autres à vingt-quatre côtés : ces caractères joints à la nature des terres qui leur servent de matrices, sont les marques auxquelles les Naturalistes s'attachent par préférence. Il y a des grenats qui contiennent des particules d'or, d'autres des parties d'étain, les autres enfin du fer : ceux-ci sont les plus ordinaires ; mais tous participent peut-être de l'étain & du fer. Voyez ces mots. M. Geofroi dit que le grenat ne se décompose point dans le feu ordinaire, qu'il se fond au feu du miroir ardent en une masse vitreuse & métallique, qui contient un fer attirable à l'aimant, & qu'il ne perd point pour cela sa couleur. Si cela étoit, il seroit facile de faire un très beau grenat, en fondant ensemble une certaine quantité de petits grenats : mais l'expérience ne réussit pas. Ce troisième caractère est du ressort du Chymiste.

Le grenat n'a, ni la transparence, ni l'éclat brillant des autres pierres, à moins qu'on ne l'expose à une lumière vive : de plus il s'obscurcit avec le tems & par l'usage. Sa dureté répond à sa beauté, & tient le sixième ou le huitième rang à compter depuis le diamant : la lime a un peu de prise sur cette pierre.

Dans le commerce on distingue les grenats en deux especes principales, à raison de leur beauté, de leur éclat & de leur dureté : on les divise en grenat oriental & en grenat occidental. Le grenat oriental, le plus beau en couleur, est d'un rouge resplendissant, tirant sur le noir pourpre, & tient le milieu entre l'améthyste & le rubis : le plus haut en couleur se nomme *vermeille*, c'est le *rubini di rocca* des Italiens ; il nous vient de Syrie, (ce qui le fait nommer *grenat Syrien*.) On en apporte aussi des Royaumes de Calcut, de Cananor, de Cambaye & d'Ethiopie ; on les trouve ordinairement détachés & répandus dans la terre de certaines montagnes & dans le sable de quelques rivières ; mais on ne peut jouir de l'éclat ou du jeu de cette pierre, qu'au grand jour : car elle paroît noire à la lumière d'une bougie.

Le grenat occidental a beaucoup moins d'éclat : sa couleur tire sur celle de l'hyacinthe : tel est le grenat de Sorane : on les apporte d'Espagne, de Pyrna en Syésie, de Hongrie, de Bohême près de Prague, de S. Saphorin au Canton de Berne ; on les trouve ordinairement dans des ardoises ; dans toutes les pierres feuilletées & talqueuses, même dans la pierre à

chaux , dans le grâis & dans les pierres de roches ; quelquefois on les rencontre détachés & isolés , & alors ils sont plus durs. Il y a aussi de riches mines de grenats dans le Briscauw : on voit à Fribourg en Briscauw les moulins & machines où on les polit , & les ouvriers qui les percent pour en faire des colliers.

A l'égard des grenats d'or , ils sont noirâtres : on les trouve isolés à la surface de la terre & dans la première couche , enveloppés dans du sable & de la glaise ; les rivières & les ruisseaux découvrent ces grains , ils contiennent peu d'or. *Voyez l'article Or.*

Quelques Auteurs conseillent l'usage du grenat en poudre depuis dix grains , jusqu'à quarante-huit grains pour arrêter le cours de ventre ; mais il y a lieu de penser que l'usage intérieur de ce verre naturel est sans efficacité. Le grenat est un des *cinq fragmens précieux*. *Voyez ce mot.*

GRENOUILLE , *Rana*. Est un animal qui est aussi connu que le crapaud : il est en partie terrestre , & en partie aquatique. Il a quatre pieds , respire par les poumons , n'a qu'un ventricule dans le cœur , & est ovipare.

Il y a des différences notables entre la grenouille & le crapaud ; celui-ci a le tronc presque également ample ; les grenouilles ont le bas ventre bien fait & délié , la tête tout près de la partie antérieure du corps ou de la poitrine , des cuisses menues : leur tête est plus allongée que celle des crapauds. La grenouille , comme les chiens , se tient accroupie sur ses pattes de derrière , & le crapaud rampe communément à terre. Les grenouilles sont très vives , leur dos devient arqué & même anguleux si on les touche ou qu'on les prenne par les pattes de derrière ; les crapauds au contraire sont engourdis. Au reste les pieds de devant des uns & des autres , sont garnis de quatre doigts , ceux de derrière en ont cinq.

On distingue plusieurs espèces de grenouilles , dont les différences se peuvent prendre des variétés qui se trouvent aux parties de leur corps. Les pieds sont souvent d'une structure différente , car les uns sont garnis de plus ou moins de doigts , les autres ont des ongles , d'autres n'en ont point , & enfin d'autres ont les pieds palmés. De plus quelques grenouilles ont le tronc du corps long & menu , d'autres l'ont convexe & rond , d'autres sont couvertes d'une peau unie & sans taches , & d'autres l'ont chargée de verrues ou de grosseurs.

Les grenouilles les plus ordinaires sont , la *grenouille brune terrestre* , la *grenouille d'arbre* nommée *raine* , ou *grenouille verte* , & la *grenouille aquatique* , qui est la *grenouille vaste* ou *commune*.

La **GRENOUILLE AQUATIQUE** est un animal amphibie , très vivace , mais plus aquatique que terrestre ; son corps est long de deux pouces & demi , & large d'un pouce ; il est couvert d'une peau lisse , dure , verte en-dessus , tachetée de points plombés , & jaunâtre sur un fond blanchâtre en-dessous ; son dos est applati , son ventre ample & comme gonflé ; sa tête grosse , mais un peu applatie ; ses yeux sont grands & saillans , avec une

membrane clignotante : la bouche est grande & très fendue ; la mâchoire supérieure de cette grenouille est armée d'une rangée de petites dents, outre deux grandes dents situées aux deux côtés du palais : la langue est longue, fortement adhérente au bout de la mâchoire inférieure, & libre vers le fond du gozier, comme dans les poissons ; par ce moyen la langue lui sert à enfoncer les alimens dans le fond du gozier. Cet animal a peu de cervelle dans le crâne : il a quatre pieds, dont ceux de devant sont plus courts, terminés chacun par une espèce de main à quatre petits doigts détachés, ceux de derrière sont plus gros & fournis de cinq & même de six doigts jaunâtres & palmés : le pouce est plus long que les autres doigts. Cette grenouille n'est point dangereuse.

La GRENOUILLE VERTE AQUATIQUE vit ordinairement dans l'eau des rivières, des lacs ou des étangs : cependant elle sort aussi au bord, quand il fait un beau soleil ; mais si-tôt qu'elle entend quelque bruit, ou qu'elle apperçoit quelqu'un, elle se plonge aussi-tôt dans l'eau. Quand les mâles croassent, ils font sortir des deux coins de la bouche deux vessies blanches & rondes, qui manquent aux femelles, ce qui fait qu'au lieu de croasser, elles ne font que grogner en enflant la gorge. Cette espèce de grenouille surpasse toutes les autres en grosseur ; excepté une espèce particulière à l'Isle de Cuba. La grenouille verte croît pendant dix ans, & peut vivre jusqu'à seize ; elle s'accouple en Juin : c'est la meilleure espèce à manger. Elle est très vorace ; elle ne se nourrit pas seulement d'insectes & de toutes sortes de lézards aquatiques, elle se jette aussi sur les jeunes fourmis & sur les petits oiseaux, souvent sur les canards nouvellement éclos. Au tems de l'accouplement, les mâles croassent fortement. Le frai des femelles tombe au fond de l'eau sans y remonter. C'est l'espèce de grenouille la plus féconde en œufs, les sortes de vers qui en sortent ont besoin de cinq mois pour arriver à la forme de grenouille parfaite.

La GRENOUILLE D'ARBRE OU RAINE, *Rana arborea*, est la plus petite de toutes les grenouilles, quel qu'âge qu'elle ait. La partie supérieure de son corps est d'un fort beau verd, & l'inférieure blanchâtre, à l'exception des pieds dans les deux sexes, & de la gorge du mâle.

Les *Raines*, qu'on nomme aussi GRENOUILLES DE S. MARTIN, se distinguent encore des autres grenouilles, en ce que les quatre doigts des pieds de devant, aussi-bien que les cinq de derrière, ont à leur extrémité un petit bouton de chair : elles ne nagent que peu ou point. Elles ne sont pas plus venimeuses que les autres espèces de grenouilles. En été elles vivent ordinairement sur les arbres, & s'y nourrissent d'insectes, mais au retour du froid, elles vont se cacher dans la fange des marais : leur peau est si gluante, qu'elle peut fixer l'animal en tous sens sur toutes sortes de corps, même sur la glace la plus unie.

La raine est la meilleure fauteuse de toutes les grenouilles ; elle se sert si adroitement de ses doigts, qu'il lui suffit de toucher seulement à une feuille ou à la plus tendre branche pour s'y tenir, & pour grimper plus

loin. Elle fait ses captures à peu près comme les grenouilles brunes terrestres, mais avec plus de finesse. Ce n'est qu'à quatre ans qu'elle devient propre à la propagation. Les raines mâles ne commencent pas même à croasser avant ce tems; aussi n'est-ce qu'à cet âge que leur gorge commence à devenir brune; celle des femelles reste blanche: au reste leur croassement qui commence dès le printems, annonce ordinairement la pluie. L'on pourroit se faire un hygrometre ou hygroscope vivant, en mettant une raines mâle dans un verre garni de gazon verd, de cousins & d'autres insectes. Les raines ne s'accouplent, comme les autres grenouilles, qu'une fois l'année. Cet accouplement se fait dans l'eau & vers la fin d'Avril: elles cherchent des mares, dans le voisinage desquelles se trouvent des arbres, & les mâles s'y font entendre plus fort que la plus grosse grenouille aquatique. Quand il y en a beaucoup dans la même eau, on les entend, sur-tout pendant la nuit, & du côté où donne le vent, à plus d'une lieue & demie de distance; car quand un mâle commence à croasser, tous les autres l'accompagnent. Dans l'éloignement, on seroit tenté de prendre ce bruit pour celui d'une meute de chiens. Quant à la grenouille brune terrestre, on a de la peine à l'entendre à quinze pas. Les raines en croassant gonflent considérablement leur gozier: on diroit alors que ce n'est qu'un sac membraneux plein d'air.

Le frai de quelques-unes des raines se fait en vingt-quatre heures, d'autres n'en sont quittes qu'au bout de trois jours. Pendant ce tems, le mâle & la femelle descendent souvent sous l'eau, & y restent assez long-tems; la femelle alors semble agitée de mouvemens intérieurs & involontaires. Plus le tems du frai approche, & plus ce mouvement devient rapide; les mâles ne restent pas plus tranquilles, ils ajustent à différentes reprises la partie postérieure de leur corps à la même partie des femelles, & ils répètent cette opération plus fréquemment quand celles-ci lâchent leurs œufs par le boyau culier. On voit de ces femelles faire leur ponte en deux heures; d'autres, sur-tout celles que les mâles abandonnent, ne s'en délivrent qu'en quarante-huit heures, & en ce cas les œufs sont stériles.

Les vers d'eau des raines ont besoin d'un peu plus de deux mois pour parvenir à la forme de grenouille; mais aussi-tôt qu'ils ont quitté leur queue pour prendre quatre pattes, & qu'ils sont par conséquent en état de bondir & de sauter, ils abandonnent l'eau.

La GRENOUILLE BRUNE TERRESTRE, *Rana fusca terrestris*, s'accouple la première de toutes, & dès que la glace vient à se fondre. La superficie du corps du mâle est d'un brun grisâtre; cette partie de la femelle est d'un beau jaune, tacheté de brun qui tire sur le rouge. Cette grenouille vit communément hors de l'eau; mais dans les nuits fraîches, elle retourne dans la fange du fond des eaux dormantes.

Les deux sexes, dont la différence ne se reconnoît que sur la fin de la quatrième année, ne s'accouplent qu'une fois l'année, & restent souvent

attachés l'un à l'autre quatre jours entiers. Ils ont dans ce tems tous les deux le ventre gros , celui des femelles étant rempli d'œufs , & celui des mâles contenant entre la peau & la chair une mucosité transparente , qui se perd quand elle n'est plus nécessaire à la propagation de l'espèce. La femelle ne rend guere d'œufs que seize jours après l'accouplement , le nombre est depuis six cens , jusqu'à onze ou douze cens : il y en a qui n'emploient qu'une minute à les rendre tous : ils sont sous la forme d'un chapelet & fortement collés ensemble par une mucosité blanche qui les environne. Chaque œuf est composé d'un globule noir qui est le fœtus.

Le frai nouvellement rendu , tombe au fond de l'eau ; au bout de quatre heures , ces especes d'œufs se renflent & remontent à la surface de l'eau ; au bout de huit heures , la matiere blanche s'étend considérablement ; au dix-septieme jour , les œufs prennent la figure d'un rognon , & il s'y forme comme une petite cicatrice ; au vingt-deuxieme jour , la queue commence à se développer ; au trente-neuvieme, on observe un certain mouvement dans les petits vers ; au quarante-deuxieme , une partie tombe au fond de l'eau , & l'autre partie reste dans la matiere visqueuse ; au quarante-sixieme , les pattes de devant commencent à se discerner à la loupe ; au cinquantieme , on les voit en *tétards*. Ils commencent alors à se nourrir de lentilles d'eau , jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à la forme d'une grenouille parfaite ; au cinquante-septieme jour , le corps & la tête forment une pelote ovale , distincte ; au quatre-vingtieme , les pieds de derriere paroissent aussi & s'agrandissent continuellement ; enfin vers le quatre-vingt-dix-septieme jour , tems de leur dernière métamorphose , ils renoncent à la nourriture , jusqu'à ce que le développement de toutes les parties soit constant , que les pattes soient entierement formées & tout-à-fait fortantes , & que la queue soit entierement oblitérée. Il y en a des especes à qui il faut moins de tems pour leur développement.

Après cette métamorphose , l'animal commence à se servir d'une nouvelle nourriture : il passe de l'eau sur la terre , pour y faire la chasse aux insectes. Il se cache souvent sous des buissons & sous des pierres , peut-être pour éviter le grand jour ; mais s'il arrive de la pluie , les petites grenouilles qui se sont tenues cachées dans les herbes & dans les trous de la terre , sortent de toutes parts de leurs retraites , même pendant le jour : c'est sans doute cette apparition imprévue qui a donné occasion de croire , ce que le peuple croit encore aujourd'hui , *qu'il pleut des grenouilles* , ou *que la pluie en engendre*. A en juger par l'accroissement successif des grenouilles terrestres , on peut conjecturer qu'elles vivent jusqu'à douze ans , quoiqu'elles aient tant d'ennemis qui les persécutent.

En général les grenouilles de notre pays se nourrissent d'insectes , tant ailés , que reptiles ; mais elles n'en prennent aucun qu'elles ne l'aient vu remuer : elles se tiennent immobiles , jusqu'à ce qu'elles le croient assez

proche d'elles; alors elles fondent dessus avec une vivacité extrême, faisant quelquefois des sauts de plus d'un demi-pied, & avançant la langue pour l'attrapper. Leur langue est enduite d'une mucosité si gluante, que tout ce qu'elle touche y reste attaché. Elles avalent aussi les araignées; mais elles font leur principale nourriture d'une espèce de petit limaçon, dont la coquille est de couleurs fort vives, & qui cause des dommages considérables aux jeunes plantes de toute espèce, dont il mange les plus tendres, & salit les autres par ses excréments. On a donc grand tort de persécuter les grenouilles dans les jardins potagers; loin de leur faire la guerre, on devrait bien plutôt les attirer: il en est sans doute de même à l'égard des grenouilles étrangères, dont nous citerons ci-après les espèces les plus connues.

Grenouilles Etrangères.

La plupart des GRENOUILLES DE L'AMÉRIQUE, sont d'un roux-clair, tiqueté de rouge: elles ont des ongles larges, & à chaque côté de la mâchoire inférieure une vessie, qui, dans les jours de l'été, est toujours pleine d'air: elles croassent vers le coucher du soleil; leur mélodie plaît aux Cultivateurs du pays, en ce qu'elle leur présume le plus souvent un temps beau & serein.

On en voit dans la Virginie, dont les pieds de devant sont palmés comme le sont ceux de derrière: celles du Brésil ont des verrues rousses sur la peau; mais les plus variées & les plus agréablement habillées, sont celles de la Virginie.

La GRENOUILLE DE LA CAROLINE est terrestre: elle avale des vers-luisans que l'on trouve en grand nombre dans ce pays, pendant les nuits chaudes: elle est d'une couleur sombre.

On y rencontre aussi la GRENOUILLE MUGISSANTE: elle est bigarrée de diverses couleurs, son croassement est épouvantable.

La GRENOUILLE DE CAYENNE est tout-à-fait bleue, & est méchante: les habitans l'appellent *Cimi-cimi*.

Les GRENOUILLES DE SURINAM n'ont presque jamais de vessie, comme les précédentes: elles se nourrissent de jeunes grenouilles: leur couleur est marbrée, d'un cendré-roux; les jambes & les cuisses sont assez blanches.

La GRENOUILLE DE LEMNOS est grande & devient la pâture du *Serpent Laphiati*, qui s'y trouve en quantité.

La GRENOUILLE D'AFRIQUE a sur le dos des lignes brunes & blanches sur un fond brun: son ventre est blanc, marqueté de points noirs: elle habite les joncs marins, quelquefois les buissons, où elle mange des serpents faxatiles.

La GRENOUILLE DE MER, étant étendue, a jusqu'à un pied de longueur: sa peau est de couleur brunâtre cendrée, marquetée de verrues: le

dos est garni de bosses , séparées par des lignes blanchâtres : les deux pattes de devant sont comme armées d'un bouclier en forme de petit bateau : la tête est barrée de raies roussâtres , & ses yeux sont grands : il paroît entre ses fesses & l'os du coccix , quatre boutons ronds.

Séba cite une douzaine de grenouilles étrangères , mais dont la plupart sont des crapauds.

On trouve à la Martinique les plus belles grenouilles du Monde. Leur peau est ornée de raies jaunes & noires ; elles habitent les bois ; leur chair est blanche , tendre & délicate. Les Negres en font la chasse la nuit avec des flambeaux , en imitant le croassement de ces grenouilles , qui ne manquent pas de répondre & d'accourir à la lueur du flambeau. Il y en a d'un pied de long : elles sont si grosses , qu'on les mange en fricassée en guise de poulets , & les étrangers s'y méprennent souvent. On les appelle *crapauds*. On voit encore à la Martinique de ces mêmes animaux , qui , comme la grenouille pisseuse de nos vergers , pissent à chaque faut qu'ils font. Nous avons parlé de la grosse Grenouille tiquetée des Antilles , à la suite du mot CRAPAUD , dont elle porte improprement le nom.

Génération des Grenouilles.

Les Naturalistes ignorent de quelle manière s'opèrent précisément la génération & la métamorphose des grenouilles : c'est ce qui est cause de la diversité de leurs opinions sur ces deux objets. Nous nous bornerons à ce que disent sur cette matière les Observateurs les plus modernes. M. Linnæus dit que c'est une hypothèse établie , qu'à un pouce de chaque main ou pied de devant de la grenouille mâle , il croît dans le printemps une petite verrue , ou chair papillaire , faite comme la partie qui caractérise le mâle , & que la grenouille mâle introduit cette partie entre les cuisses dans le corps de la femelle : c'est ainsi , suivant ce système , que s'accomplit la génération des grenouilles.

Les grenouilles naissent , dit M. Gautier , faites comme de petits têtards : elles n'ont en venant au monde , ni pattes , ni nageoires ; elles frétille dans l'eau , aussi-tôt qu'elles ont quitté l'œuf. Elles multiplient prodigieusement , & s'accouplent sans se quitter pendant des journées entières ; le mâle embrasse la femelle par les pattes de devant , & la serre étroitement , de sorte qu'en les pêchant , on les trouve souvent accouplées , & la peur du danger ou toute autre raison ne peut les faire quitter que par force.

Il est digne de remarque que les grenouilles n'ont aucune partie sexuelle extérieure ; la femelle n'a point de vagin , le mâle n'a point de verge : l'anus seul sert à l'un & à l'autre sexe , à mettre dehors les excréments , les urines , les embryons , & les œufs : tant de circonstances annoncent quelque chose de singulier dans la génération de ces animaux. M. Gautier , après avoir attaché quelques-uns de ces animaux sur une table avec de
grosses

grosses épingles , prit des ciseaux fins & délicats , & coupa avec patience la peau & les muscles de l'abdomen , qu'il releva exactement. La première grenouille qu'il ouvrit ainsi , étoit une femelle ; elle lui offrit un paquet énorme d'œufs contenus dans une glaire très gluante : ces œufs étoient tous de la même grosseur & comme des têtes de grosses épingles , jaunâtres , ronds & tachés d'un point noir ; il fouilla dans les entrailles qui palpitoient , & reconnut qu'il n'y avoit que dans les œufs prêts à sortir , qu'on pouvoit appercevoir au microscope des embryons , ou du moins des vers vivans & fretillans , tels qu'on croit en voir dans les semences. M. Gautier ouvrit de même le bas ventre à une grenouille mâle ; il se présenta d'abord une vésicule taillée à facettes, transparente, remplie d'une eau très pure & limpide , & formant deux lobes très distincts ; la vésicule du mâle , ainsi que celle de la femelle , reposoit sur l'os pubis : le cordon paroissoit être le *placenta* de plusieurs embryons vivans , qui étoient attachés par le cœur avec de petits filets à ce cordon , & qui nageoient dans l'eau claire , remuoient & fretilloient extraordinairement , battant leurs queues les unes contre les autres , sans pouvoir se détacher du cordon qui les arrêtoit.

A la vue d'un phénomène si nouveau , si inconnu , si extraordinaire , M. Gautier appella des témoins instruits , & qui virent , sans le secours de la loupe du microscope , que le mâle des grenouilles contient des embryons vivans , distincts , même avant l'émission d'aucune semence. La grenouille mâle montée & fortement attachée sur sa femelle , attend les instans que les œufs s'écoulent de la femelle , & y mêle alors ses embryons vivans , qui s'attachent aux œufs & s'en nourrissent pendant quelques jours , jusqu'à ce qu'ils puissent prendre des alimens plus grossiers. Ces embryons conservent la même figure qu'ils avoient dans la vésicule du pere , pendant l'espace d'un mois , tems auquel ils quittent cette figure , comme font les vers à soie dans le cocon. Ils développent leurs pattes postérieures , & s'écartent ; ce sont ces pattes , qui unies dans l'embryon , forment la queue du têtard , qui est l'embryon de la grenouille : les œufs de la grenouille sont brunâtres. L'embryon peut nager dans l'eau , dès qu'il est venu au monde. Voyez aussi les *Observations* (de M. Ræfel) sur la fécondation des grenouilles.

Observations sur les grenouilles.

Ces animaux quittent leur peau presque tous les huit jours , sous la forme d'une mucosité délayée : les pattes de devant leur servent de bras , & celles de derriere de rames pour nâger. Dans le tems de l'accouplement , les mâles ont aux pouces une chair particulière , noire & papillaire , qu'ils appliquent fortement contre la poitrine des femelles , pour les tenir fermement : ils se laissent plutôt arracher une cuisse que de lâcher prise.

Dans les grenouilles , le mouvement du sang est inégal : il est poussé goutte-à-goutte & à diverses reprises. Ces pulsions sont fréquentes ; & ces animaux étant jeunes ouvrent & referment la gueule & les yeux autant de fois que le cœur leur bat. Malpighi a découvert , dans le tronc de la veine-porte des grenouilles , des cannelures graisseuses , dont l'utilité est admirable , en ce qu'elles suppléent au défaut de nourriture pour l'entretien du sang : elles servent de réservoir pour la substance de cet animal pendant l'hiver , lorsqu'il est caché au fond des eaux.

Dans les grenouilles , le cœur n'a qu'un ventricule : il pousse & reçoit alternativement le sang par le moyen de deux soupapes , comme les soufflets simples , qui reçoivent & qui donnent l'air , de manière que l'air n'entre que d'un côté , & ne sort que de l'autre : c'est une contre-soupape qui empêche le mélange du sang dans le ventricule de la grenouille , comme dans celui de la tortue & des autres amphibies. M. Gautier dit que ce viscère conserve pendant sept ou huit minutes , après son extraction du corps , le mouvement de systole & de diastole ; ce qui n'arrive pas dans les autres animaux , ni dans l'homme. L'œsophage de la grenouille est assez ample pour avaler des scarabées entiers , de petites souris nouvellement nées , & de petits oiseaux. L'estomac est petit , mais susceptible d'une extension considérable. Les intestins sont grêles : la cavité de l'oreille contient une corde qui s'étend à la volonté de l'animal , & qui lui sert pour recevoir les vibrations de l'air.

Les poumons sont adhérens de chaque côté au cœur , & divisés en deux grands lobes , composés d'une infinité de cellules membraneuses , destinées à recevoir l'air , & faites-à-peu-près comme les alvéoles des rayons de miel ; en sorte que ces poumons , au lieu de s'affaïsser tout-à-coup , comme sont ceux des autres animaux , demeurent tendus & gonflés , c'est-à-dire , qu'ils s'emplissent d'air à la volonté de l'animal , sans qu'il ouvre la gueule. La grenouille renvoie l'air de ses poumons dans des vessies qu'elle porte proche l'oreille aux angles de ses mâchoires : ces vessies lui servent apparemment de réservoir pour raréfier l'air qu'elle a dans les poumons. Svammerdam , ce grand Observateur de la Nature , a remarqué dans les poumons de presque toutes les grenouilles qu'il a disséquées , de petits vers vivans , au nombre de cinq ou six : ces vers ont un bec aigu ; ils sont semblables à de petits filamens , qui se roulent sur eux-mêmes. Ces vers se multiplient dans les poumons mêmes. Les parties sexuelles de la grenouille mâle consistent en deux testicules gros comme des pois ; celles de la femelle sont des cordons entortillés. Les œufs ne sont point dans des ovaires , mais dans un viscère particulier : ils sont répandus dans une glaire , & forment un paquet qui tient aux reins. Ces œufs croissent vers le printems , & presque tous à la fois : il en reste d'autres après l'émission des premiers , mais trop petits pour être aperçus. On prétend que les grenouilles jettent plus d'onze cens œufs , & qu'elles restent plusieurs jours dans l'action du coït.

La pêche des grenouilles est amusante, & peut divertir à la campagne : on les prend au feu avec des filets comme les poissons ; ou à la ligne, avec des hameçons où l'on a attaché des vers, des mouches, des papillons, des scarabées, des hannetons, des entrailles de grenouilles, ou un morceau de drap rouge, ou un peloton de laine teinte de couleur de chair ; car elles sont goulues, & se jettent à l'envi sur l'appât qu'on leur présente, tenant ferme ce qu'elles ont une fois mordu. Elles fuient l'homme ; elles se précipitent avec impétuosité dans l'eau, dès qu'elles le voient ou l'entendent.

Les grenouilles qu'on emploie en Médecine, doivent être de rivière ou d'étang : il faut qu'elles soient vertes, bien nourries, prises vivantes dans le tems de la pleine lune. Leur cendre est astringente : leur chair est un peu dure étant fraîche ; mais elle devient tendre étant gardée : elles sont regardées, prises à l'intérieur, comme humectantes & incraissantes, & propres pour adoucir les âcretés de la poitrine : elles sont restaurantes & bonnes dans la consommation. On en fait aussi des potages fort sains, qui conviennent dans les chaleurs d'entrailles, & pour dissiper les boutons du visage. Des Cuisiniers habiles ont l'art d'assaisonner les cuisses de nos grenouilles aquatiques, de manière qu'on les mange comme un mets des plus exquis.

Le frai de grenouilles, nommé aussi *spernirole* ou *sperme de grenouilles*, est une matière très visqueuse, transparente, blanche & remplie de petits points noirs. Il est fort d'usage en Médecine, & on le regarde comme le meilleur réfrigérant du règne animal : il convient dans les inflammations de la goutte ; il guérit la brûlure, l'érésypelle & les feux volages du visage : il suffit de tremper un linge plié dans le frai, & de l'appliquer sur la partie douloureuse ; souvent on y mêle un peu de camphre pour le rendre plus efficace. On le mêle avec du miel-rosat ; on imbibe une éponge de ce mélange, & on l'applique avec succès dans les endroits où il y a hémorrhagie.

La façon de le conserver (car il se pourrit facilement) est de l'enfermer dans un vaisseau, qu'on expose au soleil en été ; par ce moyen, l'alcali volatil s'exalte, aidé par un commencement de putréfaction, & il s'en forme une liqueur par défaillance, qui se dépure d'elle-même. On la filtre ; après quoi elle peut se conserver deux années. D'autres, pour être plus sûrs de sa conservation, distillent au bain-marie le frai de grenouilles, de la même manière qu'on fait à l'égard des vers, des limaçons, &c. Les grenouilles entrent dans l'emplâtre fondant de Vigo : on les applique aussi, vivantes ou coupées en deux, sur les tumeurs.

GRENOUILLE PÊCHEUSE : voyez GALANGA.

GRENOUILLE POISSON. Mademoiselle Merian & Seba disent qu'en Amérique on donne ce nom à une grenouille qui se transforme en poisson. Si cela est, c'est le contraire de ce qui arrive communément aux grenouilles, qui, avant d'être sous cette forme, ont été, en quelque

forte , des poissons. La grenouille dont il est ici question , a la peau tachetée sur les côtés , le ventre pommelé , les pattes de derriere palmées. On dit qu'on en trouve beaucoup dans la riviere de Surinam , dans la Cornawina-Creck & dans la Pivica. Dès qu'elles sont parvenues à leur grosseur , il leur croît peu-à-peu une queue : elles perdent leurs pattes , & prennent totalement la forme d'un poisson. Les Américains & les Européens , établis dans ces endroits , donnent à ce poisson le nom de *Jakies* , & le regardent comme un mets délicat : il a le goût de la lamproie. Ses arrêtes sont cartilagineuses ; sa peau est douce & couverte de très petites écailles ; de petites nâgeoires lui tiennent lieu de pattes : la couleur de ce poisson est d'abord grise , ensuite brunâtre. On voit dans les Ouvrages des Auteurs cités ci-dessus , une planche qui représente la transmutation de ces animaux.

GRENOUILLETTE. On donne ce nom à la *renoncule-tubéreuse* : voyez **RENONCULE**.

GREQUE , est une espece de sauterelle , de la grandeur & de la forme de la mante. Ses petites cornes & ses aîles sont de couleur jaune : elle a l'œil couleur d'hiacinthe , & le reste du corps est de la couleur de l'améthyste.

GRÈS : voyez **GRAIS**.

GRÉSIL. Nom donné à une sorte de menue grêle assez dure , & dont la blancheur égale celle de la neige. On ne doit pas confondre le grésil avec une petite grêle qu'on voit quelquefois tomber par un tems calme , humide & tempéré , & qui se fond presque toujours en tombant. Le grésil tient en quelque sorte le milieu entre la neige & la grêle ordinaire ; il tombe communément au commencement du printems : voyez **GRÊLE** & **NEIGE**.

GREVE , se dit d'une place sablonneuse , ou d'un rivage de gros sable & de gravier sur le bord de la mer ou d'une riviere , où l'on peut facilement aborder & décharger les marchandises : ainsi tous les fonds de sable que la mer couvre & découvre , soit par ses vagues , soit par son flux & son reflux , sont des greves : voyez **MER**.

GRIBOURI , *Cryptocephalus*. Insecte coléoptere , très connu & très redouté des Cultivateurs , parcequ'il ronge & désole les différentes plantes sur lesquelles il se trouve. La larve du gribouri de la vigne est celle qui fait le plus de tort , surtout dans les pays de vignobles : voyez à l'article **VIGNE**. Le gribouri est d'une forme ovale. Ses pattes sont longues , sa tête est petite & cachée en partie par la rondeur du corselet. Ses antennes sont longues , filiformes , composées d'articles allongés , & d'égale grosseur partout. En général les gribouris habitent les endroits humides.

GRIFFES : se dit de l'extrémité de la patte d'un animal , lorsqu'elle est armée d'ongles crochus & recourbés. Telle est la griffe d'un chat , la griffe du lion. On donne encore le nom de *griffes* aux *serres* des oiseaux de proie : on dit aussi *griffe de renoncule* au lieu de cayeux ou d'oignons : voyez le *Ta-*

bleau *Alphabétique des Termes, &c. à l'article général* PLANTES.

GRIFFON. On a donné ce nom à divers oiseaux qui ont une force incroyable & une grandeur démesurée. M. Perrault a donné, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, la description de deux griffons, mais qu'il qualifie du nom de *Vautours* : voyez ce mot.

L'un de ces oiseaux, qui étoit plus grand que l'aigle, avoit huit pieds d'envergure, & trois pieds & demi de longueur : ses jambes avoient un pied de long ; ses pieds étoient noirâtres ; ses ongles noirs, moins grands & moins crochus qu'ils ne sont aux aigles : il avoit les yeux à fleur de tête, & autour étoit une peau dénuée de plumes, formant un bourlet comme dans l'autruche. Sa langue étoit dure & cartilagineuse ; son bec, étroit & plus long que celui des aigles ; le plumage du dos & des cuisses étoit d'un gris rouffâtre, celui des ailes & de la queue étoit noir ; le dedans des cuisses, la tête & le bas du col étoient entièrement blancs : il y avoit au bas du col une fraise composée de plumes effilées, longue de trois pouces, & d'un blanc éclatant. On prétend que la jambe d'oiseau, que l'on garde dans le trésor de la Sainte Chapelle à Paris, est celle d'un griffon : cette jambe a cinq pieds de longueur, depuis l'extrémité de l'ongle du grand doigt de devant, jusqu'à l'ongle du petit doigt qui est derrière.

On dit que les griffons d'Afrique sont fort grands, peut-être ne sont-ils que des espèces de *cuntur* ou *condor* : voyez ce mot.

GRIGRI. Les Indiens donnent ce nom à une des espèces de palmiers très commune dans les Isles Caraïbes. Cet arbre porte des grappes de petits cocos, de la grosseur d'une balle de pistolet, très durs à rompre, & contenant une amande dont on peut tirer de l'huile. *Encyclopédie*.

A la Martinique l'on appelle aussi *grigri* une espèce d'oiseau qui est l'*émerillon* des Antilles : voyez EMERILLON.

GRILLON, *gryllus*. Genre d'insecte à antennes simples longues & filiformes, qui a deux filets à la queue, trois petits yeux lisses. (Ce dernier caractère est fort commun dans les insectes à deux & à quatre ailes nues). Ses pattes postérieures sont longues & propres pour sauter ; elles ont, ainsi que les autres pattes, trois articles à leurs tarses. On croit que ces animaux ruminent.

Le GRILLON DOMESTIQUE OU CRI-CRI, *gryllus pedibus anticis simplicibus*. Ce grillon & celui des champs ne sont que la même espèce. Le premier est plus pâle & plus jaune, & le second est plus brun. Ses antennes sont minces comme un fil, très mobiles, & de la longueur du corps. La tête est grosse, ronde, luisante, & les yeux de couleur jaune semblable à ceux du *grillon-taupe*. Le corselet est large & court. Dans les mâles les étuis sont plus longs que le corps, veinés, comme chiffonnés en dessus, & enveloppant une partie du ventre. Dans les femelles au contraire, les étuis sont plus petits que le ventre, non chiffonnés, & ne se croisent presque point. De plus la femelle porte à l'extrémité de son corps une pointe dure presque aussi longue que le ventre, plus grosse par le bout,

composée de deux gaines qui enveloppent deux lames. Cet instrument lui sert à enfoncer & déposer ses œufs dans la terre à portée des racines. Le mâle & la femelle ont, ainsi que la taupe grillon, à l'extrémité du ventre, deux appendices pointues & molles. Leurs pattes postérieures sont plus grosses & font ressort pour le saut de l'animal.

Cette espèce de grillon habite dans les maisons, & se niche dans des murs d'argile, ou entre des briques, dans des trous de cheminées, proche des foyers, des fours & des fourneaux, enfin dans les lieux chauds où l'on fait un grand feu toute l'année : il chante continuellement, surtout le soir & la nuit, excepté dans les plus grands froids : il s'accoutume au bruit, ce que ne fait pas le grillon sauvage, qui s'épouvante d'un rien, & qui ne chante que dans les beaux jours d'été. Le grillon domestique fuit seulement la lumière, comme plusieurs autres insectes. Il mange de tout ce qu'il trouve à son goût, pain, farine, viande, graisse, fruits : il n'y a que le mâle qui chante. Son cri aigu & continu paraît désagréable & incommode à bien des gens. Mais ce chant triste & monotone pour nous, réjouit au contraire sa femelle, parcequ'il est pour elle le cri de l'amour. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes, surtout parmi le vulgaire, qui ont du goût pour le chant des grillons, & qui croient même que ces animaux portent bonheur à leur maison. Les parents inspirent le même préjugé à leurs enfants, & ceux-ci apportent à la maison des grillons de campagne pour les mettre dans les cheminées; mais ces grillons sauvages ne sont pas faits pour habiter les foyers ; ils ont même tant d'antipathie pour les grillons domestiques, qu'ils les détruisent tant qu'ils peuvent. Il y a des gens, en Afrique, qui font commerce de grillons ; ils les nourrissent dans des espèces de fours de fer battu, & ils les vendent ensuite à un prix fort avantageux, parceque le petit bruit que font ces insectes n'est point désagréable à ces peuples, & qu'ils se persuadent qu'ils contribuent à leur procurer un sommeil tranquille.

Quant au chant du grillon, quoiqu'on l'attribue au battement redoublé de ses aîles, il est dû à un jeu d'organes construits avec plus d'appareil, & renfermés, selon Scaliger, dans la capacité du ventre. D'autres prétendent que dans les mâles, l'aîle droite supérieure est garnie de différentes fibres réticulaires, qui sont toutes crêpues : les deux aîles venant à se joindre exactement en ligne droite, l'air, frappé par leur battement, est nécessairement poussé en bas, & il doit, au moment de l'impulsion, éprouver un trémoussement, qui cause le son qu'on entend. Emmanuel Kœnig veut que l'organe qui produit ce son soit une membrane, qui, en se contractant, par le moyen d'un muscle & d'un tendon placés sous les aîles de cet insecte, se plie à-peu-près de la même façon qu'un éventail, & que pour peu que cette membrane soit mise en mouvement du vivant, ou même après la mort de l'animal, le cri perçant se fait entendre. Il est certain que, si l'on partage le grillon par le milieu du corps,

ou qu'on lui coupe la tête, il ne laisse pas que de vivre encore quelque tems, & de faire son cri accoutumé. Enfin quelques-uns prétendent que le cri du grillon est produit par le frottement du corcelet.

Jonston dit qu'on peut faire déguerpir ces insectes, en exposant à l'air libre une dissolution de vitriol : une forte vapeur de soufre le fait périr, comme la plupart des animaux. En Médecine, on regarde les grillons comme diurétiques & moins dangereux que les cantharides : on les fait ordinairement sécher au four dans un vaisseau couvert, & on les réduit en poudre, qui se donne depuis douze grains jusqu'à un scrupule, dans un eau appropriée, soit de persil, soit de saxifrage.

GRILLON - CRIQUET, *acridio - gryllus*. Le criquet n'est point un grillon ; il est d'une espèce particulière, il ressemble beaucoup à la sauterelle ; mais celle-ci a quatre articles aux tarses, & le criquet n'en a que trois. Ses antennes filiformes sont grosses & courtes. Du reste la forme & la métamorphose de ces insectes sont les mêmes. Voyez SAUTERELLE.

Le criquet a aussi, outre les deux grands yeux à réseau, trois petits yeux lisses. Cet insecte saute très bien par le moyen de ses pattes postérieures qui sont beaucoup plus grandes que celles de devant, & garnies de muscles très forts. Le criquet marche aussi sur terre, mais mal & pesamment. En revanche il vole assez bien. Ses ailes, qui sont repliées sous des étuis fort étroits, paroissent grandes étant étendues, & ornées de couleurs vives & brillantes.

La larve du criquet ne diffère de l'insecte parfait que parcequ'elle ne peut pas voler. Ce petit animal métamorphosé dépose ses œufs en terre, où la chaleur les fait éclore. Il est très vorace, & se nourrit d'herbes & de feuilles. Souvent il fait beaucoup de dégâts dans les campagnes.

GRILLON-TAUPE ou **TAUPE-GRILLON**, *gryllo-talpa*, *aut gryllus pedibus anticis palmatis*. Cet insecte, également connu sous le nom de *courtille* ou *courtillere*, est un des plus hideux & des plus singuliers : il est de la longueur du doigt, d'un gris obscur, doux au toucher ; il ressemble un peu au grillon, mais il s'en distingue aisément. Sa tête est petite, allongée, garnie de deux antennes filiformes, longues, & de quatre antennules grandes & grosses : derrière les antennes sont deux gros yeux durs, brillants & noirâtres, entre lesquels on en voit trois autres, lisses, plus petits, & tous rangés sur une même ligne transversale. Le corselet forme comme une espèce de cuirasse allongée, presque cylindrique & comme veloutée. Les étuis, qui sont courts, ne vont que jusqu'au milieu du ventre ; ils sont croisés l'un sur l'autre, & ont de grosses nervures brunes : les ailes repliées se terminent en pointes plus longues que le ventre, qui est mol, & qui se termine aussi par deux appendices assez longues. Ses pattes antérieures sont très grosses, aplaties ; ses jambes sont très larges, & se terminent en dehors par quatre grosses griffes en scie, & en dedans par deux seulement. M. Geoffroi a observé que le tarse ou le pied est souvent situé & caché entre ces griffes. Cet insecte cherche les lieux humides, & passe la plus grande partie de sa vie

sous terre , principalement dans les couches : il sort la nuit , même dès le coucher du soleil , marche lentement ; il saute comme les sauterelles ; il se nourrit de froment , d'orge & d'avoine ; il en porte l'été , dans les trous où il se retire , pour en vivre l'hiver : on prétend qu'il se nourrit aussi de fiente de cheval. Mais ce qu'il y a de plus singulier dans les parties de l'intérieur de cet insecte , c'est qu'il s'y trouve plusieurs estomacs , comme dans le animaux ruminants.

Le *grillon-taupe* est ainsi nommé , parcequ'il fait le même bruit que le *grillon domestique* , & parcequ'il fouit & élève de petits monceaux de terre , comme les *taupes*. Cet insecte est le fléau des Jardiniers & des Fleuristes , parcequ'il ravage toutes les plantes d'un jardin , sur-tout les melons & les laitues , &c. Il en coupe & ronge les racines. Ses pattes à dents de scie lui servent à cet usage. Quand les Payfans l'entendent crier , ils en augurent une année de fertilité.

On en voit beaucoup dans quelques Provinces de Suède , où ils chantent sur le soir : on en rencontre aussi une grande quantité en France , & sur-tout dans la Province de Normandie , où cet insecte , appelé *taupette* , mord souvent les doigts des personnes qui fouillent la terre : cette morsure est quelquefois vénimeuse.

Le *taupe-grillon* vit quelque tems dans l'eau , ce qui le fait regarder comme une sorte d'amphibie. Ces insectes marquent beaucoup d'adresse dans la construction de leur nid. Goëdard dit qu'ils choisissent une motte dure , dans laquelle ils pratiquent un trou qui leur sert pour entrer & pour sortir : ils forment au dedans de cette motte une cavité assez spacieuse pour y déposer leurs œufs : cela fait , ils ont grand soin de bien affermir les dehors de ce nid souterrain : sans cette précaution , leurs œufs deviendroient bientôt la proie de certaines mouches noires , cachées sous terre. On prétend aussi , que ces insectes se fraient autour de leurs nids , une espece de chemin couvert pour y faire leur ronde en sûreté , & veiller à ce que l'ennemi ne s'y glisse point à l'improviste.

GRIMME. Espece d'animal qui paroît tenir le milieu entre les chevres & les chevrotains , & qui se trouve au Sénégal. La grimme se distingue facilement à une grande cavité qu'elle a au-dessous de chaque œil , & à un bouquet de poil bien fourni , qui s'élève perpendiculairement sur le sommet de sa tête.

GRIMPEREAU. Petit oiseau de passage , dont on distingue plusieurs especes. En général , ces oiseaux ont un bec en forme de faulx , obtus par dessus , comme émoussé par la pointe , & dont les côtés sont un peu en forme de coin : les narines sont rondes & couvertes des plumes du front : leur langue est membraneuse , un peu plate , fendue par le bout : la queue est forte , composée de douze grandes plumes égales : leurs pieds sont garnis de trois doigts par devant , & d'un ergot par derriere.

La premiere espece est le GRIMPEREAU-TORCHE-POT ou GRIMPEREAU NOIR , *falcinellus arboreus nostras*. Il est un peu plus grand que le pinçon , &

& presque droit : il a le bec noir & rond , la tête & les yeux fort petits , le plumage plombé , une tache blanche au bout de la queue , & une autre d'un rouge chatain sous le ventre & à la gorge , les pieds de couleur bleuâtre , les doigts languets , les ongles crochus & noirs. Il grimpe & descend le long des arbres , & les creuse : on l'appelle *grand grimpereau gris* ou *pic cendré* : il se retire sous les toits des maisons , dans les murailles & dans les creux des arbres. On l'appelle aussi *casse noisette*.

Quand cet oiseau trouve un grand trou dans un arbre où il veut faire son nid , il le ferme très industrieusement avec du limon en n'y laissant qu'une petite entrée : sa couvée est nombreuse. Il vit de la vermine qu'il trouve aux environs des arbres & de leurs écorces : il se nourrit aussi de noix qu'il ouvre avec son bec très adroitement : il est fort vigilant & actif : le mâle , au printems , appelle sa femelle en faisant un cri , comme s'il disoit *guiric* , *guiric*. Il ne se tient avec elle que pendant l'été ; dès que leurs petits sont élevés , ils se séparent , il bat même sa femelle , lorsqu'il la rencontre après l'avoir quittée. On trouve dans la nouvelle Angleterre un grimpereau noir d'une petite espèce.

Le petit GRIMPEREAU TORCHEPOT a la voix plus forte & plus haute que le précédent ; le mâle ne va qu'avec la femelle qu'il a choisie ; quand il en rencontre une autre , il l'oblige de fuir ; il appelle ensuite sa femelle d'une voix claire pour la rendre témoin de sa fidélité : d'ailleurs il est semblable en tout au grand *grimpereau gris*.

Le petit GRIMPEREAU D'ARBRE se retire dans les troncs d'arbre , s'attache aux branches , à la manière des *pics* , voltige de branche en branche , & ne demeure jamais en place ; mais il reste toute l'année dans un même canton. Il est un peu plus grand que le roitelet. Sa queue est courte , ses griffes sont blanches & pointues , son bec est courbé en arc.

Le GRIMPEREAU DE HAMBOURG n'est pas plus grand que le moineau. Le plumage du dessus de son corps est d'un brun ombré de pourpre , & celui du ventre d'un brun jaunâtre mêlé de noir. Cette sorte de grimpereau est plus disposée que tous les autres à grimper d'arbre en arbre ; il les examine par-tout l'un après l'autre , & descend le long du tronc jusqu'à terre ; il ne se sert guère de ses ailes , tant qu'il se trouve parmi les arbres : il se nourrit de cerfs volants & d'autres insectes.

M. Klein donne la notice de dix-neuf espèces de grimpereaux des Indes , qui ne diffèrent que par la variété de leurs belles couleurs. Ces grimpereaux chantent comme le rossignol. Dans le Mexique leur couleur est d'un bleu d'azur ou de turquoise ; ce ne sont que des colibris. Ceux du Ceylau sont verts , nuancés d'une couleur aurore : dans l'Isle de Cuba , ils sont d'un bleu nuancé d'argent ou de couleur verte : leur courage est tel qu'ils osent poursuivre des bandes de corbeaux , & les obligent de s'aller cacher : on les appelle dans le pays *guit guit*. Des Ornithologistes ont cité d'autres espèces de grimpereaux , qui ne sont que des *pics* , voyez ce mot , tel est le *grimpereau de Bengale* : le grand & le petit grimpereau

verts bigarrés, nommés ainsi de leur couleur : ils sont gros & longs comme nos *pics verts*. Voyez le second vol. du *Dictionnaire des Animaux*.

GRIOTTE. Cerise à courte queue, tantôt douce & tantôt aigre : & dont l'arbre se nomme *g-iottier*. Voyez ce mot à l'article CERISE.

GRISARD ou COLIN. Voyez CANARD DE MER.

GRISART. Voyez BLAIREAU.

GRISETTE. Est un fort beau petit oiseau étranger, qu'on appelle aussi *syriot* ; il ne se nourrit que de mouches & d'autres insectes : son bec est grêle, foible & long ; son corps est brun, excepté le ventre qui est tout blanc : ses jambes & ses pieds sont noirâtres : on lui apprend à parler. Sa chair est blanche, tendre & très délicate. C'est un des meilleurs mets quoique rassasiant. Cet oiseau de passage reste chez nous en automne près des endroits aquatiques ou sur les côtes de la mer : ils vont par bandes & sont très difficiles à approcher ; mais dès qu'il y en a un de blessé, on le laisse crier pour qu'il fasse venir les autres, ou s'il est mort on le retourne sur le dos : tout le reste de la bande, après avoir un peu tourné, revient à l'endroit d'où elle est partie, & appercevant le mort, elle vient voltiger autour de lui ; pendant ces viements on en tue beaucoup, surtout si l'on a eu la précaution de se cacher derrière les roseaux : la chair des *grisettes* ne se garde pas long-tems sans se corrompre.

GRIVE, *turdus*. Oiseau dont on distingue plusieurs especes qui sont plus ou moins communes en France ; savoir, 1°. la *grosse grive de gui* autrement dite *suserre*, *jocasse*, *fraye* ou *tourdelle* : 2°. la *petite grive de gui*, dite *grive de vigne commune* ou *mauvis* : 3°. la *grive de genevrier*, autrement dite *litorne*, ou *oiseau de nerte*, dite vulgairement *chacha* : 4°. la *grive rouge*, que quelques-uns nomment *roselle* : il n'y a que les deux premières de permanentes, car les deux autres sont passageres & ne font pas leur nid chez nous.

LA GRANDE GRIVE ou GRIVE DE GUI, *turdus viscivorus major*, est un peu moins grande que la pie. Son bec & ses pieds sont d'un brun jaunâtre ; son col & son ventre sont ornés de taches blanches ; son dos & ses ailes sont brunâtres : elle a l'iris couleur de noisette. Cet oiseau mange, ainsi que les autres especes, des baies de Gui, qui ne restent pas long-tems dans ses intestins : il les rend en entier, & elles sont si glutineuses qu'elles peuvent encore végéter. Dans l'hiver, il mange des baies de houx sauvage & d'aubépine : il se nourrit aussi de vers, de chenilles & d'autres insectes. La chair de cette grive n'est pas estimée, parcequ'elle est de difficile digestion. Elle est moins commune que les autres : on en élève en cage. On en mange à Dantzic, qui viennent des forêts voisines de cette ville. Cette especes de grive est un oiseau de passage, qui va par petites compagnies : il chante très bien au printemps, & ordinairement il se perche au-dessus des arbres, sur les chênes, ormes, &c. il se plaît aussi dans les pâturages, dans les prés, &c. Le plumage de cet oiseau change pendant l'été & devient un peu cendré : on a remarqué que l'espece ap-

pellée particulièrement *drenne*, se tient seule sur un arbre, qu'elle ne s'en écarte pas loin, & qu'elle en éloigne les autres oiseaux.

La PETITE GRIVE DE GUI, *turdus minor*, est ainsi nommée, non parcequ'elle mange des baies de Gui; mais parcequ'elle ressemble à la grosse grive de Gui. Elle est plus petite que la litorne, & n'est guere plus grande que la roselle: elle pèse environ trois onces: son bec est long d'un pouce, & brun; l'iris de ses yeux est de couleur de noisette; la poitrine est jaunâtre, le ventre blanc, le dessus du corps olivâtre par-tout avec un mélange de roux & de jaune aux ailes; les jambes & les pieds sont d'un brun pâle, la plante des pieds est jaunâtre. Elle a le port de la roselle, & est tachée autour des yeux: elle se nourrit d'insectes plutôt que de baies; elle mange aussi des vermisseaux, des scarabées & des limaçons: elle demeure pendant toute l'année en Angleterre, & y fait son nid, qu'elle construit de mousse & de paille en-dehors, & l'enduit de boue en-dedans: elle pond sur cette boue nue cinq ou six œufs de couleur bleue, verdâtres, piquetés de taches noires clair-semées. Elle chante admirablement au printems, étant perchée sur les arbres des bois taillis: elle est solitaire, ainsi que la grosse grive de Gui, mais elle fait son nid dans les haies, plutôt que dans les arbres élevés: elle est stupide, & se laisse prendre facilement: on l'éleve quelquefois en cage. En Silésie, il y en a une si grande quantité dans les forêts & dans les montagnes, qu'elles suffissent pour nourrir les habitants pendant l'automne.

Les payfans en font des provisions & les gardent encore dans le vinaigre à demi-rôties. On les prend avec des collets de crins de cheval, en y pendant pour amorce des baies de sorbiet sauvage. Cet oiseau est fort gourmand: il aime passionnément la graine de jusquiame. Dans les vignobles, il mange beaucoup de raisin; aussi est-il très gras & très rempli dans le tems des vendanges: c'est ce qui a donné lieu au proverbe, *saoul comme une grive*. On sert la petite grive sur les tables les plus délicates, à cause de son bon goût: aussi Martial lui a-t-il donné le premier rang parmi les oiseaux, comme il l'a donné au lievre parmi les quadrupèdes.

La grive, dite *roselle*, est celle que nous voyons communément voler par grande troupes, & qui, dans l'été, est la plus commune dans nos plaines de France. La grive roselle est la même que la grive rouge ou à rouges ailes. Ses cuisses & ses pattes sont pâles: elle a le dessous des ailes rougeâtre, le ventre blanc. Cette grive repaire en hiver dans la Bohême, dans la Hongrie & dans les pays du Nord: elle gazouille admirablement bien; son ramage, qui renferme une grande quantité de tons, procure de l'agrément pendant neuf mois de l'année.

La grive, nommée *litorne*, ressemble, pour la grandeur & la figure, au merle femelle, avec cette différence, que la litorne a l'estomac jaunâtre, tacheté de noir, & le ventre blanc. Ses jambes & ses pieds sont noirs: cet oiseau est de couleur cendrée sur la tête, le col & le crou-

pion ; le dessus du dos est tanné , mais peu grivelé ; le dessous de l'aîle est blanc. La litorne est la moins estimée des grives.

On donne encore le nom de *grive* à plusieurs oiseaux étrangers ; tel est l'*oiseau à quarante langues de l'Amérique* , nommé ainsi , parcequ'il surpasse tous les autres par son ramage mélodieux : il se trouve au Mexique & dans la Virginie. La grive du Bresil n'est pas plus grande qu'une alouette ; son bec est rouge. On en trouve une espece dans les Îles de l'Archipel , principalement à Zira & à Nia , qui fait son nid entre des monceaux de pierres : on dit qu'il s'en trouve qui apprennent si bien à chanter , qu'après les avoir formées à cet exercice , on les vend à Constantinople & à Smyrne , depuis 50 jusqu'à 100 piastras.

Les grives de l'Afrique sont , dit-on , toutes blanches. Nous avons vu un oiseau , auquel on donnoit ce nom ; mais après l'avoir examiné , nous avons reconnu que c'étoit un merle. La grive , dite *ja-seur de la Caroline* , pourroit bien n'être qu'une variété du geai de Bohême.

GRIVE DE MER , *turdus marinus*. On donne ce nom à un poisson à nageoires épineuses : on le nomme à Rome *poisson paon* , à cause de ses belles couleurs.

GROLE. Voyez FREUX.

GRONDEUR. Poisson très commun dans les Îles Antilles , qui grogne de même que le *groneau* , & qui fait une des principales nourritures de plusieurs habitants de Cayenne. Voyez GRONEAU.

GRONEAU ou GROGNAUT , *lyra*. On donne ce nom à un poisson de la Méditerranée , qui grogne comme un porc : il a les nageoires épineuses. Voyez ROUGET.

GROS-BEC , *coccothraustes*. Oiseau ainsi nommé par la grosseur de son bec , relativement à celle de son corps. Cet oiseau est d'un tiers plus grand que le pinson : sa tête est grosse en comparaison du corps : elle est de couleur roussâtre ; son col est de couleur cendrée ; son dos est roux ; la poitrine & les côtés sont de couleur cendrée , légèrement teinte de rouge.

Ces oiseaux sont fort communs en France , en Italie & en Allemagne : ils restent en été dans les bois & sur les montagnes ; en hiver , ils descendent dans les plaines. Ces oiseaux ont le bec si fort , qu'ils cassent avec facilité les noix , les noyaux d'olives & de cerises : ils font du tort , parcequ'ils mangent les boutons des arbres. Ils vivent pour l'ordinaire de semence de chenevis , de paniz. C'est toujours sur le sommet des arbres qu'ils font leurs nids. Ils pondent cinq ou six œufs. On les nomme quelquefois *casse-noix* ; mais l'oiseau qui porte ce nom est différent. Voyez CASSE-NOIX à l'article MERLE DE ROCHER.

Il y a dans les Indes , sur-tout à la Virginie , une espece de gros-bec , de couleur écarlate , dont la tête est ornée d'une crête. Cet oiseau est de la grosseur d'un merle : son chant est fort agréable. On donne aussi le nom de gros-bec au *toucan* , voyez ce mot.

GROSEILLER. On donne ce nom à plusieurs especes d'arbrisseaux épineux ou non épineux , & qui varient encore entr'eux par la diversité des fruits : nous ne parlerons ici que des principales especes les plus connues.

Le GROSEILLER ÉPINEUX , *grossularia spinosa* , aut *uva crispasimplici acino* , est de deux especes ; l'une *sauvage* & l'autre *cultivée*. Le groseiller blanc sauvage est le plus commun : il vient de lui-même contre les haies , dans les bois : les forêts de Saint-Germain & des environs de Montmorency , près de Paris , en sont remplies. Cet arbrisseau est haut de six pieds ou environ : sa racine est ligneuse , & un peu fibreuse ; elle pousse des tiges nombreuses & rameuses , & garnies de toutes parts d'épines fortes près de l'origine des feuilles. Son écorce est purpurine dans les vieilles branches , blanchâtre dans les jeunes. Son bois est de couleur de buis pâle : ses feuilles sont larges comme l'ongle du pouce , presque rondes , un peu découpées , vertes , velues , d'un goût aigrelet , & portées sur de courtes queues. Ses fleurs sont petites , & d'une odeur suave : elles naissent plusieurs ensemble , belles , pendantes , composées chacune de cinq feuilles , disposées en rond , & attachées aux parois de leur calice , qui est découpé en cinq parties. Il leur succede des fruits ou baies rondes ou ovales , séparées , molles , pleines de suc , de la grosseur d'un grain de raisin , rayées depuis le pédicule jusqu'au nombril , en maniere de méridiens ; vertes d'abord & acides au goût ; jaunâtres , étant mures , d'une saveur douce & vineuse , remplies de plusieurs petites graines blanchâtres.

L'espece de groseiller cultivé ne differe du précédent qu'en ce qu'il est moins épineux , & que ses feuilles & ses baies deviennent plus grandes & plus aromatiques.

Ce sont ces sortes de baies qu'on appelle *groseilles blanches* ou *groseilles douces* ; étant vertes , on en fait usage dans les ragoûts au lieu de verjus : c'est alors qu'on les nomme *groseilles à maquereau*. Elles sont rafraîchissantes & astringentes , excitent l'appétit , & sont ordinairement agréables aux femmes enceintes , lorsqu'elles ont du dégoût pour les alimens : elles guérissent les nausées & arrêtent les flux de ventre , même les hémorrhagies ; cuites dans le bouillon , elles sont utiles aux fébricitans. L'on mange celles qui sont mûres au sortir de l'arbrisseau ; mais elles se corrompent facilement dans l'estomac. Leur suc devient un peu vineux par la fermentation. Il s'en consomme une grande quantité en Hollande & en Angleterre , où l'on en cultive une quantité considérable.

Ray dit que les Anglois font du vin de ces fruits mûrs , en les mettant dans un tonneau , & en jetant de l'eau bouillante par-dessus : ils bouchent bien le tonneau , & le laissent dans un lieu tempéré , pendant trois ou quatre semaines , jusqu'à ce que la liqueur soit imprégnée du suc spiritueux de ces fruits , qui restent alors insipides. Ensuite on verse cette liqueur dans des bouteilles , & on y met du sucre : on les bouche bien , &

on les laisse jusqu'à ce que la liqueur se soit mêlée intimement avec le sucre par la fermentation, & soit changée en une liqueur pénétrante & semblable à du vin.

Le GROSEILLER A GRAPPES : on en distingue deux especes.

1°. Le GROSEILLER ROUGE, *ribes ruber*, est un arbrisseau non épineux, qui croît dans les forêts des Alpes & des Pyrénées, mais qu'on cultive communément dans les jardins & les vergers. Ses racines sont branchues, fibreuses & astringentes : ses tiges ou rameaux sont nombreux, durs, tortus ; cependant flexibles & hauts de cinq pieds ou environ, couverts d'une écorce brune. Le bois en est verd, & renferme beaucoup de moëlle : ses feuilles sont presque rondes, vertes & dentelées : ses fleurs sont disposées en petites grappes, dont les pédicules sortent des aisselles des feuilles. Chacune de ces fleurs est composée de plusieurs feuilles, disposées en rose & attachées au parois du calice. Il leur succede des baies grosses comme celles du genievre, vertes d'abord, rouges étant mûres, sphériques, & remplies d'un suc acide fort agréable au goût & à l'odorat, & de plusieurs petites semences. Ces baies sont les groseilles rouges. Le groseiller rouge transplanté veut une terre grasse bien fumée : on le met en bordure.

2°. L'autre espece de groseiller à grappes porte des baies blanches, mais la plupart des Botanistes le regardent plutôt comme une variété du précédent, que comme une véritable espece. Ces baies sont appelées *petites groseilles blanches* : elles ne sont pas si communes que les rouges ; mais elles ont le même goût & la même vertu : elles sont même plus estimées, & les grappes en sont plus grosses. La groseille blanche & perlée, dite de *Hollande*, demande une terre forte & humide : on la plante de distance en distance, & on ne taille que fort peu ces buissons les deux premières années ; mais les suivantes, on les taille assez court. En général les groseillers se multiplient de rejettons enracinés, ou de boutures coupées sur du vieux bois. C'est en Hollande que l'on entend le mieux la culture & la taille des groseillers à grappes.

On mange les baies blanches & rouges des groseillers, encore attachées à leurs grappes & sans aucune préparation ; ou bien on les sépare des grappes, & on y ajoute un peu de sucre. Les enfans, & sur-tout les jeunes filles qui ont les pâles couleurs, même les femmes qui sont attaquées du *pica* & du *malacia*, ainsi que les febricitans, les recherchent avec avidité, à cause de leur saveur acide, vineuse & agréable au goût. On confit, avec le sucre, ces grappes toutes entières, de même que les cerises. On prépare aussi une gelée de groseilles, qui est très belle, tremblante & très agréable au goût, en faisant cuire le suc de groseilles avec du sucre, jusqu'à une consistance convenable. C'est une confiture que l'on sert non-seulement au dessert, mais qu'on réserve encore pour soulager les malades, & sur-tout ceux qui ont la fièvre. Elle convient très bien dans les convalescences des maladies aiguës, elle fournit un aliment léger, tem-

perant & véritablement raffraîchissant. Dans les boutiques , on prépare un sirop avec ce même suc , ou un rob , ou résiné , en le faisant épaisir jusqu'à consistance de miel. Ce suc étendu dans trois ou quatre parties d'eau & édulcoré avec suffisante quantité de sucre , est connu sous le nom d'*eau de groseille*. Le goût agréable de cette boisson l'a fait passer de la boutique de l'Apothicaire à celle du Limonadier , & cette boisson est exactement analogue à la limonade.

Tout le monde convient de la bonté des groseilles rouges pour tempérer le bouillonnement intérieur du sang , & réprimer les mouvemens de la bile : elles sont modérément astringentes , fortifient l'estomac , ôtent le dégoût & adoucissent le mal de gorge. Elles conviennent dans les vomissemens , les diarrhées & les hémorrhagies , dans les fièvres malignes & les maladies contagieuses : cependant l'usage en devient nuisible , si l'on en prend trop & mal-à-propos ; car l'usage continu des acides nuit à l'estomac , excite la toux , est pernicieux pour la poitrine , & sur-tout lorsqu'on craint l'inflammation des viscères du bas-ventre.

Il y a encore d'autres espèces de groseillers , tel que le *Cassia* ou *Cassier des Poitevins*, autrement *Groseiller noir*. Voyez CASSIS. Le Groseiller des Antilles , dont les Créoles mangent le fruit , est le *Solanum scandens aculeatum* , *hyoscyami folio* , *flore intus albo* , *extus purpureo*. Plum. & Barr.

GROS-VENTRE. C'est le nom qu'on donne à plusieurs poissons ronds ou *orbis* , que l'on trouve dans l'Isle de Cayenne , & dont l'usage est assez dangereux : ils sont même regardés , par bien des gens , comme des poisons. Le gros-ventre est orné de taches ou rubans de couleur brune & jaune.

GROS-YEUX. C'est un poisson fort abondant en l'Isle de Cayenne , & que les habitans de ce pays nomment *Kouttai*. Ses yeux sont saillans en-dehors de plus d'un demi-pouce : il se tient sur le rivage de la mer , & se laisse aller au gré des vagues. On tue ce poisson à coups de flèche ou à coups de fusil. M. Barrere croit que ce poisson est vivipare : il est fort bon à manger , sur-tout étant frit.

GROTTE, *Spelunca*. On nomme ainsi les cavernes , les creux ou les espaces vuides qui se rencontrent dans le sein de la terre , & sur-tout dans l'intérieur des montagnes. On attribue la formation des grottes à divers bouleversemens , causés par des révolutions particulières , telles que celles qu'ont pu causer les feux souterrains , ou les eaux , qui , en pénétrant au travers des montagnes & des rochers , ont détaché & entraîné la terre & le sable qui leur présentoient le moins de résistance , & ont ainsi donné lieu à des cavernes.

On connoît en divers endroits des cavernes & des grottes qui présentent des singularités propres à piquer la curiosité. Voyez CAVERNE.

La grotte d'*Arcy* , en Bourgogne , dans l'Auxerrois , est remarquable par ses salles qui se succèdent les unes aux autres , & dans lesquelles on

observe différens jeux de la Nature. L'entrée de cette grotte est si basse , qu'on ne peut y passer que courbé : depuis quelques années on l'a fermée , & le Seigneur en garde la clef. Lorsqu'on a passé une première salle , on entre dans une autre très vaste , dont le sol est rempli de pierres entassées confusément : on y voit un lac , dont le diamètre peut avoir cent vingt pieds ; l'eau en est claire & bonne à boire. On entre ensuite dans une troisième salle , qui est très remarquable par ses trois voûtes portées l'une sur l'autre , la plus haute étant supportée par les deux plus basses. Il y a plusieurs salles , dans lesquelles on voit des stalactites & des pyramides , qu'on croiroit être de marbre blanc. Dans une autre , on voit une espèce de figure humaine grande comme nature , qui de loin paroît être une Vierge tenant entre ses bras l'Enfant Jesus ; d'un autre côté , une espèce de forteresse avec des tours : l'Art est peut-être venu-là un peu à l'aide de la Nature , ou l'imagination y voit les objets plus distincts qu'ils ne le sont réellement : le cheval & les autres objets que l'on voit dans la fameuse grotte de Bauman , dans le Duché de Brunswick , sont peut-être dans le même cas. La concavité du dôme d'une autre salle , paroît être à fond d'or , avec de grandes fleurs noires ; mais lorsqu'on y touche , on efface la beauté de l'ouvrage , car ce n'est que de l'humidité. On voit au milieu de cette voûte une quantité de chauves-souris , quelques-unes se détachent pour venir voltiger autour des flambeaux.

Il est digne de remarque , que dans cette grotte l'air est extrêmement tempéré ; celui qu'on y respire dans les plus grandes chaleurs , est aussi doux que l'air d'une chambre , quoiqu'il n'y ait point d'autre ouverture que la porte par laquelle on entre : ce qui est contraire à ce qui arrive ordinairement dans les lieux souterrains , sur-tout lorsqu'ils ont très peu de communication avec l'air extérieur.

Tout le monde a entendu parler de la fameuse *grotte d'Antiparos* , dans l'Archipel , dont M. de Tournefort a donné une si belle description , dans son *Voyage du Levant* , tom. 1 , pag. 190. On trouve d'abord une caverne rustique d'environ trente pas de largeur , partagée par quelques piliers naturels : entre les deux piliers qui sont sur la droite , il y a un terrain en pente douce , & ensuite jusqu'au fond de la même caverne une pente plus rude d'environ vingt pas de longueur : c'est-là le passage pour aller à la grotte intérieure , où l'on pénètre par un trou fort obscur , par lequel on ne sauroit entrer qu'en se baissant , & au secours de flambeaux. On descend d'abord dans un précipice horrible , à l'aide d'un cable que l'on prend la précaution d'attacher à l'entrée : on se coule dans un autre bien plus effroyable encore , dont les bords sont fort glissans , & répondent sur la gauche à des abysses profonds , où la voix forme des échos & résonne comme le bruit du tonnerre. On place sur les bords de ces gouffres une échelle , au moyen de laquelle on franchit un rocher tout-à-fait coupé à plomb : on continue à glisser par des endroits un peu moins dangereux ; mais dans le tems qu'on se croit en pays praticable , le pas le plus

plus affreux vous arrête tout court , & on s'y casseroit la tête , si on n'étoit averti ou arrêté par ses guides. Pour le franchir , il faut se couler sur le dos le long d'un gros rocher , & descendre une échelle qu'il faut porter exprès. Quand on est arrivé au bas de l'échelle , on se roule quelque-tems encore sur des rochers , & enfin on arrive dans la grotte. On compte trois cens brasses de profondeur depuis la surface de la terre. La grotte , qui est de la plus grande beauté , paroît avoir quarante brasses de hauteur sur cinquante de large : elle est remplie d'un grand nombre de coquilles fossiles , & notamment de belles & grandes stalactites de différentes formes , tant au-dessus de la voûte , que sur les terrains d'en-bas. On y voit encore la fameuse pyramide appelée *Autel* , où l'on lit : *Hic ipse Christus adfuit , ejus natali diè mediâ nocte celebrato* , 1673. Cette inscription est d'un Ambassadeur de France à la Porte , qui y fit célébrer la Messe en grande solennité , la nuit de Noël. Ces stalactites sont une espece d'*Albâtre Oriental* , qu'on ne doit regarder que comme un marbre plus épuré , veiné , couleur d'onyce , entraîné par les eaux , & déposé ensuite sur les parois de la grotte. Voyez STALACTITES.

Les rochers qui composent les Alpes , sont remplis , en quelques endroits , de cavités ou de grottes , où les habitans de la Suisse vont tirer le cristal de roche. On reconnoît qu'on va rencontrer quelques-unes de ces cavités , lorsqu'en frappant avec de grands marteaux de fer sur les rochers , ils rendent un son creux. Ce qui les indique encore d'une manière bien plus sûre , c'est une zone de quartz blanc , qui coupe la roche en différens sens. Si l'on voit suinter de l'eau au travers du roc , près des endroits où l'on a observé ce quartz , on est sûr que ces cavernes contiennent du *cristal*. Voyez ce mot.

La *grotte du Chien* , en italien *grotta del Cane* , est ainsi nommée de l'épreuve que l'on fait de ses exhalaisons sur un chien , pour satisfaire la curiosité des Voyageurs. Cette grotte est située en Italie , dans le Royaume de Naples. Elle a environ huit pieds de haut , douze de long , & six de large. Il s'élève de son fond une vapeur chaude , ténue , subtile , qu'il est aisé de discerner à la simple vue. Cette vapeur en s'élevant couvre toute la surface du fond de la grotte ; & ce qu'il y a de remarquable , c'est qu'elle ne se disperse point dans l'air , mais qu'elle retombe un moment après s'être élevée. Si l'on y introduit un flambeau allumé , & qu'on le baisse contre terre , on le voit s'éteindre , à mesure qu'il en approche , & la fumée qui devroit naturellement s'élever , rase le sol & gagne vite le grand air par l'ouverture.

Le Docteur Mead a éprouvé sur lui-même , qu'on peut se tenir debout dans cette grotte , sans ressentir aucune incommodité , tant que la tête est au-dessus de la hauteur où s'élèvent les vapeurs. Il n'en est pas de même lorsque la tête y est plongée. L'Histoire rapporte que Charles VIII, Roi de France , en fit l'essai sur un âne ; & que deux Esclaves qui y furent mis la tête en bas par ordre de Pedro de Toledé , Viceroi de Naples,

y perdirent la vie. Aujourd'hui un homme qui a les clefs de cette grotte, en fait l'expérience sur un chien qui est au fait de ce manège. Il couche cet animal à terre dans la grotte ; au bout d'une trentaine de secondes , il paroît comme mort ; dans l'espace d'une minute , ses membres sont attaqués d'une espèce de mouvement convulsif , & il ne conserve bientôt d'autre signe de vie , qu'un battement , presque insensible , du cœur & des artères , qui seroit suivi de la mort , si on le laissoit deux ou trois minutes en cet endroit. Si après la défaillance , on le tire hors de la grotte , il reprend ses sens & ses esprits , aussi-tôt qu'on l'a plongé dans le lac d'Agnano qui est tout près , ou qu'on l'a jetté sur l'herbe. Quelques personnes avoient regardé ces vapeurs comme des moufettes ou vapeurs minérales ; mais par les épreuves qu'en a fait M. l'Abbé Nollet , il ne leur a reconnu aucune des qualités de ces espèces de vapeurs ; ce qui lui a fait penser que celles de la grotte du Chien ne produisent ces effets pernicieux , & ne mettent l'animal en danger de mort , qu'en produisant l'effet que feroit la vapeur de l'eau bouillante sur un animal qu'on obligeroit de la respirer.

L'Antiquité nomme plusieurs autres cavernes célèbres par des exhalaisons mortifères. Telle étoit la Méphitis d'Hierapolis , dont il est parlé dans Ciceron , dans Galien & dans Strabon , qui avoient été témoins de ses effets. Telle étoit encore la caverne Méphitique de Corycie , *Specus Corycius* , dans le mont Arima en Cilicie , qui , à cause de ses exhalaisons empestées , étoit appelée l'Antre de Typhon , *Cubile Typhonis*. Au reste les vapeurs pernicieuses de toute nature ne sont pas rares. *Voyez à l'article EXHALAISONS.*

La *grotte de la Sibylle* est près du lac d'Averne dans le Royaume de Naples. La principale entrée en est déjà comblée , & celle par laquelle on y parvient aujourd'hui s'affaïsse & se bouche tous les jours : c'est une des merveilles de l'Italie qu'il faudra bientôt rayer de ses Fastes.

La *grotte de Noce* est des plus bizarres à la vue. Sur le penchant de la montagne de Noce est un théâtre d'écueils effroyables , qui , au premier coup d'œil , semblent menacer ruine. On ne sauroit mieux comparer ces écueils qu'à une montagne mise en pièces à force de mines. Ce sont apparemment des rochers qui ont écroulé , & qui sont tombés l'un contre l'autre. Les uns sont restés droits en forme de tour , les autres ont roulé jusques dans la plaine , d'autres enfin sont restés attachés à la montagne. Dans leur rencontre mutuelle , ils ont formé des cavernes très variées , mais horribles , & des plus bisarres. Au rapport des payfans , quand il doit pleuvoir , on voit sortir par reprises du milieu de ces affreux & inaccessibles précipices de la fumée ou du brouillard. Au-dessus de l'Eglise de Noce , on trouve à mi-côte de la montagne une grotte très spacieuse , & si bien construite qu'on auroit peine à la croire naturelle : l'entrée en est très vaste , & ressemble à la porte d'un palais : dans l'intérieur de la grotte , l'on voit comme des espèces de petites chambres de figure presque

ovale , & couvertes de voûtes en dôme , avec des ouvertures qui communiquent d'un lieu à l'autre , & par où l'on a la vue des pentes de la montagne : il roule au milieu des appartemens une source d'eau qui murmure en tombant : enfin on voit dans ces grottes plusieurs congellations , qui prennent différentes figures , selon la différente courbure des parois.

La *grotte de la Balme* mérite d'être connue , à cause de sa grandeur , à cause des productions qu'elle renferme , & par la curiosité qu'eut François I^{er} de la faire examiner étant en Dauphiné , mais malheureusement par des gens peu hardis qui en dirent des fables. M. Morand en a donné la description dans le deuxieme tome des *Mémoires étrangers*. Cette grotte , située à sept lieues de Lyon , est dans une montagne qui s'étend très loin. Des congellations de diverses couleurs & de différentes formes , y font un très bel effet. Quelques-unes qui ont la figure de bassins , qui seroient disposés les uns au-dessus des autres , reçoivent l'eau qui forme des nappes & des cascades naturelles. On voit sortir d'une des rues de cette grotte , un courant d'eau qui se perd sous terre , vient ensuite reparoître à l'entrée de la grotte , & va se décharger dans le Rhône.

Un Curé du canton fit , avec quelques-uns de ses amis , l'entreprise de remonter le courant souterrain. Suivant leur relation , à peine , dans certains endroits , y avoit-il de l'eau ; dans d'autres , il étoit sans fond ; quelquefois ils furent obligés de porter leurs bateaux ; d'autres fois de s'y coucher. Après l'avoir remonté environ l'espace d'une lieue , leur navigation se termina à une ouverture ronde & spacieuse , dont l'eau sortoit à gros bouillons : c'est sans doute le bruit qu'elle fait en tombant , qui épouvanta les Observateurs de François I^{er}.

La *grotte de Quingey* , près du Doux , en Franche-Comté , est longue & large , & la Nature y a formé des colonnes , des festons , des trophées , des tombeaux ; enfin , l'on y voit , pour ainsi dire , tout ce que l'on veut imaginer ; car l'eau dégoutant , s'épaissit sous diverses figures & fait mille grotesques. Cette caverne , ainsi que toutes les autres de cette espece , est le séjour d'un nombre très considérable de chauves-souris.

La *grotte de Besançon* , ou la *Glaciere* , est une grande caverne creusée dans une montagne , à cinq lieues de Besançon. Plusieurs Mémoires , insérés dans ceux de l'Académie , ont parlé diversément de cette grotte. M. de Cossigni , Ingénieur en chef de Besançon , en a donné une description détaillée , inscrite dans le tome premier des Mémoires présentés à l'Académie. Le thermometre , suivant ses observations , est presque toujours fixé , dans cette caverne , à un demi degré au-dessus du terme de la glace. Le bas de cette caverne est de 146 pieds au-dessous du niveau de la campagne : l'entrée est large de 60 pieds & haute d'environ 80 ; la grotte a 135 pieds dans sa plus grande largeur , & 168 de longueur. On y voit treize ou quatorze pyramides de glaces ; de sept à huit pieds de hauteur. Ces pyramides se font sans doute formées en place de semblables colonnes de glace qu'on y voyoit au commencement de ce siècle ,

& qui furent détruites en 1727 pour l'usage du camp de la Saône , la glace manquant alors dans Besançon. On dit que cette glace est plus dure que celle des rivières : on explique ce phénomène , en observant que les terres du voisinage , & celles du dessus de la voûte , sont pleines d'un sel nitreux ou d'un sel ammoniacal naturel. La variation du thermomètre pendant l'hiver & l'été , y est très peu considérable ; aussi y a-t-il de la glace en tout tems. Il sort quelquefois de cette grotte , pendant l'hiver , un brouillard qui y annonce un léger dégel ; mais aussi-tôt que la chaleur se fait sentir , la glace augmente. Il regne continuellement dans cette glacière un froid très vif. Un coup de pistolet tiré dans la caverne y fait un bruit considérable. Peut-être seroit-il sage de ne pas répéter trop souvent cette dernière expérience , qui pourroit détacher des glaces qui sont attachées à la voûte.

On voit , par ce qui vient d'être rapporté , que cette grotte présente aux Physiciens un phénomène unique dans la Nature ; la glace qui s'y forme dans les chaleurs de l'été , prouve que le froid qui regne dans cet endroit souterrain est très réel , & n'est point relatif comme celui des autres souterrains , & fait par conséquent une exception aux règles que suit ordinairement la Nature. Aussi M. de Vanolles , Intendant de Franche-Comté , instruit qu'on enlevoit la glace à mesure qu'elle se formoit , & voulant conserver cette curiosité naturelle , fit fermer l'entrée de la grotte par une muraille de vingt pieds de haut , dans laquelle fut pratiquée une petite porte dont la clef fut remise aux Echevins du Village , avec défense d'y laisser entrer personne pour enlever de la glace. *Voyez les articles GLACE & GLACIERS.*

GROUGROU. C'est une espèce de petit palmier de l'Amérique : il est garni d'épines longues de quatre à cinq pouces. Cet arbre , différent du véritable palmier épineux , porte son fruit en grappes de la grosseur d'une balle de paume , & renfermant un petit cocos plus gros qu'une aveline , noir , poli , & très dur , au-dedans duquel est une substance blanchâtre , coriace , insipide , & très indigeste : cependant les Negres en mangent beaucoup. Les Sauvages en font une huile dont ils se frottent le corps. Le chou qui provient de cet arbre est infiniment meilleur que celui du palmier franc , mais moins exquis que celui du palmier épineux. Les montagnes de la Grenade en Amérique , sont toutes couvertes de *grougroux*.

GRUAU , *Grutum*. Voyez au mot AVOINE.

GRUE , *Grus*. C'est un oiseau scolopace & de grande taille , qui pèse quelquefois jusqu'à dix livres. Il a depuis le bout du bec jusqu'au bout des doigts près de cinq pieds de longueur. Il a le col très long , aussi-bien que les jambes ; le bec droit , pointu , d'un noir verdâtre , & long de près de quatre pouces ; le sommet de la tête noirâtre. Derrière la tête , le mâle a une espèce de plaque en forme de croissant , couverte de poils rougeâtres , ce que n'a pas la femelle. La grue a deux raies blanches derrière les yeux , la gorge & les côtés du col de couleur obscure , le plu-

mage du corps cendré, une envergure très large ; les grandes plumes sont noires ; sa queue est courte, & paroît arrondie quand elle se développe ; ses jambes sont noires & nues au-dessus des jointures ; ses doigts sont noirs & très longs, le doigt extérieur est lié par une membrane épaisse à la dernière articulation de celui du milieu.

La trachée artère de la grue a une conformation rare, elle entre profondément dans le sternum par un trou fait exprès, elle s'y réfléchit quelques tours, puis elle sort par le même trou pour aller aux poumons. L'estomac de cet animal est musculeux : il ne mange point de poisson, il mange du grain ou de l'herbe, quelquefois aussi des scarabées & d'autres insectes.

Ces oiseaux sont passagers comme les cicognes : les Auteurs de la suite de la Matière Médicale, disent en avoir vû passer par Orléans en plein jour, dans les quinze premiers jours du mois d'Octobre en 1753, des milliers qui voloient du Nord au Midi par troupes de 50, 60, & de 100 ; plusieurs de ces bandes s'étant abbatues la nuit dans des plaines de bled farrazin en Sologne, y firent beaucoup de dégât. La grue ne fait ordinairement que deux petits, nommés *Cuculides*, *ou* *en* *maie*, *ou* *en* *renelle*, & si-tôt qu'elle les a élevés, & qu'ils ont appris à voler, elle s'en va en poussant un cri qu'elle fait entendre de loin. On dit que les jeunes grues n'ayant pas encore de plumes courent cependant si vite qu'un homme ne sauroit presque les atteindre.

Quoique la grue soit un grand oiseau, il y a plusieurs petits oiseaux de proie instruits par les Fauconniers, qui osent se hasarder à la combattre corps à corps ; mais on a coutume d'en lâcher plusieurs, afin de pouvoir jouir de la vue de leur combat. Ces oiseaux aiment les lieux marécageux ; ils se battent quelquefois entr'eux très vivement. Lorsqu'ils volent en troupe, ils observent l'ordre de triangle, soit pour passer la mer pour voyager, soit sur terre. Il y a peu d'oiseaux dont le cri se fasse entendre d'aussi loin.

Les Polonois nourrissent des grues, auxquelles ils arrachent les plumes de la queue, & ils versent de l'huile dans les creux d'où elles ont été arrachées : il y renaît ensuite des plumes blanches, qui sont chez eux de grand prix, pour orner les bonnets des Gentilshommes. La grue est facile à tromper, car elle se joue & faute à la voix de l'homme qui contrefait son cri ; elle aime la compagnie & s'apprivoise aisément : mais, sans appeau, il est fort difficile d'en approcher & d'en tuer une seule, quoiqu'on les voie en foule par terre ; elles sont toujours aux aguets & s'envolent dès qu'elles apperçoivent le Chasseur. Les grues ont beaucoup de peine à s'élever de terre ; mais quand une fois elles sont à une certaine hauteur, elles volent avec aisance, & souvent à perte de vue, au point de ne paroître pas plus grosse que des grives : on prétend que ces animaux vivent plus de quarante ans.

Les pierres qu'on trouve dans l'estomac des grues, leur sont utiles

pour faciliter la digestion : ces pierres servent comme de petites meules , étant mises en mouvement par l'action de deux muscles forts & robustes qui composent le gésier.

La grue étoit autrefois recherchée dans les repas. Plutarque dit qu'on la tenoit enfermée dans des volieres & qu'on lui crevoit les yeux pour l'engraisser : cependant sa chair est massive , fibreuse & coriace : elle doit être bien faisandée & chargée d'assaisonnement pour qu'on en puisse manger sans en être incommodé. En Médecine , on l'estime propre pour le genre nerveux : sa graisse est pénétrante & résolutive , elle convient dans la paralysie & les rhumatismes : elle est utile dans certaines surdités.

On donne encore le nom de grue à plusieurs autres oiseaux : savoir , la *grue de Numidie*. Voyez DEMOISELLE DE NUMIDIE.

La GRUE DES INDES , *grus Indica*. Son col est dénué de plumes , la peau de cette partie est rouge , & les pieds de couleur de rose : elle est plus petite que notre grue.

La GRUE BALÉARIQUE est un très bel oiseau , de la figure de la cigogne , qui a le cri & la manière de vivre du paon : d'ailleurs il est assez semblable à la grue ordinaire. Sa tête est ornée d'une crête ou huppe , composée de quantité de plumes très déliées & menues qui sont dorées & placées au près des tempes ; cette grue a une tache blanche assez longue , au bas de laquelle se voient deux pendans de chair couleur de rose : on voit ordinairement cette grue aux environs du Cap Verd. Belon dit que la grue Baléarique est le *bihoreau* , & M. Perrault soupçonne que c'est l'*oiseau royal*.

La grue du Japon est presque toute blanche , le bec & les pieds sont d'un verd brun , le sommet de la tête d'un rouge éclatant , le bas du col est noirâtre , ainsi que les grandes plumes.

Les grues sont très communes à la Louisiane : on les y voit dans les terres , & le long des lacs & des fleuves. On les trouve aussi en grand nombre à la Chine : on les y apprivoise si facilement , qu'on leur apprend à danser.

GRUE, POISSON , *grus , piscis marinus*. Ce poisson qui se trouve dans l'Attique , a quinze pieds de longueur , & n'a que la grosseur d'une médiocre anguille ; il est très rare & ne se voit guère sur les côtes de France.

GRYPHITES , *conchiti curvi rostri*. Ce sont des coquilles bivalves & fossiles du genre des *huitres* ; voyez ce mot. La gryphite est très commune , elle ressemble un peu à un bateau : elle est composée de deux pièces inégales , dont l'une qui est inférieure , a un bec recourbé en dedans ; la valve supérieure est plate , ou légèrement concave : il y en a de feuilletées , d'unies , de cannelées & sillonnées : les unes sont petites , les autres sont grandes : l'analogie marin de cette coquille n'est pas bien connu.

GRYPs ou GRYPHUS : voyez CONDOR.

GUACUCUJA , ou CHAUVESOURIS AQUATIQUE , *vespertilio aquaticus*. Poisson du Bresil , dont la tête , fort grande à proportion du corps , a la figure d'un soc de charrue. Il a entre les yeux une corne fort dure & longue de deux doigts ; sa bouche est sans dents. Sa peau n'a point d'écailles , mais des tubercules , elle est brunâtre sur le dos , tiquetée de noir sur le côté & rouge sous le ventre. Ses nageoires sont fort élevées.

GUAFFINUM ou GUAINUMU : gros cancre du Bresil , fort bon à manger. Sa gueule est si large , que le pied d'un homme peut entrer dedans ; il se tient dans des trous auprès du rivage. Quand il tonne , ces cancrs sortent de leurs cavernes , & font un tel bruit entr'eux , qu'on croiroit qu'ils veulent surpasser celui du tonnerre.

GUAJACANA. Voyez PLAQUEMINIER.

GUAINIER. Voyez ARBRE DE JUDÉE.

GUANA : animal amphibie d'Afrique qui tient du crocodile , & qui n'a gueres plus de quatre pieds de longueur. Son corps est noir & tacheté , ses yeux sont ronds & sa chair tendre ; il n'attaque , ni les hommes , ni les bêtes , à l'exception des poules , dont il fait quelquefois un grand carnage.

Quantité d'Européens qui en mangent , trouvent sa chair au-dessus de la meilleure volaille.

GUANABANE : est l'arbre qui porte le fruit appelé *cœur de bœuf* : voyez ce mot.

GUAO : est un arbre fort commun au Mexique & dans l'Isle de Porto-Ricco. Son bois est verd , & empreint d'un suc caustique : on s'en sert à faire des bois de lit , parceque son suc a la propriété de chasser les punaises : cette même qualité agit aussi sur ceux qui le mettent en œuvre , puisqu'elle leur fait enfler pendant quelques jours les mains & le visage ; les feuilles du guao sont rouges & velues. Les Mexiquains appellent cet arbre *tetlathian*. Ses fruits sont de la grosseur & de la figure de ceux de l'arbousier , mais verdâtres : on n'en doit point manger , ni se reposer ou s'endormir sous cet arbre , à cause de ses émanations & de l'âcreté de son suc , qui est si caustique , qu'il enleve le poil de tous les animaux qui se frottent contre son tronc.

GUARA , *numenius indicus* , est un bel oiseau du Bresil , de la grosseur d'une pie , il a un long bec recourbé & de longs pieds. Quand il est nouvellement éclos , il est noir ; dès qu'il commence à voler , son plumage devient d'un beau blanc , & peu à peu il rougit , jusqu'à ce que avec l'âge , il devienne de couleur de pourpre , qui est la couleur qu'il garde ensuite. Il niche dans les maisons & vit de poissons , de chair & d'autres viandes toujours trempées dans de l'eau. Les Sauvages l'estiment fort , parceque ses plumes leur servent à composer leurs couronnes & leurs autres ornemens : ces oiseaux volent par bandes , & c'est quelque chose de fort agréable , que de les considérer quand le soleil darde sur eux.

GUARAL, est un insecte presque semblable à la tarentule, mais beaucoup plus grand : il se trouve dans les déserts de la Lybie : il est plus long que le bras & plus large que quatre doigts : il a du venin à la tête & à la queue. Les Arabes coupent ces deux parties quand ils en veulent manger. *Dapper, Descript. de l'Afrique, pag. 17.*

GUAYAVIER ou GOYAVIER, ou POIRIER DES INDES, *guayava*. Est un arbre des Indes Orientales, & de plusieurs Provinces de l'Amérique, haut d'environ vingt pieds, & gros à proportion. Sa racine est longue & ligneuse, rousse en dehors, blanche en dedans, pleine de suc, d'un goût doux ; son tronc est droit, dur & rameux : son bois est grisâtre, les fibres en sont longues, fines, pressées, mêlées & flexibles, ce qui les rend difficiles à couper : son écorce qui est unie, verte, rougeâtre, odorante, & d'un goût austère, est fort mince, & a beaucoup d'adhérence au bois, pendant que l'arbre est sur pied, mais elle se détache aisément, se fend & se roule quand il est abattu : ses feuilles sont opposées, longues de trois doigts, & larges d'un doigt & demi, charnues, pointues, un peu crépées, veineuses, vertes, brunâtres, luisantes. Il sort des aisselles de la queue de ces feuilles plusieurs pédicules qui soutiennent des fleurs grandes comme celles du coignassier, en rose a cinq pétales, blanches & de bonne odeur : il leur succède des fruits gros comme une pomme de reinette, ronds, couronnés comme une nœlle, d'abord verdâtres & acerbés, mais qui en murissant, prennent une couleur jaunâtre, & un goût agréable. Ce fruit est blanc en dedans ou rougeâtre, & divisé en quatre parties, qui contiennent chacune des graines menues, & si dures qu'on ne les digere jamais.

Ce fruit s'appelle *guayave* ou *goyave* : sa semence étant mise en terre, pousse en trois ans un arbre qui porte du fruit, & il continue à en porter pendant trente ans. Ses racines sont astringentes, & fort estimées pour la dysenterie & pour fortifier l'estomac. Ses feuilles sont aussi astringentes, vulnéraires, résolutives : on en emploie dans les bains pour guerir la galle ; son fruit fortifie l'estomac & aide à la digestion. On fait grand cas de cet arbre en Amérique : sur-tout dans la Guiane où l'on en distingue trois sortes par les fruits ; savoir, le blanc, le rouge & l'amazon : le blanc est un des meilleurs, le rouge devient fort gros. Ces fruits sont sujets à être attaqués des vers, le rouge en a davantage. En général le fruit du goyavier n'est pas très sain quand on le mange crud, attendu qu'il faut le manger un peu verd, avant que les vers y soient. Cet inconvénient disparoit si on en fait des compotes ou des marmelades qui sont excellentes. On en fait aussi des candis, des pâtes qu'on emploie en santé & en maladie.

Nous avons dit que les graines du goyavier ne se digeroient jamais : en effet les hommes & les animaux les rendent comme ils les ont prises, sans qu'elles perdent rien de leur vertu végétative : il arrive de-là que les animaux qui ont mangé de ces graines, les restituent avec leurs excréments

ments dans les savannes , c'est-à-dire , dans les prairies où ils paissent toute l'année. Bien-tôt ces graines prennent racine , levent & produisent des arbres qui seroient à charge dans une infinité de lieux , si on n'avoit grand soin de les arracher. Dans les Isles Caraïbes où les Negres habitent on ne manque pas de pepinieres de goyaviers. On a eu en Europe la curiosité de cultiver les goyaviers , & on est parvenu à avoir du fruit ; mais ces arbres n'ont poussé qu'à la hauteur de six à sept pieds. Le bois du goyavier est très bon à brûler , & on en fait en Amérique d'excellent charbon pour les forges. On se sert de son écorce pour tanner les cuirs.

GUEDE ou GUESDE. Plante du Languedoc qui sert à la teinture des draps. Voyez PASTEL.

GUENON ou GUENUCHE. Nom donné à la femelle du *singe*. Voyez *ce mot*.

GUÊPE , *Vespa*. Les guêpes sont des insectes carnaciers , chasseurs , vivant de rapines , dont l'histoire présente des objets capables de piquer la curiosité.

On peut diviser les guêpes qui vivent en société dans ce pays-ci , en trois classes principales , qui se distinguent par rapport aux différentes places qu'elles choisissent pour construire leurs nids. Celles de la première classe qu'on nomme guêpes aériennes les attachent à des plantes ou à des branches d'arbres : elles sont plus petites , & ne composent que des sociétés peu nombreuses. Les guêpes de la seconde classe se nichent dans des troncs d'arbres , ou dans des greniers peu fréquentés ; celles-ci sont les plus grosses de toutes : on les appelle *frêlons*. La troisième classe comprend celles que nous voyons le plus communément ; elles habitent sous terre , & on peut les nommer *guêpes souterraines*. Outre ces trois classes de guêpes qui vivent en société , il y en a aussi beaucoup d'espèces solitaires , qui ne montrent pas moins de tendresse pour leurs petits , que les abeilles solitaires , & qui ont recours à des moyens aussi singuliers que ceux que ces dernières emploient , pour les loger commodément & pourvoir à leur subsistance.

Les guêpes se distinguent très aisément de tout autre insecte , par leur forme & par leur couleur. Le ventre ne tient au corselet que par un filet très fin , qui est plus long dans les unes , plus court dans les autres ; au lieu qu'on ne l'apperçoit qu'à peine dans les abeilles : de plus le corps des guêpes est lisse , luisant , & leur livrée distinctive est du jaune & du noir , combinés par raies & par taches. Les guêpes ont les antennes brisées ou coudées dans leur milieu , elles ont trois petits yeux lisses , & n'ont point de trompe comme les abeilles ; mais elles ont à la place une bouche qui ressemble à ces fleurs que les Botanistes nomment *fleurs en gueule*. Cette bouche est accompagnée de deux espèces de dents , qui tiennent aux deux côtés de la tête , & qui viennent se rencontrer sur le devant de la bouche ; elles sont larges à leur extrémité , & se terminent par trois dentelures à pointes aiguës , dont la structure est très appropriée à ces insectes

voraces. Une singularité particuliere aux guêpes, & qui les fait distinguer de toutes les autres mouches à quatre aîles, est que leurs aîles supérieures, plus longues que les inférieures, sont toujours pliées en deux dans leur longueur, excepté dans le tems que la mouche vole. Au-dessus de l'origine de chaque aîle supérieure, est une partie écailleuse qui fait l'office de ressort, & empêche l'aîle supérieure de s'élever trop; cette partie rend par conséquent les coups d'aîles plus courts, & les vibrations plus vives; ce qui étoit nécessaire à cet insecte, qui, destiné à vivre de chasse, est souvent obligé de poursuivre sa proie à tire d'aîles.

Structure du Guêpier construit par les Guêpes souterraines ou Guêpes domestiques.

On a donné aussi le nom de *guêpes domestiques* à ces guêpes qui habitent sous terre, parcequ'elles entrent familièrement dans nos appartemens, qu'elles se jettent sur nos tables comme des harpies, qu'elles ravagent nos espaliers, & sur-tout nos muscats dont elles sont très friandes.

C'est toujours sous terre, souvent à un pied ou un pied & demi de profondeur, au milieu d'un pré, d'un champ, sur les bords d'une allée ou d'un grand chemin, dans un lieu sur-tout où la terre est facile à remuer, que l'on trouve les guêpiers : ils se font remarquer à la surface de la terre, par un trou qui peut avoir un pouce de diametre, par où elles entrent & elles sortent continuellement.

Ce trou est une espece de galerie que les guêpes ont faite à force de miner, & qui conduit par des détours au séjour ténébreux où est construit le guêpier. C'est M. de Réaumur qui nous a instruit de la maniere dont les guêpes construisent; il les a observées dans des ruches vitrées, dans lesquelles il a fait mettre des guêpiers.

Lorsqu'on veut jouir du plaisir d'examiner un guêpier, on peut commencer par faire périr les guêpes, en introduisant par l'ouverture qui est à la surface de la terre, une mèche soufrée, dont la vapeur les étouffe. On fouille ensuite la terre légèrement, & on découvre enfin une espece de boule allongée ou sphérique, & qui a quelquefois jusqu'à quatorze ou quinze pouces dans son plus grand diametre. On observe toujours deux portes à l'extérieur d'un guêpier; les habitans sortent par l'une & entrent par l'autre avec la dernière exactitude. Si on coupe un guêpier en deux, on remarque d'abord son enveloppe, dont l'épaisseur est d'un pouce ou d'un pouce & demi, & qui n'est composée que d'especes de feuilles de papier. L'usage de ce mur est de préserver l'intérieur du nid de l'humidité de la terre & des pluies qui la pénètrent. Cette matiere de papier y paroît peu propre, mais l'on voit ici une structure singuliere suppléer à la foiblesse : toutes ces feuilles de papier qui composent l'enveloppe du guêpier, au lieu d'être plates & appliquées exactement les unes sur les autres, sont séparées, & ne forment qu'un assemblage de petites voutes :

de cette maniere l'eau coule facilement ; une voute défend l'autre , & l'humidité ne peut pas pénétrer , ce qui seroit arrivé si toutes les feuilles eussent été appliquées les unes contre les autres. Cette architecture a de plus l'avantage d'épargner beaucoup de matiere , & par conséquent de travail aux ouvrières.

Il n'y a pas mille ans que l'on a l'usage du papier ; avant ce tems nos ancêtres ne se servoient pour écrire , que de feuilles de plantes , d'écorces d'arbres , de tablettes de cire , toutes matieres fort incommodes & d'un usage très embarrassant. Le parchemin inventé par un Roi de Pergame étoit une marchandise chere , & destinée seulement pour des ouvrages d'importance. Si les hommes eussent su observer les guêpes dont nous parlons , elles auroient pu leur apprendre l'art de faire le papier.

On rencontre très fréquemment des guêpes attachées sur de vieux treillages ; de vieux chassis , ou autres vieux bois ; si on les observe , on les voit occupées à ratifier le bois avec leurs dents , en détacher les fibres , les écharper , les couper , les mettre en masses de forme ronde , qu'elles portent tout de suite à leur guêpier. Aussi-tôt qu'elles ont fait leur provision de cette matiere premiere de leur papier , elles vont le fabriquer. Pour cet effet elles l'humectent d'une liqueur qu'elles dégorgent , & dont elles se servent pour coller ensemble toutes ces petites fibres , qu'elles pétrissent avec leurs pattes & réduisent , à l'aide de leurs dents , en lames minces pour former l'enveloppe & même les cellules du guêpier.

La matiere que les guêpes emploient , & celle dont nous nous servons , sont si peu éloignées l'une de l'autre , que le bien public exige qu'on y fasse attention. Les Maîtres des papeteries se plaignent souvent que les vieux chiffons deviennent de jour en jour une matiere rare , parceque la consommation du papier augmente , pendant que celle du linge , dont il est fait , reste à-peu-près la même. Les guêpes nous donnent des vues pour multiplier le fond de ce commerce , elles nous apprennent que nous pouvons en trouver la matiere premiere ailleurs que dans les chiffons ; leur exemple est pour nous une leçon qui doit nous exciter à chercher parmi les plantes inutiles , & même parmi les arbres ou les vieux bois , de quoi suppléer à la disette du vieux linge , à chercher des plantes dont on puisse faire immédiatement du papier , en s'y prenant d'une maniere équivalente à celle des *guêpes*. Voyez ci-après GUÊPES CARTONNIERES.

L'intérieur du guêpier est un édifice qui a quelquefois plus de douze à quinze étages , mais dont les inférieurs sont bâtis les derniers ; ils sont tous de matiere de papier , ainsi que l'enveloppe. Entre chaque étage regne une colonnade formée par des liens employés à suspendre le gâteau inférieur , & à le tenir attaché à celui qui le précède immédiatement. Ces étages sont proportionnés à la taille des guêpes , & par conséquent peu élevés ; ce sont des especes de places publiques. Chaque gâteau est composé de cellules exagônes , construites régulièrement , disposées dans un plan parallele à l'horizon. Les édifices sont d'autant plus parfaits , qu'ils

répondent mieux aux vues qu'on a en les construisant : ceux des guêpes auroient de grands défauts , s'ils étoient construits sur le modele de ceux des abeilles ; aussi ne le font-ils point. Les gâteaux des mouches à miel sont composés de deux rangs de cellules adossés l'un à l'autre ; ceux des guêpes n'ont qu'un seul rang de cellules , dont les ouvertures sont en bas ; les fonds regardent le haut & forment tous ensemble ces places publiques, ornées de colonnades. Les cellules ne contiennent ni miel , ni cire : elles sont uniquement destinées à loger les vers , les nymphes & les jeunes mouches qui n'ont pas encore pris l'essor. On peut compter , dans un guêpier de moyenne grandeur , jusqu'à dix mille alvéoles ; & comme chaque alvéole peut servir de berceau à trois jeunes guêpes , consécutivement un guêpier peut produire par an trente mille guêpes.

*Mœurs des Guêpes , leur nourriture , la maniere dont elles naissent ,
& dont elles élèvent leurs petits.*

Une république de guêpes souterraines , telle nombreuse soit-elle , est presque l'ouvrage d'une seule mere qui a été fécondée en automne , & qui au printems a commencé à chercher à se débarrasser du fardeau de sa fécondité. Elle creuse elle-même en partie la cavité qui contient le guêpier ; ou bien elle profite d'un trou de taupe , dans lequel elle construit des alvéoles , & y dépose à mesure des œufs. Au bout de vingt jours , ces œufs ont passé par les états de vers & de nymphes , & sont devenus guêpes. La mouche mere les a nourris , veillés , soignés toute seule ; mais à peine ces mouches sont-elles écloses , qu'elles l'aident dans les travaux du ménage.

La mere guêpe donne naissance à des mouches de trois especes différentes ; savoir , des *mâles* , des *femelles* & des *mulets*. Ces dernieres mouches sont ainsi nommées , parcequ'elles sont sans sexe , ou *ouvrieres* parcequ'elles sont presque seules chargées de tout le travail. Ces mulets sont communément de deux grandeurs différentes : ils portent un aiguillon dont les piqures sont plus cuisantes que celles des abeilles. Les mâles tiennent le milieu , pour la grosseur , entre les mulets & les femelles , & sont pareillement de deux grandeurs , mais ils n'ont point d'aiguillon. Enfin les plus longues de toutes sont les femelles , qui sont armées d'un aiguillon très redoutable. Ces trois especes varient encore en nombre. Pour quinze ou seize milliers de mulets , on trouve ordinairement , à la fin de l'été , trois cents mâles & autant de femelles.

Comme il n'y a que les guêpes mulets qui aident la mere dans ses travaux , la nature a sagement établi qu'ils seroient pondus & naîtroient les premiers : un guêpier ne se peuple de deux sexes qui servent à la multiplication , qu'après avoir été pourvu d'un grand nombre de mulets. Lorsque ceux-ci sont parvenus à être en nombre suffisant pour exempter la mere guêpe de travailler aux édifices publics , elle ne s'occupe plus qu'à

pondre dans les alvéoles qu'on lui prépare, & à veiller sur sa postérité. De quinze ou seize gâteaux qui composent un guêpier, il n'y a que les quatre ou cinq derniers qui contiennent des cellules à mâles & à femelles.

Les soins & les attentions que la mère & les fils aînés prennent pour la jeune postérité, sont des plus admirables. Lorsque les vers sont éclos, on va leur chercher à la campagne de quoi vivre : on leur donne la becquée : on leur dégorge d'abord du sirop de fruits, du jus de viande ou du hachis, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour prendre des nourritures plus solides, manger des ventres d'insectes, & même de la viande crue. Il y a lieu de penser qu'il passe dans le séjour ténébreux du guêpier, assez de lumière pour éclairer ces animaux, & que la délicatesse de leur organe supplée à la petite quantité de rayons lumineux qui percent la terre & les autres corps, & qui parviennent jusqu'à eux. Lorsqu'ils sont arrivés à leur état de perfection, ils filent une coque qui tapisse & bouche leurs cellules : ils passent à l'état de nymphes ; & au bout de quelques jours à celui de guêpes, qui, dès l'instant qu'elles sont nées, vont sur-le-champ chercher à vivre. Voyez au mot INSECTE, ce que ces transformations présentent de curieux.

Les guêpes ne s'entretiennent point du fruit de leurs travaux, & ne font point de provisions ; ce sont de vrais pillards, qui semblent nés pour vivre à nos dépens : nos fruits, nos viandes, les mouches précieuses qui nous fournissent le miel & la cire, sont la nourriture après laquelle elles courent le plus volontiers. On les voit quelquefois fondre comme des éperviers sur des abeilles, les couper en deux, & emporter la partie postérieure qu'elles savent contenir du miel & des intestins qui sont fort de leur goût.

On voit ces mouches en grand nombre dans les boutiques des Bouchers de campagne, où elles coupent des morceaux si pesans, qu'elles sont obligées de se reposer à terre. Les Bouchers, pour éviter un plus grand pillage, ne trouvent rien de plus avantageux que de laisser sur l'appui de leur boutique un foie de veau ou une rate de bœuf, à laquelle les guêpes s'attachent de préférence, parceque ces morceaux sont plus tendres. D'ailleurs elles leur rendent l'important service de poursuivre ces grosses mouches bleues, qui déposent sur la viande des œufs, d'où sortent ces vers qui la font corrompre plus vite : ces mouches n'osent plus approcher d'une boutique où elles apperçoivent les guêpes, qui sont leurs plus cruelles ennemies.

Lorsque les guêpes mulets, qui ont été au pillage, apportent la provision au guêpier, plusieurs guêpes s'assemblent autour d'eux, & chacune prend sa portion de ce qu'ils ont apporté ; d'autres dégorgent le suc des fruits qu'ils ont sucés, & en font part aux mouches du guêpier. Cela se fait de gré à gré, sans combat ni dispute. Lorsque dans l'été il survient des pluies qui durent plusieurs jours, comme ces mouches ne font point de provisions, elles sont obligées de jeûner.

Depuis le printems jusques vers la fin du mois d'Août, la mere guêpe ne fait que donner le jour à des mulets; ensuite elle commence à donner naissance à des mâles & à des femelles. Ce n'est donc qu'au commencement de l'automne qu'un guêpier peut passer pour complet, & que la république est pourvue de trois especes d'habitans qui doivent la composer; leur nombre va quelquefois jusqu'à trente mille. La mere primitive qui s'étoit renfermée pendant les mois de Juin, Juillet & Août pour faire cette prodigieuse ponte, recommence à sortir vers le mois de Septembre, & avec elle, les mâles & les femelles nouvellement nés. Les mâles ne sont pas tout-à-fait aussi paresseux que ceux des mouches à miel: ils s'occupent à tenir le guêpier net, & à jeter dehors les corps morts. Les femelles sont plus actives: leurs soins s'étendent à tout: mais la ponte est le plus essentiel de leurs devoirs.

Malgré le concert & l'union qu'on remarque dans un guêpier, la paix n'y regne pas toujours. Il y a souvent des combats de mulets contre mulets, de mulets contre mâles; mais ces combats vont rarement à la mort comme parmi les abeilles. Cependant vient un tems où la barbarie prend le dessus; ce Royaume se renverse de lui-même, & se détruit de fond en comble pour notre repos & pour celui de bien des êtres vivans. Vers le mois d'Octobre, dans le tems que le guêpier est fourni d'une jeunesse vive & brillante; que les mâles & les femelles, dans toute la vigueur de leur âge, ne songent probablement qu'à peupler, une especie de fureur s'empare tout-à-coup des guêpes. Ces nourrices si tendres, deviennent des marâtres impitoyables; les mâles, les mulets jettent hors des cellules, les œufs, les vers; les nymphes, sans distinction de sexe. Lorsque toute cette espérance de l'Etat est périée, les peres & meres, les mulets mêmes ne font que languir; les premiers froids de l'automne les affoiblissent. A mesure que l'hiver approche, ils perdent jusqu'à la force de chercher leur nourriture, & périssent presque tous de faim & de misere. Si quelqu'une des femelles, qui, toutes ont été fécondées, peut échapper dans quelques trous de murs aux froids de l'hiver, elle reparoît au printems, & jette elle seule les fondemens d'une nouvelle république.

Des Frélons.

Comme l'histoire des frélons (*Crabro*) a beaucoup de choses communes avec celle des guêpes souterraines, nous ne parlerons que de celles en quoi elle differe essentiellement.

Les frélons sont de véritables guêpes; & même les plus grandes de ce pays-ci. Leur piqure est terrible & presque meurtriere, sur-tout dans les grandes chaleurs où le poison est le plus actif: on a vu un Observateur piqué si vivement par un de ces insectes, qu'il en perdit la connoissance, & presque l'usage des jambes pour l'instant, & eut la fièvre pendant deux ou trois jours.

Les gâteaux des frélons sont disposés de même que ceux des guêpes souterraines ; mais les liens qui les attachent les uns aux autres , sont plus hauts , plus massifs , & encore moins réguliers ; celui du milieu est beaucoup plus gros que les autres ; & comme ils sont faits d'une sorte de papier plus mauvais & plus cassant , parceque la matiere qu'ils emploient n'est que de la sciure de bois pourri , les frélons ont soin de mettre leur nid dans un creux de tronc d'arbre , ou dans d'autres lieux peu fréquentés & abrités , où l'eau ne sauroit pénétrer. L'entrée de leur guêpier est un trou percé à côté de l'arbre ; & qui traversant le vif du bois , vient sortir par l'écorce.

Ces guêpes sont infiniment supérieures en force à toutes les autres : elles en feroient un furieux carnage , si la Nature n'avoit mis un frein à leur voracité , en ne leur donnant qu'un vol lourd , accompagné d'un bruit qui avertit de loin les autres insectes de l'approche de leurs plus redoutables ennemis. Du reste , tout ce que nous avons dit des guêpes convient parfaitement aux frélons.

Guêpes aériennes.

Ces especes de guêpes sont les plus petites de toutes celles qui vivent en société : on leur donne le nom de *guêpes aériennes* , parcequ'elles établissent leur nid en plein air : elles s'attachent communément à une branche d'arbre , ou à une paille de chaume. Ces nids sont attachés par un lien qui leur tient lieu de main ou de bras : on en voit de diverses grosseurs , depuis celle d'une orange jusqu'à celle d'un œuf de poule. Leurs gâteaux sont placés verticalement , & défendus par une enveloppe composée d'un très grand nombre de feuilles. Si ces feuilles , au lieu d'être grises , étoient d'une couleur vermeille , l'enveloppe seroit prise pour une rose à cent feuilles , commençant à s'épanouir , mais plus grosse que les roses ordinaires. La structure & la position de ce nid donnent lieu à l'eau de s'écouler , mais plus que tout cela , une espece de vernis avec lequel les guêpes recouvrent le papier dont est construit leur nid. Ce vernis est même si bon , qu'on a éprouvé de laisser tremper dans l'eau un de ces nids , qui n'a été nullement altéré ni ramolli. La vie & les occupations des guêpes aériennes , sont à-peu-près les mêmes que celles des guêpes souterraines.

Guêpes Cartonnières.

Les ouvrages des guêpes de notre pays dont nous venons de parler , ont sans doute de quoi piquer la curiosité ; mais ils nous sembleront très imparfaits si nous les comparons avec ceux d'une espece de guêpes des environs de Cayenne , qu'on peut nommer *guêpes cartonnières*.

Ces guêpes sont plus petites que celles de notre climat : elles naissent , croissent & vivent à-peu-près de la même manière ; mais leur guêpier est

digne de toute l'attention d'un Observateur de la Nature. Il est fait d'un carton qui ne seroit pas défavoué par ceux de nos Ouvriers qui le font le plus beau , le plus blanc , le plus ferme , & qui savent lui donner le grain le plus fin.

Ces mouches attachent leur guêpier à une branche d'arbre. Son enveloppe est une espece de boîte du plus beau carton , & de l'épaisseur d'un écu : cette boîte est longue de douze à quinze pouces , & quelquefois plus ; elle a la figure d'une cloche allongée , fermée par en bas , qui n'auroit pour toute ouverture qu'un trou d'environ cinq lignes de diametre à son fond. Son intérieur est occupé par des gâteaux de même matiere , disposé par étage , comme ceux des guêpes souterraines. La circonférence de chaque gâteau fait , par-tout , corps avec la boîte : chacun de ces gâteaux a un trou vers son milieu , qui permet aux mouches d'aller de gâteau en gâteau , & d'étage en étage.

Le guêpier des guêpes de Cayenne prouve donc , encore mieux que celui des guêpes souterraines , qu'il seroit possible de faire de beau papier en se servant immédiatement du bois. Ce seroit vraisemblablement parmi les bois blancs qu'il faudroit chercher la matiere de ce papier.

Il est si certain qu'on peut faire du papier par cette méthode , qu'au rapport de Kempfer , les Japonois n'emploient point d'autres matieres. Ils pilent les écorces de certains arbres qu'ils mettent en bouillie ; & cette bouillie , plus ou moins fine , est la matiere dont ils font leurs différens papiers , qui valent bien les nôtres.

Guêpes ichneumones.

Les Naturalistes ont désigné par le nom d'*Ichneumones* , des mouches guerrieres , qui attaquent & tuent les araignées , telles que sont les especes de guêpes dont nous allons parler : ils ont étendu aussi la signification de ce mot à des mouches qui laissent les araignées en paix , mais qui percent le ventre d'une chenille , & y déposent leurs œufs. On peut voir au mot MOUCHE ICHNEUMONE , pourquoi on donne ce nom d'*Ichneumon* à ces insectes.

Les guêpes ichneumones different principalement des autres guêpes , parcequ'elles n'ont point leurs aîles supérieures pliées en deux : elles ont , pour caracteres distinctifs bien sensibles , d'agiter continuellement leurs antennes , ainsi que les mouches ichneumones , & de porter au derriere , les unes une tarriere , les autres un aiguillon , qui n'est point caché dans l'intérieur du corps , comme l'aiguillon des guêpes ordinaires. Dans quelques especes , l'aiguillon se coule dans une coulisse taillée pour le recevoir dans les derniers anneaux.

Elles fondent sur les insectes , comme le faucon sur sa proie : elles ne se nourrissent , elles & leurs petits , que de leurs chasses. Il y a plusieurs

seurs especes de guêpes ichneumones , qui vont nous présenter un spectacle curieux

Ces guêpes ne vivent point en société , non plus que quelques especes d'abeilles solitaires , dont on peut voir l'histoire au mot ABEILLE. Nous avons observé qu'elles ont d'ailleurs quelque chose de commun avec ces abeilles , même avec l'abeille maçonne , pour la maniere de bâtir & de creuser , soit dans le sable , soit dans le bois.

Les murs faits de moilons unis par un mélange de sable & de terre , & placés à l'exposition du midi , sont les lieux qu'habitent certaines guêpes ichneumones : on peut remarquer sur ces murs de petits tuyaux creux , qui saillent hors du mur : ces trous sont l'ouvrage d'une espece de guêpes ichneumones : ce sont les berceaux qu'elles ont construits pour leurs petits.

La couleur dominante de cette espece de guêpe est le noir ; ses anneaux sont bordés d'un peu de jaune. C'est ordinairement dans le mois de Mai qu'elle se met à l'ouvrage : elle creuse , dans le mortier du mur , un trou de plusieurs pouces de profondeur. Pour y parvenir , elle humecte ce mortier avec une liqueur visqueuse qu'elle dégorge ; à mesure qu'elle le détache , elle le pêtrit , & élève , à l'entrée du creux qu'elle fait , un tuyau qui en prolonge la continuité au-dehors. Cet insecte travaille avec tant d'activité , qu'il ne lui faut pas plus d'une heure pour creuser un trou de la longueur de son corps , & élever un tuyau aussi long que la profondeur de ce trou. (Nous avons vu bâtir un de ces nids contre l'angle d'un mur ; ce nid qui étoit composé de plusieurs cellules séparées , avoit un pouce & demi de hauteur.) Le tuyau extérieur , formé par l'assemblage des pelottes de mortier , ressemble à cet ornement d'architecture que l'on nomme *Guillochis*.

Lorsque la guêpe a donné à ce trou la profondeur nécessaire , elle y dépose au fond un œuf , d'où doit éclore un ver ; & elle va ensuite chercher des provisions , afin que ce ver en naissant puisse trouver sa nourriture. Cette provision consiste en plusieurs petites chenilles vivantes , de couleur verte , toutes de la même espece. Elle en porte d'abord une au fond de son trou : cette chenille s'y roule sur-le-champ en anneaux , & reste-là aussi immobile que si elle n'avoit point de vie : une seconde est posée sur celle-ci , & se place de même , ainsi que les autres qui arrivent successivement , jusqu'au nombre de dix ou douze. Elles sont arrangées par lits , les unes sur les autres , & en sont d'autant moins en état de se défendre contre les attaques du petit ver qui en doit sucer une tous les jours. La guêpe se sert ensuite du mortier qui faisoit le tuyau extérieur pour boucher le trou. Elle construit ainsi successivement plusieurs trous pour déposer un œuf dans chacun , & y rassembler de même une provision de ces chenilles , qui sont arrivées à leur état de perfection , & n'ont par conséquent plus besoin de nourriture ; ce qui fait qu'elles restent vivantes , & que les vers , naissants des guêpes , les trouvent toutes prêtes

pour en faire leur nourriture. Lorsque les vers des guêpes ont consumé leur provision, qui étoit tout juste ce qu'il leur falloit pour le tems de la durée de leur accroissement, ils se filent une coque, se changent en nymphe, & ensuite en une mouche guêpe, qui fait bien s'échapper de sa prison.

D'autres especes de guêpes ichneumones, de la grosseur de celles qui donnent des chenilles vertes à leurs petits, mais sur le corps desquelles le jaune domine davantage, fournissent leurs petits d'araignées, qui sont apparemment mieux de leur goût. On voit quelquefois dans leur trou sept ou huit araignées toutes vivantes, d'une espece à longues jambes. D'autres guêpes donnent à leurs petits des araignées d'une espece différente des précédentes; ce qui prouve que chaque espece de guêpe choisit constamment, pour la nourriture de ses petits, des insectes d'un certain genre. On ne trouve point, dans un même trou, des chenilles, des araignées & des vers mêlés ensemble: il n'y a ordinairement que d'une seule espece de ces insectes.

Certaines especes de guêpes ichneumones creusent leurs nids dans des morceaux de bois; ce qui leur fait donner le nom de *guêpes perce-bois*.

Les guêpes ichneumones de l'Isle de France sont entièrement noires; leur corps a un long étranglement, aussi délié qu'un fil. Ces guêpes appliquent leurs nids, comme les hirondelles, dans quelque endroit d'une maison: elles forment ce nid avec une terre détrempée, & lui donnent la forme d'une boule de la grosseur du poing: son intérieur est de douze ou quinze cellules. A mesure que chaque cellule est construite, la guêpe porte dedans une certaine quantité de petites araignées, qu'elle y renferme ensuite avec l'œuf d'où sortira le ver qui s'en doit nourrir.

Il y a aussi dans l'Isle de France une espece de guêpes très belles & très utiles. Leur forme approche de celle des guêpes ordinaires; leur tête, leur corps & leur corselet sont d'un bleu changeant: elles paroissent bleues ou vertes, suivant la position où on les regarde: leurs antennes sont noires: leurs yeux sont couleur de feuille morte; leurs jambes de couleur violette, & bronzée proche de leur origine.

Ces guêpes sont armées d'un terrible aiguillon: elles sont hardies; guerrieres; elles livrent des combats à des insectes fort supérieurs en grandeur, & sur lesquels néanmoins elles remportent une pleine victoire. Ces insectes sont les kakerlaques, connus dans nos Isles & sur nos vaisseaux par les ravages qu'ils y font. On peut voir, au mot KAKERLAQUE, le combat de ces guêpes avec cet insecte.

GUÊPIER. Nom donné à l'habitation, ou plutôt aux gâteaux & alvéoles des guêpes, &c. Voyez à l'article GUÊPE.

GUÊPIER, MÉROPS ou APIASTER. Oiseau de la grandeur d'un merle, mais plus long. Pour la figure du corps, il ressemble beaucoup au martin-pêcheur. L'iris de ses yeux est d'un brun rouge; son plumage est fort varié pour la couleur; rougeâtre derrière la tête; d'un jaune-verdâtre au

col ; les plumes des ailes sont vertes , mêlées de noir ; quelquefois bleues , mêlées de rouge. La conformation du pied de cet oiseau est singulière ; car le doigt extérieur tient à celui du milieu par trois phalanges , & le doigt intérieur par une phalange seulement. Le guêpier a les jambes courtes & grosses ; ses griffes sont noires. Cet oiseau se nourrit non-seulement d'abeilles & de cigales , même de scarabées , mais aussi des semences d'hépatique , de persil bâtard , de navets , &c.

On trouve à Bengale une espèce de guêpier cendré , un peu bigarré : celui du Brésil a le bec long , pointu , mais de la forme d'une faulx.

GUEULE. C'est cette ouverture que l'on voit à la tête des quadrupèdes carnassiers , où se trouvent leurs dents , leur langue , & où ils mâchent ce qu'ils prennent pour vivre. Voyez à l'article BOUCHE.

GUHR. Ce nom , qui est Allemand , exprime toutes sortes de substances minérales extrêmement atténuées par le frottement des eaux souterraines , & qui se trouvent chariées & déposées dans les cavités des montagnes.

On comprend facilement que le guhr doit être une matière minérale , coulante ou molle , qui découle comme la matière des stalactites , ou dans la galerie des mines , ou dans les fentes des rochers. Si l'eau charrie du métal , du minéral décomposé , ou de l'ochre , c'est du guhr métallique : si elle ne contient qu'une sorte de craie , c'est du guhr crétacé : ainsi on voit qu'il peut y avoir bien des espèces de guhrs.

On trouve communément le guhr crétacé , coulant dans les montagnes , sous la forme d'une matière aqueuse , ou blanchâtre ou grisâtre. Le dépôt est plus ou moins lent à s'en faire , selon que la matière est plus ou moins ténue. Il y en a qui reste long-tems suspendu dans l'eau avant que de se précipiter. Ce phénomène vient encore de ce qu'il n'y a point de guhr si simple qu'il ne contienne quelque chose d'étrange à sa nature. La consistance de ce guhr précipité , jointe à son mélange , est peut-être la seule différence qu'il y ait entre la *craie coulante* , l'*agaric minéral* & la *farine fossile*. Voyez ces mots

La plupart des Auteurs Minéralogistes regardent les guhrs métalliques , comme la matière première & l'ébauche des métaux ; peut-être font-ils des minéraux décomposés : il est sûr du moins que c'est un indice de la proximité de quelques filons métalliques ; & que celui qui est durci & rougeâtre , est souvent riche en métaux : celui du toit de la plupart des mines , est rougeâtre , & contient du fer : celui qui est verd & bleu annonce du cuivre ; quand il est blanc & bleu , il désigne une mine d'argent.

GUI ou GUY , *viscum*. C'est une véritable plante parasite , qui , aux yeux des Physiciens , est un végétal très singulier. Son origine , sa germination , son développement méritent un examen attentif & des recherches particulières. C'est ainsi qu'en ont pensé Malpighi , Tournefort , Vaillant , Boherrave , Linnæus , Barel , Camerarius : enfin M. Duha-

mel a publié dans les *Mém. de l'Acad. des Scienc. ann. 1740*, des observations très curieuses sur ce sujet, qui contribueront à rendre cet article intéressant.

Le gui est une plante vivace & ligneuse, qui ne végète point dans la terre, mais seulement dans l'écorce des branches d'une grande quantité d'arbres où ses racines sont implantées : l'on en a trouvé sur le sapin, le méleze, le pistachier, le noyer, le coignassier, le poirier, les pommiers francs & les sauvages, sur le néflier, l'épine blanche, le cormier, le prunier, l'amandier, le rosier. On le voit encore communément sur le châtaignier, le noisetier, le tilleul, le hêtre, le bouleau, l'érable, le frêne, l'olivier, le faule, le peuplier ; sur l'orme, le noirprun, le buis, mais particulièrement sur les espèces de chênes. On prétend en avoir vu aussi sur la vigne, sur le genévrier & sur le faux acacia, & jamais sur le figuier. M. Duhamel en a vu germer sur des morceaux de bois mort, sur des tisons de pots & sur des pierres seulement tenues à l'ombre du soleil.

La racine du gui est peu apparente, d'abord verte, tendre & grenue, puis ligneuse dans son milieu. Il pousse de cette racine une espèce d'arbrisseau qui croît à la hauteur d'environ deux pieds, & forme une boule assez régulière. Ses tiges sont grosses comme le petit doigt, ligneuses, compactes, pesantes, nerveuses, d'un verd-brun en dehors, d'un blanc-jaunâtre en dedans, droites d'un nœud à l'autre, où elles font de grandes inflexions. Les nœuds sont de vraies articulations par engrenement ; & les pousses de chaque année se joignent les unes aux autres, comme les épiphyses se joignent au corps des os. Cette plante jette beaucoup de rameaux ligneux, plians, souvent entrelacés les uns dans les autres, plus gros par les deux bouts : ils sont articulés, couverts d'une écorce verte, un peu inégale & grenue : ses feuilles sont opposées deux à deux, oblongues, épaisses, dures & charnues sans être succulentes, assez semblables à celles du grand bouis, mais un peu plus longues, veineuses, obtuses & de couleur verte-jaunâtre, d'un goût douceâtre, légèrement amer, d'une odeur foible & désagréable.

MM. de Tournefort, Linnæus & Boerhave ont avancé que les deux sexes se trouvent sur les mêmes individus, mais dans des endroits séparés : cependant les Auteurs de la Matière médicale disent avoir reconnu par l'expérience, qu'il y a des pieds de gui mâles, qui ne portent jamais de fruit, & d'autres femelles qui en sont chargés presque tous les ans. Les fleurs du gui naissent aux nœuds des branches ; elles sont petites, formées en cloche, à quatre échancrures, ramassées par bouquets quelquefois jusqu'au nombre de sept : mais ces bouquets sont stériles. Les boutons à fruit sont placés dans les aisselles des branches sur les individus femelles, & ne contiennent ordinairement que trois ou quatre fleurs qui s'ouvrent en Février & en Mars. Il est digne de remarque que les boutons qui contiennent des fleurs mâles sont trois fois plus gros & plus arrondis que les boutons qui contiennent les fleurs femelles ou les embryons des fruits. A ces der-

nieres fleurs succedent des fruits, qui, grossissant peu-à-peu, deviennent de petites baies ovales, molles, un peu plus grosses que des pois, blanches, unies, luisantes, perlées, comme de petites groseilles blanches, remplies d'un suc glaireux & visqueux, dont les Anciens se servoient pour faire de la glu. Au milieu de ce fruit, on trouve une petite semence fort aplatie, & ordinairement échancrée en cœur.

Cette plante semble confondue dans la substance de l'arbre sur lequel elle croît, & demeure toujours verte en hiver & en été, sans que ses feuilles tombent. On sent par-là combien elle fait de tort aux arbres, dont elle tire sa nourriture; aussi les gens attentifs à l'entretien de leurs vergers, tâchent-ils de la détruire. Ses fleurs paroissent au commencement du printemps : ses fruits mûrissent en Septembre, & on les peut semer au commencement de Mars. Il est bien singulier que le gui, implanté sur tant de différentes especes d'arbres, ne varie point (car nous ne connoissons qu'une seule especes de gui), tandis que tous les végétaux, provenus de boutures ou de greffes ou marcottes, produisent des variétés à l'infini. Une autre singularité bien digne d'attention, c'est que les semences de gui mises sur des arbres en Février, germent à la fin de Juin : alors on voit sortir de la graine du gui plusieurs radicules qui s'allongent d'abord de deux à trois lignes, ensuite elle se courbent & elles continuent de s'allonger uniquement jusqu'à ce qu'elles aient atteint le corps sur lequel la graine est posée. Cette radicule prend indifféremment toutes sortes de directions, tant en haut qu'en bas. Les branches du gui sont dans le même cas : elles n'ont point cette affectation de monter vers le ciel, qui est propre à presque toutes les plantes, sur-tout aux arbres & aux arbustes : si le gui est implanté sur le dessus d'une branche, ses rameaux s'élèveront à l'ordinaire ; mais s'ils partent de dessous la branche, les rameaux tendront vers la terre ; ainsi, dans ce dernier cas, le gui végete en sens contraire, sans qu'il paroisse en souffrir.

On voit, par ce qui précède, que le gui n'est point une production spontanée, produite par l'extravasation du suc nourricier des arbres qui le portent, ou par leur transpiration, ainsi que l'ont dit quantité d'Auteurs ; le gui vient de semences ; & quand la jeune plante commence à introduire ses racines dans l'écorce d'un arbre, aussi-tôt la sève de cette même écorce s'extravase, & forme, à l'endroit de l'insertion, une grosseur, une loupe, ou si l'on veut une especes de gale, qui augmente en grosseur à mesure que les racines de la plante parasite font du progrès. Il n'est pas rare que le gui coupe les vivres à l'extrémité de la branche sur laquelle il est enté, & que chaque bouton de gui contienne le germe de trois branches. Nos forêts sont remplies de cette plante parasite ; mais il en naît beaucoup plus communément en Italie, & particulièrement entre Rome & Lorette, où un seul chêne pourroit en fournir assez pour charger une charrette. Il n'en est pas de même en Angleterre, où l'on regarde comme un phénomène en générale assez rare, un chêne chargé de gui. Quoi qu'il en soit, les Prêtres

des anciens Payens s'assembloient sous ces chênes chargés de gui pour y faire leurs prières, & ils le révéroient comme une plante sacrée, & comme un remède excellent contre le poison & pour la fécondité des animaux.

Il n'y a pas long-tems qu'un de nos Poëtes Lyriques a tracé agréablement sur la scène le canevas des cérémonies superstitieuses, que les Druides, Prêtres Gaulois, mettoient en usage pour cueillir le gui de chêne.

C'est aussi cette sorte de gui qui est le plus souvent employé en Médecine; quelques Apothiquaires exigent même des Marchands qui le leur vendent, que le gui soit récolté dans le croissant de la lune d'Août, & qu'il soit encore attaché à un morceau de chêne, afin d'en être plus sûrs, quoique les guis de coudrier ou de tilleul ne lui soient pas inférieurs. On nomme ces autres sortes de gui, *Gui commun*.

Le gui, cette panacée des Anciens, est, dit-on, un excellent anti-épileptique : on le prend en substance ou en infusion; il est également utile pour prévenir l'apoplexie & les vertiges : il est sudorifique & vermifuge.

Les baies de gui sont âcres & amères : on prétend que prises intérieurement, elles purgent trop violemment, & enflamment le bas-ventre; mais elles sont bonnes, appliquées à l'extérieur, pour faire mûrir les abscesses & hâter leur suppuration. Les Anciens se servoient des baies de gui pour faire la glu, *viscum aucupum*, en faisant bouillir ces fruits dans de l'eau, les pilant ensuite, & coulant la liqueur chaude pour en séparer les semences & la peau. Cette glu est très résolutive & émolliente; appliquée extérieurement, elle soulage les douleurs de la goutte. Des personnes font aujourd'hui la glu de gui avec l'écorce de cette plante parasite. On la met dans un lieu humide, renfermée dans un pot, l'espace de huit ou dix jours. Quand elle est pourrie, on la pile jusqu'à la réduire en bouillie; ensuite on la met dans un terrine; on y jette, de tems à autre, de l'eau de fontaine bien fraîche; on remue avec un bâton en forme de spatule, jusqu'à ce que la glu se prenne au bâton; plus elle est nette, plus elle est ténace : on l'étend ensuite à plusieurs reprises dans l'eau pour la bien nettoyer. D'autres, pour faire cette même glu de gui, en prennent également l'écorce dans le tems de la seve; ils en forment un gros peloton, & le mettent pourrir pendant cinq à six jours dans l'eau, à l'aide de la chaleur du fumier. Ils pilent ensuite cette masse d'écorce dans l'eau, & la réduisent en pâte, puis ils la lavent dans une eau courante : elle forme une masse gluante, qu'on met en boule dans un pot en un lieu frais, & on met dessus de l'eau claire, qu'on renouvelle de tems-en-tems.

GUIANACOES. Les Auteurs du *Voyage à la mer du Sud* appellent ainsi un quadrupède qui est de la taille de nos plus grands cerfs. Il a le cou fort long, les jambes menues, & le pied fourchu. Sa tête, qu'il porte avec grace, ressemble à celle du mouton. Sa queue est touffue & d'un roux très vif. Son corps est garni de laine rouge sur le dos. Cet animal est extrêmement agile; il a la vue perçante, & fuit dès qu'on veut l'approcher. Les Indiens se servent de sa peau pour faire des vêtements.

GUIB. Espece d'animal qui paroît tenir le milieu entre la gazelle & la chevre, & que l'on voit par grandes troupes au Sénégal, dans les plaines & dans les bois du pays de Podor, ainsi qu'on l'apprend par M. Adanson. Cet animal ressemble aux gazelles par la figure du corps; mais il a la poitrine & le ventre d'un brun-maron assez foncé: il est sur-tout remarquable par des bandes blanches sur ce fond de poil brun-maron, & qui sont disposées sur son corps en long & en travers comme si c'étoit un harnois. Ses cornes sont lisses, sans anneaux transversaux, & portent deux arrêtes longitudinales, l'une en dessus, l'autre en dessous, lesquelles forment un tour de spirale depuis la base jusqu'à la pointe, & elles paroissent aussi un peu comprimées.

GUIGNARD, *Pluvialis minor*. On croit que c'est une espece de petit pluvier. Cet oiseau de passage est très délicat, il approche de la grosseur d'un merle: il vole en troupe, & fréquentes les terres labourées: il y en a tous les ans un grand nombre en Beauce, sur tout aux environs de Chartres: il devient si gras que le transport en est difficile sans qu'il se corrompe.

Le guignard s'amuse à considérer si attentivement l'Oiseleur, qu'il se laisse couvrir par un autre homme avec un filet. Il vient vers le tems des vendanges, & mange du raisin. Quand on a tué un guignard d'un coup de fusil, tous les autres s'attroupent auprès, & donnent le tems au Chasseur de recharger.

GUIGNE ou GUIGNIER. Voyez à l'article CERISIER.

GUIMAUVE, *Althæa*. Est une plante fort commune, qui vient partout dans les marais & le long des ruisseaux. Sa racine qui sort d'une tête, est blanche, longue, grosse comme le pouce, ronde, bien nourrie, très mucilagineuse & divisée en plusieurs branches, renfermant un cœur ligneux, qui est comme une corde. Ses tiges sont hautes d'environ trois pieds, grêles, rondes, velues, creuses, & garnies de feuilles alternes, cotonneuses, mollasses, dentelées, portées sur une longue queue. Ses fleurs naissent des aisselles des feuilles; elles sont d'un blanc purpurin, formées en cloche, échanrées en cinq parties. Il leur succede des fruits aplatis ou en forme d'une petite pastille, composés de plusieurs capsules, qui renferment chacune une semence en forme de rein.

Le suc mucilagineux des feuilles n'altère point la couleur du papier bleu, mais celui des racines la rougit. C'est de ce mucilage gluant & douceâtre, dont la guimauve est remplie, que dépendent principalement ses vertus: savoir, d'amollir, de relâcher, d'adoucir l'âcreté des humeurs: elle est fort apéritive & béchique. On en fait une pâte ou des tablettes avec le sucre, ou un syrop, ou un looch qui facilite l'expectoration. Sa décoction prise en boisson ou en lavement est utile pour l'érosion des intestins, pour rafraîchir, & pour la néphrétique. Pilée en cataplasme, on l'applique avec succès sur les tumeurs & les parties enflammées. On fait aussi des brosses dentrifiques avec la racine de guimauve ou celle de mauve: pour

cela, on les coupe en bâtons, on en effile les deux extrémités, puis on les fait bouillir ou dans l'eau salée, ou dans l'eau alumineuse, colorée par le santal rouge ou par le bois d'Inde; ensuite on les fait sécher au four.

GUIMAUVE FAUSSE. *Voyez* FAUSSE GUIMAUVE.

GUIMAUVE ROYALE. *Voyez* ALTHEA FRUTEX.

GUIMAUVE VELOUTÉE DES INDES. *Voyez* AMBRETTE.

GUIRAPEACOA. Nom que les habitants du Brésil donnent à un petit ver qui gâte les cannes à sucre, en rongant les racines de cette plante. Les Portugais le nomment *Pao-de-Galinha*.

GUNDON. C'est une très grosse fourmi d'Ethiopie. Ces fourmis marchent ensemble dans un ordre qui ressemble à celui d'une armée rangée en bataille: elles ne font aucun amas de grains; mais elles dévorent tout ce qu'elles trouvent, & mordent même les hommes avec beaucoup de violence. Dapper (*Descript. de l'Afrique*) dit qu'il y en a de plus petites, qui ont des réservoirs de grains, & d'autres qui, avec le tems, deviennent ailées. *Voyez* FOURMI.

GYPSE, *Gypsum*. Cette pierre, que bien des Minéralogistes ont rangée parmi les terres calcaires, n'est qu'une terre endurcie & neutralisée, c'est-à-dire, le résultat d'une pierre calcaire comme dissoute & saturée par l'acide vitriolique, ensuite cristallisée.

Le gypse ainsi nommé, lorsqu'il est pur & transparent, est connu chez le vulgaire sous le nom impropre de talc; les ouvriers ne donnent le nom de *gypse* qu'à celui qui est opaque & graveleux: il ne fait point d'effervescence avec les acides; enfin ils appellent *plâtre* le produit que donne le gypse lorsqu'il a été calciné.

Le gypse est une pierre ou blanche, ou grise, ou rousâtre, plus ou moins cristallisée, quelquefois claire, quelquefois terne; ses parties sont ou feuilletées, ou rhomboïdales, ou en filets, brillantes intérieurement, mais en général toujours rudes au toucher. Le gypse est si tendre, qu'on peut ou l'écraser sous les dents, ou l'égratigner avec les doigts, ou le diviser avec le couteau. La friabilité de cette pierre fait qu'on ne peut la polir. Nous exposerons à la fin de cet article la plus grande partie des propriétés du gypse; passons à l'histoire des différentes espèces de cette pierre.

Le gypse, proprement dit, ou PIERRE A PLATRE, ou MOILON DE PLATRE, *Gypsum*, est composé de particules, moitié sphériques ou grainelées, moitié oblongues; tellement unies & ferrées entr'elles, qu'on a de la peine à les discerner sans le secours de la loupe: ce gypse est comme sablonneux, ou ressemble à du grais tendre; on en trouve qui se divise en morceaux irréguliers ou écailleux. Il ne prend point le poli, & ne devient point brillant par le frottement; calciné en poudre, il fait un léger mouvement d'effervescence avec l'eau: on en trouve dans tous les environs de Paris. Le plâtre qu'on en fait, sert à enduire les murs, ou à cimenter les pierres dans les travaux grossiers.

Le

Le GYPSE CRYSTALLISÉ , *Crystallus Gypsea* , est en crystaux qui affectent assez de prendre une forme rhomboïdale , dont les angles sont obtus : on l'appelle SÉLÉNITE , *Gypseo Selenites* ; c'est en quelque sorte le plus pur des gypses. Ses particules sont feuilletées , indéterminées , mais se cassent en rhomboïdes. On en trouve aux environs de Bâle en Suisse & de la montagne de Sommerfon en Bourgogne , qui est brillant , de la plus grande blancheur & assez transparent.

Le GYPSE FEUILLETÉ , *Gypsum lamellosum* , se calcine dans le feu , sans y pétiller sensiblement : il est rarement opaque. Nous en avons trouvé dans les Pyrénées & dans les Alpes , qui n'avoit point de couleur : il se divise en feuillets un peu flexibles. Celui des environs de Dax est écailleux , comme le Mica , & fait un petit bruit quand on le rompt ou lorsqu'on le gratte avec la pointe d'un clou. En général les parties du gypse écailleux sont irrégulières ; celles du gypse feuilleté sont perpendiculaires ou horizontales , ou obliques. Le gypse de Montmartre près Paris , dont la crySTALLISATION est cunéiforme , est un beau plâtre transparent , feuilleté & jaunâtre : il est excellent pour lambrisser & pour modeler. Les Stucateurs en font un grand usage : on fait que les bustes , statues , & toutes les figures qui sont devenues si fort à la mode , sont faites du plâtre de Paris , & qu'il ne faut pas confondre cette matière avec le verre de Russie , appelée *glacies maria*. Voyez MICA ; c'est le véritable *miroir d'âne* ou la *pietre spéculaire* proprement dite.

Le GYPSE STRIÉ , *Gypsum striatum* , est composé de parties filamenteuses , longues , claires , friables , parallèles & perpendiculaires ou inclinées , semblables à des fils de soie étroitement unis les uns aux autres ; quelquefois il est coloré. Bien des personnes le confondent abusivement avec l'amiante , avec l'asbeste , ou avec l'alun de plume ; mais il en diffère par sa nature & par ses propriétés. On trouve ce beau gypse en Chine , en Espagne près de Compostelle , à Sommerfon près Dijon , & à Boudri dans le Comté de Neuf-Châtel. Il s'en trouve dont les lames striées forment des rayons , alors on l'appelle *Fleurs de gypse* : cette pierre à plâtre est excellente pour les plafonds.

Le GYPSE SOLIDE OU ALABASTRITE , *Pseudo alabastrum* , a l'apparence d'un marbre tendre & demi-transparent : c'est le faux albâtre. Voyez ALABASTRITE & ALBATRE.

Observations sur le Gypse & sur ses propriétés générales.

Cette pierre qui est rude & brillante dans l'endroit de la fracture , varie beaucoup pour la dureté , pour la couleur & pour la figure des particules qui la composent. Si elle est pure , elle n'admet que peu ou point de poli , & ne fait aucun mouvement d'effervescence avec les acides , ne donne point d'étincelles avec le briquet , ne s'endurcit point dans le feu ; mais elle y perille & s'y calcine en une poudre farineuse appelée *plâtre* , qui , arrosée

d'une certaine quantité d'eau, ne produit que peu ou point de chaleur, donne une odeur d'œufs pourris, & se durcit aussi-tôt. Si le plâtre, ainsi mêlé avec l'eau, a été jetté en moule, il produira une figure des plus régulières, parcequ'il éprouve une augmentation de volume en séchant. Il faut observer que ce plâtre, une fois noyé d'eau, n'est plus susceptible d'une nouvelle calcination : si on le fait calciner dans un creuset, il pétille, décrépite, & paroît bouillir comme de l'eau; il a alors la propriété de reluire un peu dans l'obscurité. Nous avons toujours remarqué que le gypse se trouve en lits (*strata*) sous différentes formes & couleurs; communément sous des couches de pierres calcaires, ou remplies de corps marins : on y trouve rarement des corps métalliques; mais souvent les environs sont des terrains glaiseux & pyriteux. En faut-il davantage pour présumer que l'acide vitriolique, qui se rencontre dans ces terrains, venant à attaquer les matieres calcaires, aura produit la terre ou pierre neutralisée dont il est question, c'est-à-dire, le gypse. Ajoutons qu'il n'est pas rare de voir des morceaux de plâtre qui participent en grande partie des propriétés générales & particulieres de la chaux. Ainsi le gypse n'est point une pierre primitive. C'est un produit accidentellement formé; & quand il fait effervescence, c'est une preuve qu'il n'est point pur, & que de la pierre calcaire y est encore à nud.

Nous venons de dire que les gypses se trouvent par couches dans le sein de la terre. Prenons pour exemple la butte de Montmartre, qui fournit presque tout le plâtre qui s'emploie dans les bâtimens de Paris. Observons en même tems que cette petite montagne présente plusieurs phénomènes dignes de l'attention des Naturalistes. Elle est placée au milieu d'un pays tout-à-fait calcaire, & est composée d'un grand nombre de couches parallèles à l'horison, dans lesquelles on assure n'avoir jamais trouvé de coquilles fossiles, quoique tous les environs de Paris en soient remplis, & ne soient, pour ainsi dire, formés que de leurs débris : nous pouvons cependant attester qu'on y trouve fréquemment des ossemens & vertebres de quadrupedes qui ne sont point pétrifiés, mais qui sont déjà un peu détruits, & qui sont très étroitement enveloppés dans la pierre, nous y avons même rencontré des noyaux ou empreintes de cames.

GYRINUS. Nom générique donné à plusieurs especes d'insectes, mis dans le rang des coléopteres, c'est-à-dire, qui ont leurs aîles dans des étuis : ce sont des especes de scarabées fauteurs. On en trouve, 1°. dans la scrophulaire; 2°. dans les plantes potageres; 3°. en terre; 4°. dans la pulmonaire & la dentaire. Voyez SCARABÉE & COLÉOPTERE.

GYROLE. Voyez CHERVI.



H A C

H A L

HACHES DE PIERRE. Les Lythologistes donnent ce nom à des pierres verdâtres, d'une dureté considérable, opaques, pesantes, taillées en hache ou en coin, & que l'on trouve en terre à quelques pieds de profondeur. On prétend que ces haches ont dû jadis servir aux Sauvages de l'Amérique pour couper & fendre divers matériaux, jusqu'au tems où ils ont connu les instruments de fer. Par quelle espece de révolution ces haches de pierre se rencontrent-elles si communément dans les fouilles qu'on fait en Europe ? Aurions-nous été réduits autrefois à la même nécessité, ou y auroit-il eu aussi des Sauvages dans nos climats ?

HACUB. Plante épineuse du Levant, dont les feuilles sont un peu semblables à celles de la carline. Elle pousse au printems des rejettons tendres, que les Levantins mangent après les avoir fait cuire. Mais quand on les laisse croître, ils portent des têtes épineuses, qui donnent de petites fleurs rouges à fleurons soutenus par des embryons, qui deviennent autant de semences arrondies & nichées dans de petits trous pratiqués dans le calice commun de ces fleurons. M. de Tournefort a donné à cette plante le nom de *gundelia*, qui étoit celui de son ami & son compagnon de voyage au Levant. Cette plante croît proche d'Alep aux lieux rudes & secs : sa racine, qui est longue & grosse, est vomitive & laxative.

HÆMACATE, est l'agate rouge. *Voyez* AGATE.

HÆMACATE, serpent d'Asie qui est d'un rouge d'agate : on le trouve en Hircanie, aujourd'hui Masonderan ou Tabareïtan, vaste Province de la Perse. Ce serpent est fort dangereux. Il est paré d'une superbe robe, rayée, vermeille : on trouve aussi ce serpent au Japon.

HÆMATITE. *Voyez* ce mot à l'article FER.

HÆMORRHUS. *Voyez* AIMORRHUS.

HALINATRON, *Halinatrum*. Est un sel alkali naturel, que l'on rencontre par rayons ou par bandes sur la superficie intérieure des vieilles voûtes, & contre les parois des vieux bâtimens : on le trouve aussi sur la superficie de certaines terres, mais il est alors fort impur. Ce sel a un goût lixiviel : il ne se cristallise point ; mais quand on le fait bouillir dans l'eau, il fume beaucoup : il contient ordinairement un peu d'alkali volatil qui se dissipe en vapeur.

HALIOTITES. Nom qu'on donne à un genre de coquilles univalves & fossiles : elles sont contournées en dedans, mais elles ne sont pas turbinées sensiblement en dehors : elles sont ouvertes & ont une certaine ressemblance avec l'oreille humaine. Leur analogue vivant se nomme *Oreille de mer*. *Voyez* ce mot.

HALLEBRAN. *Voyez* ALBRAN.

HALOS. *Voyez* COURONNE DE COULEURS.

HALOSACHNÉ ou **SEL D'ÉCUME**. Divers Naturalistes ont donné ce nom à une espèce de sel marin, qui se trouve quelquefois sur le bord de la mer contre les rochers & les pierres : il ressemble à une écume salée & endurcie.

HAMMITES. Nom qu'on donne à des pierres grainelées, comme formées d'un amas de parties sablonneuses, ovalaires & grosses comme la tête d'une bonne épingle. Des personnes les regardent comme un amas d'œufs de poisson, & les appellent *Pierres ovaires*. Voyez **AMMITE**.

HAMMONITE. Est, selon quelques-uns, la petite *corne d'Ammon* ; & selon d'autres, l'*ammite*. Voyez *ces mots*.

HAMSTER. Espèce de rat qui est très fréquent en Allemagne, qui fait se construire des souterrains très curieux, & qui fait de très grands ravages dans les grains.

Le hamster ressemble un peu au *rat d'eau* par la petitesse des yeux & la finesse du poil ; il lui ressemble aussi par ses parties intérieures ; mais sa queue est beaucoup plus courte que celle du rat d'eau ; il a ordinairement le dos brun & le ventre noir : on en voit qui sont tous noirs & d'autres tous gris ; variétés qui peuvent venir de l'âge seul.

Les hamsters habitent sous terre : la forme de leur terrier varie suivant leur âge, leur sexe & la qualité du terrain. Le mâle & la femelle se forment leur terrier chacun de leur côté : celui du mâle a une ouverture oblique qui sert d'entrée ; au bout de cette issue est un trou qui descend perpendiculairement jusqu'à des chambres ou caveaux : l'entrée de celui de la femelle est construite de même ; mais au lieu d'un seul trou perpendiculaire, il y en a jusqu'à quatre, sept, huit, qui servent à donner une entrée & une sortie libre aux petits. À côté de ces trous perpendiculaires, à un ou deux pieds de distance, les hamsters des deux sexes creusent trois ou quatre caveaux particuliers, auxquels ils donnent la forme de voûte en dessus & en dessous ; dans l'un ils se retirent avec leurs familles, & dans les autres ils font les provisions nécessaires pour leur subsistance. La profondeur des caveaux est très différente : un jeune hamster dans la première année ne donne qu'un pied de profondeur à son caveau ; un vieux le creuse souvent jusqu'à quatre ou cinq pieds. Le domicile entier, y compris toutes les communications & tous les caveaux, a quelquefois huit à dix pieds de diamètre : c'est par le trou oblique qui forme l'entrée du terrier, que l'animal exporte dehors les terres qu'il retire pour pratiquer ses caveaux ; aussi voit-on toujours à côté de l'entrée de leurs trous, une petite monticule de terre ; c'est aussi par-là que l'air se communique & circule dans les caveaux.

Les hamsters font leurs provisions de grains dans l'automne : lorsqu'ils trouvent des grains de bleds secs & détachés de leurs épis, ils les emportent dans leurs bajoues qui peuvent en contenir un quart de chopine ; d'autres fois ils ramassent le bled en épis, ainsi que les pois & les fèves avec leurs cosses, & ensuite tous à leur aise ils les épluchent, & portent dehors les cosses & le déchet des épis.

La fécondité de ces animaux , sur-tout dans les années humides , est prodigieuse ; ils ont deux à trois portées par an , & chacune est de cinq ou six petits : cette grande multiplication occasionne quelquefois la disette dans certains cantons par la dévastation générale des bleds. La maniere la plus ordinaire de leur faire la chasse , est de creuser leurs terriers : c'est un travail assez considérable à cause de leur profondeur & de leur étendue ; mais dans chaque domicile on trouve en automne deux boisseaux de bon grain , & on profite de la peau de ces animaux dont on fait des fourrures.

HANCHOAN. Nom que l'on donne au Brésil à un oiseau de proie , fort semblable au *busard*. Du tems de Redy , on en a vu un dans la Ménagerie du Grand Duc de Toscane. Les Portugais établis dans le Brésil , & les Naturels du pays , disent que la raclure des ongles & du bec de cet oiseau , est un des meilleurs contre-poisons qui soient au monde ; & que ses plumes , sa chair & ses os guérissent beaucoup de maladies.

HANNEBANE. Voyez JUSQUIAME.

HANNETON, *Scarabeus stridulus*. Insecte coléoptère , c'est-à-dire , qui a des fourreaux par dessus les ailes. C'est , à proprement parler , une espèce de *scarabée* ou d'*escarbot* , dont on distingue plusieurs espèces.

Description des Hannetons.

Le hanneton le plus ordinaire , ou *scarabée roux* , *scarabeus vulgaris rufus* , est celui qui est appelé en Angleterre & en Zélande MEUNIER , en latin *Molitor* ; nom qu'on lui a donné , parceque cet insecte broie les feuilles des arbres comme si elles étoient moulues , ou parceque ses ailes paroissent couvertes d'une espèce de poussière farineuse. Cette mouche *scarabée* est grosse comme le petit doigt , longue d'un pouce , de couleur rougeâtre sur le dessus des ailes , mais la tête , le dessus du corselet & le ventre sont noirs ; les bords du ventre ou des articulations sont tachetés de points blancs , triangulaires ; le dessous du corselet , de la tête & de la poitrine est velu : il a six pattes , dont quatre longues dépendent du corps , & deux courtes du corselet. La tête est ornée de deux cornes huppées par le bout , que l'art a imitées pour en faire l'ornement des robes des Dames , sous le nom de *foucis de hannetons*. Lorsque la houe est longue & feuilletée , c'est un mâle ; si elle est courte & sans feuillet , c'est une femelle. La queue est fort pointue & courbée : il a deux paires d'ailes , dont l'une est faite de pellicules , & l'autre qu'on appelle *élytre* , c'est-à-dire fourreau ou étui , de corne. La première paire d'ailes est pliée au-dessous de cette dernière , & ne paroît jamais que quand l'animal s'apprête pour s'envoler : les ailes de corne sont rousâtres , un peu transparentes , couvertes d'une poussière blanche qui s'essuie aisément. Ce hanneton se trouve par-tout. Quand il n'est que ver , il ronge les racines de froment ; devenu insecte volant , il mange les bourgeons de la vigne , les feuilles des arbres , & sur-tout celles de hêtre.

Le HANNETON DU POITOU a les fourreaux marqués de taches blanches, éparfes çà & là : on l'appelle *scarabée peint*. On le voit au mois de Juillet. Le mâle a les antennes feuillées, & la femelle les a rondes. On le rencontre aussi sur les Dunes de la Hollande & de la Scanie. Dans l'état de ver, il ronge les racines des arbres & des plantes.

Le HANNETON DU ROSIER est le même que le scarabée des roses, qui est de couleur de cuivre verdâtre. Voyez à la suite du mot SCARABÉE.

Les Auteurs font mention d'une quatrième espèce de hanneton, d'un brun clair, dont le corselet est velu, qui a les fourreaux d'un jaune pâle, & trois lignes blanches en long : c'est le scarabée lanugineux d'arbre. C'est, en quelque sorte, une petite espèce du hanneton ordinaire : elle est plus commune en Suede que par-tout ailleurs.

Les hannetons qui se nourrissent de feuilles & d'herbes, commencent à paroître avec les premières chaleurs sur les arbres, sur-tout sur les noyers, d'où leur est venu le nom de *scarabée d'arbre*.

Accouplement & propagation des Hannetons.

Les deux sexes restent long-tems attachés l'un à l'autre pendant l'accouplement. La femelle ayant été fécondée, creuse un trou dans la terre avec la pointe de sa queue ; elle s'y enfonce de la profondeur d'un demi-pied, & elle y pond des œufs oblongs, d'un jaune clair. Ces œufs sont rangés les uns à côté des autres, mais sans aucune enveloppe terreuse. Après cette ponte, la mère sort de terre ; elle se nourrit encore pendant quelque tems avec des feuilles d'arbres, & disparoît ensuite. Sur la fin de l'été les œufs sont éclos, & il en est sorti de petits vers qui se nourrissent de gazon & des racines de toutes sortes de plantes en vigueur : ils passent quelquefois deux années dans cet état de ver, quelquefois davantage ; les Jardiniers & les Laboureurs les nomment alors *vers blancs* ou *mans*. Ces vers ou *larves* font périr les plantes dont ils rongent la racine ; aussi voit-on souvent, en arrachant de terre une plante flétrie ou desséchée, qu'elle a été rongée par un de ces vers. On en trouve quelquefois en si grande quantité, qu'ils désolent en peu de tems des potagers entiers & les prairies les mieux couvertes. En un mot, ce ver est le fléau des racines du froment, du seigle, des autres sortes de *gramens*, & de toutes les plantes qu'il rencontre dans sa route souterraine.

Description du ver ou larve du Hanneton, sa métamorphose en Scarabée & sa sortie de terre.

A l'âge de trois ans, le ver du hanneton est au moins long d'un pouce & demi, & gros comme le petit doigt : il est pour la plupart du tems recoquillé : la couleur de son corps est d'un blanc jaunâtre, presque transparent. Tout le corps de ce ver consiste, comme celui des chenilles, en

douze segments , sans compter la tête : le dernier est le plus grand , le plus gros , & paroît d'un gris violet , parcequ'on y voit les excréments à travers la peau. A chaque segment on apperçoit une couple de rides qui servent au ver à s'allonger & à s'avancer dans la terre ; & sur tous les segments s'étend une espece de bourrelet , dans lequel on apperçoit neuf points à miroirs. Ainsi ce ver respire l'air par neuf trous (stigmates) , qui répondent à autant de segments : sous les trois premiers sont six pieds roussâtres , composés de cinq à six pieces articulées & un peu velues. La tête de ce ver est assez grande , aplatie & d'un jaune luisant , munie d'une espece de tenaille dentelée , avec laquelle il coupe les matieres dont il fait sa nourriture : on remarque deux antennes derriere la tenaille.

Il n'arrive guere que ces vers qui ont six pieds , sortent volontairement de la terre : si le soc de la charue ou la bêche du Jardinier les font sortir au dehors , ils ne tardent pas à y rentrer , autrement ils deviennent bien vite la proie des oiseaux : les corbeaux & les cochons sont fort friands de ces vers , aussi-bien que des hannetons qui en proviennent. Le ver change de peau à mesure qu'il prend de l'accroissement : il creuse une petite maisonnette pour pouvoir s'y dépouiller plus commodément : cette cavité est dure & ronde comme une pilule. Après avoir quitté sa peau , le ver sort de sa caverne pour chercher sa nourriture ordinaire ; mais il ne peut butiner qu'en été , car dans l'hiver la gelée l'oblige à se resserrer , à s'enfoncer en terre à une plus grande profondeur , jusqu'à ce que la chaleur du printemps l'attire de nouveau vers la surface ; au reste , il faut une forte & longue gelée pour le faire périr.

Ce n'est guere que sur la fin de la quatrieme année (au mois de Mai) que la métamorphose de ce ver ou larve en hanneton arrive : il suffit de fouiller la terre en cette saison pour en être convaincu ; l'on y trouvera non-seulement des hannetons tout formés , mais aussi des vers à différens degrés de grandeur. Voici comment se fait la métamorphose. Dans l'automne , le ver s'enfonce en terre quelquefois à plus d'une brasse de profondeur , & il s'y fait une cavité lisse & commode. Sa demeure étant faite , il commence peu de tems après à se racourcir , à s'épaissir , à se gonfler , & il quitte , avant la fin de l'automne , sa dernière peau de ver pour prendre la forme de nymphe. D'abord cette nymphe paroît jaunâtre , puis jaune , & enfin rougeâtre ; & alors on commence à discerner l'apparence d'un hanneton. Si on irrite cette nymphe , on observe qu'elle a un mouvement sensible , & qu'elle peut se tourner d'elle-même : ordinairement elle ne conserve sa forme que jusqu'au commencement de Février. Alors on apperçoit distinctement un hanneton d'un blanc jaunâtre , qui est d'abord mol , mais qui prend sa dureté & sa couleur naturelle au bout de dix à douze jours. Il reste encore trois mois en terre dans cet état de hanneton formé ; voilà pourquoi , ceux qui fouillent la terre dans cet intervalle & y trouvent des hannetons parfaits , croient que ce sont des in-

sectes de l'année dernière , qui s'étoient mis en terre seulement à cause de l'hiver.

Après que l'insecte a passé quatre ans dans la terre , (la plus grande partie en forme de ver) il en sort enfin dans le courant du mois de Mai : c'est alors qu'on peut , sur-tout les soirs , les voir sortir de leurs anciennes demeures ; & c'est aussi ce qui fait , que pendant ce mois , principalement dans les années où il y a beaucoup de hannetons , on voit que les chemins & les sentiers , durcis par la sécheresse , sont tout criblés de trous.

Il faut observer qu'une extrême chaleur n'est pas moins pernicieuse aux hannetons , qu'un grand froid : aussi pendant les années chaudes se tiennent-ils tranquillement sur les arbres , qu'ils ne quittent que sur le soir , où ils s'élèvent par essaims pour folâtrer , & sont emportés par le vent d'une contrée à l'autre.

Selon les rigueurs des saisons , & l'avancement de l'état du ver en hanneton , on peut prédire l'année fertile ou stérile en hannetons à plaque rouge ou noire sur le col ; car ils paroissent tour-à-tour , de deux années l'une : (ceux à plaque rouge paroissent dans les années impaires , & les autres à plaques noires dans les années paires.) On n'en peut pas prédire autant des autres insectes , qui naissent & périssent dans la même année.

Ravage que cause le hanneton.

Le nombre des hannetons est si prodigieux , que leurs ennemis ne peuvent suffire pour les exterminer : le meilleur expédient , pour diminuer le nombre de ces insectes , est de battre les arbres avec de longues perches , de balayer les hannetons en ras & de les détruire ensuite : il y a quelques années qu'un certain canton de l'Irlande souffroit tant des hannetons , que les Habitans se déterminèrent à mettre le feu dans une forêt de plusieurs lieues d'étendue , pour couper la communication avec les cantons qui en étoient infestés. Cet insecte ne vole guere pendant le jour : il se tient caché sous les feuilles , ou du chêne , ou du figuier sauvage , ou du tilleul , ou du noyer , &c. Il semble y être assoupi jusqu'au coucher du soleil : alors ils se réunissent en troupes ; & avant de se mettre en route , ils déploient & allongent leurs houpes ; ils volent autour des haies en bourdonnant , & donnent brusquement contre tout ce qu'ils rencontrent ; d'où vient le proverbe : *étourdi comme un hanneton*. Les hannetons se nourrissent de feuilles d'arbres , des œufs de sauterelle , & deviennent , à leur tour , la proie des corbeaux. Les Fermiers n'entendent donc gueres leurs intérêts , lorsqu'ils mettent tout en œuvre pour exterminer ces oiseaux. Quand les hannetons ont ravagé les feuilles des chênes & des arbres fruitiers , ces arbres périssent en partie , ou ne poussent l'année suivante leurs boutons que fort tard.

Les hannetons disparaissent au bout de deux mois , soit que ce soit là le

terme

terme de leur durée , où que d'autres animaux en abregent le terme en les mangeant ; mais avant que de périr , ils pondent des œufs dont il se forme des larves , plus connues sous le nom de vers , qui , au bout de quatre ans , se métamorphosent.

Autres especes de Hannetons.

Les hannetons des Indes sont un fléau pour les vaisseaux qui reviennent de ce pays où il y en a beaucoup : ils jettent une puanteur insupportable lorsqu'on les écrase : ils mangent le biscuit dans les vaisseaux , & percent les coffres & les tonneaux ; ce qui cause souvent la perte du vin & des autres liqueurs. *Voyez* RAVET.

Mademoiselle Merian a vu sortir une espece de petit hanneton d'un petit insecte noir , qui se trouve sur la mille-feuille fleurie & l'oseille : elle a vu de petits œufs rouges sur les feuilles vertes du lis orangé , se métamorphoser en vers , de couleur de vermillon ; puis en nymphes rouges , & enfin en hannetons rouges. Elle a fait les mêmes observations sur les feuilles d'aulne , sur le bois pourri , sur la mélisse , sur l'œillet , la nielle , les feuilles de saule , &c. Elle a suivi la métamorphose de petits œufs qui se changeoient en vers , & qui chacun , suivant leur couleur différente , produisoient en dernier lieu des hannetons d'une couleur analogue : ces hannetons n'étoient probablement que des especes différentes de *scarabées*. Voyez ce mot. Passons à l'étymologie du mot *hanneton*. Il paroît qu'il se dit par corruption , pour *alleton* , du latin *alitonans* , à cause du bruit qu'il fait avec ses aîles quand il vole. De-là vient aussi que les Latins l'ont appelé *scarabeus-stridulus* , comme qui diroit escarbot ou *scarabée bourdonnant*.

HARDEAU , ou BOURDAINE BLANCHE. *Voyez* VIOIRNE.

HARENG , *halec*. Les harengs sont des poissons de passage , remarquables & intéressans par l'ordre qu'ils observent , lorsque , partis des contrées éloignées du Nord , ils descendent sur nos côtes pour aller jusques dans le midi fournir à presque tout le monde entier une nourriture abondante & saine.

Description du Hareng , sa nourriture.

Ce poisson est semblable aux très petites aloses ou aux très grandes sardines ; son lieu natal est l'Océan. Il est long de neuf à dix pouces ou environ , & a près de deux pouces de largeur ; il meurt dès qu'il est sorti de l'eau. Sa tête est aplatie sur les côtés , un peu pointue ; l'ouverture de sa bouche est grande ; sa mâchoire supérieure est plus allongée que l'inférieure , & armée de dents presque imperceptibles. Ses yeux sont grands , situés aux côtés de la tête , & l'iris est de couleur argentée. Les couvercles des ouies sont composés inférieurement de trois ou quatre lames

osseuses , & de huit arrêtes un peu courbées & jointes ensemble par une membrane ; l'extrémité de ces couvercles a ordinairement une belle tache rouge ou violette : l'ouverture des ouies est très dilatée. Les écailles de ce poisson sont grandes à proportion du corps , de couleur argentée , comme tuilées , & faciles à détacher. Le dos est d'un bleu obscur , mais qui devient plus bleu au printems : les côtés & le ventre sont d'un blanc d'argent ; tout le ventre , depuis les ouies jusqu'à l'anüs , est un peu resserré en maniere de carène aiguë ; au lieu que le dos est convexe ou arqué. Ce poisson a une nageoire au milieu du dos , unique & blanchâtre ; les nageoires de la poitrine sont blanchâtres & situées près du ventre ; les nageoires du ventre sont également blanches , ainsi que celle de l'anüs , qui approche de la queue ; la queue est fourchue & grisâtre. Ce poisson a trente-cinq côtes de chaque côté , & cinquante-six vertèbres : il a la moelle dorsale fort différente de celle des autres poissons ; elle n'est point divisée en parties égales , mais continue & sans interruption comme chez l'homme & les quadrupèdes. La chair du hareng est grasse , molle , de bon goût & de bon suc.

On voit , par cette description du grand hareng commun , que le petit hareng , nommé vulgairement *Célerin* en François , ou *Harengade* à Marseille , est de la même espece ; cependant on ne pêche point le vrai hareng dans la Méditerranée. La sardine du Nord est notre véritable hareng.

Malgré la conformité qu'a le hareng avec les petites aloses , on les distingue cependant assez facilement : l'aloise a toujours le ventre garni d'épines plus âpres que le hareng. Tous les harengs ne font des œufs qu'une fois l'année , vers l'équinoxe d'automne : ils sont plus estimés & meilleurs quand ils ont le corps plein d'œufs ou de laitance , comme tous les autres poissons. Le hareng multiplie beaucoup : il nâge en troupes , & luit la nuit. Sa nourriture ordinaire consiste en très petits poissons , en vers de mer , & même en très petits crabes.

Schoockius nomme le hareng , le *Roi des poissons* , à raison de son excellence & de son utilité. Les Pêcheurs de Hambourg nomment le hareng , *Poisson couronné*.

*Endroits où l'on rencontre les harengs , & leur séjour continuel
au Pôle du Nord.*

Le grand hareng , dit M. Linnæus , habite la mer Occidentale ; le petit habite la mer de Bothnie. La mer Glaciale , du côté de l'Asie , ne manque pas non plus de harengs. M. Anderson croit que le pays ordinaire de cette espece de poisson sont les abysses les plus reculés du Nord , fondé sur ce que les glaces immenses de ce pays leur servent d'une sûre retraite pour la conservation de leur frai , leur accroissement , & parce que les cétacées , leurs ennemis , qui ne peuvent respirer l'eau , & qui

n'y pourroient pas vivre , à cause des glaces , ne peuvent par conséquent leur nuire dans ces contrées. On prétend cependant que les harengs fraient aussi sur les côtes d'Angleterre ; du moins ils arrivent pleins , & ils se vuident long-tems avant qu'ils quittent ces côtes ; d'autres soutiennent qu'ils disparoissent dès qu'ils ont jetté leur frai.

En quelque endroit que soit le premier domicile des harengs , il paroît que leur principale demeure est entre la pointe d'Ecosse , la Norwege & le Dannemarck. Il en part tous les ans des colonies & des peuplades , qui enfilent à différentes reprises le canal de la Manche ; & après avoir rangé la Hollande , la Flandre , l'Angleterre & l'Irlande , ils viennent se jeter sur les côtes de Normandie. Jusqu'à présent on n'est allé au-devant d'eux que jusqu'aux Isles de Shethland ou Hithland , du côté de Fayrhill & de Bochenefs , où les Hollandois arrivent tous les ans vers la S. Jean avec leurs buyfes & leurs barques : ils y tendent des filets entre deux buyfes , qu'ils opposent directement à la colonne des harengs , qui y passe alors en venant du Nord. Ils en prennent , par ce moyen , des quantités prodigieuses à la fois : ils les préparent sur-le-champ à leur façon , & les ramènent chez eux , d'où ils les distribuent dans tous les pays de l'Europe.

M. Anderson dit qu'on trouve dans les golfes de l'Islande , & même sous le pôle du Nord , les harengs les plus gras , les plus gros , & en si grande abondance , qu'il seroit aisé aux habitans de ces endroits d'établir en peu de tems un commerce des plus avantageux , s'ils étoient en plus grand nombre & plus habiles pour de pareilles entreprises. Il dit encore qu'il y a une espece de ces harengs qui a près de deux pieds de long , sur trois bons doigts de large ; & il présume que c'est le vrai *Roi des harengs* , qu'on regarde communément comme le conducteur de leurs troupes. En effet , lorsque les Pêcheurs en prennent un vivant , ils ont grand soin de le rejeter aussi-tôt dans la mer , persuadés que ce seroit une espece de crime , que de détruire un poisson si utile.

Ruses des poissons auxquels les harengs servent de nourriture.

M. Anderson , qui , en remontant jusques sous le Pôle , a rencontré des troupes de harengs , croit être fondé à dire , que par-tout où les grosses & petites especes de poissons se trouvent en abondance & fort grasses , on y trouve aussi nécessairement le hareng en quantité , & dans sa plus grande délicatesse ; parceque les très petites especes attirent le hareng , dont elles font la nourriture , & que le hareng attire les grosses especes , dont il est la pâture à son tour. Entre les grandes especes de poissons , le *chien marin* , le *marfouin* , & parmi les especes de baleines , celles que les peuples du Nord appellent *hareng-baleine* , ou *nord-caper* , sont ceux qui mangent le plus de harengs. Lorsqu'on leur ouvre l'estomac , on le trouve toujours rempli de ces poissons. Le nord-caper se tient principalement aux environs de la dernière pointe du Nord de la Norwege , qu'on

appelle *Cap du Nord* ; c'est même de cet endroit qu'il a tiré son nom. La Nature conduit cet animal à choisir ce poste préféablement à tout autre , à cause des troupes prodigieuses de harengs qui côtoient la Norwege en descendant du Nord. M. Anderson ajoute que quand le nord-caper est tourmenté par la faim , il a l'adresse de rassembler les harengs , & de les chasser devant lui vers la côte. Lorsqu'il a amassé dans un endroit ferré autant de harengs qu'il lui a été possible , il fait exciter , par un coup de queue donné à propos , un tourbillon très rapide ; en sorte que les harengs , étourdis & comprimés , entrent par tonneaux dans sa gueule , qu'il tient ouverte en ce moment , en aspirant continuellement l'eau & l'air. Le nord-caper en fait de même à l'égard des maquereaux & des sardines.

Malgré la dépopulation que le nord-caper semble faire du hareng , à peine s'en aperçoit-on. La raison en est , que le hareng multiplie d'une manière prodigieuse ; tandis que les monstres marins ne font qu'un ou tout au plus deux petits par an. D'ailleurs , la plûpart des cétacées sont réduits à une autre sorte de nourriture. C'est ainsi , par exemple , que la plus grande espèce de baleine , dont le gosier est extrêmement étroit , & la gueule embarrassée d'appendices appelées *barbes* , est réduite à manger de petits crabes & certains insectes aquatiques ; d'autres mangent des *fucus* , &c.

Le hareng devient encore la proie des espèces de *cabeliau* & de *morue* ; ces poissons sont tellement avides du hareng , que quand les Pêcheurs de Hambourg & de Groënland veulent en prendre du côté de Spitzberg , ils se servent souvent pour appas , au défaut d'un hareng frais & naturel , d'une figure de hareng faite en fer-blanc : ce moyen leur réussit merveilleusement. Quelques-uns prétendent que nous ne devons l'arrivée des harengs sur nos côtes , qu'à la chasse qu'en font ces divers animaux pour se nourrir. La peur qu'ils ont de leurs persécuteurs , les oblige à se serrer ou à se cacher dans le gros de la troupe , qui ressemble par-là à une isle mouvante. Cette disposition favorise beaucoup les Pêcheurs ; car , pour peu qu'ils attrappent le fil de la colonne , ils en prennent autant que leurs filets en peuvent contenir. Il en est de même des crabes , qui , étant chassés par quantité de poissons , se resserrent par troupes ; & croyant se sauver , ils tombent tous à la fois dans les filets des Pêcheurs.

Les Pêcheurs ont remarqué que dès que les colonnes de harengs forment des glaces , elles sont immédiatement attaquées par ces animaux , qui les attendent à leur sortie , & qui en serrant de tous côtés ces colonnes épaisses , les chassent continuellement devant eux d'une mer & d'une côte à l'autre : les oiseaux de proie leur font aussi une guerre cruelle.

Marche & route annuelle des harengs.

Les mouettes , & quantité d'oiseaux maritimes , qui voltigent au-dessus de la mer , font connoître , ainsi que les gros poissons , aux Pê-

cheurs en quel lieu sont les troupes de harengs : ces animaux les poutsuivent perpétuellement pour en faire leur proie , & observent tous leurs mouvemens. Les harengs nagent par grandes troupes , & aiment à fréquenter les bords de la mer : on les trouve quelquefois en si grand nombre , qu'ils s'opposent & résistent au passage des vaisseaux : dans ces momens , les Matelots en prennent quelquefois un bon nombre avec la pelle dont on se sert pour arroser les voiles des vaisseaux. Comme les harengs sont noctiluques dans la mer , il ne doit pas paroître étonnant si la pêche en est plus heureuse & plus abondante de nuit que de jour.

La grande colonne de harengs sort du Nord au commencement de l'année : son aîle droite se détourne vers l'Occident , & tombe au mois de Mars vers l'Islande : l'aîle gauche s'étend vers l'Orient. Cette colonne se subdivise encore ; les unes vont par détachemens aux bancs de Terre-neuve ; d'autres , arrivées à une certaine hauteur , dirigent leur course vers la Norwege , & tombent en partie par le détroit du Sund dans la mer Baltique , & l'autre partie va gagner la pointe du Nord de Jutland , défile le long de cette côte , & se réunit promptement par les Belts avec la colonne de la mer Baltique ; puis se subdivise de nouveau pour cotoyer le Holstein , le Texel , le Zuyderzée , &c. La colonne occidentale , qui est aujourd'hui la plus forte , & qui est toujours accompagnée de marfouins , de requins , de cabéliaux , &c. s'en va droit au Hithland & aux Orcades , où les Pêcheurs Hollandois les attendent avec impatience , & de-là vers l'Ecosse où elle se partage ; une partie fait le tour de l'Angleterre , va aux côtes des Frisons , des Zélandois , des Barbançons , & des François ; l'autre partie va aux côtes d'Irlande ; puis elles se rejoignent dans la Manche , & après avoir fourni aux besoins de tous ces peuples , il en résulte encore une colonne qui se jette dans l'Océan Atlantique ; c'est là qu'elle disparoît. Mais ce qui est admirable , c'est que toutes ces colonnes dispersées par troupes savent où se réunir pour réformer deux seules colonnes d'une épaisseur énorme , & retourner dans leur Patrie : l'une y arrive du côté de l'Orient & l'autre du Septentrion.

Le temps du départ des harengs est également fixé ; ils quittent nos côtes aux mois de Juin & d'Août : la route est prescrite & la marche réglée. Tous ces poissons partent ensemble ; il n'est pas permis à aucun de s'écarter , point de maraudeurs , point de déserteurs ; ils continuent de côte en côte leur marche jusqu'au terme marqué. Ce peuple est nombreux , & le passage est long : dès que le gros de l'armée est passé , il n'en paroît plus jusqu'à l'année suivante. On a cherché ce qui pouvoit inspirer aux harengs le goût de voyager , la police qu'ils observent dans leur route , & le desir de retourner dans leur patrie. Nos Pêcheurs & ceux de Hollande ont remarqué qu'il naissoit en été , le long de la Manche , une multitude innombrable de certains vers qu'ils appellent *Surfs* , & de petits poissons dont les harengs se nourrissent : c'est une manne qu'ils viennent recueillir exactement. Quand ils ont tout enlevé , durant l'été & l'au-

tomne , le long des parties septentrionales de l'Europe , ils descendent vers le midi où une nouvelle pâture les appelle : si ces nourritures manquent , les harengs vont chercher leur vie ailleurs ; le passage est plus prompt & la pêche moins bonne. Au reste les harengs ne se mettent en route ou ne la terminent qu'après avoir frayé : ainsi il paroît que l'appas des insectes attire autant les harengs , que la poursuite de leurs ennemis les chasse sur nos côtes. La même loi ou le même instinct appelle après eux leurs petits dès qu'ils ont assez de force pour voyager ; & tous ceux qui échappent aux filets des Pêcheurs continuent promptement leur chemin pour remplir ailleurs le grand but de la nature ; c'est-à-dire pour devenir peres des générations de l'année suivante.

Si quelque chose est digne d'admiration dans la marche de ces animaux , c'est l'attention que ceux de la première rangée (qui marche en file & sert de signal aux autres) portent sur les mouvemens des harengs royaux leurs conducteurs ; lorsque les hareng sortent du nord , la colonne est incomparablement plus longue que large : mais dès qu'elle entre dans une vaste mer , elle s'élargit au point d'avoir une étendue plus considérable que la longueur de la Grande-Bretagne & de l'Irlande ensemble. S'agit-il d'enfiler un canal , aussi-tôt la colonne s'allonge aux dépens de la largeur , sans que la vitesse de la marche en soit aucunement rallentie ; c'est ici surtout où les signaux & les mouvemens font un spectacle digne d'admiration & d'étonnement : nulle armée si bien disciplinée qu'elle soit ne les exécute avec autant d'harmonie & de précision.

Pêche des Harengs par différentes Nations.

Nous avons déjà dit que pour cette expédition les Hollandois assemblent leurs buyfes aux environs de Hithland , où arrive la seconde division des harengs. Leurs buyfes sont au nombre de douze à quinze cens ; ils les mettent en mer , en tirant au nord-nord-ouest , & elles jettent le premier filet près Fayrhill , la nuit du lendemain de la Saint Jean , 25 Juin , aussitôt après minuit. On ne pêche que la nuit , parcequ'on reconnoît mieux le fil du banc des harengs , que l'on distingue clairement par le brillant de leurs yeux & de leurs écailles. Le jour on ne les distingue que par la noirceur de la mer & par l'agitation qu'ils excitent dans l'eau , en s'élevant souvent jusqu'à la surface , & en sautant même en l'air pour éviter la fureur dévorante de leurs ennemis. D'ailleurs , pendant la nuit , le poisson est attiré par la clarté des lanternes qui le fait venir droit aux buyfes , & l'empêche , en l'éblouissant , de discerner les filets. Les Pêcheurs de sardines se servent fort utilement de ces mêmes manœuvres sur les côtes de Dalmatie.

Les filets , qui servent à la pêche des harengs , sont longs de mille à douze cents pas , & faits , suivant l'Ordonnance , pour le moins de bon chanvre , avec des mailles bien serrées , afin que le poisson , en y appro-

chant , s'accroche aussitôt par les ouies : ceux qu'on fait aujourd'hui sont presque tous tricottés , d'une espece de grosse soie de Perse , ils durent au moins trois ans : dès qu'ils sont faits , on les teint en brun avec la fumée de copeaux de chêne , pour les rendre moins visibles dans l'eau.

Il n'est pas permis de jeter les filets en mer avant le 25 de Juin , parceque le poisson n'est pas encore arrivé à sa perfection , & qu'on ne sauroit le transporter loin sans qu'il se gâte. C'est en vertu d'une Ordonnance expresse , & des placards publiés par les Etats & par la ville de Hambourg , que les Maîtres des buyfes , les Pilotes & les Matelots prêtent serment , avant leur départ de Hollande & de Dantzic , de ne pas précipiter la pêche , & qu'ils le renouvellent à leur retour , pour attester que ni leur vaisseau , ni aucun autre de leur connoissance , n'a fait infraction à cette loi. En conséquence de ces serments on expédie des certificats à chaque vaisseau destiné au transport des nouveaux harengs , pour empêcher la fraude & pour conserver le crédit de ce commerce.

Depuis le 25 Juin jusqu'au 15 Juillet , on met tout le hareng qu'on prend , pêle-mêle dans des tonneaux qu'on délivre à mesure à certains bâtimens bons voiliers , qu'on appelle *chasseurs* , qui les transportent promptement en Hollande , où le premier hareng qui arrive porte aussi le nom de *hareng chasseur*. Quant au poisson qu'on pêche après le 15 Juillet , aussitôt qu'il est à bord des buyfes , & qu'on lui a ôté les ouies , on a grand soin d'en faire trois classes ; savoir , le *hareng vierge* ; le *hareng plein* & le *hareng vuide*. On sale chaque espece à part , & on la met dans des tonneaux particuliers. Le *hareng vierge* est celui qui est prêt à frayer ; il est fort délicat. Le *hareng plein* est celui qui est rempli de laites ou d'œufs , c'est-à-dire , qui est dans son état de perfection. Le *hareng vuide* est celui qui a frayé , qui est un peu coriace , qui se conserve bien moins ; c'est le moins estimé : ces deux dernieres especes de harengs forment la charge ordinaire des buyfes , qui partent à mesure qu'elles sont remplies , ou quand la pêche est finie.

La pêche du côté de la Norwege est beaucoup diminuée depuis l'an 1560 , tems auquel le commerce du hareng étoit très florissant , sur-tout à Berghen où il y avoit un comptoir pour cette pêche , établi sous le nom de *Confrérie de Berghen ou de Scandinavie*. Jusqu'à ce tems plusieurs milliers de vaisseaux de Dannemark , d'Allemagne , de Hollande , d'Angleterre & de France , avoient coutume d'aller tous les ans chercher sur les côtes de Scandinavie , les provisions de l'Europe ; mais le gros banc de harengs a pris une autre route vers le Hithland & du côté de l'Ecosse. Quand les Pêcheurs Ecossois ont fait leur coup sur le hareng , ceux de Dumbar , de France , du Brabant , & même des buyfes Hollandoises équipées une seconde fois , vont au devant de ce poisson près les bancs , les baies , les rivières par où doivent passer les colonnes , & ils en font encore une capture considérable. Toute la côte de Suede & de Finlande , &c. fournit un mauvais hareng , à l'exception de la petite espece ,

qui se trouve dans le Golfe Bothnique , & qui est d'un goût exquis. Le hareng de la mer Baltique & du Holstein , se pêche vers l'équinoxe du printems. Une chose assez singulière , c'est que dans les mois de Décembre , Janvier & Février , on pêche du hareng auprès du Caire en Egypte , & qu'on n'en voit point ni à Rosette , ni à Damiette , ni dans la Méditerranée.

Préparation & destination du Hareng.

Les Hollandois , parmi lesquels la seule pêche du hareng nourrit ordinairement plus de cent mille personnes & en enrichit beaucoup , les Hollandois , dis-je , avant que de transporter plus loin le hareng de leur pêche , le salent de nouveau.

Le meilleur hareng que l'on connoisse à Hambourg & qu'on envoie dans l'Empire , est celui qui vient de Hollande ; mais avant cette dernière destination , les Jurés-Emballeurs de Hambourg le salent & l'encaquent encore une fois à la façon Hollandoise ; puis en font , sous serment , une estimation qu'ils marquent sur les tonneaux.

Si le hareng de Hollande est d'un goût infiniment plus délicieux que celui des harengs pris & préparés par d'autres nations , c'est que les Pêcheurs Hollandois y prennent des soins & des précautions particulières : ils lui coupent les ouies à mesure qu'ils le prennent ; & l'ayant préparé avec grand soin , ils ne manquent jamais de ferrer tout ce qu'ils ont pris dans une nuit avant la chute du jour. Les tonneaux , dans lesquels ils encaquent leurs harengs , sont de bois de chêne , & ils les y arrangent avec beaucoup d'ordre dans des couches de gros sel d'Espagne ou de Portugal. Les tonneaux , dont les Norwégiens se servent , sont de bois de sapin ; ce qui communique un mauvais goût au poisson : d'ailleurs , ils le salent trop ou point assez , & l'empâtent mal dans les tonneaux. De plus , le hareng de leur pêche est moins gras que celui du Hithland ; il est même défendu dans les Provinces-Unies , par un Edit de 1720 , de pêcher aucun hareng entre les rochers de Norwege , ou d'en acheter des gens de ces pays , sous peine de confiscation de la marchandise , & de trois cents florins d'amende.

L'Angleterre a fait de grands efforts pour faire fleurir en Ecoffe le commerce du hareng ; mais les Ecoffois se sont avisés de pêcher ce poisson avant sa perfection ; de plus ; ils n'en font la pêche qu'avec de petites chaloupes , en côtoyant la terre : ils sont même dans l'usage de ne point préparer leur poisson sur-le-champ : ils attendent pour cela que leurs chaloupes en soient remplies. Cette façon lente de le préparer , ôte au poisson sa délicatesse naturelle , & la faculté de se conserver. Les Habitants d'Yarmouth se contentent d'en pêcher aussi cinquante mille tonneaux ou environ , dont ils font leur hareng rouge ou enfumé.

Les Flamands , qui étoient autrefois de grands pêcheurs , ont inventé les premiers la meilleure façon de préparer & de saler le hareng ; mais
trop

trop voisins d'un peuple industrieux (les Hollandois) jaloux du commerce & du gain, ils ont été bannis de la mer. Il n'y a pas long-tems qu'on disoit *hareng de Flandres*; aujourd'hui l'on dit, *hareng de Hollande*. Nous disons que l'usage d'encaquer les harengs n'est guere connu que depuis trois cents cinquante ans au moins. Quelques Historiens fixent l'époque de cette simple & utile invention à l'an 1397 & d'autres à 1416; l'inventeur s'appelloit *Guillaume Benckels*, natif de Bieruliet en Flandres. Le souvenir du nom de *Benckels* fut par la suite si agréable, que l'Empereur Charles V & la Reine de Hongrie allerent en 1536 en personnes voir son tombeau à Bieruliet, comme pour témoigner leur reconnoissance d'une découverte si avantageuse à leurs Sujets de Hollande.

Tout le hareng, que les Hollandois prennent par un second équipement, ainsi que les François & les Habitants de Galles, &c., est mangé frais en partie: le reste, qui va à plusieurs milliers de tonneaux, est salé; & c'est celui que l'on envoie en Espagne & dans la Méditerranée; sous le faux nom de *hareng de Hollande*. Ce sont sur-tout les Négocians de Devonshire & de Cronwal, qui savent le préparer en le pressant d'une façon particuliere, & qui en envoient la plus grande quantité à Cadix, à Lisbonne, à Venise, à Livourne, & jusqu'en Afrique.

M. Anderson dit que sur les côtes d'Yarmouth on vuide & on coupe les ouies au hareng, dès qu'on en a amené une barque à terre; ensuite on le met dans des tonneaux avec du sel d'Espagne, ayant soin de le remuer de tems en tems; au bout de seize à vingt-quatre heures, ils l'ôtent des tonneaux, le lavent bien avec de l'eau fraîche, & le suspendent à des bâtons posés sur des lattes dans des cabanes faites exprès pour cet usage: il y font ensuite du feu avec du bois fendu bien menu, qu'ils rallument toutes les quatre heures, ayant grand soin de fermer exactement les cabannes pour y contenir la fumée, & la faire recevoir par le poisson. Ils y laissent pendant six semaines celui qui doit être envoyé hors du Royaume, & on l'empaquette bien pour l'envoi. Tel est, dit M. Anderson, le principal secret pour bien enfumer le hareng.

Les Islandois prennent encore aujourd'hui des quantités prodigieuses de petits harengs, qu'ils entassent vivants sur le bord de la mer, & qu'ils partagent ensuite entr'eux par tête. Dans la Bothnie Occidentale, on le met dans de grands tonneaux avec beaucoup de sel; & après l'avoir bien remué avec un bâton, on le laisse dans le sel pendant vingt-quatre heures, jusqu'à ce que le sang soit sorti, & que le poisson se roidisse: on l'ôte le lendemain, & on l'empaquette bien dans de petits tonneaux de toutes sortes de grandeur: on le débite, soit dans le pays même, soit dans le voisinage. On choisissoit autrefois les plus petits; & après les avoir salés, on les faisoit sécher au four pour les envoyer en présent dans les pays étrangers: c'étoit dans certains cantons un régal aussi délicieux que le raff ou rekel du Nord. La bonté de ce poisson se perd sur nos côtes; & d'ailleurs on n'y a pas la bonne façon de le saler & préparer pour le trans-

port, comme les Hollandois : ce qui fait qu'on le mange frais, ou que tout au plus on l'enfume pour en faire une marchandise un peu durable. On estime assez cette préparation, dont la maniere est rapportée dans les Annales de Breslau, *Avril 1720*. Dans tous les pays ou côtes à harengs, on est obligé d'enfumer ceux de ces poissons qui sont maigres & coriaces; tels sont les *harengs* de Lubeck, de Prusse & de Dantzick. Les Hollandois font encore beaucoup de hareng saur ou enfumé avec ce poisson qui, étant poursuivi par l'épaular & le marsouin, vient souvent jusques dans l'Y Grec, devant la ville d'Amsterdam. On le prépare en Novembre & en Décembre : il est très gras & d'un goût exquis; mais on le consomme dans le pays; car il seroit difficile de le transporter bien loin, à cause de l'abondance de sa graisse. L'on envoie le hareng fumé le plus maigre, à Hambourg, à Brême, & de-là plus loin dans l'Empire.

Le hareng fréquente aussi les côtes de l'Amérique Septentrionale, mais on y en voit beaucoup moins qu'en Europe : il ne va pas plus loin que les fleuves de la Caroline. Ces harengs seroient-ils les mêmes que ceux que l'on voit disparoître en se jettant dans l'Océan Atlantique, ou un détachement de la grande troupe Septentrionale, qui, venant sur les côtes de Groënland, s'écarte sur les côtes du Nord-Ouest de l'Amérique, au lieu de tirer au Sud-Est avec les autres.

A l'égard des harengs d'Amboine & de Banda, que l'on y sale & enfume, ce ne sont point de vrais harengs, mais des poissons qui leur ressemblent beaucoup. Il n'en est pas de même de celui qui se trouve au Cap de Bonne-Espérance : on l'y voit par troupes très semblables à nos harengs d'Europe : ils remontent quelquefois dans les rivières où ils se nourrissent d'herbes, de charognes, &c. Les Esclaves Negres en prennent très souvent au filet : ils les laissent quelques jours dans la saumure avant de les manger.

Il est étonnant que les Européens, & particulièrement les Hollandois, n'aient encore pû trouver la véritable maniere de saler le hareng au point qu'il se conserve assez pour l'envoyer dans nos colonies, où il seroit d'un usage infini & très précieux. Tous ceux qu'on y a envoyés jusqu'ici ont été gâtés avant que d'arriver.

Le hareng frais se nomme *hareng blanc* : il est d'une chair blanche & d'un bon goût : il convient à bien des tempéraments. Celui qui est salé se nomme *blanc-salé*, il est assez mal sain : il ne convient qu'à des estomacs robustes ; celui qui est dessalé se nomme *hareng pek* : il est moins mal-faisant, mais moins délicat que le hareng frais. Quant au hareng saur ou enfumé, il est pernicieux, quoique le menu peuple l'appelle *appétit* ou *rouge salé* ; il est sec, dur & très difficile à digérer. En 1764, un Epicier de Paris annonça aux Habitants de cette Capitale, une espece de poisson d'un goût fort exquis, & qu'il distribuoit (sous le nom de *frigard*) à quatre sols la piece. Ce poisson qui lui venoit des côtes de Flandres en très petits barils, n'étoit qu'un hareng cuit dans une sorte de court-bouil-

lon aromatisé par la sauge , le laurier , le thym , &c. Le hareng est apéritif. La saumure de ce poisson convient pour déterger les ulcères fétides : elle arrête les progrès de la gangrene. On en fait entrer dans les lavements pour la sciatique : voyez GARUM.

- HARENGADE : voyez CELERIN.

- HARICOT , *phaseolus vulgaris*. Le nom de haricot est commun à la plante & au fruit qu'elle produit : pour distinguer cependant la gouffe qu'on mange en verd d'avec le grain lorsqu'il est séparé de sa gouffe , on dit haricot verd & haricot blanc ; & lorsque le grain est sec , on dit fève de haricot.

Le haricot est universellement connu , & il s'en fait une grande consommation en tous pays. La feuille de cette plante est uniforme dans toutes les especes de ce pays-ci ; elle est divisée en trois parties presque égales. Ses fleurs sont sans odeur , de forme irrégulière , & du nombre des fleurs légumineuses ; elles sont blanches ou purpurines , suivant l'espece , & sortent des aisselles des feuilles par bouquets , de quatre , six , huit ou dix , placées de deux en deux par échelon , le long du rameau où elles tiennent ; la tige est déliée , & ne se soutient qu'en s'accrochant aux tiges voisines au défaut d'autres appuis. A la fleur succede la gouffe , qui est plus ou moins longue , suivant l'espece , & contient plus ou moins de grains.

Il y a un très grand nombre d'especes de haricots : on en a compté , dit-on , jusqu'à soixante & trois especes , très distinctes par la forme & par la couleur ; mais qui n'ont que fort peu de différence pour le goût & les qualités.

Nous ne parlerons ici que de quelques especes les plus usitées. La différence la plus frappante qu'il y ait entre les diverses especes de haricots , c'est que les unes filent , c'est-à-dire , montent , & qu'on est obligé de les ramer ; d'autres restent basses , & sont nommées *haricots nains* ou *à la touffe*. Les unes ont dans l'intérieur de leur gouffe une espece de pelli-cule , & les autres n'en ont pas : ce qui fait nommer ces dernières especes , *haricots sans parchemin* , ce sont les meilleurs à manger en verd. Ces plantes ont un avantage sur toutes les autres , elles réussissent mieux la seconde année dans la même terre que la première , pourvu qu'on la secoure d'un peu de fumier ; le grain devient plus clair & plus uni.

Le haricot nommé *haricot gris* , est un des premiers qu'on sème dans les terrains hâtifs. Sa fleur est purpurine ; son grain est de couleur noire jaspée de blanc : on n'en fait ordinairement usage qu'en verd , parcequ'il n'a point de parchemin , c'est une espece de haricot-nain.

Le *haricot blanc nain hâtif* est de toutes les especes , celle qui donne le plus de profit dans un jardin bourgeois ; mais le grain sec ne renfle pas beaucoup.

- Le *haricot de Soissons* est d'un beau blanc & d'un émail supérieur à tous

les autres ; c'est celui qui tient le premier rang pour être mangé en sec ou en grains lorsqu'il est encore frais & tendre.

Le *haricot de Prague* ou *haricot à la Reine* a une forme qui n'est pas bien décidée ; il s'en trouve de quarrés , de ronds , tous plus petits que les plus petits pois , de couleur isabelle jaspée de noir ; cette espece mériterait d'être plus répandue ; car elle se peut manger en verd , en grain tendre ; ils ont même un goût fin en sec : ils rapportent beaucoup.

Le *gros haricot de Hollande à confire* est reconnoissable par sa gouffe de sept à huit pouces de longueur ; on le confit au sel pour l'hiver ; c'est presque la seule maniere dont on l'emploie : il s'en fait une consommation immense en Hollande & dans les pays voisins ; mais on ne le connoît presque pas en France.

En général , quand les filets des haricots ont atteint le bout des rames il faut les arrêter , car ils consomment inutilement beaucoup de fève dont le bas profiteroit.

La farine de haricot est employée dans les cataplasmes pour amollir , resoudre & disposer les tumeurs à suppurer. On dit que le grain mâché & appliqué sur la morsure des chevaux , guérit la blessure.

Bien des personnes sont curieuses de conserver les haricots verts pour les manger en hiver. Pour cet effet on choisit les plus tendres & ceux où la fève n'est pas encore formée dans la cosse : on en retire les pointes ou le filet , on les jette à plusieurs reprises dans un chauderon d'eau bouillante pour les faire blanchir , on les retire pour les plonger dans de l'eau froide , & on les fait égoutter sur des claies d'osier ; ensuite on les laisse dessécher ou à l'ombre ou à l'étuve , & on les ferre dans une caisse ou dans des sacs de papier. Lorsqu'on en veut manger en hiver ou en carême , on en fait tremper dans de l'eau tiède , ils y renflent , puis on les accommode à quelque sauce que ce soit. Ils ont encore la même couleur & presque le même goût que s'ils venoient d'être cueillis dans le jardin. Il y a des personnes , qui , au lieu de les faire sécher , comme nous avons dit , les confisent au vinaigre , ou au beurre fondu ou à l'huile ; mais ces préparations leur ôtent leur goût.

HARICOT EN ARBRISSEAU , *phaseoloïdes*. C'est un petit arbrisseau , ou plutôt une plante sarmenteuse de la Caroline , que l'on peut élever ici très aisément de semences ou de marcottes. Cet arbrisseau porte des fleurs de couleur purpurine , ramassées en gros bouquets ; ses feuilles sont composées de folioles pointues & finement dentelées , rangées par paires sur une nervure , & terminées par une seule. Cette plante peut faire , en Juin , l'ornement des terrasses par ses gros bouquets purpurins.

HARLE ou **HERLE** , espece de plongeon nommé ainsi vers les rives de la Loire , comme à Cône , à la Charité , à Nevers , &c. On le vendoit autrefois à Paris sous le nom de *tiers* ou de *morillon* ; il ressemble

plus à une oie qu'à une canne sauvage : sa chair a un goût fort marécageux & désagréable.

HARMALE, espece de rue sauvage, fort odoriférante & particuliere à l'Egypte. Les Mahométans attribuent à l'odeur de cette plante la vertu de chasser les malins esprits.

HARPE, *lyra*. On donne ce nom à un poisson de moyenne grandeur, rond, de couleur rouge, sans dents, & qui porte à la tête deux cornes disposées en forme d'une harpe, d'où est venu son nom : sa voix est comme un grognement : il vit de plantes mêlées avec de l'écume de mer : sa chair est extrêmement coriace : on le pêche dans les environs d'Antibes.

HARPE ou CASSANDRE, espece de coquillage univalve, du genre des conques sphériques, dont la coquille est très belle, très variée dans ses couleurs, & ornée de cannelures longitudinales, qui vont en diminuant comme les cordes d'une harpe, d'où lui est venu son nom. Voyez au mot TONNE.

HARPENS, oiseau de nuit, qui ne fréquente que les lieux inaccessibles des hautes montagnes du Dauphiné : on en voit aussi dans le Briançonnais. Cet oiseau, dit Belon, fait son nid dans les ouvertures des rochers, où les boucs-étains se retirent communément : son cri est fort lugubre. Cet oiseau ne sort jamais de jour.

HARPIE. Voyez à l'article CHAUVÉ-SOURIS.

HARPONNIER, *jaculator*. Nom qu'on donne à des oiseaux fort semblables au héron : ils ont un bec long, fort & pointu, de la forme d'un pieu ou d'un dard ; ils savent s'en servir de la même manière que les Pêcheurs usent de l'instrument qu'ils ont pour harponner les grands poissons cétaqués. Le harponnier a la tête assez grande ; les jambes grosses & les pieds courts ; le plumage cendré, mêlé de noir. Le harponnier du Mexique est de couleur rouge.

HASE ou HAZE. Nom que l'on donne à la vieille *lapine* & à la femelle du *lièvre*. Voyez ces mots.

HAUT ou HAUTHSI, ou HAY. Animal du Brésil, qui est de la grandeur d'un chien ; il a la face d'une guenon, le ventre pendant, une longue queue, des pieds velus à la manière des ours, des ongles aigus & longs. Il se plaît au haut des arbres, d'où lui est venu son nom : on l'apprivoise assez facilement ; on croit que cet animal est une espece d'*ai* ou de *pareffeux*. Voyez ce mot.

HAUTIN ou OUTIN, *piscis oxyrhincus*, est un poisson qu'on voit communément dans la Flandre & en Hollande. Il a la bouche longue, menue, pointue, molle & noire ; il n'a point de dents ; la mâchoire supérieure surpasse de beaucoup l'inférieure : il a la figure d'une truite.

Sur les bords de la mer Caspienne on en trouve d'une grandeur considérable. Les Marchands le vendent, en ce pays, desséché & salé : sa graisse est nourrissante : ses boyaux étant cuits, sont employés à faire

de la colle. Les Pêcheurs du Nil se donnent bien de garde de toucher au hautin qui se trouve dans leur fleuve, parcequ'ils ont pour lui une grande vénération.

HAYE, est la plus grande espece de *requin*. Voyez ce mot.

HAY-SENG. Les Chinois donnent ce nom à un poisson très laid, & dont on use à la Chine presque à tous les repas : il est sans os & sans aucune espece d'arrêtes : il meurt aussi-tôt qu'il est pressé dans la main ; mais un peu de sel étant suffisant pour le conserver, on le transporte dans toutes les parties de l'Empire de la Chine.

HAY-TSING. C'est l'oiseau de proie le plus beau, le plus vif, le plus courageux & le plus remarquable qui soit à la Chine. Il est très rare : on n'en trouve que dans le district de Hang-Chang-Su, Ville de la Province de Chenfy, & dans quelques parties de la Tartarie. Il surpasse en beauté, en force & en grosseur nos plus beaux-faucons ; aussi-tôt qu'on en prend un, il doit être porté à l'Empereur, qui le confie aux soins des Fauconniers Impériaux. Voyez FAUCON.

HEDERÉE. Les Epiciers Droguistes donnent ce nom ou celui de *gomme hédérée*, à la résine de lierre. Voyez ce mot à l'article LIERRE.

HELIANTHÈME, *helianthemum vulgare*. Plante qui vient communément dans les bois & les lieux montagneux, aux environs de Paris, & qui est connue aussi sous les noms d'*herbe d'or*, d'*hysope des garygues*, de *fleur du soleil*, & de *cyste-bas*. L'hélianthème a une racine blanche & ligneuse : ses tiges sont nombreuses, grêles, rondes, velues, couchées sur terre, & revêtues de feuilles oblongues, étroites, & attachées à des queues courtes, vertes en-dessus, blanchâtres en-dessous, d'un goût glutineux, & qui rougissent légèrement le papier bleu. Ses fleurs sont au sommet des tiges, disposées comme en longs épis, attachées à des pédicules, composées chacune de cinq feuilles, disposées en rose, & jaune. Le pistil se change en un fruit triangulaire, assez gros, qui s'ouvre en trois, & qui contient quelques semences également triangulaires & rousses. On ne se sert que des racines & des feuilles de cette plante : elles sont estimées vulnéraires, & avoir les mêmes propriétés que la consoude, pour arrêter toutes les especes de flux, & sur-tout ceux du sang ; on s'en sert encore avec succès pour laver les parties de la génération qui sont ulcérées.

On donne aussi le nom d'*hélianthème tubereux* aux *poires de terre* ou *topi-nambours*. Voyez ce mot.

HELIOTROPE. Voyez HERBE AUX VERRUES, & TOURNESOL.

HELIOTROPE. On a donné aussi ce nom à une sorte de jaspe, d'un verd-bleuâtre, tacheté de rouge, qui est très estimé. On le porte en amulette, pour préserver de la contagion, de la gravelle, de l'épilepsie ; & de quantité d'autres maladies, qu'on n'a pour cela ni plutôt ni plus tard, quoi qu'en disent les Charlatans qui le vendent pour de tels effets. Voyez JASPE.

HELLEBORE ou ELLEBORE. Plante dont on distingue plusieurs

especes, & qui ont été connues des anciens Grecs & Latins. Nous ne parlerons ici que des deux especes qui sont en usage ; savoir, l'*hellébore blanc* & le *noir*.

HELLÉBORE BLANC, *Veratrum album*. Les racines de cette plante sont fibrées & nombreuses : elles sortent comme d'une tête bulbeuse & jaunâtre : elles sont oblongues, grosses comme le pouce, olivâtres, blanches en dedans, d'un goût âcre, amer, désagréable, & qui cause des nausées. La tige est haute de deux à trois pieds, ronde, droite, creuse, de laquelle naissent des feuilles alternes, de la figure de celles du plantain ; mais plus grandes, plus nerveuses, d'un verd-clair, & qui entourent la tige par leur base faite en maniere de tuyau. Du milieu de la tige jusqu'à l'extrémité, sortent des grappes de fleurs disposées en roses, d'un verd-blanchâtre : il leur succede un fruit composé ordinairement de trois gânes membraneuses, qui renferment des graines oblongues, blanchâtres, & bordées d'un feuillet membraneux.

Il y a une autre espece d'*Hellebore blanc*, dont les fleurs sont d'un rouge-noir, les feuilles plus longues, plus minces & plus penchées.

L'HELLÉBORE NOIR DES JARDINS, *Helleborus niger*, est d'un genre différent de l'*hellébore blanc*, suivant les observations de M. de Tournefort, dans ses *Elémens de Botanique*. Les racines de l'*hellébore* dont il est question, sont tubéreuses, noueuses : il sort de leur sommet un grand nombre de fibres, serrées, noires au dehors, blanches ou grises en dedans ; d'un goût âcre, un peu amer, & excitant des nausées ; d'une odeur forte, lorsque la plante est récente. De la racine naissent des feuilles portées sur de longues queues, pleines de suc, maculées de points purpurins, comme la tige de la grande serpentaire. Ces feuilles sont divisées jusqu'à la queue, le plus souvent en neuf portions, comme une main ouverte, formant autant de petites feuilles roides, lisses, d'un verd foncé, & dentelées. Cette plante n'a point de tiges : les fleurs sont uniques, ou il y en a deux : elles sont composées de cinq feuilles disposées en rose, arrondies, d'abord blanchâtres, ensuite purpurines, enfin verdâtres, ayant en leur milieu plusieurs étamines courtes & jaunes : il naît, entre les feuilles & ces étamines, plusieurs cornets disposés en couronne, à la base du pistil. Ces fleurs durent long-tems sur la plante sans tomber : il leur succede un fruit composé de plusieurs gânes membraneuses, ramassées en maniere de tête, & renfermant des semences arrondies & noires.

Nous avons rencontré ces especes d'*hellébore*s dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Dauphiné, la Bourgogne & l'Auvergne : on les cultive quelquefois dans les jardins, à cause de la beauté de leurs fleurs & de l'utilité de la plante.

M. de Tournefort croit avoir retrouvé, dans son voyage du Levant, le véritable *hellébore* des Anciens. C'est un *hellébore* noir, plus nourri que le nôtre, sans odeur, sans amertume : il est commun non-seulement dans

les Isles d'Antycire , qui sont vis-à-vis du Mont-Æta , dans le golfe Maléac , que l'on appelle à présent le *golfe du Zeiton* , près de l'Isle d'Eubée , à présent *Négrepont* ; mais encore plus sur les bords du Pont-Euxin , & sur-tout au pied du mont Olympe en Asie , près de la fameuse Ville de Pruse. M. de Tournefort propose une expérience pour connoître si les racines , que l'on a coutume de vendre sous le nom d'*hellébore noir* , sont utiles dans la Médecine. Il faut en faire infuser dans une suffisante quantité d'eau de fontaine , & distiller ensuite dans un alambic : si l'eau qui sort de l'alambic n'a pas de goût , il faut rejeter ces racines comme inutiles ; mais si l'eau qui en sort est âcre , on peut les employer.

Nous devons , dit-on , la connoissance des propriétés de l'*hellébore* , & sur-tout du *noir* , à un certain Mélampus , qui étoit Médecin ou Berger ; & qui inventa la purgation : il guérit avec ce remède les filles de *Pratus* , qui étoient devenues furieuses. On retire de ces racines , par le moyen du feu , un esprit très âcre , qui coagule la solution du mercure doux. L'infusion de ces racines rend plus vive la couleur du papier bleu. Les racines de l'un & l'autre *hellébore* , purgent fortement les humeurs dures & tenaces : elles sont émétiques , sternutatoires & soporeuses. Ce purgatif convient aux maniaques , aux apoplectiques & aux ladres , même aux galleux qui sont robustes , mais jamais aux valétudinaires ni aux femmes. Ce que nous avons dit de la vertu médicinale de la coloquinte peut s'appliquer aux *hellébores*. Des Médecins prudents abandonnent aujourd'hui les *hellébores* à la Médecine vétérinaire pour guérir le farcin , &c. On donne aussi le nom d'*hellébore noir commun* au *pied de griffon*. Voyez ce mot.

HELMINTHOLITE. Sous ce nom , les Naturalistes désignent tous les vers de terre & de mer , qui se sont changés en pierre ou minéralisés , & qui pourroient bien n'être que des tuyaux vermiculaires marins.

HÉMATITE. Voyez ce mot à l'article FER.

HÉMEROBE , *Hemerobius*. Nom donné à un genre de mouches à ailes nerveuses , qui ont le palais élevé , avec deux antennules de chaque côté ; telles sont particulièrement les *demoiselles*. Voyez ce mot.

HÉMEROCALE. Plante dont la fleur est jaune , & qui ressemble assez au lis par les feuilles & par la tige : elle croît sans culture , & ne conserve sa beauté qu'un jour. Il y a une *hémerocalle* de jardins , dont les fleurs sont variées. Les Fleuristes Hollandois font grand cas de cette plante.

HÉMIONITE , *Hemionites*. Plante semblable à la langue de cerf , excepté que ses feuilles ont deux grandes oreilles à leur base. L'*hémionite* est fort vivace : elle croît dans les bois , dans tous les lieux humides & ombrageux. On s'en sert pour purifier la masse du sang : c'est un excellent béchique & vulnéraire.

HÉMIPTÈRE , *Hemiptera*. Nom donné à des insectes , dont les fourreaux ressemblent beaucoup à des ailes ; seulement ils sont un peu moins mols , plus colorés & moins transparents. On diroit que ces étuis sont
moitié

moitié aîles & moitié fourreaux. C'est de-là qu'on a formé le mot d'*hémipteres*, comme qui diroit *demi-aîles*. Il se trouve même des hémipteres mâles qui n'ont en tout que deux aîles, tels que le kermès & la cochenille (leurs femelles sont *apteres*, c'est-à-dire sans aîles). La bouche de ces insectes est une espece de trompe qui tire sa naissance du dessous du corselet, ou qui est prolongée le long de la partie inférieure du même corselet. Les larves des hémipteres ressemblent assez à l'insecte parfait, à l'exception des aîles & des étuis. M. Geoffroi (*Hist. des Insect. des environs de Paris*) a donné un détail circonstancié sur les métamorphoses & les singularités que présentent ces petits insectes. On peut aussi consulter les mots SCORPION AQUATIQUE, PSYLLE, PUCERON, KERMÈS, COCHENILLE, CIGALE, PUNAISE, MOUTHE, NAUCORE, PUNAISE A AVIRONS, CORISE, & l'article INSECTE.

HÉMORRHOIS. Voyez AIMORRHOU.

HÉPATIQUE, *Hepatica*. On donne ce nom à plusieurs especes de plantes de genre tout-à-fait différent : savoir, à l'*hépatique commune*, à l'*hépatique des Fleuristes*, au *petit muguet*, ou à l'*hépatique des bois*. Les Botanistes appellent *hépatiques* des plantes rampantes à tissu sillonné en réseau. Leurs racines sont fibreuses, & les fleurs mâles communément séparées des femelles sur le même pied.

L'HÉPATIQUE COMMUNE OU DE FONTAINE, *Hepatica fontana*, sive *lichen petraeus latifolius*. Est une plante qui croît aux lieux ombrageux, le long des rochers humides, des ruisseaux ou des fontaines, ou des puits : ses racines sont fines comme des cheveux ; elles sortent de dessous les feuilles qui sont très nombreuses, larges d'un doigt, & longues de deux, verdâtres, écailleuses. La fleur de cette plante n'est pas apparente : il sort de l'extrémité de la feuille un pédicule blanc, lisse, ferme, succulent, transparent, de la grosseur du jonc, long de quatre pouces ; surmonté d'une petite tête semblable à celle d'un champignon, divisée en dessous en quatre ou cinq parties. Cette tête est d'abord verdâtre, ensuite jaunâtre, & enfin roussâtre ; & ses parties inférieures en s'ouvrant, laissent voir un fruit noir ou des capsules purpurines, noirâtres, pleines de suc quand elles sont vertes, & quand elles sont sèches, de poussière ou de semences noirâtres qui forment une espece de fumée en tombant.

Cette hépatique a une saveur d'herbe, un peu amere, astringente, & d'une odeur légèrement aromatique & bitumineuse : elle est excellente pour les maladies du poulmon & du foie ; elle divise les humeurs épaissies ; elle convient aussi dans les maladies de la peau.

HÉPATIQUE DES BOIS ou PETIT MUGUET. Voyez MUGUET DES BOIS.

HÉPATIQUE DORÉE. Nom donné à la *Saxifrage dorée*. Voyez ce mot.

HÉPATIQUE DES FLEURISTES ou DE JARDIN, ou BELLE HÉPATIQUE, *Hepatica nobilis*. Ses racines sont rougeâtres & capillaires ; elle ne paroît extérieurement qu'un amas de fibres entrelacées. De chaque

petite tête de la racine, il sort tous les ans d'abord des fleurs, ensuite des feuilles, qui sont velues & repliées dès qu'elles paroissent, lisses quand elles sont étendues, vertes, quelquefois purpurines, fermes, à trois angles, & portées sur de longues queues : il sort de la même racine plusieurs tiges grêles, qui portent chacune une belle fleur en rose, dont le pistil se change en une petite tête, sur laquelle sont entassées plusieurs graines pointues, à la manière des renoncules : la couleur de la fleur varie ; elle est bleue, de couleur de chair & blanche. On cultive cette plante dans les jardins à cause de la beauté de sa fleur qui paroît au cœur de l'hiver.

On met cette plante au nombre des hépatiques ; elle est vulnérable, rafraîchissante & astringente : elle convient dans les inflammations de la gorge ; elle leve l'obstruction du foie, sur-tout dans ceux qui se sont trop livrés à l'amour. On en faisoit autrefois une eau distillée, dont les Dames faisoient usage comme d'un excellent cosmétique, & particulièrement pour blanchir la peau du visage, lorsqu'elle est gâtée par l'ardeur du soleil.

HÉPATIQUE DE FONTAINE. Voyez ci-dessus à l'article HÉPATIQUE.

HERBE, Herba. Est le nom qu'on donne aux plantes dont les tiges périssent en partie tous les ans. Il y en a de plusieurs sortes : 1°. les *herbes potageres* qu'on cultive pour l'usage de la cuisine ; telles sont celles qu'on appelle *herbes fines*, comme le *cerfeuil*, le *persil*, la *sarriette*, le *pourpier*, la *pimprenelle*, la *corne de cerf*, le *cresson ainois*. L'oseille & la poirée, &c. sont également des herbes. 2°. Les *herbes ou plantes odoriférantes*, telles que le *baume* ou le *basilic*, l'*absinthe*, la *marjolaine*, la *civette* *appetit*, la *camomille*, le *romarin*, la *sauge*, la *citronnelle*, le *coq*, l'*anis*, le *fenouil*, l'*estragon*, le *thym*, &c. 3°. Les *herbes sauvages* qui sont les plantes médicinales, telles que l'*hellébore*, la *scammonée*, l'*agaric*, le *thytimale*. 4°. Enfin on donne le nom de *mauvaises herbes* à toutes les plantes qui enlèvent aux bons grains une partie de la substance de la terre qu'elles épuisent : celles qui sont les plus nuisibles pour le bled, sont la *nielle*, qui se sépare difficilement du grain & noircit le pain ; voyez *nielle* à l'article BLEB : la *queue de renard*, dont la semence ressemble à celle de froment, & qui rend le pain amer ; le *ponceau* ou *pavot sauvage*, qui se multiplie au point d'étouffer le froment ; le *vesceron* qui le fait pourrir ; le *chiendent*, dont les racines s'étendent en traînaise & nuisent au labour ; le *mélilot* qui donne au pain une mauvaise odeur ; les *chardons* & les *yebles*.

À l'égard des *herbages*, on donne ce nom aux herbes des marais, ou aux prairies dont on fait le foin.

Les herbes entières doivent être cueillies lorsqu'elles sont dans leur plus grande vigueur, c'est-à-dire lorsqu'elles sont en pleine fleur, ou un peu avant la maturité des premières graines, & il faut les faire sécher suspendues à l'ombre. Celles qui sont aromatiques comme la plupart des labiées, doivent être enfermées dans des boîtes qui ferment exactement, afin de conserver leur aromate.

HERBE A L'AMBASSADEUR ou A LA REINE, ou SAINTE, &c.
Voyez NICOTIANE.

HERBE AUX ASNES, *Onagra*. Plante qui nous a été apportée de l'Amérique, & qu'on cultive, pour la curiosité, dans plusieurs jardins : elle vient de graine, & ne pousse sa tige que la seconde année.

La racine de cette plante est longue, de la grosseur du doigt, blanchâtre & fibreuse. Sa tige est haute, grosse comme le doigt, moëlleuse, ronde par la base, anguleuse & rameuse en haut, grisâtre & marquetée de points rouges; ses feuilles sont longues & étroites, sinueuses & dentelées : ses fleurs sont grandes & ordinairement à quatre feuilles jaunes, disposées en rose dans les échancrures d'un calice, duquel une moitié est fistuleuse & l'autre solide. Cette fleur est odorante, mais de peu de durée, car elle ne demeure qu'un jour épanouie sans se flétrir; quand elle est passée, la partie solide du calice devient un fruit cylindrique, qui s'ouvre par la pointe en quatre parties, contenant quatre loges remplies de petites semences anguleuses : cette plante est détersive & astringente. On prétend cependant que ses feuilles servent aux Indiens du Para pour résoudre les bubons, maladie fort commune dans le pays.

HERBE DES AULX. *Voyez ALLIAIRE.*

HERBE A BALAI, *Malva ulmifolia semine rostrato*, *Barr.* Cette espèce de mauve croît dans les rues à Cayenne : elle tire son nom de ce qu'on l'emploie à faire de petits balais. Les habitans se servent de sa racine en décoction pour guérir la gonorrhée & le mal d'estomac. *Mais. Rust. de Cayenne.*

HERBE DE BENGAL. Plante dont la tige, qui est grosse comme le petit doigt, est couronnée d'un bouton en forme de houe, qui se file, & dont les Tisserands du pays font diverses étoffes, sur-tout cette sorte de taffetas qu'on nomme en Europe *taffetas d'herbes*.

HERBE BLANCHE, *Gnaphalium maritimum*. Cette plante, qui croît au bord de la mer, a une odeur un peu aromatique, approchante de celle du *stæcas citrin*, & une saveur tant soit peu salée. Sa racine est longue, grosse & ligneuse, un peu fibrée; ses tiges sont hautes d'un pied, grosses, lanugineuses, garnies de beaucoup de feuilles oblongues, lesquelles étant rompues, paroissent comme autant de petits flocons de laine cotonneuse, propre à servir de mèche dans les lampes. Aux sommets des tiges naissent des fleurs en bouquets à fleurons, évasés en étoile, de couleur blanche & jaune : il leur succede de petits fruits blancs, composés chacun d'une graine courbe & d'une espèce de casque qui la recouvre. Cette plante est détersive, dessicative & astringente.

HERBE BLANCHE ou PIED DE CHAT, *Hispidula*. Est une plante cotonneuse qui se plaît sur les montagnes exposées au vent & couvertes d'herbes; ses racines sont fibreuses & très rampantes; ses feuilles sont couchées sur terre, oblongues, d'un verd gai, & duvetées : au milieu de ces feuilles s'élèvent des tiges de neuf pouces de longueur, velues, blan-

châtres, & garnies de longues feuilles étroites : au sommet de ces tiges sont plusieurs fleurs à fleurons, divisées en manière d'étoile, portées chacune sur un embryon, & renfermées dans un calice écailleux luisant, blanc ou rougeâtre, & qui représentent, étant épanouies, le pied d'un chat : l'embryon se change en une graine garnie d'aigrettes.

Ses fleurs sont sur-tout d'usage : elles appaisent la toux, facilitent l'expectoration, empêchent l'ulcération des poumons. Cette plante convient à ceux qui ont les poumons engorgés : on l'emploie utilement en infusion ou en sirop dans le crachement de sang. Les Pharmaciens en font une conserve qui convient aux poitrinaires.

HERBE AU CANCER. *Voyez* DENTELAIRE.

HERBE DU CARDINAL. Nom donné à la *confoude royale*.

HERBE AU CHANTRE. *Voyez* VELAR.

HERBE AUX CHARPENTIERIS ou HERBE DE SAINTE BARBE, *Barbarea*. Est une espèce de cresson qui croît sur le bord des fossés, le long des ruisseaux & des eaux courantes ou dormantes, quelquefois dans les champs. Sa racine est oblongue, médiocrement grosse, blanche, vivace, d'un goût âcre : elle pousse plusieurs tiges à la hauteur d'un pied & demi, rameuses, moëlleuses & creuses, portant des feuilles plus petites que celles de la rave, un peu approchantes de celles du cresson, d'un verd foncé & luisant ; les sommités sont garnies de longs épis de fleurs jaunes, petites, ayant chacune quatre feuilles disposées en croix : il leur succède de petites gousses longues, cylindriques, tendres, contenant des semences rousâtres. On cultive aussi cette plante dans les jardins potagers pour la salade : elle fleurit en Mai & Juin ; elle reste verte tout l'hiver, & se multiplie très aisément.

Cette plante est détersive, vulnérable : on en fait des bouillons ou tisanes utiles dans la colique néphrétique, le scorbut ou l'hydropisie naissante. Il y a des paysans qui pilent légèrement la plante & la font macérer dans de l'huile d'olive pendant un mois de l'été, & s'en servent ensuite avec succès comme d'un baume excellent pour les blessures.

HERBE AU CHAT. *Voyez* CATAIRE.

HERBE DE CITRON. *Voyez* MÉLISSE.

HERBE DU COQ. *Voyez* COQ DES JARDINS.

HERBE A COTON, *Filago*. Cette plante qui croît aux lieux stériles, sablonneux, dans les terres en friche & dans les bois, a une racine fibrée & chevelue ; ses tiges sont grêles, cotonneuses, hautes d'un demi-pied, branchues, couvertes d'un grand nombre de feuilles velues & oblongues. Ses fleurs naissent aux extrémités des tiges ; ce sont des bouquets à fleurons, évafés en étoile, jaunâtres, & soutenus par un calice écailleux : à cette fleur succèdent des semences allongées, & garnies chacune d'une aigrette.

Cette plante est dessicative & astringente ; on la substitue quelquefois au pied de chat pour le crachement de sang & pour les regles trop abon-

dantes. Lobel dit que dans la partie occidentale de l'Angleterre, le peuple pile cette plante, la fait macérer & bouillir dans l'huile, & s'en sert utilement pour les contusions & les coupures.

HERBE COUPANTE, *Cyperus scandens foliis & caule serratis*. BARR. Espece de fouchet qui croît à Cayenne, dont les feuilles & les tiges sont dentelées sur les bords comme une scie. L'on doit se garantir d'être accroché & déchiré par cette plante, car les écorchures qu'elle fait sont difficiles à guérir.

HERBE AUX COUPURES. Voyez MILLEFEUILLE.

HERBE AUX CUILLERS, *Cochlearia*. Est une plante qui croît communément aux lieux maritimes & ombrageux, même dans les Pyrénées & sur les côtes de la Flandre, quelquefois dans les jardins. On distingue six especes de *cochlearia*; mais nous ne parlerons que de la principale, qui est celle des boutiques, autrement dite *cochlearia folio subrotundo*. Sa racine est blanche, un peu épaisse, droite & fibrée; ses feuilles sont nombreuses, arrondies, à oreilles creuses, presque en maniere de cuillers, vertes, succulentes, âcres & piquantes, ameres, d'une odeur nidoreuse désagréable, & portées sur des queues longues; ses tiges sont branchues, courbées sur terre, hautes d'environ un pied, lisses, revêtues de feuilles découpées, longues & sans queues. Ses fleurs, qui paroissent en Avril, sont composées de quatre pétales blancs disposés en croix: il leur succede des fruits arrondis, composés chacun de deux coques qui renferment de petites graines rousâtres. Ces fruits sont mûrs en Juillet.

Toute cette plante tient le premier rang parmi les spécifiques contre le scorbut de terre; elle est apéritive, détersive, vulnéraire, & très propre à raffermir les gencives: on en fait prendre le suc ou l'infusion; il y a des personnes qui en mettent dans la biere qu'ils boivent. Cette plante desséchée ou en extrait, n'a que peu ou point de vertu, la partie alkaline volatile, qui constitue sa principale propriété, ne s'y trouvant plus. Les Groënlandois réussissent très bien à guérir le scorbut de terre & le scorbut de mer, en mêlant le suc de l'herbe aux cuillers avec celui de l'oseille. On tient dans les boutiques une eau & un esprit ardent de *cochlearia* distillés.

HERBE D'OR. Voyez HELIANTHEME.

HERBE DORÉE ou DAURADE. Voyez CÉTÉRACH. On appelle encore *herbe dorée* une très grande jacobée des prés, à feuilles de limonier. C'est le *virga aurea major vel dauria* de C. Bauhin.

HERBE A ECHAUFFURE. Plante qui croît à Cayenne sur les murailles, & dont le nom indique son usage: c'est le *begonia hirsuta flore albo*, *folio aurito*, *fructu coronato* de Barrere. Le fruit est garni d'une petite couronne, formée par les découpures du calice. On en fait des décoctions pour les élévations de la peau.

HERBE AUX ÉCUS. Voyez NUMMULAIRE.

HERBE A L'ÉPERVIER, *Hieracium*. Plante qu'on compte au nombre des *chicoracées*, & qui croît dans les champs de tous les côtés, parmi les

pâturages ; sa racine est longue , simple , charnue & laiteuse : ses tiges sont hautes de deux pieds , anguleuses , creuses , rameuses , vertes brunâtres , garnies de quelques feuilles : ses feuilles principales sortent presque toutes de sa racine , éparées à terre , découpées & vertes.

Les fleurs sont des bouquets à demi-fleurons , jaunes ; il leur succede des semences longues , rousses & garnies d'une aigrette. La racine de cette plante est humectante , rafraîchissante & un peu astringente. On distingue encore deux autres espèces d'*hieracium* : l'une est l'herbe à l'épervier à feuilles tachées , voyez PULMONNAIRE DES FRANÇOIS ; l'autre est l'herbe à épervier odorante , elle a effectivement l'odeur de l'amande amere.

HERBE A L'ESQUINANCIE. Voyez à l'article BEC DE GRUE. On donne aussi ce nom à la *petite garance*. Voyez ce mot.

HERBE A ÉTERNUER , *Ptarmica*. Plante qui croît dans les lieux incultes & ombrageux : elle est haute d'un pied & demi , & quelquefois de plus de trois pieds. Sa racine est longue & filamenteuse : sa tige est grêle , ronde , fistuleuse & garnie de feuilles longues , comme celles de l'estragon , crenelées , verdâtres , & d'un goût piquant comme celui de la *pyrethre*. ; le haut de la tige est rameux ; les fleurs sont radiées & blanches , disposées en bouquets fort serrés : il leur succede des semences menues. Une feuille de cette plante mise dans le nez , fait éternuer long-tems ; si on la mâche , elle fait saliver , & est propre à guérir le mal de dents.

HERBE A LA FIEVRE. Nom donné à une petite plante rampante de Cayenne : c'est le *balliem* de Barrere. Elle ressemble assez au plantain par la forme & l'épaisseur de ses feuilles : elle a une odeur forte & désagréable quand on passe auprès ; cependant elle est agréable au goût. On fait usage de ses feuilles , en maniere de thé , ou dans le bain pour les fievres opiniâtres.

HERBE FLOTTANTE , *Sargazo*. On donne ce nom au *fucus* ou varec qui couvre la portion de la mer des Indes , qui est entre les Isles du Cap Verd , les Canaries & la terre ferme d'Afrique , & à laquelle les Portugais ont donné le nom de *sargasso*. Cette plante s'élève sur la surface de la mer de trois à quatre pouces ; elle pousse plusieurs rameaux menus , déliés , gris , qui s'amoncelent & s'entortillent les uns avec les autres ; ses feuilles sont longues , minces , étroites , dentelées en leurs bords , roussâtres , d'un goût approchant de plusieurs fucus de nos mers. Ses tiges sont garnies de vessies rondes , grosses comme le poivre , légères & vuides. Cette plante est fort tendre quand on la tire de l'eau ; mais elle devient dure & cassante quand elle a été séchée. On n'y a jusqu'à présent découvert aucune racine ; on y remarque seulement la marque de l'endroit par où elle a été rompue quand on l'a tirée de la mer : il y a néanmoins bien de l'apparence qu'elle est enracinée d'une maniere quelconque au fond de la mer. Cette herbe , par son abondance , rend la navigation de cette mer fort dangereuse , à cause des rochers ou bancs de sable sur lesquels elle croît. Voyez GOEMON.

On mange sur les lieux, de cette plante en salade ; elle est apéritive, diurétique , & bonne pour le scorbut.

HERBE AUX GENCIVES : c'est le *Fœniculum annuum* , *umbella contracta oblonga* de Tournefort. *Voyez* VISNAGE.

HERBE GRASSE ou HUILEUSE. *Voyez* GRASSETTE.

HERBE AUX GOUTTEUX ou HERBE DE LA ROSÉE ou ROSÉE DU SOLEIL , *Ros Solis*. Plante qui naît dans les lieux rudes , sauvages , humides & marécageux , le plus souvent parmi une mousse aquatique d'un blanc rougeâtre. Sa racine est fibrée & déliée comme des cheveux : elle pousse plusieurs queues longues , menues , velues en dessus , auxquelles sont attachées de petites feuilles presque rondes , concaves , en maniere de cure-oreille , verdâtres , garnies d'une frange de poils rougeâtres , fistuleux , d'où transudent quelques gouttes de liqueur dans les cavités des feuilles , de sorte que ces feuilles & leurs poils sont toujours mouillés d'une espece de rosée , même dans les tems les plus secs. Il s'élève d'entre ces feuilles deux ou trois tiges , presque à la hauteur d'un demi pied , grêles , rougeâtres , dénuées de feuilles ; lesquelles portent en leurs sommités de petites fleurs disposées en roses blanchâtres : il leur succede de petits fruits de la grosseur & figure d'un grain de bled , & qui renferment plusieurs semences.

On trouve encore une autre espece de *rosée du soleil* , qui ne differe de la précédente que par la figure de ses feuilles qui sont oblongues : elles sont l'une & l'autre également gluantes au toucher , à-peu-près comme la *graslette* , avec laquelle elles ont un certain rapport pour les propriétés : on doit les cueillir dans leur plus grande vigueur & par un tems serein. Si l'on touche du bout du doigt les gouttes de liqueur qui en transudent , cette espece de glu forme de petits filamens soyeux & blanchâtres , qui se coagulent aussi-tôt. Toute la plante est pectorale : on s'en sert dans la toux , l'asthme & l'ulcere du poulmon : elle s'ordonne en infusion jusqu'à deux gros , & à un gros en poudre : dans les boutiques on en fait un syrop béchique.

On prétend que le *ros-solis* ferré dans la main dissipe la fièvre. Toujours est-il certain que c'est un poison pour les moutons ; il leur gâté le foie , le poulmon , & leur excite une toux qui les fait périr insensiblement.

HERBE AUX GUEUX ou VIORNE DES PAUVRES. *Voyez* CLÉMATITE.

HERBE AUX HÉBÉCHETS. *Voyez* ARROUMA.

HERBE DE LA HOUETTE. *Voyez* APOCIN.

HERBE IMPATIENTE. *Voyez* à la suite du mot BALSAMINE.

HERBE A JAUNIR. *Voyez* GAUDE.

HERBE DE LA LACQUE. *Voyez* MORELLE A GRAPPES.

HERBE AU LAIT , *glaux maritima*. Plante qui croît au bord de la mer , principalement en Zélande & en Angleterre : ses racines sont

fibrées : ses tiges , grêles , basses & rampantes , portent des feuilles opposées & semblables à celles de l'Herniole. Sa fleur est un godet blanchâtre ou purpurin , sans calice , découpé en rosette à cinq quartiers : il lui succède une capsule membraneuse qui renferme des semences rougeâtres & menues. En plusieurs pays , on est dans l'habitude d'en faire faire usage aux nourrices , soit dans le potage , ou en décoction pour leur augmenter le lait. On donne aussi le nom d'herbe à lait , au *Poligala*. Voyez *ce mot*.

HERBE AUX MAMMELLES : voyez *LAMPSANE*.

HERBE MAURE ou D'AMOUR : voyez *RESEDA*.

HERBE MIMEUSE : voyez *SENSITIVE*.

HERBE AUX MITES , *blattaria*. Plante qui croît en terre grasse au bord de l'eau , & qui tient son nom de la propriété qu'elle a de tuer l'espece de vermine appelée *mitte* , laquelle ronge les habits. La racine de cette plante a la figure d'un navet , elle est fibreuse : ses tiges sont hautes comme celles de la moleine , droites , divisées en aîles ; ses feuilles sont longues , pointues , crénelées , glâbres , d'un verd noirâtre , d'une odeur désagréable & d'un goût amer ; ses fleurs sont des rosettes , comme celles du bouillon blanc , d'un jaune foncé , odorantes : il leur succède un fruit rond qui renferme de petites semences noirâtres : cette plante est apéritive & antivermineuse.

HERBE MOLUCANE , *herba molucana*. Est une plante rampante de la Nouvelle-Espagne , qui tire son nom d'un lieu nommé *Moluco* , où elle croît abondamment ; elle demeure verte toute l'année : on en vante la seconde écorce & les feuilles , comme de puissants vulnéraires , propres à guérir les ulcères invétérés ; lorsqu'on applique les feuilles en substance , il faut auparavant les ramollir au feu , ou les piler. Les Indiens appellent cette plante *brungara aradna* , c'est-à-dire , *plante à fleur jaune*. Les François qui sont établis dans le lieu où elle croît , l'appellent le *remède des pauvres* & la *ruine des Chirurgiens* , à cause de ses grandes vertus pour les plaies.

L'herbe molucane étant transplantée , s'étend & occupe en très peu de tems beaucoup de terrain.

HERBE AUX MOUCHERONS. Voyez *CONISE*.

HERBE MUSQUÉE. Voyez *MOSCATELLINE*.

HERBE AUX NOMBRILS , *omphalodes*. Nom que donnent les Herboristes à une petite espece de consoude , qui ressemble à la petite bourrache. Cette plante est basse & rampante , ses feuilles sont un peu semblables à celles de la pulmonaire ; ses tiges sont hautes d'un demi pied ; ses fleurs sont en rosette , il leur succède des fruits dans des capsules faites en corbeilles , lesquelles contiennent des semences semblables à celles du lin , sa racine est fibreuse. Cette plante croît au printems dans les jardins : elle est astringente & agglutinante.

HERBE AU PANARIS. Voyez *RENOUÉE ARGENTÉE*.

HERBE

HERBE DU PARAGUAY. *Voyez* THÉ DU PARAGUAY.

HERBE A PAUVRE HOMME. *Voyez* GRATIOLE.

HERBE AUX PERLES. *Voyez* GREMIL.

HERBE AUX POUMONS. *Voyez* PULMONAIRE.

HERBE AUX POUX. *Voyez* STAPHIS AIGRE.

HERBE AUX PUCES, *Psyllium*. Plante dont il y a plusieurs especes. Nous ne parlerons que des deux les plus en usage ; les autres en different peu par les propriétés.

L'HERBE AUX PUCES VIVACE, *Psyllium perenne*, a une racine longue, ligneuse, dure & fibrée ; elle pousse des tiges sarmenteuses, ligneuses, rameuses & rampantes, très chargées de feuilles, velues, & d'un verd blanchâtre, formant une touffe d'un aspect agréable sur le gazon ; ses sommités portent de petits épis courts, auxquels sont attachées de petites fleurs lanugineuses, d'un jaune pâle ; chacune de ces fleurs est un tuyau évasé par le haut & disposé en croix. Il succede à cette fleur une capsule membraneuse à deux loges, qui renferment des semences menues, oblongues, noirâtres, lisses, luisantes & semblables à des puces. Cette espece de *psyllium* se rencontre fréquemment aux environs de Montpellier, & dans les lieux incultes & sablonneux de la mer : on la cultive aussi dans les jardins. Elle fleurit en Juillet, & l'on récolte sa semence en automne.

L'HERBE AUX PUCES ANNUELLE, *Psyllium annuum*, est l'espece la plus commune : sa racine est annuelle, simple, blanche & fibrée ; ses tiges sont hautes d'un pied, rondes, velues, rameuses, garnies de feuilles opposées & semblables à celles de l'hyssope ou de l'estragon, nerveuses comme celles du plantain. Il sort des aisselles des feuilles, des pédicules longs, garnis en leurs sommets d'épis courts, qui sont composés de petites fleurs pâles, semblables, ainsi que les graines qui leur succèdent, à celles de l'espece précédente.

Cette espece de *psyllium* croît abondamment dans les champs, aux bords des vignobles.

L'herbe aux puces contient beaucoup de parties mucilagineuses : sa semence est rafraîchissante & adoucissante ; elle convient dans les inflammations des reins. Les Egyptiens s'en servent contre les fievres ardentes ; dans notre pays on en emploie tous les jours & avec succès dans l'ardeur d'urine, & pour adoucir l'âcreté de certains purgatifs : enfin, c'est un assez bon spécifique pour arrêter le crachement de sang, la dyssenterie & les gonorrhées.

HERBE AUX PUNAISES. Nom donné par Tournefort à la grande espece de verge d'or, dont les feuilles sont visqueuses & odorantes, & les fleurs radiées. C'est le *Conyza major*, *Monspeliensis odorata* de J. Bauhin.

HERBE AUX RHAGADES, *Rhagadiolus*. Plante qui croît dans les lieux incultes aux pays chauds : ses tiges sont hautes d'un pied & demi, lanugineuses & rameuses ; ses feuilles sont longues, sinueuses & velues : sa fleur est un bouquet à demi fleurons jaunes, dont les feuilles sont pliées

en gouttiere ; à la fleur succedent des graines membraneuses , disposées en étoile , & velues : les semences sont longues & pointues. Cette plante prise en décoction , est apéritive , détersive & diurétique.

HERBE A ROBERT. *Voyez* à l'article BEC DE GRUE.

HERBE SANS COUTURE. *Voyez* OPHIOGLOSSE.

HERBE DE SAINT ANTOINE, *Chamanerion*. C'est le petit laurier rose. *Voyez* ce mot.

HERBE DE SAINTE BARBE. *Voyez* HERBE AUX CHARPENTIER.

HERBE DE SAINT BENOIT. *Voyez* BENOITE.

HERBE DE SAINT CHRISTOPHE. *Christophoriana*. Plante qui croît dans les lieux montagneux : sa racine est grosse , chevelue , noire en dehors & jaunâtre en dedans : elle pousse des tiges à la hauteur de deux pieds , menues , rameuses : ses feuilles sont grandes & larges , laciniées , dentelées & verdâtres. Ses fleurs , qui naissent aux extrémités des branches , sont à fleur en rose , disposées en grappes , & succédées de baies molles , noirâtres & remplies de semences applaties. On ne se sert de cette plante qu'extérieurement , soit pour guérir la galle , soit pour faire mourir la vermine.

HERBE DE SAINT ETIENNE ou DES MAGICIENNES. *Voyez* CIRCÉE.

HERBE DE SAINT JACQUES. *Voyez* JACOBÉE.

HERBE DE SAINT JEAN. *Voyez* ARMOISE.

HERBE A SEPT TIGES ou GAZON D'OLIMPE. *Voyez* STATICE.

HERBE DU SIEGE. *Voyez* SCROPHULAIRE AQUATIQUE.

HERBE AU SOLEIL , ou FLEUR AU SOLEIL , ou COURONNE DU SOLEIL ou SOLEIL , *Corona solis*. Plante différente de l'heliotrope ou tournesol , & dont il y a beaucoup d'especes. La première monte fort haut en peu de tems , & principalement en Espagne , où l'on en a vu croître à la hauteur de vingt-quatre pieds : celle qu'on cultive en France est de la hauteur de six pieds environ. Sa tige est grosse , droite , sans rameaux ; ses feuilles sont grandes & larges comme celles de la bardanne , & crenelées en leurs bords : elle porte en son sommet une grande fleur large , ample , radiée , jaune , arrondie , représentant une couronne formée par des demi-fleurons , qui entourent un grand amas de fleurons. Cette fleur est toujours penchée du côté du soleil , parcequ'étant pesante , & sa tige étant échauffée & amollie de ce côté-là , elle y doit naturellement incliner (*voyez* l'explication de ce phénomène à l'article PLANTE). A la fleur succede un grand nombre de semences oblongues , plus grosses que celles du melon , garnies chacune dans le haut de deux feuilles , & enchassées dans une feuille en gouttiere.

La seconde espece ou variété est plus petite que la précédente ; elle se divise en plusieurs rameaux : l'une & l'autre sont vivaces.

Il y a plusieurs autres especes de soleils que l'on cultive dans les jardins. Ces plantes viennent du Pérou : on les cultive présentement dans tous les jardins en Europe , sur-tout dans les potagers , à cause de la beauté de leurs

fleurs ; ils conviennent aussi entre les arbres isolés d'une grande allée d'un parc : on les peut tondre en buissons , en retranchant aux ciseaux les branches qui s'élèvent trop. Les semences de la grande espece servent dans la Virginie à faire du pain & de la bouillie pour les enfants. Les Sauvages du Continent de l'Amérique mangent ces graines & en tirent une huile propre pour différents usages : on mange aussi les sommités de cette plante encore jeune , après les avoir fait cuire & les avoir trempées dans de l'huile & du sel. On dit que toute la plante est nourrissante , restaurante , propre pour exciter la semence. M. Hales a prouvé par des expériences , qu'un pied de soleil (le Vosakan) à masses égales & dans des tems égaux , transpire dix-sept fois plus qu'un homme.

HERBE AUX SORCIERS. *Voyez* POMME ÉPINEUSE.

HERBE AUX TEIGNEUX. *Voyez* BARDANNE & PÉTASITE.

HERBE AUX TEINTURES. *Voyez* GENESTROLE.

HERBE DE LA TRINITÉ. *Voyez* PENSÉE.

HERBE TURQUE. *Voyez* TURQUETTE.

HERBE DU VENT. *Voyez* COQUELOURDE.

HERBE AUX VERRUES ou HÉLIOTROPE, *Heliotropium*, aut *verrucaria*. Cette plante qui vient abondamment dans les champs , le long des chemins , aux lieux sablonneux & auprès des édifices , a une racine simple , dure , menue & ligneuse ; sa tige est haute d'environ un pied , cotonneuse , d'un verd blanchâtre , remplie de moëlle , & rameuse : ses feuilles sont semblables à celles du basilic , ovales , nerveuses & velues : ses fleurs naissent aux extrémités des rameaux , en maniere d'épis blancs , longs , lanugineux , & contournés comme la queue d'un scorpion : chacune de ces fleurs est un petit bassin plissé ; il leur succede quatre semences jointes ensemble , oblongues , cendrées , convexes d'un côté & applaties du côté par où elles se touchent.

Les feuilles de cette plante sont ameres : si on frotte avec cette herbe les verrues , les porreaux & les cors du gland ou de la verge & de l'an us , elle les guérit : elle passe pour efficace contre les ulceres gangréneux & les tumeurs écrouelleuses.

HERBE AUX VIPERES , *echium vulgare*. Plante qui croît dans les champs , contre les murailles ; sa racine est longue , grosse comme le pouce & ligneuse ; ses tiges sont hautes de deux pieds , velues & piquetées de taches rouges & rudes ; ses feuilles sont étroites , velues , rudes au toucher & d'un goût fade. Ses fleurs qui environnent toute la longueur de la tige , sont en entonnoir , de couleur bleue purpurine : il leur succede quatre semences jointes ensemble , ridées & ayant séparément la figure de la tête d'une vipere , d'où vient qu'on l'appelle *herbe aux viperes*.

On prétend aussi que cette plante est bonne contre la morsure de la vipere : on est plus sûr de sa qualité humectante & pectorale : elle adoucit les âcretés du sang , & elle le purifie.

HERBE AUX VOITURIERS : voyez MILLE-FEUILLE.

HERBES VULNÉRAIRES : voyez FALTRANCK.

HERBIER. On donne ce nom à un amas de plantes entières ou de parties de plantes desséchées, soit à la presse, soit sans les comprimer, & conservées dans des paniers, afin d'en avoir l'image sous les yeux sans sortir de chez soi, & dans des tems où la rigueur du climat nous empêche de les avoir fraîches & vivantes.

Quelques Curieux font de ces jardins secs, soit en prenant l'empreinte des plantes comme nous le dirons ci-après, soit par le dessein, la gravure, l'enluminure ou la peinture. Mais ces dernières méthodes ont beaucoup d'inconvéniens : car quoique les figures en général, ou leurs desseins puissent être regardés comme des lettres ou caracteres qui peignent & expriment aux yeux l'ensemble des différences des objets, quoique leur utilité & leur nécessité soient bien démontrées en Histoire naturelle ; cependant les défauts qui les accompagnent trop communément font tort à la Botanique. On y pourroit remédier en unissant les descriptions aux figures : par ce moyen on auroit non-seulement la figure de la plante, mais aussi l'explication de toutes ses qualités physiques ; comme la saveur, l'odeur, le dur, le lisse, le lieu, le climat, les vertus, &c. Les quatre moyens les plus usités de figurer les plantes, sont la peinture, l'impression en couleur, l'enluminure & la gravure. On doit avoir soin de dessiner chaque plante dans tous ses détails, depuis sa racine jusqu'à ses graines, &c. représenter toutes ses parties dans leur situation naturelle, en réduire la grandeur naturelle à une échelle moyenne, & grossir au microscope les plantes infiniment petites : en un mot choisir un milieu entre ces deux extrêmes.

Plus les plantes se dessèchent promptement, plus elles conservent de leurs couleurs naturelles. Celles qui se dessèchent presque subitement à la moindre chaleur ont communément peu de sucs, telles sont la plupart des gramens, des ombellifères, des labiées, des légumineuses : celles qui exigent plus de chaleur & un espace de huit à quinze jours pour se dessécher, sont les brionnes, quelques renoncules & autres plantes aqueuses : celles qui ne se dessèchent que difficilement & au bout de quelques mois, sont les pourpiers, les joubarbes, plusieurs liliacées, les plantes marines, & autres plantes appelées *grasses* ou *charnues*. M. Adanson dit qu'il n'y a aucune plante de ces trois classes qu'il ne soit parvenu à dessécher, en employant trois sortes de degrés de chaleur ; savoir, celui de la chaleur humaine (30 ou 35 degrés) qu'on peut employer pour les premières. La chaleur du Soleil entre 40 & 60 degrés pour les deuxièmes. Enfin celle du fer chaud ou du four, qui doit aller de 80 à 100 degrés pour les plantes charnues.

Au reste, de telle manière qu'on veuille dessécher les plantes, il faut les avoir cueillies par un tems sec, sans rosée, dans toute leur vigueur & garnies de leurs racines, feuilles, fleurs, & fruits ou graines ; les étendre

dre fans aucun pli chacune entre deux feuilles de papier gris : puis les arranger & les conserver ainsi sechées dans de nouvelles feuilles de papier gris. Des personnes font dans le mauvais usage de coler de petites plantes pour les fixer en place ; ce moyen empêche qu'on ne les puisse voir des deux côtés ; il suffit de les attacher au papier avec des épingles qui fixent leurs tiges & leurs branches principales. Quant aux plantes fort épaisses & fort amassées l'on peut si l'on veut les coudre pour qu'elles ne glissent pas lorsqu'on ouvre son herbier, mais le mieux & le plus commode pour l'usage est de les laisser libres chacune dans leur papier volant. Pour conserver un tel herbier, il suffit de le garantir de la moisissure & des mites.

Pour ce qui concerne la maniere de sécher les plantes fans les aplattir ni les comprimer, voyez à l'article FLEURS. Lorsqu'on veut donner un vernis à la plante, on l'enduit fraîche d'une eau de gomme épaisse, puis on la met sécher au four, mais la gomme prend la poussiere dans les tems humides : il vaudroit mieux se servir du blanc d'œuf bien battu avec quelques gouttes de lait de figuier ou de tithymale : ces fortes de gommes-résines augmentent la limpidité de cette espece de vernis.

On fait que parmi les plantes qu'on desséche à la presse, il y en a qui laissent sur le papier leur figure empreinte, soit par une sorte de gomme-résine qui couvre leur surface (comme dans le ciste-ladanifère), soit par une couleur que leur humidité y décharge, comme dans la plupart des faules & des peupliers, ce qui, selon l'Auteur des Familles des Plantes, fait une impression que l'art a imitée, en gommant légèrement celles de ces plantes qui sont aqueuses, huilant celles qui ne prennent pas l'eau ou la gomme, puis répandant dessus de la couleur en poudre, & les mettant ensuite à la presse sur un papier blanc auquel s'attachoit cette couleur, en marquant davantage les côtes & les nervures. Telle est la maniere d'avoir les plantes par empreinte. Enfin, Boyle a indiqué un moyen de prendre l'empreinte grossiere de la figure des feuilles de routes fortes de plantes. Pour cela il faut noircir une feuille quelconque à la fumée de quelque résine, du camphre ou d'une chandelle, &c. Ensuite, après avoir noirci cette feuille suffisamment, on la met à la presse entre deux papiers brouillards, par exemple deux papiers de la Chine, & l'on a l'exakte étendue, figure & ramification des fibres de la feuille ; voyez *Boyle, Works, Abridg'd, vol. 1, pag. 132* : mais cette empreinte s'efface très aisément en tout ou en partie. L'art a trouvé une autre façon de prendre la figure d'une plante fans l'applatir : c'est en coulant dans son moule fait de plâtre, du métal fondu, comme étain, plomb, &c. ; ce procédé qui est actuellement connu de tout le monde, produit une plante métallique qui représente assez parfaitement la naturelle. L'industrie des hommes est encore parvenue à dissequer les feuilles supérieurement bien ; l'on fait aujourd'hui des squeletes de feuilles beaucoup plus parfaits que ceux que nous fournissent les insectes si vantés dans ce travail par quelques Naturalistes.

Severinus est un des premiers qui ait montré l'exemple ; quoique seulement sur un petit nombre de feuilles. Ensuite Musschenbroeck , Kundman & autres ont poussé le succès jusqu'à faire des squeletes de toutes sortes de feuilles. *Voyez* les articles , PLANTES , FLEURS , FEUILLES , &c.

HERECHERCHE , espece singuliere de mouche luisante , qui , selon Dapper , se trouve dans l'Isle de Madagascar , & dont les bois sont remplis , comme d'autant de bluettes de feu , qui forment un spectacle singulier pendant la nuit. Quelquefois ces mouches s'attachent en nombre aux maisons. Flacourt crut un jour la sienne en feu ; mais en examinant de près , il ne trouva qu'un sujet d'amusement & d'admiration dans ce qui avoit causé sa frayeur. Dapper dit que c'est un escarbot lumineux , qui éclaire & étincelle dans les bois & sur les maisons pendant toute la nuit , comme s'il étoit enflammé. *Voyez* MOUCHE LUISANTE.

HÉRISSEE , nom qu'on donne à la chenille velue de l'artichaud , & qui dès qu'elle est rassasiée de ses feuilles , se retire en terre : son papillon est blanc.

HÉRISSON BLANC ou BARBET BLANC. M. de Réaumur donne ce nom au plus singulier des vers mangeurs de pucerons , à cause de sa figure. Tout son corps est couvert & hérissé de certaines touffes blanches , oblongues , & arrangées comme les piquans d'un porc-épic : ce sont des filets ou pinceaux , rangés avec symétrie sur six lignes. Il y a de ces insectes , dont les touffes sont beaucoup plus longues que celles des autres : elles ne s'élèvent pas en lignes droites , mais se recourbent un peu en crochets , & en partie vers la queue ; les crochets du bord du ventre , sont tournés en-dehors : ceux de la tête tombent sur les yeux ; ce qui donne à cet insecte l'air de ces barbets , à qui des touffes de poils tombent sur les yeux. M. de Réaumur explique l'origine de ces touffes cotonneuses , *Mém.* 11 , *Tom.* III.

Ce Naturaliste dit avoir trouvé cet insecte dans les mois de Juin & de Juillet , sur des feuilles de prunier , peuplées de pucerons ; il ajoute que ces pucerons de prunier semblent être plus de son goût que tous les autres. Pendant toute sa vie , il est entouré d'une abondante provision de gibier. Quant ces *barbets blancs* en ont dépeuplé une feuille , ils passent sur la feuille voisine. Ces petits insectes barbets , en moins de quinze jours , parviennent à la grandeur qu'ils doivent avoir : ils se transforment en une nymphe peu différente de celle des scarabées hémisphériques. Après que l'insecte est resté environ trois semaines sous cette forme , il la quitte pour prendre celle d'un très petit scarabée.

HÉRISSON FRUIT. On donne ce nom à un fruit des Indes Orientales , de la figure & de la grosseur d'une poire , mais couvert d'une écorce hérissée d'épines. Il croît par grappes à de grands arbres ; & sa pulpe , qui est de fort bon goût , se conserve si bien , qu'on en fait provision dans le pays pour les voyages de mer.

HÉRISSON DE MER. *Voyez* l'article OURSIN.

HÉRISSON TERRESTRE, *echinus terrestris* : est un petit animal terrestre, gros comme un lapin moyen, & qui fréquente ordinairement les bois ; il est long de huit à neuf pouces : ses yeux sont petits & à fleur de tête : ses oreilles sont larges, longues & élevées, ses narines dentelées ; il a à chaque pied cinq doigts armés d'ongles, le pouce est plus court que les autres. Tout le dessus du corps ; savoir, le dos, les côtés & le sommet de la tête, sont couverts de piquans durs & pointus, comme le sont les coques de chataignes ; ces piquans sont variés de brun & de blanchâtre, les plus longs ont environ un pouce & demi. Le hérisson leve & abaisse à son gré ces épines qui sont ses armes naturelles. Sa tête, si on en excepte le sommet, sa gorge, son ventre, ses pieds & sa queue, sont couverts de poils bruns & blanchâtres : il a, à chaque mâchoire, deux longues dents incisives ; les supérieures sont éloignées l'une de l'autre, & les inférieures presque contiguës ; & en outre de chaque côté de la mâchoire supérieure sont quatre petites dents canines séparées par paires, & cinq molaires, dont la première & la dernière sont plus petites que les trois du milieu : de chaque côté de la mâchoire inférieure, il y a trois petites dents canines contiguës & couchées obliquement en avant, & quatre molaires, dont la dernière est plus petite que les trois autres : en tout trente-six dents. La femelle a huit mamelons.

Il ne faut pas confondre cette espèce de hérisson avec le porc-épic : ces animaux différent l'un de l'autre, par la grandeur, par la forme de leurs aiguillons, par la figure du corps, & par les pays qu'ils habitent. Voyez PORC-ÉPIC.

On distingue plusieurs sortes de *hérissons terrestres*, dont le caractère est d'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire, des dents canines, les doigts onguiculés, & le corps couvert de piquans. Il y a des hérissons qui ont le museau long, pointu, semblable au grouin d'un pourceau ; dans les autres, il est plus court, plus applati, & semblable au museau d'un chien.

Quand le hérisson a peur, il se met en rond ; & par ce moyen, il cache sa tête & ses pieds, & n'offre de toutes parts, qu'une boule épineuse. Dans cet état, il se défend très bien contre les chiens & les autres bêtes : si on l'arrose d'eau, ses pointes se rabaissent aussi-tôt. Cet animal ne sort que la nuit : il se nourrit de fruits ; il détache avec ses pattes les grappes de raisins : rien d'aussi singulier que de le voir se rouler sur ces grappes qui sont à fleur de terre, ou sur les fruits que le vent a abbatu. Dès qu'il sent que ses pointes sont entrées dans ces fruits, il s'enfuit avec sa charge dans les lieux où il se retire : soit dans les creux des arbres, soit dans les cavernes, ou au pied des vieilles mazes. Cet animal passe le fort de l'hiver à dormir.

Entre les quadrupèdes, dit Mathiole sur Dioscoride, le seul hérisson a les parties naturelles attachées aux reins, comme les oiseaux. Le mâle & la femelle s'accouplent de bout, à cause de leurs piquans : on trouve,

dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, & dans les *Ephémérides des Curieux de la nature*, la description anatomique du hérifson.

Le hérifson est d'un naturel froid. M. Temple assure qu'ayant ouvert deux de ces animaux, il en détacha le cœur dont le sistole & le diastole continuerent deux heures entieres : il fit éprouver à ces viscères, pendant la dernière demi-heure, une convulsion à chaque piquure qu'il leur faisoit. Le hérifson abonde en excréments : sa chair est astringente, difficile à digérer, & nourrit peu ; mais dans les Indes, où la chair du hérifson est blanche, les Indiens s'en nourrissent. Comme ces animaux ne vivent que de fruits, d'œufs de fourmis, d'herbes & de racines, les Espagnols en mangent pendant le Carême.

On trouve aussi dans les pays étrangers plusieurs sortes de hérifsons terrestres ; savoir, le *hérifson d'Afrique*, qui, selon Dapper, se trouve dans le pays des Negres : il y en a de la grosseur de nos pourceaux, que l'on appelle *quenja* : ils ont des piquans fort longs, qu'ils hérissent quand ils sont en colère : ils tuent les léopards qui les veulent dévorer ; car les plaies qu'ils font sont incurables, à cause de la longueur & de l'épaisseur de leurs piquans. Les petits n'ont pas plus d'un pied de hauteur, & leurs pointes sont plus foibles. Ce hérifson est un *porc-épic*.

Le *hérifson d'Amérique* est de la grosseur du nôtre : ses oreilles ne sont point saillantes ; elles sont comme des especes de trous. Ses piquans sont courts, gros & durs, d'un cendré jaunâtre ; le reste est comme dans les hérifsons ordinaires.

Le *hérifson de Malaca*, a les yeux grands & brillans : ses oreilles sont glabres ; ses piquans fort effilés, variés de blanc noirâtre, & de blanc roussâtre, longs depuis un jusqu'à six pouces. Les espaces qui sont entre ces piquans, sont remplis de poils déliés, longs & foyeux. On le trouve à Java, à Sumatra, & sur-tout à Malaca. Ce n'est peut être encore qu'une espece de PORC-ÉPIC. Voyez ce mot.

Le *hérifson de Sibérie*, qui est fort petit, a les oreilles & le museau courts : ses piquans sont gros, pointus, mais courts, & d'un jaune doré. Son ventre est garni de poils fins, laineux, d'un cendré doré.

Les Chasseurs, dans l'Inde & dans l'Afrique, pour prendre les hérifsons & les porc-épics, se servent de ruses, & retiennent leurs chiens ; car ces animaux blessent les hommes & les chiens avec leurs piquans, qui sont comme autant de poignards : il y en a de blancs, de noirs, & de différentes couleurs.

HERISSONE, chenille marte, ou espece de chenille velue, dont le poil forme des houpes. Voyez l'article CHENILLE.

HÉRITINANDEL, couleuvre fort dangereuse, de l'Isle de Malabar. M. Linnæus dit que sa morsure corrompt toutes les chairs, qui pourrissent & tombent ensuite ; & qu'après mille tourmens, le malade meurt.

HERMAPHRODITE. On donne ce nom aux individus dont les deux sexes sont réunis dans une même enveloppe, & peuvent se féconder réciproquement,

proquement : tels sont la plupart des végétaux. On n'a pas encore vu d'animaux qui puissent porter ce nom. Les limaçons , par exemple , quoiqu'ils réunissent les deux sexes dans une ouverture commune , ne peuvent se féconder eux-mêmes , & sont une espèce particulière d'hermaphrodites. Voyez LIMACON. Ceux qui portent les deux sexes sur le même individu , mais séparés l'un de l'autre , chacun dans une enveloppe particulière , s'appellent *androgynes*. M. Adanson dit qu'on n'en a encore vu que dans les plantes. Parmi les hermaphrodites & les androgynes , on voit souvent , dit encore le même Auteur , l'un des deux sexes stérile : quelquefois aussi l'on voit des hermaphrodites mêlés avec des mâles & des femelles parmi ces androgynes ; on appelle ces derniers *ubrides* & *poligames*.

On voit à l'article *Coquillage* , les différentes espèces d'hermaphroditisme connues : il est maintenant facile de juger de la différence d'un *hermaphrodite* avec un *aphrodite* : celui-ci , que M. Linnæus a appelé *monoïque* , parcequ'il est *unisexe* , produit seul & toujours par génération sans le concours d'un autre individu , &c. voyez l'article APHRODITE , & ce qui est dit de l'hermaphroditisme des fleurs au mot *fleurs* : voyez encore le mot SEXE , inséré dans le *Tableau alphabétique* , &c. , à la suite de l'article PLANTE.

Le vulgaire s' imagine que les personnes qu'on appelle hermaphrodites ont à la fois toutes les parties naturelles des deux sexes : mais c'est une erreur. Ces hermaphrodites sont des monstres , n'y en ayant jamais eu d'assez parfaits pour servir en même tems de mâle à une femelle & de femelle à un mâle , & pour devenir propres à produire & à concevoir avec l'un & avec l'autre des deux sexes.

Les sujets humains , que l'on qualifie de ce nom , loin d'être tout-à-la-fois hommes & femmes , ne sont ordinairement ni l'un ni l'autre : ils ne doivent leur conformation singulière qu'à un jeu de la Nature dont l'opération ordinaire a été interrompue.

Il n'est pas absolument rare de voir des sujets hermaphrodites , ou du moins qui se font passer pour tels , depuis qu'ils n'ont rien à appréhender des préjugés & des loix. Bien loin d'être jettés à la mer ou dans la rivière , comme on le faisoit à Athenes & à Rome ; au lieu d'être relégués dans quelque Isle déserte , & regardés comme des êtres de mauvais-préage , on les cherche avec soin , on désire de les voir comme un des objets les plus curieux que la Nature puisse offrir.

On a vu à Paris , en l'année 1751 , un hermaphrodite âgé de seize ans , qui avoit été baptisé comme fille & nommé *Michel-Anne Drouart*. Ce sujet étoit maigre , mince , sec , sa poitrine étoit plate , & ne montrait rien qui annonçât une gorge naissante ; il ne se sentoit aucune des incommodités propres au sexe ; il avoit beaucoup de poil sur tout le corps , principalement au menton & aux parties naturelles : sa marche , son port , ses gestes , le ton de sa voix étoient d'un garçon ; mais l'examen qu'on en

fit donna lieu de penser que ce prétendu hermaphrodite n'étoit qu'une fille pourvue d'un grand clitoris.

On est porté à croire que tous les hermaphrodites sont des filles mal configurées. Leurs inclinations dominantes sont plus propres que tout autre examen à décider le sexe qui les constitue : celle de Paris dont on vient de parler , n'a pas choisi une fille pour voyager , mais un garçon d'assez bonne mine. Quoique cet hermaphrodite parût pourvu des parties viriles , il ne pouvoit en faire usage ; car , quoique susceptibles d'érection , elles ne pouvoient se relever à cause d'un double frein qui les arrêtoit.

Cependant la Nature n'est pas toujours constante à cet égard , & l'on en a un exemple bien frappant dans le nouvel hermaphrodite que l'on a vu à Paris au commencement de 1765. Cet être , nommé *Grand-Jean* , qui participoit en apparence de l'un & de l'autre sexe , & qui a été baptisé en 1732 , à Grenoble , comme fille , & marié à Chambery , en 1761 , comme garçon , a fixé l'attention des Magistrats de la ville de Lyon & de celle de Paris. Le sexe le plus apparent chez cet infortuné , au premier moment de son existence , fut le sexe féminin : il vit les filles avec indifférence jusqu'à l'âge de quatorze ans ; ce fut alors qu'il éprouva l'instinct du plaisir , & qu'il sentit naître des passions qui n'appartiennent point au sexe dont on l'avoit cru d'abord. Enfin , cet individu qui n'étoit point obligé d'être Naturaliste , prit le vêtement convenable au sexe dominant chez lui , c'est-à-dire les attributs de la masculinité ; ainsi l'âge & des facultés trompeuses l'appellerent à l'état de mari. Mais des circonstances plus singulieres les unes que les autres , déterminèrent les Magistrats de Lyon à décréter de prise-de-corps l'individu hermaphrodite , & à le réduire dans un cachot les fers aux pieds , à le mettre au rang des infâmes ; enfin à le condamner d'être attaché au carcan , au fouet & au bannissement perpétuel. Ces peines rigoureuses prononcées pour le maintien des mœurs , parceque ces premiers Juges avoient cru trouver dans son mariage la profanation d'un Sacrement auguste : ces peines , dis-je , ne furent point ratifiées par les Juges du Parlement de Paris : ceux-ci examinèrent quel'étoit dans le physique , dans le Droit & dans le fait l'état de l'accusé : bientôt éclaircis des erreurs ou des caprices de la Nature , & de la bonne foi de l'individu que la Nature elle-même avoit trompé , les Dépositaires des Loix rendirent la liberté à ce malheureux Citoyen , & lui assignèrent la place qui lui étoit propre dans la Société (celle de femme) , & ils déclarèrent nul son mariage , qui , ne pouvant donner des Citoyens à la Patrie , n'auroit pu subsister davantage sans profanation.

Il est important de dire ici que tout l'ensemble de *Grand-Jean* paroissoit être un mélange des deux sexes dans la même imperfection : il n'avoit point de barbe , mais ses jambes étoient velues : sa gorge plus considérable que ne l'est communément celle d'un homme , n'étoit point délicate & sensible au toucher comme celle des femmes ; les mammelons en

étoient gros & sans aréole : sa voix étoit celle d'un garçon qui arrive à l'adolescence : son espece de mentule qui sortoit des grandes levres , au-dessus du meat urinaire , étoit longue de cinq doigts , de l'épaisseur d'un doigt , susceptible d'érection , & demouroit ferme dans l'acte du coït ; on y distinguoit vers l'origine deux especes de testiculés , & vers son sommet une sorte de gland avec son prépuce : comme ce gland n'étoit point perforé , il n'en pouvoit sortir aucune matiere séminale. Quant au reste de la vulve , l'entrée en étoit très étroite , & il n'en sortoit aucun écoulement menstruel ni séminal , &c.

Tout ce détail , & une multitude d'autres observations que nous croyons inutile de citer ici , tendent à démontrer , 1°. que parmi les différentes especes d'hermaphrodites , il n'y en a point qui réunissent les facultés des deux sexes avec un égal avantage , c'est-à-dire , qui puissent engendrer hors d'eux comme dans eux , & qui puissent être au gré de leur caprice , tantôt femmes tantôt hommes. 2°. Que s'il se trouve des hermaphrodites qui ont un sexe prédominant , avec toutes les facultés qui lui sont propres , les organes du sexe opposé sont imparfaits , &c. 3°. Enfin , que la dernière espece d'hermaphrodite , & qui est la plus commune , se rencontre dans ceux qui ont quelque chose de la conformation appartenante à l'un & à l'autre sexe , & qui ne sont puissants ni dans l'un ni dans l'autre. Tël étoit *Grand Jean* , & tels ont été vraisemblablement tous les individus de l'espece humaine qui ont passé pour hermaphrodites. Les autres hermaphrodites que l'on a vus , avoient des différences dans la conformation. Au reste , quoique les hermaphrodites passent pour des femmes , il ne paroît pas qu'il soit bien démontré qu'aucune de ces prétendues femmes ait conçu. Il y a eu des gens qu'on a regardés quelquefois , mais fort mal-à-propos , comme des hermaphrodites ; c'étoient de jeunes gens , qui , à l'âge de puberté , devenoient garçons , de filles qu'on les avoit crus ; les parties de l'homme qui étoient demeurées cachées , sortoient tout d'un coup , ou par la force du tempérament à l'âge de quinze ou vingt ans , ou à l'occasion d'une chute ou de quelque effort violent. Combien de *Tribades* sont improprement prises aussi pour des hermaphrodites !

On dit qu'à Surate au Mogol , il y a beaucoup d'hermaphrodites , qui , avec des habits de femme , portent le turban pour se distinguer , & afin d'apprendre à tout le monde qu'ils ont deux sexes.

HERMINE , *mustella armellina* , est un animal du genre de la *belette* , dont le caractere est d'avoir six dents incisives à chaque mâchoire , à chaque pied cinq doigts onguiculés , tous séparés les uns des autres , & dont le pouce est éloigné des autres doigts , & articulé plus haut. Tous les quadrupedes de ce genre ont le corps allongé , & les jambes courtes ; aussi l'hermine semble-t-elle n'être qu'une espece de *belette*. L'hermine est un peu plus grande : elle a les ongles blancs , & le bout de la queue noir. Tout le reste de son corps est blanc en hiver ; mais en été , la partie su-

périeure du corps est rouge , & la partie inférieure est blanche ; le tour de ses yeux est rouge & gris ; elle fait sa nourriture de rats & de taupes. On trouve cet animal en Russie , en Scandinavie , & dans tous les pays du Nord , rarement en France : mais on le rencontre communément au Cap de Bonne-Espérance , & sur-tout en Arménie ; c'est d'où lui est venu le nom d'*hermine*. Il gîte dans les cavernes : sa peau est très estimée des Foureurs ; c'est avec le bout noir de sa queue , que les Pelletiers font ces agréments qui pendent à la base de l'aumusse des Chanoines : ces bouts de queue sont très chers.

HERMODACTE, *hermodactylus offic.* Est une racine qui passe pour être celle d'une espèce de *colchique*. Voyez ce mot. On trouve cependant quelque différence entre le colchique commun ou mortel & l'hermodacte des boutiques ; mais M. de Tournefort assure qu'il a trouvé très souvent l'hermodacte , dans l'Asie Mineure , avec des feuilles & des fruits semblables à ceux du colchique : il n'est donc plus douteux que l'hermodacte ne soit la racine bulbeuse d'un colchique oriental.

On ne nous apporte d'Orient , d'Egypte & de Syrie , que la partie intérieure dépouillée de ses tuniques ou enveloppes ; c'est-à-dire , une racine dure , tubéreuse , triangulaire , ou représentant la figure d'un cœur coupé par le milieu , aplatie d'un côté , relevée en bosse de l'autre , & se terminant comme par une pointe , avec un sillon creusé de la base à la pointe sur le dos , d'un peu plus d'un pouce de longueur , jaunâtre en dehors , blanche en dedans : si on la pile , elle se réduit facilement en poudre , d'un goût visqueux , douceâtre & un peu âcre comme l'est la racine d'*arum*. Ces racines sont sujettes à être vermoulues.

Les Arabes sont les premiers qui ont enrichi la Pharmacie de ce remède qui étoit inconnu aux anciens Grecs : ces racines étant récentes , purgent la pituite par le vomissement & par les selles. Lorsqu'elles sont desséchées les Egyptiennes s'en servent , dit-on , pour se nourrir & s'engraïsser. Les hermodactes conviennent aux gouteux.

HERNIAIRE ou HERNIOLE : voyez TURQUETTE.

HERON , *ardea*. Oiseau aquatique , scolopace & imantopede , qui vit de poissons , & dont il y a plusieurs espèces. Nous en citerons les plus connues , ensuite nous donnerons l'histoire du *butor* , autrement dit le *héron étoilé*.

Quant au *flamant* , au *pelican* , à la *grue* , & à la *cigogne* que bien des Auteurs rangent avec le *héron* , nous en parlerons à chacun de ces mots.

Le HÉRON GRIS ou CENDRÉ ordinaire , *ardea* , est un oiseau qui est plus petit que la grue & la cigogne. Il a depuis le bout du bec jusqu'au bout des ongles , quatre pieds de longueur , & trois pieds jusqu'au bout de la queue , ou environ ; le bec long d'un demi pied , fort , droit , pyramidal , & d'un verd jaunâtre ou brunâtre ; ayant une fossette gravée depuis les narines jusqu'à sa pointe , les côtés un peu âpres & dentelés en arrière vers l'extrémité , afin de pouvoir mieux retenir les poissons

glissants dont il se nourrit ; les plumes antérieures du sommet de la tête sont blanches ; il a une crête noire haute ou prolongée de quatre pouces & demi. Le mâle a communément une crête bleuâtre , composée de trois plumes , longues de huit pouces , pendantes & couchées en arriere : ces plumes sont d'un grand prix : l'oiseau s'en défait dans le tems de la mue. Le héron a le menton blanc , le col cendré , roussâtre ; la gorge blanche , tachetée de noir ; le dos lanugineux , couvert de longues plumes cendrées & bigarrées de blanc ; le milieu de la poitrine & le dessous du croupion un peu jaunâtre ; une grande tache noire au dessous des épaules , d'où part une raie noire qui va jusqu'à l'anus ; le plumage des ailes est extrêmement long , gris & noir , la queue cendrée & courte ; les jambes très longues , dégarnies de plumes ainsi que les cuisses , & verdâtres comme les pieds ; les doigts sont fort longs , celui du milieu est dentelé ; l'estomac est lâche & membraneux , plutôt que musculeux , comme dans les animaux carnaciers : il a dix-huit vertebres au col , une seule appendice cæcale comme dans les quadrupedes : la trachée artère passe deux fois en droite ligne par les vertebres du col avant que d'entrer dans la poitrine.

Le héron se nourrit de poissons , de grenouilles ; souvent il blesse d'assez grands poissons sans pouvoir les rirer de l'eau ou les emporter. Ses petits s'engraissent d'intestins de poissons , de chair , &c. Son attitude naturelle est d'avoir la tête ramenée entre les deux épaules , & le col couronné. Ces oiseaux sont fort communs en basse Bretagne , ils font leurs nids au sommet des arbres de haute futaie , & leurs nids sont assez souvent plusieurs ensemble , peu éloignés l'un de l'autre : mais c'est une question de savoir s'ils nichent dans les nids des corneilles comme Aldrovande le rapporte d'après Polydore. Les œufs du héron sont d'un verd pâle tirant sur le bleuâtre. Le mâle s'accouple en tenant ses jambes fléchies sur le dos de la femelle , de façon que ses pieds sont à la tête , & ses genoux vers l'anus de la femelle. Il se trouve aussi en Angleterre & en quelques contrées de l'Allemagne des héronnières , comme en France. Selon dit , que de son tems on avoit coutume de faire un commerce considérable des petits du héron. Les Modernes ont inventé une maniere de construire certaines loges élevées en l'air le long de quelques ruisseaux , seulement couvertes à claire voie , & les ont nommées *héronnières* , parce que les herons s'accoutument à dresser leur aire sur ces loges ; les petits qui y sont dénichés sont très estimés , & donnent effectivement un assez bon profit. Les héronneaux sont plus délicats que les grues , & passent pour être une viande royale , aussi la Noblesse Françoisé fait-elle grand cas de ce mets : dans certaines Provinces on en fait d'excellents pâtés qui se servent sur les meilleures tables. Les Etrangers n'en font pas tant de cas. Aristote n'a pas eu tort de dire que l'aigle attaque le héron , & que celui-ci meurt en se défendant. Le héron , dont le vol fait le plaisir des Rois & des Seigneurs , se sentant assailli par le sacre ou par le gersaut ,

tâche de gagner le dessus en volant en haut , & non en fuyant au loin , & il met son bec par dessous son aîle : par cette ruse il se défend assez bien contre les oiseaux de proie , qui se fichent ce bec dans la poitrine en voulant attaquer le héron.

Lès hérons sont solitaires. Comme ils ont les jambes fort longues , leur habitude pendant le jour est de se tenir dans l'eau , où ils font une grande destruction de menus poissons : leur longueur & leur bec leur sont très utiles pour poursuivre & atteindre leur proie bien avant. Cette position leur est aussi avantageuse pour éviter les insultes des oiseaux de proie & des bêtes à quatre pieds. On voit aussi quelquefois le héron dormir sur les arbres. Ses grandes aîles , qui paroîtroient devoir incommoder un animal dont le corps est si petit , lui sont d'un secours infini pour faire de grands mouvements dans l'air , & pour pouvoir emporter de lourds fardeaux dans son nid , qui est quelquefois à une & deux lieues de l'endroit où il pêche.

La graisse du héron est émolliente & résolutive ; elle appaise les douleurs de la goutte , si on l'applique en liniment : on l'estime aussi propre pour éclaircir la vue & ôter la surdité. Quelques Pêcheurs en amorcent leurs filets pour attirer le poisson.

Le PETIT HÉRON CENDRÉ a la plûpart du plumage semblable à celui du vanneau , le reste du dos est cendré ; le menton , le gosier , la poitrine , le ventre & le dedans des cuisses est blanchâtre , les ongles sont noirs , & ceux du milieu dentelés en dehors. Ray dit que ce héron de la seconde espece est le *nycticorax* des Allemands , & qu'il est ainsi nommé , parcequ'il crie la nuit d'un ton discordant , & comme s'il vouloit vomir : voyez CORBEAU DE NUIT.

On voit une troisième espece de *héron cendré* , dont le doigt de derriere est plus grand que les autres : dans les plumes de derriere la tête , il y a un toupet qui est composé de plumes faites comme des poils , tant elles sont menues & délicates : le bas du bec est rougeâtre , le plumage cendré , brunâtre ; les grandes pennes des aîles sont diversifiées de blanc ; celles de la queue sont fort longues ; les plumes scapulaires sont semées de taches longues , noires , rousses & blanches , & les cuisses rousses.

Hérons étrangers.

Le HÉRON BLANC est de la grande espece ; son plumage est entièrement blanc ; sa queue est longue , mais il n'a point de crête , ou au moins elle n'est pas apparente ; ses pieds sont noirâtres , bleus par le milieu ; le petit doigt a deux articles , le second en a trois , celui du milieu quatre , & le dernier cinq. Cette espece de héron , qui se trouve en Bretagne & en Angleterre , fréquente les marais voisins de la mer : on trouve aussi des *hérons blancs* beaucoup plus petits & crêtés : ils ont le bec noir , bleuâtre , & les pieds verdâtres : on en trouve même dont la tête est couleur de safran.

Le HÉRON BLEU est de la grandeur du héron ordinaire ; son bec est d'un beau jaune & un peu crochu à sa pointe : sa huppe est de couleur plombée.

Le HÉRON BRUN est une espèce de *butor brun*.

Le HÉRON CHATAIN est le plus petit de tous les hérons ; presque tout son plumage est châtain safrané ; sa queue est très petite ; ses pieds & ses jambes sont d'un rouge foncé ; la tête & le col sont couverts , en partie , de plumes jaunes.

Le HÉRON CRÊTÉ est l'oiseau connu des Naturalistes sous le nom d'*aigrette* : voyez ce mot.

Celui d'Amboine est une espèce d'*ibis* : voyez ce mot.

Le HÉRON ÉTOILÉ est le *butor* , dont nous donnerons ci-après l'histoire. Albin cite un héron blanc , qu'on trouve dans les marécages de Lincoln en Angleterre.

Le HÉRON HUPPÉ DE L'AMÉRIQUE a quatre pieds & demi de haut : il est de couleur jaunâtre , brune ; ses grandes pennes sont noires.

Le HÉRON A BEC RECOURBÉ a des couleurs fort agréables : ses cuisses sont revêtues de plumes , ce qui est particulier à cette espèce de héron ; au reste , ce héron est , peut-être , une espèce de courlis. Quant au petit héron à cuillier , autrement nommé *poche* ou *pale* , voyez PALETTE.

Il y a plusieurs sortes de hérons , remarquables par leur couleur jaunecendrée ou jaune verdâtre , dont parle le Comte de Marilly , pag. 20. Les Italiens donnent aussi le nom de *squacio* , & celui de *squajotta* , à une espèce de héron de couleurs diversifiées : il a le bec court & robuste , d'un jaune rouillé. Dans les Isles-Antilles , il y a deux sortes de hérons , qui diffèrent fort peu du héron commun , si ce n'est en une chose très particulière , qu'on a remarquée dans ces oiseaux : ils ont tous , dans la substance de la peau du ventre , quatre taches jaunes , larges d'un pouce & longues de deux , & deux autres semblables aux deux cuisses , mais plus épaisses , & amères comme le fiel. Il faut avoir soin de les couper ; cette amertume étant d'une telle force , que si on faisoit bouillir un de ces oiseaux avec d'autre viande , il seroit impossible d'en manger. Les Habitans nomment ces hérons *crabiers* , parcequ'ils se nourrissent de crabes. On les trouve dans les anses & les Isles désertes. Leur chair en daube est un assez bon manger.

Les hérons du Brésil sont le *soco* , le *cocoi* , le *guiratinga* ou le *garza* des Portugais. On trouve aussi des hérons au Brésil & à la Louisiane , dont la chair est bonne à manger.

Description du Butor.

Cet oiseau , que l'on regarde comme une espèce de héron paresseux ou fainéant & poltron , est marqué de taches rouges en forme d'étoiles ; d'où on lui a donné le nom de *héron étoilé* ; on l'appelle aussi BUTOR , *but-*

corius, parcequ'il crie le bec plongé dans la boue, & qu'il imite le mugissement du taureau, se faisant entendre d'une demi-lieue. On distingue deux especes de butors, l'une est rougeâtre, & l'autre est huppée.

La chair du premier sent extrêmement le sauvagin. Dans les endroits où il y a beaucoup de poisson, il reste comme immobile en attendant sa proie : il contracte son col ; & s'il est surpris par quelque Chasseur qui ne connoît pas l'usage qu'il fait faire de son bec pointu, il ne manque pas de le bleffer. Le butor huppé est le plus petit de tous les oiseaux ardés, c'est-à-dire, du genre des hérons. Voici la description du butor ordinaire.

Le butor est un oiseau aquatique, de la grosseur du héron gris : il a environ trois pieds de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des ongles. Sa tête est petite & étroite : le sommet est noir ; la gorge & les côtés du col sont roussâtres, avec des taches noires & régulières ; le col est couvert de grandes plumes ; de sorte que l'oiseau paroît plus court & plus gros qu'il ne l'est en effet. Tout le plumage de cet oiseau est fauve, ou d'un roux tacheté de noir : la queue est très courte & petite ; le bec est droit & fort, pyramidal, très pointu, tranchant des deux côtés, & de couleur verdâtre ; la mâchoire inférieure entre dans la supérieure ; l'iris des yeux est jaunâtre ; l'ouverture de la bouche fort ample : elle s'étend jusqu'au de-là des yeux, de sorte qu'ils paroissent être dans le bec. Les oreilles sont grandes ; les jambes non emplumées au-dessus de l'articulation ; les pieds verts, les doigts allongés, les ongles longs & forts ; le doigt extérieur, qui tient au doigt du milieu, a le côté intérieur dentelé, comme dans tous les autres oiseaux de ce genre. Ils se servent de ces pointes pour retenir les anguilles & les autres poissons glissants.

Le butor fait trois ou cinq ou sept œufs, arrondis, blanchâtres, tiquetés de verd : son nid est fait en terre sur une touffe de jonc. Cet oiseau se cache dans les joncs des marais ; souvent il se tient dans des buissons la tête levée. Il commence à chanter ou meugler en Février, & finit dès que le tems de ses amours est passé. Dans l'automne, après le coucher du soleil, les butors ont coutume de prendre l'essor à une grande distance, & s'élèvent en ligne spirale, jusqu'à ce qu'on les perde de vue. Dans le Royaume de Congo, les butors & les hérons sont gris : on les y appelle *oiseau royal*.

HERON DE MER, nom que l'on donne à l'*espadon* : voyez *ce mot* à l'article BALEINE.

HÊTRE, FAU, FOUTEAU ou FOYARD, en latin *fagus*. C'est un arbre de forêt, des plus grands & des plus beaux. Il paroît qu'il n'y en a qu'une seule espece, quoique quelques-uns en distinguent deux especes ; savoir, le hêtre blanc ou de montagne, & le rouge ou le hêtre de plaine. Ils se fondent sur la différence de la couleur des écorces ; différence sur laquelle on ne peut point s'appuyer, car les arbres varient souvent de couleur, suivant les positions, selon que l'air circule plus ou moins facilement
autour

autour de leurs tiges , ou suivant la nature du terrain qui les produit. L'influence de l'atmosphère est si considérable , que les Marchands d'arbres observent que la couleur des écorces des arbres qu'ils transportent de leurs pépinières de la campagne , dans les jardins de ville , change absolument.

Le hêtre porte deux sortes de fleurs ; des mâles & des femelles : les fleurs mâles sont composées d'étamines , & forment , par leur assemblage , un chaton sphérique : les fleurs femelles qui se trouvent sur la même tige , sont composées d'un calice , dans l'intérieur duquel est un pistil. Ce calice ou embryon se change en un fruit épineux , dur comme du cuir , & relevé de quatre côtes , dans l'intérieur desquels sont contenues quatre semences triangulaires , appelées *faines* ou *fouesnes* , dont la moelle est blanche. Les feuilles de cet arbre sont plus petites que celles du coignassier , d'un beau verd très luisant , minces , douces au toucher , & rangées alternativement sur les branches : elles ont de la fermeté , ce qui est cause qu'elles sont peu attaquées par les insectes. L'arbre en général a une très belle forme , ce qui le rend propre à en faire des avenues ou des salles d'automne : comme il est susceptible de prendre diverses formes sous le croissant , il est aussi propre que les charmes à faire de belles palissades ; son écorce pour l'ordinaire est unie & blanchâtre. Cet arbre , d'une très grande utilité , croît assez volontiers dans toutes sortes de terrains , mais avec plus ou moins de promptitude , selon que le sol lui est plus approprié. En général le hêtre croît plus vite , & devient plus beau dans une terre légère & humide ; il croît même dans le pur sable , pourvu qu'il soit humide. On le voit réussir , dit Ellis , même dans des terres crayonneuses , pierreuses & glaiseuses , pourvu qu'on le plante en haie. Quoique le hêtre fournisse un bois dur , il croît cependant fort vite , même du double plus promptement que le chêne : ce qui est digne de remarque , car on observe en général , qu'il y a un rapport entre la durée de l'acroissement & la dureté des bois. Cet arbre croît lentement dans les vingt premières années ; il croît ensuite une fois plus vite , environ jusqu'à la soixantième année où il commence à dépérir : quoiqu'il grossisse encore alors à l'extérieur pendant quelques années , il commence à pourrir dans l'intérieur.

La nature & la qualité du hêtre varient , ainsi que celles des autres arbres , suivant la nature des différents terrains.

C'est ainsi que , selon les observations insérées dans un Mémoire de la Société d'Agriculture de Berne , tous les arbres qui croissent dans des lieux rudes , secs , & dans un air libre & froid , ont un bois compact , sec , souple & dur ; mais ceux qui croissent dans une terre grasse , humide & basse , & dans un air épais & humide , ont un bois gras , épais & spongieux , qui n'est pas de durée , plus sujet à pourrir & moins estimé des ouvriers.

Lorsqu'on veut former un bois de hêtre , on le peut faire en semant

la *faine* ou *fouesne*, qui est la semence du hêtre, après avoir eu soin auparavant de la faire tremper dans des eaux de fumiers, qui lui communiquent un goût désagréable, & l'empêchent d'être mangée par les mulots. On prépare la terre par des labours; & avec la faine on sème de l'avoine ou de l'orge, qui procure au jeune plant une ombre nécessaire, & récompense le Cultivateur de son travail & de ses peines. On peut établir aussi un bois de hêtre par le moyen de jeunes plantes que l'on trouve facilement dans les forêts; plus le plant est jeune, plus il est facile à transplanter. Comme cet arbre est très beau, & fait un très bel effet dans les avenues, l'Auteur du Mémoire que nous venons de citer, a fait, d'après ses propres expériences, une observation très intéressante, qui est que, lorsqu'on veut les disposer dans des avenues, les pieux que l'on met aux pieds des jeunes arbres, pour les étayer contre la violence des vents, ou pour aider à leur alignement, doivent toujours être plantés du côté du Sud. En cet état, ils rendent, dit-il, aux arbres plus de service qu'on ne pense, attendu que les vents du Nord, même dans les climats froids, ne font point autant de tort aux arbres, nouvellement plantés, que le soleil du Midi en été.

Le bois de hêtre, dont on fait usage pour un si grand nombre de choses utiles, comme nous aurons lieu de le voir, pourroit être même substitué au chêne, dans les pays où celui-ci manque, si on pouvoit trouver un moyen de le préserver des vers. La consommation & la disette du chêne, dit l'Auteur du Mémoire, a fourni aux Anglois la première idée d'y substituer un autre bois. Le hêtre, qui est généralement un bel arbre, & dont le bois est dur, attira l'attention de quelques-uns de leurs Physiciens pratiques: ils tâchèrent de découvrir l'origine du ver, auquel le bois de hêtre est plus sujet qu'aucun autre, & un moyen pour l'en garantir. Leurs recherches ne furent point inutiles. Ellis, dans sa préparation des bois de charpente, indique les moyens propres à garantir ce bois des vers: il a observé que les bois étoient d'autant plutôt attaqués par les vers, qu'ils contenoient plus de sève: il a donc cherché les moyens de faire sortir la sève du bois; & il y a réussi, en faisant tremper le bois de hêtre dans l'eau. On garantit aussi ce bois des vers, en l'exposant à la fumée, & en le brûlant jusqu'à ce qu'il s'y forme une légère croûte noire. En réunissant ces méthodes, pour la préparation de ce bois, il peut devenir propre alors pour la charpente & dans l'air & dans l'eau; honneur, comme le dit Ellis, qui lui a été en effet décerné juridiquement en Angleterre.

On fait usage en Angleterre de ce bois ainsi préparé, dans la construction des vaisseaux pour les bordages & les ponts pour lesquels il faut un bois droit & uni. Lorsque le bois de hêtre est bien privé de sa sève, il est fendu & cassant; mais tant qu'il en conserve un peu, il est pliant & fait ressort; aussi est-il d'un excellent usage pour les brancards des chaises de poste, & pour les rames des bâtimens de mer. Il y a peu de bois, d'un

service aussi étendu dans l'œconomie : on en fait des jantes de roues & des affuts de canon. Comme il se travaille très bien , les Menuisiers en meubles en font beaucoup d'usage , ainsi que les Ebénistes. Il seroit sans doute très avantageux que nos ouvriers employassent la méthode Angloise , pour garantir les meubles de la piquure des vers. On observe tous les jours que les pelles , sabots , attelles de colier , & autres ouvrages qu'on en fait & que l'on a exposés à la fumée , qui donne à ce bois une couleur assez agréable , ne sont point si-tôt attaqués par les vers. Les Laitiers font une grande consommation de planches minces de hêtre , ainsi que les Gainiers & les Fourbisseurs. Le Tourneur en fait beaucoup d'ouvrages : on fait avec ce bois des copeaux pour éclaircir le vin.

M. Duhamel dit que c'est encore avec ce bois qu'on fait les manches de couteau , que l'on appelle *jambette*. Quand le manche est dégrossi , on le met sous une presse dans un moule de fer poli , qu'on a fait chauffer , & que l'on a frotté d'huile. Ce bois entre dans une espece de fusion ou d'amollissement. Une portion du bois s'étend entre les deux plaques de fer qui forment le moule , comme si c'étoit une espece de métal ; & le manche sort du moule bien formé , très poli , après y avoir acquis beaucoup de dureté , & y avoir pris une couleur assez agréable. En cet état , il n'est plus possible , dit-il , de reconnoître le grain du bois de hêtre.

La faveur des semences de hêtre , est presque aussi agréable que celle des noisettes. Quoique très bonnes aux animaux , & particulièrement aux pourceaux & aux pigeons , on dit , qu'étant mangées vertes , elles causent aux hommes une espece d'ivresse. L'huile qu'on retire des semences du hêtre , est très douce , & a beaucoup de rapport avec celle de noisette. M. Isnard , dans les Mémoires de l'Académie , prétend que l'huile de faine , nouvellement exprimée , cause des pesanteurs d'estomac ; mais qu'elle perd cette mauvaise qualité , en la conservant un an dans des cruches de grès , bien bouchées , que l'on enterre. Les Parfumeurs s'en servent quelquefois : on en fait aussi de l'huile à brûler.

HIBOU ou CHAT-HUANT , oiseau nocturne , dont il y a plusieurs especes ou variétés , que la plupart de nos Lexicographes ont confondues ou embrouillées sous les noms de *chouette* , de *duc* , de *fresaie* , de *chevéche* , de *hulotte* , de *hibou* & de *chat-huant*. Le mot *Strix* , comme le dit M. Linnæus , doit être le nom générique de tous les oiseaux nocturnes ; & celui de *noctua* , avec une épithete , distingue les différences , ainsi que le mot *accipiter* est le nom de tous les oiseaux de proie en général. Le mot *asio* convient au *hibou* à oreilles d'âne ; celui de *bubo* à tous les *ducs* , avec une épithete pour en distinguer la grandeur & la variété ; celui de *noctua aurata* à la *chouette* à oreilles ; celui d'*aluco* à la *chouette* ; celui d'*ulula* à la *chevéche* ou *hulotte* ou *hnette* ; celui de *noctua templorum alba* à la *fresaie*

ou *effraie* ; cette remarque n'est pas hors de propos pour ce que nous avons dit à chacun de ces mots.

On donne en François le nom de *hibou* à différens oiseaux nocturnes du rang des oiseaux de proie. Une singularité , dans ces animaux , est qu'ils clignent des yeux en faisant descendre la paupière de dessus sur celle d'en bas comme font tous les oiseaux de rapine. Nous répétons ici que le *hibou* & la *chevéche* n'ont point de cornes ou bouquets de plumes aux oreilles ; mais ils ont comme une couronne de plumes qui leur entoure le devant de la tête , & le dessous de la gorge en forme de collier. Les yeux du hibou sont noirs ; le ventre est blanc : les pieds velus ; le dos plombé & moucheté ; ses aîles sont si grandes qu'elles excèdent la longueur de la queue. Cet oiseau est fort maigre , il fait beaucoup de mines de têtes ; il vole de travers & sans faire de bruit , & crie la nuit en huant , ou d'une manière lugubre : il fait sa nourriture de souris , & en vomit toujours les poils & les os. Quand le hibou est attaqué , il se met à la renverse & se défend avec les ongles & les griffes , comme font les autres oiseaux de nuit. Cet oiseau se retire dans le creux des arbres & dans les maisons abandonnées.

Dans la baie d'Hudson se trouvent le *hibou couronné* & le *hibou blanc*. M. Anderson dit qu'on voit en Irlande des *hibous à cornes* & des *hibous de rochers* ; si on leur lâche un pigeon , un d'entr'eux se jette aussitôt d'en haut sur lui , & après lui avoir arraché quelques plumes , il lui mange d'abord le cœur à travers le dos , ensuite les entrailles , & en dernier lieu la chair. A la Martinique on voit une espèce fort singulière de hibou : cet oiseau que les habitans nomment *cohé* fait un cri semblable à son nom.

HIPOCISTE , plante parasite , qui croît sur le ciste , & de laquelle on retire le suc d'hipociste. Voyez CISTE.

HIPPELAPHE ou CHEVAL-CERF : voyez à la suite du mot CERF.

HIPPOCAMPE ou CHEVAL MARIN , *hyppocampus* , est une espèce de petit poisson marin qui ne vaut rien à manger. On le trouve dans les Ports de mer & dans tous les cabinets des Naturalistes : il est long de six pouces , & gros comme le doigt : il a la tête & le col à-peu-près faits comme ceux d'un cheval ; un bec long & creux comme un flageolet ; deux yeux ronds , & deux arrêtes sur les cils qui paroissent comme des cheveux quand il est en mer ; son front est sans poils ; le devant de sa tête & le dessus de son col sont couverts d'espèces de filets qui lui servent comme de *tentacula* ; les femelles n'en ont point , elles n'ont que le devant de la tête velu. Quand le cheval marin est mort , tous ses filets tombent. Il porte une nageoire sur le dos ; son ventre est blanchâtre , gros & enflé , la femelle est encore plus ventrue : la queue de ces animaux est quarrée & quelquefois recourbée comme un crochet ; tout leur corps est couvert de petits cercles cartilagineux & pointus , d'où sortent de petits aiguil-

lons ; les cercles sont attachés l'un à l'autre par une peau déliée qui est de couleur brune avec quelques taches blanches. A mesure que cet insecte se dessèche on lui fait prendre ordinairement la figure d'une S romaine.

On trouve des hippocampes plus grands que le précédent , & à criniere. Il y en a qui n'ont point d'aiguillons & peu d'anneaux ; d'autres enfin qui n'ont point d'aiguillons , mais beaucoup de cercles ou d'anneaux : on en compte à leur queue jusqu'à trente-cinq.

La plupart des Auteurs disent qu'il sort du ventre de cette sorte de poisson un venin , dont le remede est d'avalier du vinaigre dans lequel on aura fait mourir une seche , poisson qui se dérobe aux yeux des Pêcheurs en jettant une liqueur noire comme de l'encre : *Voyez* au mot SECHE. On prétend que l'hippocampe est bon contre la morsure des chiens enragés.

HIPPOLITHE, *hippolithus*. Nom qu'on donne à la pierre ou bezoard de cheval , laquelle se trouve dans la vésicule du fiel , ou dans les intestins ou dans la vessie de cet animal. Elle est ordinairement grosse comme le poing , grisâtre , composée de couches circulaires. *Voyez* au mot BEZOARD ou CALCUL.

Il s'engendre aussi quelquefois des pierres dans les mâchoires & dans d'autres parties des chevaux. Lémery dit qu'il y a même lieu de penser que la plupart des maladies qui arrivent aux chevaux , & auxquelles les Maquignons ni les Maréchaux ne connoissent rien , viennent de ces pierres , qui ayant été engendrées & formées dans quelques-uns des viscères de l'animal , y font des obstructions naturelles.

On prétend que l'hippolithe est sudorifique , qu'elle résiste au venin , tue les vers , & qu'elle arrête le cours de ventre.

HIPPOMANE, *hippomans*. C'est un corps que les Anciens disoient être de la grosseur d'une figue sauvage , de couleur noire , & adherent à la tête du poulain nouvellement né. L'opinion commune étoit que si la jument ne devoit pas elle-même l'hippomane elle abandonnoit le poulain. On regardoit aussi ce corps comme la matiere principale d'un philtre extrêmement puissant. Cette opinion étoit si accréditée du tems de Juvenal , qu'il n'a pas hésité d'attribuer une grande partie des désordres de Caligula à une potion que sa femme lui avoit donnée à prendre & où elle avoit fait entrer un hippomane entier. Des observations solides & dénuées de préjugés , ont fait connoître la fausseté de ces divers sentimens avancés par les Anciens.

On doit distinguer deux sortes d'hippomane. Le premier est une liqueur qui sort des parties naturelles de la jument pendant qu'elle est en chaleur ; le second est une matiere qui a diverses formes , qui est composée de petites lames dans toute son étendue , & qui n'a point l'air d'être un corps organisé , mais simplement un suc épais , ainsi que s'en est assuré M. Daubenton. Cette matiere est le sédiment d'une liqueur , qui se

trouve dans une cavité qui est entre l'amnios & l'allantoïde : ainsi ce corps n'est point placé sur le front du poulain , & la jument ne nourrit pas moins son petit , quoiqu'on ait enlevé l'hippomane.

Quant à l'effet de ce philtre redoutable , on est en droit de douter de sa possibilité. Voyez *l'Histoire de l'Académie de Sciences* , année 1751.

On voit , dans le Cabinet du Jardin du Roi , des hippomanes de différentes grandeurs , conservés dans l'esprit-de-vin. On donne le nom d'*hippomanès végétal* à la semence de la *pomme épineuse*. Voyez ce mot.

HIPPOPHAES , est un arbrisseau qui croît dans la Morée , aux lieux sablonneux de la mer : il est garni d'épines fort dures , & de feuilles qui ressemblent à celles de l'olivier , mais sont plus longues , plus étroites & plus tendres. Ses sommets se répandent en rond , en forme de chevelure blanche. Sa racine est grosse , longue , & remplie d'un suc laiteux très amer & d'une odeur forte : ses fleurs sont en grappes.

Le suc de l'hippophaes est purgatif : les foulons du pays se servent de cet arbrisseau.

HIPPOPOTAME ou **CHEVAL DE RIVIERE** , *hippopotamus* , est un animal amphibie qui habite plus dans l'eau que sur terre , qui tient extérieurement du cheval & du bœuf , mais dont le caractère principal est d'avoir quatre doigts onglés à chaque pied ; & à chaque mâchoire , quatre dents incisives , dont les supérieures sont séparées par paires , & les inférieures paroissent en avant parallèlement à la mâchoire ; les deux du milieu sont beaucoup plus longues que celles du côté. M. Briffon dit que l'hippopotame a en tout quarante-quatre dents ; savoir , huit incisives , quatre canines & trente-deux molaires ; ces dernières dents sont comme de l'ivoire ; leur figure est carrée , elles ressemblent assez aux dents machelières de l'homme ; les canines sont fort dures , longues & arquées. Cet animal a depuis la tête jusqu'à la queue treize pieds de long ; le diamètre horizontal de son corps a quatre pieds & demi : sa tête a deux pieds & demi de large , & trois pieds de long ; l'ouverture de sa bouche un pied ; ses jambes ont trois pieds & demi de long , depuis le ventre jusqu'à terre , & trois pieds de tour. Ses pieds sont très gros , fendus en trois , formant quatre doigts , environnés par-tout d'un ongle & d'une forme de talon , qui fait comme une cinquième division. Son museau est gros & charnu : il a les yeux petits , les oreilles minces & longues de trois pouces. Sa queue , qui a un pied de long , est grosse à son origine , & se termine tout-à-coup en pointe : sa peau est très épaisse , dure , & d'une couleur obscure : il n'a que peu ou point de poil ; excepté au bout de la queue & au museau , où il a une moustache semblable à celle des lions & des chats.

On voit , dans le Cabinet de Leyde , un hippopotame qui nous a paru assez conforme à cette description. On voit aussi une tête de cet animal , dont la peau est tannée , au cabinet des Augustins de la Place des Victoi-

res à Paris. Cet amphibie se trouve dans le Nil (*equus niloticus*), dans le Niger, dans la rivière de Gambie, & généralement dans toutes les rivières des côtes de l'Afrique : il marche au fond des eaux comme en plein air, il vient respirer souvent sur l'eau & y hennir : il dort dans les roseaux, & sur le bord des rivières : il n'est pas rare d'en rencontrer qui pèsent jusqu'à quinze cents livres. Leurs dents sont d'une dureté extrême ; leur cri est une sorte de hennissement ; leur vue est perçante & terrible. Les pieds & les dents de cet animal sont les seules armes dont la Nature l'a pourvu : sa course n'est pas assez vite pour attraper un homme aussi léger, que le sont les Negres : c'est ce qui les rend assez hardis pour l'aller attaquer à terre. On a soin de lui barrer le chemin qui tend aux rivières ; car souvent il cherche moins à se défendre qu'à regagner le séjour des eaux : mais lorsqu'il est dans l'eau, il propose volontiers sa revanche ; car il nage assez vite, & tâche de se placer de manière à exercer toute sa force. Il entre peu dans la mer ; il préfère l'eau douce, sur-tout celle qui coule dans des prairies & dans des terres cultivées.

Il paroît que le requin & le crocodile redoutent l'hippopotame, car on ne les a point encore vus mesurer leurs forces avec lui. La peau du cheval de rivière est extraordinairement dure sur le dos, ainsi que sur la croupe & le dehors des cuisses : les balles de mousquet ne font que glisser dessus, & les flèches y rebroussent ; mais elle est moins dure & moins épaisse sous le ventre & entre les cuisses : c'est aussi dans ces endroits-là, que ceux qui ont des armes à feu, des fleches & des sagayes, tâchent de le frapper. Cet animal a la vie dure, & ne se rend pas aisément. Les Européens, qui vont à cette chasse, tâchent de lui casser les jambes avec des balles ramées ; & quand il est une fois à terre, ils en font, en quelque sorte, les maîtres. Les Negres, qui attaquent, le couteau à la main, les crocodiles & les requins, n'osent pas se jouer ainsi aux chevaux de rivière. Si cet animal a été blessé dans l'eau avec une lance, il jette aussi-tôt des regards menaçans ; il s'élance avec furie sur le bâtiment où il voit ses ennemis, & en enlève quelquefois avec ses dents des morceaux de bois assez considérables ; quelquefois y fait un sabord d'un coup de pied : si c'est une chaloupe, il la fait virer, quelque grande qu'elle soit. Nous avons dit ci-dessus que l'hippopotame dort dans les roseaux & halliers sur le bord des rivières ; comme il ronfle très fort, c'est par-là qu'il se trahit & qu'il avertit ceux qui le cherchent, du lieu où il repose : dans cette situation, il est aisé à surprendre & à tuer ; mais il faut y aller sans bruit, car son ouïe est très fine. Les Pêcheurs redoutent cet animal qui ne ménage pas leurs filets, ni leur poisson, ainsi que les autres animaux qu'il peut surprendre : les Negres disent qu'il est plus ennemi des blancs que des Noirs.

Les femelles de cheval de rivière font leurs petits à terre : elles leur y donnent à téter, & les y élèvent : elles apprennent à ces nouveaux nés à se jeter à l'eau au moindre bruit.

Les Negres d'Angola , de Congo , de la Mina , & des côtes orientales d'Afrique , regardent le cheval de riviere comme un diminutif de quelque espece de Divinité : ils l'appellent *fétiso*. Ils le mangent pourtant , quand ils peuvent en attrapper.

Au rapport du P. Labat , cet animal , qui est fort sanguin , se phlébotomise d'une maniere singuliere : pour cette opération , il cherche un coin de rocher aigu & tranchant , & s'y frotte vivement , jusqu'à ce qu'il se soit fait une ouverture suffisante pour laisser couler son sang : il s'agit même quand il ne sort pas à son gré ; & quand il juge qu'il en a tiré suffisamment , il va se coucher dans la vase , & ferme ainsi la plaie qu'il s'est faite. Si le fait est vrai , cette espece de Chirurgien amphibie feroit présumer que l'art de la saignée est de toute antiquité , & qu'elle est dans l'ordre de la nature.

On se sert de la peau du cheval de riviere pour faire des boucliers & des rondaches : lorsqu'elle est sèche & bien étendue , elle est à l'épreuve des flèches , des sagayes & des balles. Les Portugais emploient cette peau aux mêmes usages que celle des bœufs , & elle est infiniment meilleure quand elle est bien apprêtée : on dit que les Peintres Indiens emploient le sang de cet animal parmi les couleurs. Les grosses dents ou défenses sont fort recherchées par les Opérateurs qui se mêlent d'arracher les dents & d'en remettre d'artificielles : ils ont éprouvé que la couleur de celles-ci ne jaunit point comme l'ivoire ; qu'elles sont beaucoup plus dures , & par conséquent d'un meilleur usé : on en fait aussi de petites plaques minces , que l'on perce en deux endroits , afin d'y passer un ruban ; c'est une amulette que bien des personnes portent contre la crampe , la goutte sciatique & les hémorrhagies ; mais qui certainement ne leur est pas d'un grand secours.

La chair de l'hippopotame est très estimée au Cap de Bonne Espérance ; on l'y vend douze à quinze sols la livre : soit rôtie , soit bouillie , c'est un manger délicieux pour les habitants , même pour les Negres & les Portugais de toutes les rivières , depuis le Niger jusqu'au Nil. Cette chair est pour l'ordinaire très grasse & très tendre ; elle a un petit goût & une odeur qui tiennent du sauvageon. La graisse de cet animal se vend autant que sa chair. Quoique l'hippopotame soit un amphibie , les Portugais n'ont pas laissé que de le déclarer poisson , apparemment afin d'en pouvoir manger en tout tems.

Le cheval de riviere , comme nous l'avons dit , se nourrit de chair & de poisson ; mais dans l'occasion il va aussi paître l'herbe des campagnes : il aime sur-tout le riz , le millet , les pois , les melons , & autres légumes qu'on cultive en ce pays-là , & dont il est grand mangeur. Les Negres , qui sont contraints de faire leurs lougans (habitations) aux environs des rivières ; afin de jouir de la fraîcheur & de la graisse de la terre , qui se trouvent , disent-ils , communément en ces endroits , sont obligés de

garder leurs champs jour & nuit , & d'y faire bien du bruit & du feu , afin d'en éloigner les chevaux de riviere & les éléphants.

HIPPRO. *Voyez* au mot PEUPLIER.

HIPPURIS. *Voyez* à la suite du mot CONSERVA.

HIPPURITE, *Hippurites corallinus*. Est une pierre composée de cônes turbinés, comme empilés les uns dans les autres : les jointures des articulations croissent & décroissent, comme on le voit au *sparanium*. L'hippurite n'est communément qu'une espece de coralloïde fossile, tubulée & articulée, quelquefois rayée ou étoilée. Pour l'intelligence de cet article, lisez les mots CORAIL, CORALLINES (où l'on trouvera celui de *Litophyte*), & MADREPORE.

HIRONDELLE, *Hirundo*. Nous connoissons en Europe cinq especes d'hirondelles; savoir, 1^o. l'*hirondelle de cheminée*, qui a le ventre blanc & le dos noir; 2^o. la *grande hirondelle*, qu'on nomme vulgairement *grand martinet*; 3^o. l'*hirondelle de fenêtre* ou à *cul blanc*, que quelques-uns appellent *petit martinet*; 4^o. l'*hirondelle de riviere* ou de *rivage*; 5^o. le *tette-chevre*, dit en Sologne *chauche branche*, plus connu sous le nom de *crapaud volant*, &c. Les marques caractéristiques de ces oiseaux, sont d'avoir la tête grande, le bec court, avec une ouverture grande & propre à avaler les mouches & autres insectes qu'elles prennent en volant. Ils ont les pieds courts & petits, car ils ne marchent pas beaucoup; leur queue est longue & fourchue. Nous allons donner une histoire plus détaillée de l'hirondelle vulgaire, afin que le lecteur ait une idée suffisante de la configuration de cette espece d'oiseau : nous finirons cet article par la citation de quelques especes étrangères, & enfin par un exposé des particularités que les Naturalistes en ont remarquées.

L'HIRONDELLE DOMESTIQUE, OU DE VILLE, OU DE CHEMINÉE, *hirundo vulgaris*, pese à peine une once : elle a fix à sept pouces de long, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue; & près d'un pied d'envergure : elle est d'une grosseur mitoyenne entre le petit & le grand martinet. Son bec est court, noir, fort large près de la tête, pointu par le bout; l'ouverture en est très ample : sa langue est fendue en deux; ses yeux, un peu grands, sont fournis de membranes clignotantes : l'iris est de couleur de noisette; ses pieds sont courts & noirâtres; son plumage est d'une fort belle couleur bleue foncée rougeâtre : elle a une tache sanguine, obscure au menton; sa poitrine & son ventre sont blanchâtres, avec quelque rougeur; & sa queue est fourchue.

Cet oiseau a un gasouillement assez agréable, & qui approche du chant : c'est principalement de grand matin, dans les longs jours, qu'il chante; mais il ennuie bientôt par sa monotonie : on ne peut le tenir en cage ni en voliere. On lui trouve souvent dans le ventricule plusieurs petites pierres transparentes, inégales, rougeâtres, grosses comme une lentille; on prétend qu'elles servent, ou pour aider la trituration de ses aliments, ou pour nettoyer son estomac : on s'en sert pour mettre dans les yeux lorsqu'on

veur en faire sortir quelque ordure qui y est entrée. Cette espece d'hirondelle fait son nid dans les cheminées; ce nid est couvert en forme de panier. Sa couvée est de cinq à six œufs tout blancs. Willugby dit que sur la fin de Septembre, il a vu une grande quantité de ces oiseaux, quoique maigres, au marché de Valence en Espagne. Il n'y a point d'oiseau qui vole avec tant d'agilité que l'hirondelle; son vol est aussi tortueux que rapide: elle a de fortes ailes; aussi se fiant à son vol, elle entre familièrement dans les maisons, & fait hardiment, comme nous venons de le dire, son nid, ou au plancher ou aux cheminées, & dans les endroits où les chats, les rats & autres oiseaux de rapine ne sauroient aller; elle le bâtit de chaume, de foin & de paille, en prenant toujours une bécquetée de boue avec chaque brin de chaume, afin de mieux mastiquer le tout ensemble: elle lie son ouvrage comme un Mâçon. Quand le nid est bien uni en dedans, elle y apporte des plumes & toutes sortes de matieres molles. Elle mange en volant, & on ne la voit point descendre sur terre pour prendre sa nourriture: elle a les pieds trop courts & trop foibles pour pouvoir marcher; aussi marche-t-elle assez mal, & fort rarement.

On prétend que les hirondelles font deux couvées par an; & lorsque la premiere s'envole, elle cherche dans le voisinage une mare ou un étang où il y ait beaucoup de roseaux, pour passer les nuits en sûreté contre la pluie & les oiseaux de proie. Rien d'aussi singulier que de voir l'agitation, & d'entendre les cris du pere & de la mere de ces oiseaux, pour appeller les autres hirondelles, lorsqu'on touche à leur nid ou à leurs petits. Ce sont de toutes les hirondelles celles qui s'en vont le plus tard. Lorsqu'il s'agit de leur migration, elles s'assemblent auparavant à un étang, ou dans les vignes sur les échelas, & partent le matin en silence dans de beaux jours. On a remarqué que quand ces oiseaux volent bas, rasant la terre & l'eau, c'est un signe de pluie: elles volent ainsi, soit pour faire la chasse aux mouches & aux autres insectes dont elles se nourrissent, soit pour éviter le vent.

Le retour de l'hirondelle domestique nous annonce le printemps. Comme elle part quinze jours plutôt que les autres especes, elle arrive aussi quinze jours avant; en un mot, elle change ainsi de climat pour y trouver sa nourriture ordinaire, qui ne se rencontre que depuis le printemps jusqu'à l'automne. Cependant M. de Réaumur a fait voir que ces voyageuses n'étoient pas toujours instruites de l'état actuel de notre climat. Effectivement, en 1740, il en coûta la vie à celles qui n'avoient pas prévu que le froid retarde la transformation des insectes qui sont leur nourriture, comme la chaleur l'avance; aussi les voyoit-on tomber aux pieds des passants dans les rues, dans les cours & dans les jardins: les environs de Paris étoient, en certains endroits, jonchés de ces oiseaux morts ou mourants. Les rossignols, qui ne prennent pas seulement dans l'air leur nourriture, comme les hirondelles, mais qui la savent trouver sur la surface de la terre; n'éprouverent point le même sort, quoiqu'arrivés de bonne heure.

L'HIRONDELLE RUSTIQUE OU DE CAMPAGNE, OU HIRONDELLE DE FENÊTRE OU A CUL BLANC, OU PETIT MARTINET, *hirundo agrestis*, fait son nid aux fenêtres, aux portes & aux voutes des Eglises. Ce nid est artificieusement construit; il est composé de boue & de paille, & fait en forme de mortier. C'est la seule hirondelle qui fasse son nid de figure sphérique en n'y laissant qu'une petite entrée. Cette hirondelle a le dessus de la tête, du col & du dos, comme la précédente, mais elle n'a point de rougeur, excepté au haut du gosier & aux narines qui en font quelquefois tachetées : elle est blanche par dessous jusqu'aux doigts de ses pieds : ses jambes sont couvertes de plumes blanches, ainsi que son croupion.

La GRANDE HIRONDELLE OU GRAND MARTINET, qu'on nomme encore HIRONDELLE DE MURAILLE OU DE CAVERNE, OU DE ROCHER, OU MOUTARDIER, *hirundo apus*, est la plus grande de toutes les especes d'hirondelles. Elle est presque de la grosseur de l'étourneau : le dessus de sa tête est large, le col court, l'ouverture du gosier si ample qu'elle avale du premier coup des hannetons & des papillons; elle a des especes de paupieres : son bec est petit, noir & aigu; ses aîles sont longues, sa queue est fourchue, ses jambes sont couvertes de plumes jusqu'au dessus des doigts, qui sont armés d'ongles aigus, & qui serrent très fort : les jambes & pieds ne servent à cette espece d'hirondelle que pour ramper; elle fait sa demeure & son nid sous les ponts, dans les fentes des arches, sous les toits des tours, des vieilles murailles, & dans les bâtimens les plus élevés. Sa vue est des plus fines; elle apperçoit de très loin une mouche, qu'elle poursuit aussi-tôt avec vivacité : on l'entend crier de loin en volant. Sa couleur est par-tout grisâtre, obscure, excepté à la gorge où est une tache blanche. En volant, sa queue forme une grande fourche, & ses aîles un arc tendu; son vol paroît planer & est d'une vitesse extrême; on la voit une des premières en France, & elle en sort la dernière. Cette espece d'hirondelle est un peu sujette à varier.

L'HIRONDELLE DE RIVIERE OU DE RIVAGE, *hirundo riparia*, differe du *martinet* ordinaire, en ce qu'elle n'a point de blanc sur le croupion, ni de plumes sur les pieds, ni la queue si fourchue que les autres hirondelles; mais elle a un collier blanc. Elle ne fait aucun nid, elle cave le bord des rivières & les montagnes argilleuses; son trou étant fait, elle y porte des plumes & d'autres matieres propres pour y faire éclore ses petits & les y élever.

L'HIRONDELLE TÊTE-CHEVRE OU CRAPAUD VOLANT, est fort commune en Suede. Bien des Naturalistes la confondent avec les hiboux, parcequ'elle ne sort que la nuit. Voyez TÊTE-CHEVRE.

La chair des hirondelles passe pour être un spécifique contre l'épilepsie, l'esquinancie & les autres maladies de la gorge, même pour fortifier la vue. On tient dans les boutiques une eau d'hirondelles composée, qui est très recommandée dans tous ces cas. La fiente de cet oiseau est extrêmement chaude, âcre, résolutive & apéritive. Le nid d'hirondelle est en-

côre regardé par quelques-uns , comme un antidote contre l'esquinancie & l'inflammation des amygdales ; on en fait un cataplasme , qu'on applique extérieurement contre la partie malade.

Hirondelles étrangères.

L'*hirondelle du Bresil*, qui est appelée des habitants *tapera*, & des Portugais *andorinha*, ressemble beaucoup à notre hirondelle de muraille qui fait peu d'usage de ses pieds : elle a le bec grand , & le peut ouvrir en apparence jusqu'aux yeux.

L'*hirondelle de la Caroline* repaire aussi dans le Bresil & à la Virginie , & dans les mêmes faisons que les hirondelles d'Europe arrivent en Angleterre.

L'*hirondelle de l'Amérique* a le haut du gosier d'un brun blanc , & la queue est divisée en six. On en trouve encore une espèce dans l'Amérique , qui est de couleur de pourpre , & qui fait ses petits comme les pigeons , dans des trous qu'on fait exprès pour eux autour des maisons , & dans des callebasses qu'on attache à de grandes perches. Les hirondelles , à la Martinique & dans l'Isle de Cayenne , font leurs nids dans les creux des arbres.

Les *hirondelles du Cap de Bonne-Espérance* font de plusieurs espèces. Il y en a de bigarrées , qui fréquentent les maisons ; de noires , qui chassent les précédentes de leurs nids ; de grises , qui ont les pieds couverts de longues plumes.

Sur la côte de Malaguettes , les hirondelles sont fort petites , ainsi que celles de la côte d'Or.

L'*hirondelle de la Chine* est une espèce d'*alcyon* , dont on mange les œufs. Voyez *ALCYON*.

L'*hirondelle du détroit de Gibraltar* est de couleur fauve , & elle a le col blanc : c'est une espèce d'*hirondelle de muraille*.

Observations sur la migration des hirondelles.

Les hirondelles restent-elles cachées pendant l'hiver dans les lieux où elles ont pris naissance , jusqu'à ce que le beau tems les fasse reparoître ? ou vont-elles passer l'hiver dans les pays chauds ? où se retirent-elles ? enfin sont-elles passagères ? C'est une question qui a été agitée par les Anciens & par les Modernes : les uns disent qu'elles se cachent dans les trous de murailles & des arbres ; d'autres , qu'elles vont chercher le fond des roseaux ou des étangs , où elles restent comme sans mouvement & sans vie ; d'autres , qu'elles passent à l'entrée de l'hiver dans les pays chauds. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'elles disparaissent à l'arrivée des canards sauvages , qui sont également des oiseaux passagers , & qui viennent hiverner chez nous. Mais si c'est le froid qui les chasse de nos climats , il faut donc

dire, avec Belon, qu'elles vont en hiver chercher un pays chaud. D'un autre côté, il n'est pas moins certain qu'on en trouve d'engourdies pendant l'hiver, dans les carrieres, les trous des murailles & des arbres. La contrariété des opinions oblige de suspendre son jugement; d'autant plus que les observations qu'on a faites à ce sujet, paroissent demander à être vérifiées. Il y a des faits rapportés à cet égard par trop d'Observateurs, pour qu'on doive les croire:

HIRONDELLE. Les Conchyologues donnent ce nom à une coquille bivalve du genre des huitres. Elle est faite comme la mouchette, dont on se sert pour retirer le lumignon d'une bougie: étant ouverte, elle ressemble à un oiseau qui vole. Elle est nacrée en dedans; & quand sa partie supérieure est découverte, rien n'est au dessus de sa couleur aurore. M. Adanson met ce coquillage bivalve dans le genre du *jambonneau*. Voyez ce mot.

HIRONDELLE DE MER, *hirundo marina*, est un oiseau d'un genre différent de celui dont nous avons parlé plus haut. On en distingue deux especes; la *grande* & la *petite*. Celle-ci pèse environ cinq onces: elle a le corps menu, longuet & la queue fourchue. Son plumage est d'un cendré obscur; le dessous du ventre blanchâtre, le bord des ailes noirâtre; le bec est long, droit & de couleur rouge; les pieds sont de cette même couleur: on en voit beaucoup à Caldey, Isle de la Province Méridionale de Galles.

Albin dit que le mâle de la grande espece d'hirondelle de mer a dix pouces de longueur, & deux pieds d'envergure; le bec, la tête, le col & la poitrine sont noirs; les plumes du dos, des ailes & de la queue sont de couleur de frêne, celles du ventre & des cuisses sont d'un blanc sale; les jambes & les pieds sont rouges, dégarnis de plumes au-dessus des genoux, & les griffes sont noires; la femelle est un peu plus petite. Cet oiseau vole vite & se soutient toujours en l'air: s'il voit un poisson, il se plonge dans l'eau, & s'envole dès qu'il a attrappé sa proie. On prétend qu'il se repose sur la superficie des eaux. Ils volent en troupe en pleine mer, environ à cinquante lieues proche l'extrémité d'un promontoire de la partie Occidentale d'Angleterre, où ils s'assemblent d'abord; ensuite ils vont chercher les Isles de Madere, sur la mer Atlantique: ils vont dans les Isles désertes, nommées *Salvages*, faire leurs petits, & y multiplier en grand nombre.

HIRONDELLE DE MER ou **RONDOLE**, *Piscis hirundo marina*. Poisson fort curieux, & du genre de ceux qui ont les nageoires épineuses. On lui a donné le nom d'*hirondelle*, parcequ'il ressemble à l'oiseau qui porte ce nom: sa tête est osseuse, dure, quarrée & âpre; le derriere finit en deux aiguillons qui ont leur pointé vers la queue: les couvercles des ouies sont osseux & finissent également en deux aiguillons. A chaque coin de la bouche, il a deux petites boulettes perlées; ses yeux sont grands, ronds & rougeâtres; le dos est tout couvert d'écailles âpres & très dures. Ce poisson est rond & blanc sous le ventre; son dos est quarré, entre noir

& rouge ; les nageoires des ouies sont si longues , qu'elles touchent presque à la queue ; elles sont semées de petites étoiles ou taches de diverses couleurs , comme les aîles des papillons ; il s'en sert pour voler : il a encore au dos deux autres aîles semblables aux précédentes ; sa queue est faite comme celle des hirondelles : l'intérieur de sa bouche est rouge & luisant.

Ce poisson vole hors de l'eau pour n'être pas la proie de plus grands poissons. Ses nageoires , qui sont longues & larges , font du bruit en volant : sa chair est dure & sèche ; elle nourrit beaucoup , mais elle est de difficile digestion : ses œufs sont rouges. *Voyez* MUGE VOLANT & POISSON VOLANT.

HIRONDELLE DE TERNATE. *Voyez* OISEAU DE PARADIS.

HISOPE. *Voyez* HYSOPE.

HISTOIRE NATURELLE. Tout le monde sait que ce mot exprime la connoissance & la description des êtres qui composent l'Univers entier. L'histoire des cieus , de l'atmosphère , de la terre , de tous les phénomènes qui se passent dans le monde , & celle de l'homme même , appartiennent au domaine de l'histoire naturelle : mais un tel champ est trop vaste ; contentons-nous d'étudier ce que renferment les cabinets d'histoire naturelle ; car , on le fait , la science de l'histoire de la nature n'a fait des progrès qu'à proportion que les cabinets se sont complétés ; je dis plus , ce n'a guère été que dans ce siècle que l'on s'est appliqué à l'étude de la nature avec assez d'ardeur & de succès pour marcher à grands pas dans cette carrière. C'est aussi à notre siècle que l'on rapportera le commencement des établissemens les plus dignes du nom de *Cabinet d'Histoire Naturelle*. Ainsi nous nous bornerons à inviter notre lecteur d'entrer dans un cabinet d'histoire naturelle , dont la collection soit ample & rangée , autant qu'il est possible , conformément au système de la Nature elle-même. C'est dans un tel sanctuaire qu'il trouvera en détail & par ordre , ce que l'univers lui présente en bloc : c'est dans un tel livre , qui nous paroît éloquent pour tous les hommes , qu'il apprendra à connoître l'organisation des êtres créés , le concours , les rapports , la correspondance réciproque de toutes les parties qui composent l'univers. Oui , une telle exposition des êtres matériels , suffira pour lui présenter un spectacle magnifique & vraiment touchant. Si ce particulier est un Philosophe , il y contempera avec fruit l'ordre des productions de la Nature ; s'il est Physicien , il découvrira des phénomènes nouveaux & singuliers ; s'il est Chymiste , la seule inspection raisonnée de ces matériaux , lui dévoilera quelques secrets qui pourront le guider dans ses recherches : est-ce un Voyageur lettré , la vue d'une telle collection lui inspire le desir de recueillir désormais de semblables curiosités ; s'il est Artiste , il tentera de les faire servir aux usages économiques de la société ; n'est-il qu'un Cultivateur , il essaiera de multiplier & d'améliorer les espèces qui lui auront paru les plus importantes à l'entretien de la vie ; ne fut-il enfin qu'un simple ouvrier , à force d'observer & de consulter les productions de la Nature , il auroit également part aux confidences de cette mère commune.

Le vrai Naturaliste doit être instruit de la Physique & de la Chymie , & même des arts ; c'est à l'aide de ces connoissances , qu'il peut comparer les divers objets que les différentes contrées ont offerts à son cabinet ; il y reconnoîtra , jusqu'à un certain point , les causes de leur altération , de leurs variétés , de leurs accidents. Au reste , comme il est certain que ceux qui veulent étudier l'histoire naturelle , ne peuvent pas toujours voyager , & qu'à ce défaut , ils s'instruisent plus dans le cabinet d'un Naturaliste éclairé , que dans tous les ouvrages qui ont traité de ces matieres , nous croyons devoir donner à nos lecteurs une description abrégée d'un cabinet d'histoire naturelle , en observant une distribution méthodique , par classes , par genres , par especes & par variétés. Il s'agit d'y exposer les trésors de la Nature , selon quelque distribution relative , soit au plus ou moins d'importance des êtres , soit à l'intérêt que nous y devons prendre , soit à d'autres considérations , entre lesquelles il faut préférer celles qui donnent un arrangement qui plaît aux gens de goût , qui intéresse les Curieux , qui instruit les Amateurs , qui inspire des vues aux Savants ; en un mot , un arrangement sans fard , & sans autre apprêt que celui que l'élégance , la symétrie & la connoissance des objets doivent suggérer , & qui fasse valoir utilement l'opulence de la Nature. Ceux qui ont trois pieces de suite pour loger les différentes productions naturelles , y doivent distribuer , dans l'une les *minéraux* , dans l'autre les *végétaux* , & dans la troisieme les *animaux*. Ainsi chaque regne auroit son quartier à part. Si l'on n'a qu'une très grande piece , voici comment il faut les arranger , ayant toujours soin de joindre au travail de la main , l'esprit d'observation ; car dans ce genre d'étude , plus l'on voit , plus l'on fait.

Cabinet d'Histoire Naturelle.

Sur une des aîles du cabinet , il faut pratiquer dix armoires garnies de tablettes supportées par des tasseaux de bois , à dents de crémailler : ce nombre d'armoires est destiné à contenir les dix classes suivantes du REGNE MINÉRAL , savoir :

- | | |
|------------------|---|
| 1°. Les eaux. | 7°. Les demi-métaux. |
| 2°. Les terres. | 8°. Les métaux. |
| 3°. Les sables. | 9°. Les bitumes & productions des
volcans. |
| 4°. Les pierres. | 10°. Les pétrifications. |
| 5°. Les sels. | |
| 6°. Les pyrites. | |

On sent déjà l'effet d'un tel arrangement où tout est distinct & distribué de la façon la plus favorable à la vue de l'Etudiant. Chaque armoire à grillage ou vitrée , doit être étiquetée en haut sous sa corniche , par le moyen d'une plaque d'émail qui indique la classe qu'elle renferme : indé-

pendamment de cela , chaque gradin dans l'armoire annonce sur sa bordure par une petite étiquette le genre des matieres qu'il supporte dans des bocaux de verre blanc , bien couverts & bien étiquetés.

Tout ce que l'on met en bocaux dans ces armoires , annonce le commencement d'un droguier : on y voit les terres , les argilles , les tourbes , les terres bolaires , les ocre , les craies , les marnes , les différens sables , les ardoises ou schistes , les asbestes , les pierres ollaires & micacées , les pierres calcaires ou à chaux , même les spaths , les congelations , les résidus pierreux , les stalactites , les albâtres , les gypses ou pierres à plâtre , les cailloux , les pierres de roche , les cristaux de roche & de mine , les fels & les pyrites sujets à tomber en efflorescence , les charbons & autres bitumes , les laves & scories des volcans. On peut se réserver dans le bas de chaque armoire l'espace de deux tablettes , & garnir ce vuide d'un bon nombre de petits gradins en amphithéâtre , afin d'y déposer à nud , ou sur de très petits piédestaux , des morceaux précieux & bien conservés , tels que du sel gemme transparent , des groupes de pyrites , celle appelée la pierre des Incas , de beaux échantillons de cobalt , de bismuth , de zinc , d'antimoine , de mine de mercure coulant & de cinna-bre : le tout bien étiqueté & rangé selon sa classe.

L'armoire des métaux doit offrir sous un même ordre les morceaux rares des mines de plomb , la mine de Nikkel , des groupes d'étain cristallisé ou de grenats d'étain , le *flos-ferri* , de belles aiguilles d'hématite , & un fort aimant brut , avec de la platine , & un morceau de fer réfractaire ; le cuivre foyeux de la Chine , un groupe de malachite. Dans les métaux précieux , il est agréable de voir l'argent natif & l'argent rouge , de même qu'un groupe de mine d'or.

L'armoire des bitumes peut pareillement offrir sur de petits piédestaux , des échantillons de jayet poli d'un côté , de l'ambre gris & du succin de différentes couleurs , qui , quand il contient des insectes , doit être poli par les deux surfaces opposées , des morceaux de soufre jaune & rouge transparens.

Dans l'armoire des pétrifications ou fossiles , on doit également placer sur un amphithéâtre à gradins les pieces les plus rares & les mieux conservées , telles que la cunolite , le *litium lapideum* , les madreporites , les belemnites transparentes , les oursins agatifiés , le nautilus concaméré , les cornes d'Ammon sciées & polies , l'hysterolite , la pierre lenticulaire , la griphyte , &c. les calculs ou bézoards , les turquoises , les crapaudines , les glossopetres , enfin toutes les pierres figurées , même le bois pétrifié.

L'armoire aux pierres , avec un semblable réservoir de gradins , fait voir différentes quilles de cristaux & toutes les pierres précieuses dans leur matrice. On met celles qui sont détachées & non taillées dans des capsules ou verres de montre ; celles qui sont taillées & montées , sont dans un écrin ou baguier ouvert : on en fait de même à l'égard des morceaux ,

teaux, tasses, cuvettes, ou plaques d'agate polies; de cornaline, de jade, de sardoine, d'onix, de calcédoine, de jaspe, de porphyre, de granite, de lapis lazuli, de marbre, d'albâtre, de spath ou crystal d'Islande : on y dépose aussi la pierre de Boulogne, la serpentine, le talc, l'amiante, le balsate ou pierre de touche, les cailloux d'Egypte & d'Angleterre. A l'égard des empreintes & grandes arborisations, ainsi que des pierres de Florence, si elles sont bien conservées, on les fait encadrer, & on les suspend à des agraffes sur les pilastres qui unissent les armoires du regne minéral. Ces armoires qui sont uniformes en hauteur, mais partagées par la largeur selon l'étendue ou le nombre des matériaux qui composent la classe qu'elles doivent renfermer; ces armoires, dis-je, ainsi que celles qui regnent au pourtour, sont posées sur un corps de tiroirs à hauteur d'appui; le dessus de ces studioles pratiqués dans le bas, sert à poser les tiroirs quand on veut les visiter. Ces tiroirs doivent répondre à chacune des armoires qui sont au-dessus, & contenir des matières de la même classe : cet arrangement, toujours méthodique, soulage beaucoup la mémoire, en ce qu'il tient lieu au besoin d'un catalogue chiffré & numéroté, & que dans une multitude d'objets, c'est le seul moyen de trouver dans l'instant ce que l'on cherche.

Dans le regne minéral, ces tiroirs sont très propres pour renfermer des terres sigillées, des bélemnites, des entroques, des astroïtes & autres fossiles à polypier, des coquilles univalves, bivalves & multivalves, des pierres numismales, des os & des tranches de bois pétrifiés & polis, des suites de marbres & de cailloux polis, les suites du silex, des sables & du succin, des collections suivies de minéraux, d'ardoises, d'empreintes & de géodes, &c.

Les *minéraux* en général demandent d'être tenus proprement, & de façon qu'ils ne se touchent pas : il y'en a quelques-uns, comme les sels, qui se fondent aisément, & les pyrites qui fleurissent en se décomposant; les *végétaux* & les *animaux* sont aussi plus ou moins sujets à la corruption : ce désagrément exige des soins pour conserver certaines pièces sujettes à un prompt dépérissement; mais heureusement toutes les saisons de l'année ne sont pas également critiques.

Sur la deuxième aîle du Cabinet, on doit faire mettre treize armoires distribuées comme celles du Regne minéral : elles sont destinées à renfermer les treize divisions suivantes du REGNE VÉGÉTAL; savoir :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1°. Les racines. | 8°. Les herbes & plantes tubéreuses. |
| 2°. Les écorces. | 9°. Les agarics & les tumeurs. |
| 3°. Les bois. | 10°. Les baumes & les résines solides. |
| 4°. Les feuilles. | 11°. Les gommes, résines & les sucsgommeux. |
| 5°. Les fleurs. | |
| 6°. Les fruits & semences. | |
| 7°. Les tiges & plantes parasites. | |

12°. Les fucs extraits , sucres & féculs.

13°. Les plantes marines & maritimes.

Dans ce Regne , on observe le même ordre d'armoires , même symmétrie & même arrangement que dans le Regne minéral. Les gradins du bas des armoires sont très utiles ici pour contenir dans de petits flacons quarrés le vernis de la Chine , les huiles essentielles , & quelques autres aromates particuliers , soit de l'Arabie , soit de l'Inde ; ainsi que les racines de bambou , de mandragore , certains fruits des Indes , monstres , ou ordinaires , que les Indiens ont fait mûrir dans une ample bouteille à col étroit , & conservés dans de l'eau-de-vie de grain.

Comme la collection des *végétaux* surpasse en nombre les minéraux , on est dans l'usage de ne mettre dans les bocaux que les parties séchées de plantes étrangères qu'on emploie , tant en Médecine , que dans les Arts , celles mêmes qui ne sont chez nous que de pure curiosité ; à l'égard des indigènes , on fait un *herbier* , tant des plantes terrestres que marines , collées dans des livres , suivant le système des meilleurs Botanistes. On peut encore , pour rendre l'usage de cet herbier le plus commode qu'il soit possible , mettre ses plantes desséchées entre deux papiers gris , & les empiler les unes au-dessus des autres , soit à découvert sur des tablettes , soit dans de grands cartons , en les rangeant par familles , genres & espèces , & plaçant sur le milieu de leurs dos les étiquettes qui indiquent leurs familles , à leur extrémité une bande qui porte le nom du genre , & dans chaque feuille le nom de l'espèce qu'elle contient ; le tout sur des papiers volans , pour avoir la liberté de faire des changemens à volonté. Voyez l'article HERBIER. Les tiroirs servent en partie à mettre les échantillons des bois avec leur écorce ; coupés de manière qu'on y distingue la *tranche* , le *fil* & le *contrefil* : on y tient aussi une collection de bois des Indes polis. Une autre partie des tiroirs est intérieurement divisée par caissons ou compartimens , afin d'y mettre les graines : chaque quarré est recouvert d'une petite étiquette.

On peut encadrer les *fucus* , petites plantes marines , dont le port & la couleur forment des tableaux agréables , & on les accroche aux pilastres des armoires. Nous avons déjà dit que les *végétaux* & les animaux sont plus ou moins sujets à la corruption. On ne peut la prévenir qu'en les desséchant le plus qu'il est possible , ou en les mettant dans des liqueurs préparées , dont on doit éviter l'évaporation. Les pièces qui sont desséchées demandent encore un plus grand soin : les insectes qui y naissent en abondance dès le mois d'Avril , & qui y trouvent leur aliment , les détruisent dans l'intérieur avant qu'on les ait apperçus : ce fléau dure environ cinq mois , pendant lesquels il faut veiller avec soin. Ainsi l'humidité de l'hiver & la chaleur de l'été exigent que l'on tienne scrupuleusement fermées les armoires d'un Cabinet d'Histoire naturelle , excepté celles du côté du Nord.

Sur la troisième aile qui doit faire le fond du Cabinet en face des fenêtres, il doit y avoir dix armoires destinées à contenir les dix divisions suivantes du REGNE ANIMAL, savoir :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1°. Les fausses plantes marines. | 7°. Les amphibies. |
| 2°. Les zoophytes. | 8°. Les oiseaux, avec leurs nids & leurs œufs. |
| 3°. Les testacées entières. | 9°. Les quadrupèdes. |
| 4°. Les crustacées. | 10°. L'homme. |
| 5°. Les insectes terrestres. | |
| 6°. Les poissons. | |

On peut encore observer la même décoration & distribution extérieure de ces armoires, que dans les précédentes.

L'intérieur de celle des *fausses plantes marines* doit être rangé de manière à présenter au premier coup d'œil l'histoire des lithophytes, des madrepores & du corail brut ou dépouillé, le tout monté sur des pieds d'ouche de bois noirci ou doré. Les corallines à collier peuvent, ainsi que les fucus, être collées sur un papier & encadrées : ces tableaux accrochés au dehors des pilastres séduisent toujours les yeux des spectateurs. Si la collection de ces fausses plantes articulées & flexibles est considérable, il faut prendre le parti de former une espèce d'*herbier* de productions molles à polypes & à figure de plantes.

L'armoire des *Zoophytes* contient les éponges, le jet-d'eau marin, la plume marine, les holothuries, & tous ces corps marins qu'on appelle *animaux plantes* : on les doit conserver dans de l'esprit de vin bien déphlegmé ; la quantité d'eau que contiennent ces substances est plus que suffisante pour l'affoiblir.

L'armoire des *Testacées* est garnie de bocalx remplis d'une liqueur spiritueuse dans laquelle sont les animaux à coquille : sur l'amphithéâtre ou gradins du bas de cette armoire, on place les grosses coquilles, ainsi que les petites, qui sont recouvertes de leur drap marin : on y place aussi des morceaux de pierres remplies de pholades, & de coquilles qu'on nomme *Dattes* à Toulon. Des groupes de pousse-pieds, de conques anatifères, & de glands marins desséchés, y tiennent bien leur place.

L'armoire des *Crustacées* est presque toute en gradins : elle renferme les cancre, les crabes, les écrevisses : on encadre les petits hommars, les squilles, & tous les petits crustacées, à l'exception du Bernard l'hermite.

Sur les côtés sont les étoiles marines, tant épineuses, qu'unies, à plusieurs rayons, la tête de Méduse, &c.

Dans l'armoire des *Insectes terrestres*, il y en a de deux sortes : les uns bien séchés, doivent être dans de petits cadres vernissés & vitrés par les deux grandes surfaces, afin de pouvoir examiner l'insecte des deux côtés : tels sont les mouches, les mantres, les scarabées, les papillons avec leurs nymphes ou chrysalides, &c. (Ces sortes d'animaux forment la partie

d'Histoire naturelle la plus brillante, & celle des oiseaux la plus apparente ; mais elles exigent beaucoup de soins.) Les autres insectes, tels que les fauterelles, les scolopendres, les scorpions, les salamandres, les araignées, les tarentules, les vers, les chenilles, & tous les insectes mols doivent être dans des bocaux remplis de liqueur.

Dans l'armoire des *Poissons*, on voit ceux des petits poissons étrangers qu'on nous envoie toujours dans la liqueur. On conserve aussi de cette manière les poissons mols de notre pays : on écorche les grands poissons d'eau douce & de mer, & l'on colle la peau perpendiculairement sur un papier : quelquefois on embauche les deux parties, & on fait revivre les couleurs avec du vernis. Le poisson volant doit être suspendu vers le haut de l'armoire ; le poisson armé, sur les gradins d'en-bas.

L'armoire des *Amphibies* contient dans des bocaux remplis d'esprit de vin affoibli par de l'eau alunée, les serpens, les vipères & couleuvres, les grenouilles, les crapauds, les lézards, les petites tortues terrestres ou aquatiques, un petit carret avec son écaille.

Le bas des gradins est garni d'un petit serpent à sonnettes, d'un caméléon, d'un scinc marin, d'un castor, du lion marin, &c.

L'armoire des *Oiseaux* est remplie de ces animaux, tant étrangers que de France, & qui sont écorchés, empaillés, & garnis d'yeux d'émail. On conserve parfaitement à sec la peau emplumée & embauchée d'un moule de mousse d'arbre, & saupoudrée intérieurement de poudre de chaux vive, de poivre, de camphre & de sublimé corrosif, afin d'éviter l'attaque des mites & des scarabées disséqueurs : ensuite on tient ces oiseaux, dont la cervelle a été vidée, perchés & dressés sur leurs pieds : il faut s'appliquer à rendre dans chaque pièce l'attitude, l'air, le maintien, & pour ainsi dire, le génie & les inclinations de l'animal, afin que ceux qui examinent les détails d'une telle collection, puissent appliquer à chaque individu, le mot de l'Anthologie sur la Génisse de Miron : *Où la Nature est morte, ou l'Art est animé*. Ce qu'on dit ici pour les oiseaux, regarde également les autres animaux.

Les gradins d'en bas sont garnis des œufs & nids des oiseaux : on fait aussi un *Plumier* dans un livre, comme un *Herbier*.

L'armoire des *Quadrupèdes* contient, dans des bocaux, de petits animaux, tels que les souris & les rats, le didelphe ou phlandre, &c. Les autres animaux sont empaillés, tels que le chat, l'écureuil, le hérisson, le porc-épic, le tatou, le cochon d'Inde, le loup, le renard, le chevreuil, le lièvre, le chien, &c.

L'armoire qui contient l'*Histoire de l'homme* est composée d'une myologie entière, d'une tête injectée séparément, d'un cerveau & des parties de la génération de l'un & de l'autre sexe, d'une névrologie, d'une ostéologie, d'embryons de tout âge avec leur arrière-faix, de fœtus monstres & d'une momie d'Egypte. On y met aussi de belles pièces d'anatomie, représentées en cire, en bois, & des concrétions pierreuses tirées du corps humain.

Les tiroirs qui règnent sous ces armoires du regne animal, renferment de petites parties séparées d'animaux : telles que les dents, les petites cornes, les mâchoires, les pattes, les becs, les ongles, les vertebres, les poils, les écailles, les égagropiles, & une collection d'os remarquables par des coupes, des fractures, des difformités & des maladies.

Afin de décorer un Cabinet avec le plus d'avantage, & de faire un ensemble qui ne soit point interrompu, il faut meubler les murs dans toute leur hauteur : aussi est-on dans l'usage de garnir le dessus des corniches des armoires, de très grandes coquilles, de guépiers étrangers, d'une corne de rhinoceros, d'une dent ou défense d'éléphant, & de celle d'une licorne ; d'urnes & bustes d'albâtre, de jaspe, de marbre, de porphyre ou de serpentine. On y met aussi des figures de bronze antique, de grands lithophytes ou panaches de mer, des animaux faits de coquilles, des globes & sphères. La multiplicité & la singularité des objets fixent toujours l'attention des spectateurs.

Quoique les surfaces du pourtour du Cabinet soient garnies ; comme nous l'avons décrit, on peut aussi paver le sol avec les différentes pierres communes & susceptibles du poliment.

Le plat-fond bien blanc, présente encore une surface, que l'on distribue en trois travées, garnies de crampons & de fils d'archal : c'est-là que l'on peut ranger par ordre différentes productions végétales & animales, d'un volume trop considérable pour tenir dans des armoires, telles que :

1°. La canne à sucre, la branche de palmier, & celle appelée l'*Eventail Chinois*, les cocos, la feuille du bananier.

2°. Les peaux des gros animaux, même les animaux empaillés, tels que le crocodile, le cayman, le requin, l'espadon, la tortue de mer, les grands & longs serpents, les bois de cerf, de bouquetin, de daim, de rhénne, le priape de la baleine.

3°. La troisième travée est remplie de raquettes, de hamacs, d'habillements & plumages des Indiens, de calumets, de carquois, de flèches, de casse-têtes, & d'autres armes & équipages des Indiens.

Comme l'étendue d'une belle collection met dans la nécessité de profiter des places que les lieux nous offrent, on peut ranger, dans le pourtour du Cabinet, & particulièrement aux angles, des scabellons, pour porter de grosses vertebres, une tête de vache marine, ou de très gros madrepores, ou des groupes considérables, soit de crystal ou de minéraux.

Dans le milieu du Cabinet, on met le coquillier, qui est une grande table ou bureau à rebords relevés ; la surface de cette table forme un parterre de vingt-sept cases particulières de différentes grandeurs, & proportionnées aux vingt-sept familles de coquilles marines qu'on y dépose. Les séparations sont faites de bois ou de carton peints en bleu ; quelquefois ces compartiments sont en gradins : le fond des quarrés est enduit ou recouvert d'un coton bleu, ou d'un satin verd ; ou encore, & ce qui est le plus simple, d'une étoffe de lin blanc, mais assez rude pour retenir les coquilles

dans leur place. Dans certains Cabinets, ces gradins sont revêtus de glaces sur toutes les surfaces; ce qui rend les objets doubles, & les fait voir des deux côtés opposés. Les coquilles de mer, qu'on place dans le coquillier, sont toutes nettoyées, & présentent, par la diversité de leurs formes & de leurs couleurs émaillées & par leur inégalité, un tableau agréable & enchanteur, qui est d'autant plus piquant, que la distribution méthodique s'y rencontre avec l'ordre symétrique. Le dessus de cette table se ferme par un treillage de laiton, recouvert d'une serge, afin de préserver les coquilles de la poussière. N'obmettons pas de dire qu'au milieu de cette table est un quarré long & élevé, qui contient les coquilles terrestres & fluviatiles. Du milieu de chaque compartiment, où est chaque famille de coquilles, s'élève un petit carton horizontal, ou une espèce d'écriteau qui en désigne le genre.

Sous la table du coquillier est, du côté des fenêtres, une cage vitrée, assez ample pour contenir les squelettes d'un animal de chaque classe; savoir, d'un poisson, d'un amphibie reptile & d'un lézard, d'un oiseau & d'un quadrupède. Lorsqu'il est possible d'y joindre, pour l'ostéologie comparée, les squelettes des individus intermédiaires de ces animaux, & ceux qui se rapprochent le plus de l'homme, tels que le *singe* & l'*ours*, cela est instructif & agréable. Dans le reste du dessous de cette table, on place les meilleurs livres qui ont rapport aux différentes branches de l'Histoire Naturelle; sur-tout ceux qui ont des estampes enluminées. On y peut mettre aussi l'*herbier*, & le *plumier*, arrangés en livres.

Le dessus de la porte est garni d'un grand cadre, rempli de peaux de poissons rares, desséchées, vernies & collées sur le papier.

Les trumeaux des croisées sont garnis d'une ou de deux armoires, qui contiennent sur des tablettes plusieurs instruments de physique, machine pneumatique, miroir ardent, lunette à longue vue, loupe, microscope, télescope, aimants naturels & artificiels.

On voit sur les gradins du bas, la pâte du ris de la Chine, ainsi que la pierre de lard qui servoit autrefois de hache aux Sauvages, quelques morceaux de laque, les bijoux des Sauvages du Nord, qui sont ou d'ivoire ou d'ambre jaune ou de corail, garnis d'or ou d'argent, de la pâte de porcelaine, &c.

Les tiroirs des studioles, sous cette armoire, contiennent un médailler, de l'encre de la Chine, des phioles lachrymatoires, les soufres & les plus belles pierres gravées de l'Europe, ou leur empreinte en cire d'Espagne, les jettons, les camées, les poids & les mesures des Anciens, les idoles, les cinéraires, les lampes, les instruments des sacrifices, les fausses piergeries.

Enfin les embrasures des fenêtres doivent être garnies de tableaux de pierre en pièces de rapport. On y peut mettre aussi, de même que dans les embrasures de la porte & sur les panneaux, des tubes scellés hermétiquement, remplis de reptiles rares, conservés dans les liqueurs convenables.

Quel immense & merveilleux assemblage ! quel spectacle magnifique ! Ce tableau, varié par des nuances à l'infini, ne peut être rendu par aucune expression ; l'idée n'en peut être exprimée que par les objets mêmes dont il est composé : un *Cabinet d'Histoire Naturelle* est un abrégé de la Nature entière.

Me fera-t-il permis de finir cet article par l'exposition d'un projet qu'on lit dans l'Encyclopédie, & qui ne seroit guere moins avantageux qu'honorable à la Nation ? Ce seroit d'élever à la Nature un Temple qui fût digne d'elle. Il le faudroit composer de plusieurs bâtimens proportionnés à la grandeur des êtres qu'ils devroient renfermer : celui du milieu seroit spacieux, immense, & destiné pour les monstres de la terre & de la mer. De quel étonnement ne seroit-on pas frappé à l'entrée de ce lieu habité par les crocodiles, l'éléphant, le rhinoceros & la baleine. On passeroit de-là dans d'autres salles contiguës les unes aux autres, où l'on verroit la Nature dans toutes ses variétés & ses dégradations. On entreprend tous les jours des voyages dans les différens pays, pour en admirer les raretés ; croit-on qu'un pareil édifice n'attireroit pas les hommes curieux de toutes les parries du Monde, & qu'un Etranger un peu lettré pût se résoudre à mourir sans avoir vû une fois la Nature dans son Palais ? Si je pouvois juger du goût des autres hommes par le mien, il me semble que pour jouir de ce spectacle, personne ne regretteroit un voyage de cinq ou six cents lieues ; & tous les jours ne fait-on pas la moitié de ce chemin pour voir des morceaux de Raphaël & de Michel-Ange ? Les millions qu'il en coûteroit à l'Etat pour un pareil établissement, seroient payés plus d'une fois par la multitude des Etrangers qu'il attireroit en tout tems ? Si j'en crois l'Histoire, le grand Colbert leur fit autrefois acquitter la magnificence d'une Fête pompeuse, mais passagere. Quelle comparaison entre un Carrousel & le Projet dont il s'agit ? & quel tribut ne pourrions-nous pas en espérer de la curiosité de toutes les Nations ?

HOANCYCIOYU. Animal qui se voit dans la Province de Quantong en Chine : il tient de la forme du poisson & de l'oiseau. Il est jaune pendant l'été, & vole sur les montagnes comme un oiseau : vers l'hiver, il se retire dans la mer ; c'est alors que, pour l'attrapper, car sa chair est fort délicate, on lui dresse des pieges, & on lui tend des filets ; du moins tel est le récit du Rédacteur de l'*Ambassade des Hollandois à la Chine*.

Le même Narrateur, dit qu'il se trouve aussi dans la Province de Che-Kiang du même Empire, un petit oiseau nommé *Hoancyngio*, que les habitans trempent dans leur vin fait de riz, & dont ils font des especes de confitures, qu'ils vendent à bon prix.

HOBEREAU ou HAUBREAU. C'est, après l'émérillon, le plus petit des oiseaux de leurre, dont on se sert en Fauconnerie. *Voyez l'article FAUCON.*

HOBUS. *Voyez à l'article MYROBOLANS.*

HOCHE-PIÉ ou **HAUSSE-PIED**. Nom qu'on donne à l'oiseau qu'on lâche seul après le héron , pour le faire monter.

HOCHE-QUEUE : voyez **BERGERONETTE**. On a donné aussi le nom de *Hoche-queue* à un poisson des Indes Orientales , parcequ'il remue toujours la queue comme l'oiseau qui porte ce nom. Ce poisson se trouve proche Amboine , dans l'endroit qu'on appelle *Golfe de Portugal* : le mâle fuit toujours sa femelle ; l'un & l'autre sont d'un bleu clair.

HOCOS ou **OCOS**. Dans l'Isle de Cayenne , on appelle ainsi une espece de dinde des bois , qui semble exprimer par ses cris les deux syllabes qui composent son nom. Sa tête est surmontée d'une huppe de trois pouces de hauteur , & composée de plusieurs plumes comme étagées. Ces plumes sont blanches , noires par l'extrémité , & se replient en devant. Le hocos leve & baisse sa huppe à volonté. Cet animal est différent de l'*oiseau de plumes du Mexique* : voyez ce mot.

HOLLI ou **ULLI**. Les Indiens donnent ce nom à une espece de liqueur résineuse , qui découle par les incisions qu'ils font à un arbre appelé *chilli* ou *holquahuylt* , qui croît au Mexique : son tronc est léger & moëlleux , de couleur fauve : sa fleur est large , blanche , rougeâtre & étoilée : son fruit a la figure d'une aveline , & est d'un goût amer.

La liqueur holli est employée dans la composition du chocolat des Indiens : elle est cordiale , stomachique , & propre à arrêter le cours de ventre.

HOLOTHURIES , *holothuria* , especes de corps marins informes de l'espece des mollusques , qu'on a mis parmi les *zoophytes* ou *Plantes animales* ; corps qu'on ne mange point , & que la mer jette avec des ordures sur le rivage. On en distingue plusieurs sortes ; les unes ne sont point attachées aux rochers , mais elles sont adhérentes à la vase , & couvertes d'un cuir dur : elles sont plattées , & de la figure d'une rose ; il y a tout autour de petits trous. De cet endroit pend une petite excroissance molle ; l'autre bout est plus menu ; en dedans toutes les parties sont confuses : ce zoophyte sent mauvais.

La seconde espece se trouve dans les ordures que la mer jette sur le bord du rivage. Sa peau est dure & âpre : on en peut mieux distinguer les parties intérieures. A un bout , il semble qu'il y ait une tête ronde & un trou , qu'on peut prendre pour une bouche ronde & ridée , qui s'ouvre & se ferme ; après quoi , on trouve un corps assez gros , plein d'aiguillons & qui finit en pointe. C'est comme une queue qui a de chaque côté un pied ou une aîle : l'aîle de dessus est plus étroite , découpée à l'entour , & finissant en pointe ; depuis le haut de cette aîle jusqu'à la pointe , il y a un trait ; l'autre aîle est plus large par-tout. C'est par le moyen de ces aîles , que ce zoophyte paroît se remuer.

On parle beaucoup d'une espece d'holoturie des Indes , qu'on ne peut toucher sans se sentir la main violemment enflammée : le remede est d'y appliquer promptement de l'ail pilé ; sans quoi , cette ardeur va jusqu'à
donner

donner la fièvre. Malgré la propriété singulière de cette sorte d'holoturie, des Indiens en laissent macérer quelque tems dans leurs liqueurs pour les rendre plus piquantes ; mais ils sont sujets à avoir des maladies éphémères toutes les fois qu'ils en boivent : voyez ZOOPHYTES.

HOMMARD : voyez ECREVISSE.

HOMME, *homo*. L'homme est le chef-d'œuvre de la nature, le Roi ou le premier des animaux, un monde en raccourci, le centre où l'univers entier se réfléchit. Tout nous démontre l'excellence de sa nature & la distance immense que la bonté du Créateur a mise entre l'homme & la bête. L'homme est un être raisonnable ; l'animal brute est un être sans raison, L'homme le plus stupide suffit pour conduire le plus spirituel de tous les animaux ; il le commande, il le fait servir à ses usages, & celui-ci lui obéit. Les opérations des brutes ne sont que des résultats purement mécaniques, purement matériels & toujours les mêmes ; l'homme, au contraire, met de la variété ou de la diversité dans ses ouvrages, parceque son ame est à lui, & qu'elle est indépendante & libre. Ainsi l'homme est l'animal par excellence, le seul de son genre, mais dont les individus sont fort différens par la figure, la grandeur, la couleur, les mœurs, le naturel, &c.

Le globe que l'homme habite est couvert des productions de son industrie & des ouvrages de ses mains : c'est réellement son opération qui met toute la terre en valeur.

Soit que nous considérons l'homme dans ses différens âges, soit que nous jettons un coup d'œil sur les variétés de son espèce, soit que nous examinons son organisation merveilleuse, son histoire nous touche sous ces différens points de vue tous également intéressans. Nous tâcherons donc d'en présenter ici de légères esquisses : mais que pourrions-nous faire de mieux que de présenter d'abord & en partie un extrait, tiré de ce qu'en a dit un Philosophe très éloquent & très éclairé, c'est-à-dire l'illustre M. de Buffon !

Prenons l'homme à l'instant de sa naissance. Incapable de faire encore aucun usage de ses organes, l'enfant qui naît a besoin de secours de toute espèce, c'est une image de misère & de douleur ; il est dans ces premiers tems plus foible qu'aucun des animaux. En naissant, l'enfant passe d'un élément dans un autre : au sortir de l'eau qui l'environnoit de toutes parts dans le sein de sa mère, il se trouve exposé à l'air, & il éprouve dans l'instant l'effet de ce fluide actif. L'air agit sur les nerfs de l'odorat & sur les organes de la respiration ; cette action produit une secousse, une espèce d'éternuement qui soulève la capacité de la poitrine ; & donne à l'air la liberté d'entrer dans les pulmôns ; les secousses du diaphragme pressent pendant ce tems les viscères du bas ventre, les excréments sont par ce moyen, & pour la première fois, chassés des intestins, & l'urine, de la vessie. Ainsi l'air dilate les vésicules des pulmôns, les gonfle, s'y rarefie à un certain degré ; après quoi le ressort

des fibres dilatées réagit sur ce fluide léger , & le fait sortir des poulmons : voilà l'enfant qui respire , & qui articule des sons ou cris.

Cette fonction de la respiration est essentielle à l'homme & à plusieurs especes d'animaux : c'est ce mouvent qui entretient la vie ; s'il cesse , l'animal périt. Aussi la respiration ayant une fois commencé , elle ne finit qu'à la mort ; & dès que le *fœtus* a respiré pour la premiere fois , il continue à respirer sans interruption.

L'enfant dans le sein de la mere nâge dans un fluide , & y vit sans respirer ; le sang passe d'un ventricule du cœur à l'autre ventricule , par le moyen du trou ovale : mais dès que l'enfant commence à respirer , le sang prend une nouvelle route par les poulmons. Cependant on peut croire avec quelque fondement que ce trou ovale ne se ferme pas tout à coup au moment de la naissance , & que par conséquent une partie du sang doit continuer à passer par cette ouverture. Il seroit peut-être possible d'empêcher que ce trou ovale ne se fermât , en plongeant l'enfant nouveau né dans de l'eau tiède , en le mettant ensuite à l'air , & en réitérant cela plusieurs fois ; on parviendroit peut-être par ce moyen à faire d'excellents plongeurs , qui vivroient également dans l'air & dans l'eau. C'est une expérience que M. de Buffon avoit commencée sur des chiens : la chienne mit bas ses petits dans l'eau tiède , où ils resterent une demi-heure ; on les laissa ensuite respirer l'air le même tems ; on les replongea dans du lait ; on les remit à l'air , & ils vécurent très bien.

La plupart des animaux ont encore les yeux fermés quelques jours après leur naissance : l'enfant les ouvre aussitôt qu'il est né , mais ils sont fixes , ternes & communément bleux. Le nouveau né ne distingue rien , car ses yeux ne s'arrêtent sur aucun objet ; l'organe est encore imparfait ; la cornée est ridée ; & peut-être aussi la rétine est-elle trop molle pour recevoir les images des objets & donner la sensation de la vue distincte. Il ne commence à entendre & à rire qu'au bout de quarante jours : c'est aussi le tems auquel il commence à pleurer ; car auparavant les cris & les gémissements ne sont point accompagnés de larmes. Le rire & les larmes sont des produits de deux sensations intérieures , qui toutes deux dépendent de l'action de l'ame ; aussi ces signes sont-ils particuliers à l'espece humaine pour exprimer le plaisir ou la douleur de l'ame ; tandis que les cris , les mouvements & les autres signes des douleurs & des plaisirs du corps , sont communs à l'homme & à la plupart des animaux.

La grandeur de l'enfant né à terme , est ordinairement de vingt-un pouces , & ce *fœtus* qui pese alors douze livres , quelquefois quatorze , & même beaucoup plus , tiroit son origine neuf mois auparavant d'une bulle imperceptible. La tête du nouveau né est plus grosse à proportion que le reste du corps ; & cette disproportion , qui étoit encore beaucoup plus grande dans le premier âge du *fœtus* , ne disparoît qu'après la premiere enfance. La peau de l'enfant , qui naît , paroît rougeâtre , parce-

qu'elle est assez transparente pour laisser appercevoir une nuance foible de la couleur du sang : au reste on prétend que les enfants dont la peau est la plus rouge en naissant , sont ceux qui , dans la suite , auront la peau la plus belle & la plus blanche. La forme du corps & des membres de l'enfant qui vient de naître n'est pas bien exprimée , toutes les parties sont gonflées ; au bout de trois jours il lui survient ordinairement une jaunisse , & dans ce même tems il y a dans les mammelles de l'enfant du lait qu'on peut exprimer avec les doigts ; ce gonflement diminue à mesure que l'enfant prend de l'accroissement.

On voit palpiter dans quelques enfants nouveaux nés le sommet de la tête à l'endroit de la fontanelle , & dans tous , on y peut sentir le battement des sinus ou des arteres du cerveau , si on y porte la main. Il se forme au dessus de cette ouverture une espece de croute ou de galle , qu'on frotte avec des brosses pour la faire tomber à mesure qu'elle se sèche ; il semble que cette production ait quelque analogie avec celle des cornes des animaux , qui tirent aussi leur origine d'une ouverture du crâne & de la substance du cerveau. On aura lieu de voir dans la suite que toutes les extrémités des nerfs deviennent solides lorsqu'elles sont exposées à l'air , & que c'est cette substance nerveuse , qui produit les cornes , les *ongles* & les *ergots*. Voyez aussi ces mots.

La liqueur contenue dans l'*amnios* laisse sur l'enfant une humeur visqueuse blanchâtre. Nous avons dans ce pays-ci la sage précaution de ne laver l'enfant qu'avec de l'eau tiède ; cependant des Nations entieres , celles mêmes qui habitent les climats les plus froids , sont dans l'usage de plonger leurs enfants dans l'eau froide aussitôt qu'ils sont nés , sans qu'il leur en arrive aucun mal ; on dit même que les Laponnes laissent leurs enfants dans la neige jusqu'à ce que le froid les ait saisis au point d'arrêter la respiration , & qu'alors elles les plongent dans un bain d'eau chaude : ces peuples lavent aussi les enfants trois fois chaque jour pendant la premiere année de leur vie. Les peuples du Nord sont persuadés que les bains froids rendent les hommes plus forts & plus robustes ; c'est par cette raison qu'ils les forcent de bonne heure à en contracter l'habitude. Ce qu'il y a de vrai , c'est que nous ne connoissons pas assez jusqu'où peuvent s'étendre les limites de ce que notre corps est capable de souffrir , d'acquérir ou de perdre par l'habitude.

On ne fait pas tetter l'enfant aussi-tôt qu'il est né : on lui donne auparavant le tems de rendre la liqueur & les glaires qui sont dans son estomac , & le *mæconium* qui est dans ses intestins ; ce sont des excréments de couleur noire : ces matieres pourroient faire aigrir le lait. On commence donc par lui faire avaler un peu de vin sucré : ce n'est que dix ou douze heures après la naissance , qu'il doit tetter pour la premiere fois.

A peine l'enfant jouit-il de la liberté de mouvoir & d'étendre ses membres , qu'on lui donne de nouveaux liens ; on l'embeguine , on l'emmaillotte ; heureux si on ne l'a pas ferré au point de l'empêcher de respirer ,

& si on a eu la précaution de le coucher sur le côté , afin que les eaux , qu'il doit rendre par la bouche , puissent tomber d'elles-mêmes ! car étant ainsi empaqueté , il n'auroit pas la liberté de tourner la tête sur le côté pour en faciliter l'écoulement. Les peuples qui se contentent de mettre leurs enfants nuds sur des lits de coron suspendus , ou de les couvrir simplement dans leurs berceaux garnis de pelleteries , nous donnent un exemple que nous devrions imiter. Les bandages du maillot peuvent être comparés aux corps que l'on fait porter aux filles dans leur jeunesse. Cette espece de cuirasse , imaginée pour soutenir la taille & l'empêcher de se déformer , cause certainement plus d'incommodités & de difformités qu'elle n'en prévient. Les enfants qui ont la liberté de mouvoir leurs membres à leur gré , deviennent plus forts que ceux qui sont emmaillottés ; car le défaut d'exercice retarde l'accroissement des membres. On voit les enfants des Nègres commencer à marcher dès le second mois , ou plutôt se traîner sur les genoux & sur les mains : pour les obliger à marcher , leurs meres leur présentent de loin la mamelle comme un appas , & on les voit se traîner pour l'aller chercher. Cet exercice leur donne la facilité de courir dans cette situation presque aussi vite que s'ils étoient sur leurs pieds :

Ces petits enfants Negres deviennent si adroits & si forts , que lorsqu'ils veulent tetter , ils embrassent l'une des hanches de la mere avec leurs genoux & leurs pieds ; & la ferment si bien , qu'ils peuvent s'y soutenir sans le secours des bras de la mere : ils s'attachent à la mamelle avec leurs mains , & ils la sucent constamment , sans se déranger & sans tomber , malgré les différents mouvements de la mere , qui , pendant ce tems , travaille à son ordinaire.

Les enfants nouveaux nés ont besoin de prendre souvent de la nourriture. On les fait tetter dans la journée de deux en deux heures ; & pendant la nuit , à chaque fois qu'ils se reveillent. Ils dorment pendant la plus grande partie du jour & de la nuit dans les premiers tems de leur vie ; ils semblent même n'être éveillés que par la douleur ou par la faim. Les entraves du maillot les tiennent dans une situation qui devient fatigante & douloureuse après un certain tems : leur peau fine & délicate est souvent refroidie par leurs excréments : il n'y a guere que la tendresse maternelle qui soit capable d'une vigilance assez continuelle pour tenir les enfants bien propres. Les Sauvages , qui sentent combien ce soin est nécessaire , y suppléent d'une maniere bien simple. Ils mettent au fond du berceau une bonne quantité de poudre que l'on tire du bois rongé des vers , & ils recouvrent leurs enfants de pelleteries : cette poudre pompe l'humidité , & on a soin de la renouveler. En Orient , & sur-tout en Turquie , on attache les enfants nuds sur une planche garnie de coton , & percée pour l'écoulement des excréments. On cherche à apaiser les cris des enfants en les berçant , mais on ne doit les agiter que fort doucement ; car cette agitation , si elle étoit trop violente , feroit peut-être

capable de leur ébranler la tête , & d'y causer du dérangement. Pour que leur santé soit bonne , il faut que leur sommeil soit naturel & long ; cependant s'ils dormoient trop , il seroit à craindre que leur tempérament n'en souffrît : dans ce cas , il faut les tirer du berceau , & les éveiller par de petits mouvements , ou leur faire voir quelque chose de brillant. C'est à cet âge que l'on reçoit les premières impressions des sens : elles sont sans doute plus importantes que l'on ne croît pour le reste de la vie.

On doit avoir grand soin de mettre le berceau , de manière que l'enfant soit placé directement devant la lumière ; car , comme ses yeux se portent toujours du côté le plus éclairé , si le berceau étoit placé de côté , un des yeux , en se tournant vers la lumière , acquerrait plus de force , & l'enfant deviendrait louche. La nourrice ne doit donner à l'enfant que le lait de ses mamelles , pour toute nourriture , au moins pendant les deux premiers mois , il ne faudroit même lui faire prendre aucun autre aliment pendant le troisième & le quatrième mois , sur-tout lorsque son tempérament est foible & délicat. Quelque robuste que puisse être un enfant , il pourroit en arriver de grands inconvénients , si on lui donnoit d'autre nourriture que le lait de la nourrice , avant la fin du premier mois. En Hollande , en Italie , en Turquie , & en général dans tout le Levant , on ne donne aux enfants que le lait des mamelles pendant un an entier. Les Sauvages du Canada les allaitent jusqu'à quatre , cinq & même sept ans. Dans ce pays-ci , comme les femmes n'ont pas assez de lait pour fournir à l'appétit de leurs enfants , elles y suppléent par un aliment composé de farine & de lait ; mais ce n'est guère qu'à deux ou trois mois que l'on doit commencer à leur donner cette nourriture plus solide , à laquelle même on devoit substituer du pain détrempé dans le lait : c'est ainsi qu'on prépare peu-à-peu l'estomac des enfants à recevoir le pain ordinaire , & les autres aliments dont ils doivent se nourrir dans la suite.

Les dents qu'on appelle *incisives* , sont au nombre de huit ; leur germe se développe ordinairement le premier , & communément à l'âge de sept mois , souvent à celui de huit ou dix , & d'autres fois à la fin de la première année. Cette opération , quoique naturelle , ne suit pas les loix ordinaires de la nature , qui agit à tout instant dans le corps humain , sans y occasionner la moindre douleur , & même sans exciter aucune sensation. Ici il se fait un effort violent & douloureux , qui est accompagné de pleurs & de cris. Les enfants portent leurs doigts à leur bouche , pour tâcher d'appaîser la démangeaison qu'ils y ressentent. On leur donne un petit soulagement en mettant au bout de leur hochet un morceau d'ivoire ou de corail , ou de quelqu'autre corps dur & poli ; ils le ferment entre les gencives à l'endroit douloureux ; cet effort opposé à celui de la dent , calme la douleur pour un instant ; il contribue aussi à l'amincissement de la membrane de la gencive , qui étant pressée des deux côtés à la fois ,

doit se rompre plus aisément ; la Nature s'oppose ici à elle-même ses propres forces , on est obligé quelquefois de faire une petite incision à la gencive pour donner passage à la dent.

Sur la fin de la première , ou dans le courant de la seconde année , on voit paroître seize autres dents que l'on appelle *molaires* ou *mâchelières* , quatre à chaque côté de chacune des *canines*. Ces termes pour la sortie des dents varient : les deux incisives , les canines , & les quatre premières mâchelières tombent naturellement dans la cinquième , la sixième ou la septième année ; mais elles sont remplacées par d'autres , qui paroissent dans la septième année , souvent plus tard , & quelquefois elles ne sortent qu'à l'âge de puberté. La chute de ces seize dents est causée par le développement du second germe placé au fond de l'alvéole , qui en croissant , les pousse au dehors ; ce germe manque ordinairement aux autres mâchelières , aussi ne tombent elles que par accident , & leur perte n'est presque jamais réparée.

Il y a encore quatre autres dents qui sont placées à chacune des deux extrémités des mâchoires ; ces dents manquent à plusieurs personnes , leur développement ne se fait ordinairement qu'à l'âge de puberté , & quelquefois dans un âge beaucoup plus avancé , & c'est par cette raison qu'on les a nommées *dents de sagesse*. Le nombre des dents en général ne varie , que parceque celui des dents de sagesse n'est pas toujours le même ; de-là vient la différence de vingt-huit à trente-deux dans le nombre total des dents. *Voyez* l'article DENTS.

Lorsqu'on laisse crier les enfants trop fort & trop long-tems , ces efforts leur causent des descentes qu'il faut avoir grand soin de rétablir promptement par un bandage , ils guérissent aisément par ce secours ; mais si on négligeoit cette incommodité , ils seroient en danger de la garder toute leur vie. Les enfants sont fort sujets aux vers ; en leur faisant boire de tems en tems un peu de vin , on prévient peut-être une partie des mauvais effets que causent les vers : car les liqueurs fermentées s'opposent à leur génération.

Quelque délicat que l'on soit dans l'enfance , on est à cet âge moins sensible au froid , que dans tous les autres tems de la vie ; la chaleur intérieure est apparemment plus grande. On sait que le pouls des enfants est bien plus fréquent que celui des adultes : cette seule observation suffiroit pour faire penser que la chaleur intérieure est plus grande dans la même proportion. On ne peut guère douter que les petits animaux n'aient plus de chaleur que les grands , par cette même raison : car la fréquence du battement du cœur & des artères , est d'autant plus grande , que l'animal est plus petit : les battements du cœur d'un moineau se succèdent si promptement , qu'à peine peut-on les compter.

La vie de l'enfant est fort chancelante jusqu'à l'âge de trois ans , mais dans les deux ou trois années suivantes , elle s'assure , & l'enfant de six ou sept ans est plus assuré de vivre , qu'on ne l'est à tout autre âge. Sui-

vant les nouvelles tables faites à Londres sur les degrés de la mortalité du genre humain dans les différents âges ; il paroît que d'un certain nombre d'enfants nés en même-tems , il en meurt au moins la moitié dans les trois premières années. Suivant ces tables , la moitié du genre humain devrait périr avant l'âge de trois ans , par conséquent tous les hommes qui ont vécu plus de trois ans , loin de se plaindre de leur sort , devraient se regarder comme traités plus favorablement que les autres. Mais cette mortalité des enfants n'est pas à beaucoup près si grande partout , qu'elle l'est à Londres ; car M. Dupré de S. Maur s'est assuré par un grand nombre d'observations faites en France , qu'il faut sept ou huit années , pour que la moitié des enfants nés en même-tems , soit éteinte ; & M. Wargentin , Secrétaire de l'Académie Royale de Suède , examinant la proportion des morts dans les différents âge de la vie , cherche à déduire des principes certains pour le calcul des tontines & rentes viagères , en un mot combien un homme en santé peut encore vivre d'années.

Parmi les causes de la mortalité des enfants & même des adultes , on doit placer en tête les effets de la petite vérole ; mais heureusement personne n'ignore que l'on trouve presque toujours dans l'inoculation un moyen de pallier avec succès les disgrâces de ce fléau : tous les Journaux de 1757 ont fait une mention honorable de l'excellent Mémoire de M. de la Condamine sur ce sujet. Ce beau plaidoyer de la cause de l'inoculation & de l'humanité est aujourd'hui entre les mains de tout le monde & traduit en toutes les langues. La multitude de faits réunis & la solidité du raisonnement forment un corps de preuves , à l'évidence desquels il est difficile de résister.

Si les mères nourrissoient elles-mêmes leurs enfants , il y a apparence qu'ils en feroient plus forts & plus vigoureux. Le lait de leur mère doit leur convenir mieux que le lait d'une autre femme : car le fœtus se nourrit dans la matrice d'une liqueur laiteuse , qui est fort semblable au lait qui se forme dans les mamelles. L'enfant est donc , pour ainsi dire , accoutumé au lait de sa mère : au lieu que le lait d'une autre nourrice est quelquefois pour lui un aliment assez différent , pour qu'il ne puisse s'y accoutumer. Si l'on voit les enfants devenir languissants , malades , il faut prendre une autre nourrice ; si l'on n'a pas cette attention , ils périssent en peu de tems. Que de soins sont nécessaires pour faire éviter à l'homme les écueils de l'enfance !

L'éducation physique des enfants , est un objet de la première importance pour procurer à l'Etat des citoyens d'une bonne santé. De tout tems on a dû en sentir l'importance ; aussi l'Académie de Harlem en Hollande , a-t-elle proposé pour sujet d'un prix la question suivante : *Quelle est la meilleure direction à suivre dans l'habillement , la nourriture & l'exercice des enfants , depuis le moment où ils naissent , jusqu'à leur adolescence , pour qu'ils vivent long-tems en santé.* Le prix a été remporté par M. Ballexferd ,

citoyen de Geneve , qui a très bien discuté cette question dans son ouvrage , qui a pour titre : *Dissertation sur l'éducation physique des enfants*.

Les enfant commencent à bégayer à l'âge de douze ou quinze mois. On doit cesser d'être surpris , de ce que dans toutes les langues , & chez tous les peuples , les enfants commencent toujours par bégayer *ba ba , ma ma , pa pa* : ces syllabes sont , pour ainsi dire , les sons les plus naturels à l'homme , parcequ'elles demandent le moins de mouvements dans les organes de la parole. Il y a des enfants qui à deux ans prononcent distinctement , & répètent tout ce qu'on leur dit ; mais la plupart ne parlent qu'à deux ans & demi , & très souvent plus tard : on remarque que ceux qui commencent à parler tard ne parlent jamais aussi aisément que les autres. Ceux qui parlent de bonne heure , sont en état d'apprendre à lire à trois ans. Au reste , on ne peut guere décider , s'il est fort utile d'instruire les enfants de si bonne heure ; on a tant d'exemples du peu de succès de ces éducations prématurées , on a vu tant de prodiges de quatre ans , de huit ans , de douze ans , de seize ans , qui n'ont été que des fots , ou des hommes fort communs à l'âge de vingt-cinq ou trente ans , qu'on feroit porté à croire , que la meilleure de toutes les éducations est celle qui tend à exercer & à étendre les forces du corps & de l'esprit , sans jamais les excéder ni les épuiser , celle qui est la moins sévère , celle en un mot qui est la mieux proportionnée à la foiblesse actuelle des enfants , & en même tems aux forces qu'on prévoit qu'ils pourront acquérir , chacun suivant leur différent tempérament.

De la Puberté & de la Virginité.

La puberté accompagne l'adolescence & précède la jeunesse ; elle est pour ainsi dire , le printems de l'homme , c'est la saison des plaisirs. Jusqu'alors la nature ne paroît avoir travaillé que pour la conservation & l'accroissement de son ouvrage ; elle n'a fourni à l'enfant , que ce qui lui étoit nécessaire pour vivre , & pour croître ; il a vécu , ou plutôt il a végété d'une vie particuliere , toujours foible , renfermée en lui-même , & qu'il ne pouvoit communiquer : mais bientôt les principes de vie se multiplient , il a , non-seulement tout ce qu'il lui faut pour être , mais encore de quoi donner l'existence à d'autres. Cette surabondance de vie , cette source de la force & de la santé , ne pouvant plus être contenue au dedans , cherche à se répandre au dehors , elle s'annonce par plusieurs signes.

Le premier signe de la puberté , est une espece d'engourdissement aux aines , une espece de sensation jusqu'alors inconnue dans les parties qui caractérisent le sexe ; il s'y élève une quantité de petites proéminences d'une couleur blanchâtre ; ces petits boutons sont les germes d'une nouvelle production , de cette espece de cheveux qui doivent voiler ces parties. Le son de voix devient rauque & inégale pendant un espace de tems assez

assez long , après lequel il se trouve plus plein , plus assuré , plus fort , & plus grave qu'il n'étoit auparavant. Ce changement est très sensible dans les garçons ; s'il l'est moins dans les filles , c'est parceque le son de leur voix est naturellement plus aigu.

Ces signes de puberté sont communs aux deux sexes ; mais il y en a de particuliers à chacun : l'éruption des menstrues , l'accroissement du sein pour les femmes ; la barbe & l'émission convulsive de la liqueur féminale pour les hommes : enfin le sentiment du desir vénérien , cet appetit qui porte les individus des deux sexes à se faire réciproquement une tradition de leurs corps pour l'acte prolifique. Dans toute l'espece humaine , les femmes arrivent à la puberté plutôt que les mâles ; mais chez les différents peuples , l'âge de puberté est différent , & semble dépendre en partie de la température du climat & de la qualité des aliments. Dans toutes les parties méridionales de l'Europe , & dans les villes , la plupart des filles sont puberes à douze ans , & les garçons à quatorze ; dans les Provinces du Nord & dans les campagnes , à peine les filles le sont-elles à quatorze & les garçons à seize.

Dans les climats les plus chauds de l'Asie , de l'Afrique & de l'Amérique , la plupart des filles sont puberes à dix & même à neuf ans. L'écoulement périodique , quoique moins abondant dans les pays chauds , paroît cependant plutôt que dans les pays froids. L'intervalle de cet écoulement est à-peu-près le même dans toutes les nations , & il y a sur cela plus de diversité d'individu à individu , que de peuple à peuple ; car dans le même climat & dans la même nation , il y a des femmes qui tous les quinze jours sont sujettes à cette évacuation naturelle , & d'autres qui ont jusqu'à cinq & six semaines de libres , mais ordinairement l'intervalle est d'un mois , à quelques jours près. La quantité de l'évacuation paroît dépendre de la quantité des aliments , & de celle de la transpiration insensible ; les femmes qui mangent plus que les autres , & qui ne font pas d'exercice , ont des menstrues plus abondantes. La quantité de cette évacuation varie beaucoup dans les différents sujets & dans les différentes circonstances : on peut peut-être l'évaluer depuis une ou deux onces , jusqu'à une livre & plus. La durée de l'écoulement menstruel est de trois , quatre ou cinq jours dans la plupart des femmes , & de six , sept & même huit dans quelques-unes. La surabondance de la nourriture & du sang , est la cause matérielle des menstrues. Les symptomes qui précèdent leur écoulement , sont autant d'indices certains de plénitude , comme la chaleur , la tension , le gonflement , & même la douleur que les femmes ressentent , non-seulement dans les endroits mêmes où sont les réservoirs , & dans ceux qui les avoisinent , mais aussi dans les mamelles ; elles sont gonflées , & l'abondance du sang y est marqué par la couleur de leur aréole qui devient alors plus foncée ; les yeux sont chargés , & au dessous de l'orbite la peau prend une teinte de bleu & violet ; les joues se colorent , la tête

est pesante & douloureuse , & en général tout le corps est dans un état d'accablement causé par la surcharge du sang.

C'est ordinairement à l'âge de puberté , que le corps acheve de prendre son accroissement en hauteur ; les jeunes gens grandissent presque tout-à-coup de plusieurs pouces. Mais de toutes les parties du corps , celles où l'accroissement est le plus prompt , & le plus sensible , sont les parties de la génération dans l'un & l'autre sexe ; cet accroissement au reste n'est dans les mâles qu'un développement , une augmentation de volume ; au lieu que dans les femelles , il produit souvent un rétrécissement auquel on a donné différents noms , lorsqu'on a parlé des signes de la virginité.

Il n'est pas aisé de réussir à détruire les préjugés ridicules qu'on s'est formés sur ce sujet : mais la contrariété d'opinions sur un fait qui dépend d'une simple inspection , prouve que les hommes ont voulu trouver dans la nature ce qui n'étoit que dans leur imagination , puisqu'il y a plusieurs Anatomistes qui disent de bonne foi , qu'ils n'ont jamais trouvé ces caractères que l'on regarde comme les preuves de la virginité , c'est-à-dire , ni la membrane de l'hymen , ni les caroncules , dans les filles qu'ils ont disséquées , même avant l'âge de puberté. Ceux même qui soutiennent au contraire que cette membrane & ces caroncules existent , avouent en même-tems que ces parties varient de forme , de grandeur & de consistance dans les différents sujets. Que peut-on conclure de ces observations , sinon que les causes du prétendu rétrécissement de l'entrée du vagin , ne sont pas constantes , & qu'elles n'ont tout au plus qu'un effet passager , qui est susceptible de différentes modifications.

On a cru dans tous les tems que l'effusion du sang étoit une preuve réelle de la virginité ; cependant il est évident que ce prétendu signe est nul dans toutes les circonstances où l'entrée du vagin a pû être relâchée ou dilatée naturellement : ainsi toutes les filles , quoique non déflorées , ne répandent pas du sang ; d'autres qui le font en effet , ne laissent pas d'en répandre : il y en a même , dont la prétendue virginité s'est renouvelée jusqu'à quatre & cinq fois , dans l'espace de deux ou trois ans , & même tous les mois.

Rien donc de plus chimérique , que les préjugés des hommes à cet égard , & rien de plus incertain que ces prétendus signes de la virginité du corps. Les hommes devraient donc bien se tranquilliser sur tout cela , au lieu de se livrer , comme ils font souvent , à des soupçons injustes , ou à de fausses joies , selon ce qu'ils s'imaginent avoir rencontré.

Quel contraste dans les goûts & dans les mœurs des différentes nations ! quelle contrariété dans leur façon de penser ! Après le cas que nous voyons que la plupart des hommes font de la virginité , imagineroit-on que certains peuples la méprisent , & qu'ils regardent comme un ouvrage servile la peine qu'il faut prendre pour l'ôter ! La superstition a porté certains peuples à céder les prémices des Vierges aux Prêtres de

leurs Idoles , ou à en faire une espece de sacrifice à l'Idole même. Les Prêtres des Royaumes de Cochin & de Calicut jouissent de ce droit , & chez les Canarins de Goa , les Vierges sont prostituées de gré ou de force par leurs plus proches parents à une Idole de fer : la superstition de ces peuples , leur fait commettre ces excès dans des vues de Religion. Au Royaume d'Arracan & aux Isles Philippines , un homme se croiroit déshonoré s'il épousoit une fille qui n'eût pas été déflorée par un autre , & ce n'est qu'à prix d'argent que l'on peut engager quelqu'un à prévenir l'époux. Dans la Province de Thibet les meres cherchent des étrangers qu'elles prient instamment de mettre leurs filles en état de trouver des maris. A Madagascar les filles les plus débauchées sont les plutôt mariées ! Quelle grossiereté ! Les Anciens avoient au contraire tant de respect pour les Vierges , que lorsqu'elles étoient condamnées au supplice on ne les faisoit point mourir sans leur avoir auparavant ôté la virginité.

Le mariage est l'état qui convient à l'homme , & dans lequel il doit faire usage des nouvelles facultés qu'il a acquises par la puberté. C'est à cet âge que tout le sollicite à la génération : mille impressions ébranlent son genre nerveux & le portent à éprouver cet état dans lequel il ne sent plus son existence , que par celle de ce sens voluptueux , qui semble alors devenu le siege de son ame , qui absorbe toute la sensibilité dont il est susceptible , qui en porte l'intensité à un point qui rend cette impression si forte , qu'elle ne peut être soutenue long-tems sans un désordre général dans toute la machine. En effet la durée de ce sentiment ou de ces facultés est telle , qu'elle deviendrait quelquefois funeste à l'homme qui jouiroit trop , ou il en feroit de même s'il s'obstinoit à garder le célibat. Le trop long séjour de la liqueur séminale dans ses réservoirs , peut causer par sa qualité stimulante , des maladies dans l'un & l'autre sexe. Les irritations peuvent devenir si violentes , qu'elles rendroient l'homme semblable aux animaux , qui sont furieux & indomptables lorsqu'ils ressentent ces impressions.

L'effet extrême de cette irritation dans les femmes , est la *nymphomanie* , c'est-à-dire , la fureur utérine : mais le tempérament opposé est infiniment plus commun parmi les femmes ; la plupart sont naturellement froides , ou tout au moins fort tranquilles sur le physique de l'amour.

Au reste , les excès sont plus à craindre que la continence ; le nombre des hommes immodérés , ou *priapomanes* , est assez grand , pour en donner des exemples : les uns ont perdu la mémoire , les autres ont été privés de la vue , d'autres sont devenus chauves , d'autres ont péri d'épuisement ; la saignée est , comme l'on fait , mortelle en pareil cas. Les personnes sages ne peuvent trop avertir les jeunes gens du tort irréparable qu'ils courent risque de faire à leur santé ; & les parents aux soins desquels ils sont confiés doivent avoir la plus grande attention de les détourner de ces dangereux excès , par tous les moyens possibles. Combien n'y en a-t-il pas qui cessent d'être hommes , ou du moins qui cessent d'en avoir les

facultés , avant l'âge de trente ans ? Pourquoi forcer la nature , il suffit d'obéir , ou de répondre quand elle nous interroge : telle est donc la disposition physique que l'Auteur de la nature , ce Conservateur suprême de l'espece & de l'individu , a voulu employer pour porter l'homme par l'attrait du plaisir à travailler à se produire , à se conserver , &c.

L'objet du mariage est d'avoir des enfants ; mais quelquefois cet objet ne se trouve pas rempli. Dans les différentes causes de la stérilité , il y en a de communes aux hommes & aux femmes ; mais comme elles sont plus apparentes dans les hommes , on les leur attribue communément. La cause de la stérilité la plus ordinaire aux hommes & aux femmes , c'est l'altération de la liqueur séminale dans les testicules. Dans les cas de stérilité , on a souvent employé plusieurs moyens pour savoir si le défaut venoit de l'homme ou de la femme. L'inspection est le premier de ces moyens : il y a des hommes qui , à la première inspection , paroissent être bien conformés , auxquels cependant le vrai signe de la bonne conformation manque absolument ; il y en a d'autres qui n'ont ce signe que si imparfaitement ou si rarement , que c'est moins un signe certain de la virilité , qu'un indice équivoque de l'impuissance.

Au reste , lorsqu'il n'y a aucun défaut de conformation à l'extérieur dans les hommes , que l'érection & l'éjaculation ont lieu , la stérilité vient alors le plus ordinairement des femmes ; car indépendamment de l'effet des fleurs blanches , qui , quand elles sont continuelles , doivent causer , ou du moins occasionner la stérilité , les testicules des femmes éprouvent des changements & des altérations considérables. Ajoutez que les défauts de conformation de la matrice & du vagin , le tempérament trop ou trop peu sensible , sont encore des vices physiques pour l'acte de la génération.

Dans le cours ordinaire de la nature , les femmes ne sont en état de concevoir , qu'après la première éruption des regles ; & la cessation de cet écoulement , qui arrive ordinairement à l'âge de quarante ou cinquante ans , les rend stériles pour le reste de leur vie : on en a cependant vu qui sont devenues meres avant que d'être sujettes au moindre écoulement périodique , & d'autres qui ont conçu à soixante & soixante & dix ans , & même dans un âge plus avancé. On regardera si l'on veut ces exemples , quoiqu'assez fréquents , comme des exceptions à la regle ; mais ces exceptions suffisent pour faire voir que la matière des menstrues n'est pas essentielle à la génération.

L'âge auquel l'homme peut engendrer n'a pas des termes aussi marqués ; il faut que le corps soit parvenu à un certain point d'accroissement , pour que la liqueur séminale soit produite ; cela arrive ordinairement entre douze & dix-huit ans. A soixante ou soixante & dix ans , lorsque la vieillesse commence à énerver le corps , la liqueur séminale est moins abondante , & souvent elle n'est plus prolifique : cependant on a vu plusieurs exemples de vieillards , qui ont engendré jusqu'à quatre-vingt & quatre-vingt-dix ans ; on a vu aussi de jeunes garçons qui ont engendré à l'âge de

neuf, dix & onze ans, & de petites filles qui ont conçu à sept, huit & neuf ans; mais ces faits extrêmement rares, peuvent être regardés comme des phénomènes.

De la conception, de la grossesse, du fœtus, de son accroissement, & de l'accouchement.

Les signes que quelques Auteurs ont indiqués pour reconnoître si une femme a conçu, tels que le saisissement & le froid convulsif, *horripilatio*, que quelques femmes doivent avoir ressenti au moment de la conception, ne sont que des signes très équivoques; car d'autres femmes assurent au contraire avoir ressenti une ardeur brûlante, causée par la chaleur de la liqueur féminale de l'homme; & le plus grand nombre avouent n'avoir rien ressenti de tout cela, sinon le terme du prurit vénérien qui succede au plus grand degré d'orgasme. Mais les symptômes qui, dans les premiers mois, font reconnoître aux femmes qu'elles sont grosses, sont moins équivoques; savoir, un engourdissement dans les lombes, un assoupissement presque continuel, une mélancolie qui les rend tristes & quelquefois capricieuses, des douleurs de dents, la pâleur & des taches dans le visage, les paupieres affaissées, les yeux jaunes, le goût dépravé, le dégoût, le vomissement, la cessation de l'écoulement périodique, la sécrétion du lait dans les mamelles, enfin le mouvement du fœtus, l'enflure particuliere & dure de l'hypogastre.

La grossesse est le tems pendant lequel une femme qui a conçu, porte dans son sein le fruit de la fécondation: ce tems qui désigne l'état d'une femme enceinte, prend date depuis le moment où la faculté prolifique a été réduite en acte, & où toutes les conditions requises de la part de l'un & de l'autre sexe ont concouru à jeter les fondements du fœtus mâle ou femelle, dont la sortie est le terme. Aussi-tôt que la grossesse est déclarée, dit l'Auteur de l'*Essai sur la maniere de perfectionner l'espece humaine*, la femme doit tourner toutes ses vues sur elle-même, & mesurer ses actions aux besoins de son fruit; elle devient alors la dépositaire d'une créature nouvelle; c'est un abrégé d'elle-même, qui n'en diffère que par la proportion & le développement successif de ses parties.

L'exposition de ce qui se passe pendant la grossesse, n'étant donc que l'histoire de la formation du fœtus humain, de son développement, de la maniere particuliere dont il vit, dont il se nourrit, dont il croît dans le sein de sa mere, & dont se font toutes ces différentes opérations de la Nature à l'égard de l'un & de l'autre, c'est proprement l'histoire du fœtus qu'il s'agit de placer ici.

Nous disons que lorsque la conception a lieu, la semence du mâle s'introduit dans la matrice de la femelle; & il y a apparence qu'après le mélange des deux liqueurs féminales, tout l'ouvrage de la génération est dans la matrice sous la forme d'un petit globe. Trois ou quatre jours après la

conception, il y a dans la matrice une bulle ovale, qui a dix lignes dans un de ses diamètres. Sept jours après, on y peut appercevoir quelques petites fibres réunies, qui sont les premières ébauches du fœtus. Ces premiers linéaments ne paroissent être qu'une masse d'une gelée presque transparente. Quinze jours après, on commence à bien distinguer la tête, & à reconnoître les traits les plus apparents du visage; le nez n'est encore qu'un petit filet prééminent, & perpendiculaire à une ligne qui indique la séparation des deux levres; on voit deux points noirs à la place des yeux, deux petits trous à celle des oreilles: ainsi la bouche, le conduit intestinal jusqu'à l'anus, la moëlle allongée, à la prendre depuis le cerveau jusqu'à son extrémité inférieure, sont les parties molles qui paroissent se former les premières. A un mois, le fœtus a plus d'un pouce de longueur; la figure humaine n'est plus équivoque; toutes les parties de la face sont déjà reconnoissables; toutes les parties du corps sont dessinées. A six semaines, le fœtus a près de deux pouces de longueur: on apperçoit à-peu-près dans ce temps le mouvement du cœur; on y distingue des marques sensibles du sexe dont il est. Toute cette opération est exprimée jusqu'ici par ces deux vers latins:

Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine terni,

Bis senum carnes, ter senum membra figurant.

ce qui signifie: *la semence reste dans la matrice pendant six jours sous la forme laiteuse: elle passe à l'état sanguinolent, & y reste pendant neuf jours; puis est douze jours à prendre la forme de chair: enfin, les membres sont organisés au bout de dix-huit autres jours; ce qui forme un espace de quarante-cinq jours.* Si cependant ce bel ouvrage de la Nature, plus ou moins avancé, reçoit des troubles & des commotions trop fortes dès ses premiers jours d'arrangement: que, par exemple, le suc nourricier manque ou soit détourné du vrai germe avant qu'il ait acquis un commencement de solidité, de *vrai germe* il devient *faux germe*; ses premiers linéaments s'effacent & se détruisent par le long séjour qu'il fait encore dans la matrice avant que d'être expulsé: dans les mêmes instants, ce n'est plus qu'une congélation féminale flottante & opaque, ou un corps informe, qui venant à être expulsé ou à tomber, produit la *fausse couche* la plus ordinaire. Mais reprenons le détail d'une conception bien conditionnée. A deux mois le fœtus a plus de deux pouces de longueur: l'ossification commence par des points osseux au milieu du bras, de l'avant-bras, &c. mais les clavicules sont déjà ossifiées en entier, & l'on peut dire que les os qui ont part à la composition des organes des sens, ou qui sont destinés à leur conservation, sont les premiers perfectionnés dans le fœtus. A trois mois, le fœtus a plus de trois pouces, & pèse environ trois onces; c'est à-peu-près dans ce tems que la mère commence à en sentir le mouvement, mais cela dépend de la plus ou moins grande sensibilité de la mère. Quatre mois &

de mi après la conception , la longueur du fœtus est de six à sept pouces ; les ongles paroissent aux doigts & aux mains : toutes les parties de son corps sont repliées de maniere à occuper le moins de place possible ; les genoux touchent presque aux joues. Plusieurs observations prouvent que le fœtus prend dans la matrice des situations différentes , suivant les diverses attitudes du corps de la mere. Il est ordinairement placé les pieds en bas , le derriere appuyé sur les talons , la tête inclinée sur les genoux , les mains sur la bouche , les pieds tournés en dedans , & il nâge comme une espece de vaisseau dans l'eau contenue par les membranes qui l'environnent , sans que la mere en ressentie d'autre incommodité que le mouvement que le fœtus fait tantôt à droite , tantôt à gauche. Mais une fois que la tête vient à grossir assez pour rompre cet équilibre , elle fait la culbure & tombe en bas , la face tournée vers l'os sacrum , & le sommet vers l'orifice de la matrice : ceci se fait six semaines ou deux mois avant l'accouchement. Lorsque le tems de sortir est arrivé , le fœtus se trouvant trop serré dans la matrice , fait effort pour en sortir , la tête la premiere. Enfin , dans le moment de l'accouchement , le fœtus en réunissant ses propres forces à celles de sa mere , ouvre l'orifice de la matrice autant qu'il est nécessaire pour se faire passage. Il arrive quelquefois que le fœtus sort de la matrice sans briser son enveloppe , comme cela arrive dans l'accouchement des animaux ; mais communément le fœtus , par son effort , brise son enveloppe , dont une partie lui reste quelquefois sur la tête ; c'est ce que l'on appelle *naître coëffé*. La liqueur qui sort pendant l'accouchement , se nomme le bain ou les eaux de la mere. Ce bain naturel qui met le fœtus à couvert des injures extérieures , en éludant la violence des coups que la femme grosse peut recevoir sur le ventre , défend aussi par la même raison la matrice des secousses & des frottements causés par les mouvements du fœtus : enfin , ces eaux servent à faciliter la sortie de l'enfant dans le tems de l'accouchement , en rendant les passages plus souples. Lorsque le fœtus est sorti , le cordon ombilical entraîné par son poids ou par la main de la Sage-femme , attire le placenta & les autres membranes : on noue ce cordon à un doigt de distance du nombril , & on le coupe à un doigt au-dessus de la ligature ; le reste se desseche. Le cordon ombilical est composé de deux arteres & d'une veine ; son usage dans le fœtus étoit de prolonger le cours de la circulation du sang : les extrémités de ces vaisseaux se divisent en ramifications , & forment ce qu'on appelle le placenta. Le fœtus ne respire point dans le sein de sa mere : ainsi ce que l'on dit des cris des enfants dans le sein de leur mere , ne doit être regardé que comme une fable.

La durée de la grossesse est ordinairement de neuf mois , quelquefois plus ou moins ; mais le tems ordinaire s'étend à vingt jours de différence ; c'est-à-dire depuis huit mois & quatorze jours jusqu'à neuf mois & quatre jours. Le commencement du septieme mois est le plus court terme de

la grossesse ; le fœtus sorti plutôt avorte. Les femmes qui ont fait plusieurs enfants, assurent presque toutes que les femelles naissent plus tard que les mâles. Voyez la *Dissertation des naissances tardives*.

Il est plus ordinaire de voir des femmes n'avoir qu'un enfant à la fois qu'un plus grand nombre. Lorsqu'elles en portent deux, trois, ou plus, on les trouve très rarement sous la même enveloppe ; & leurs placentas, quoiqu'adhérents, sont presque toujours distincts : mais cette pluralité de fœtus dans une seule grossesse, cette fécondité de différents individus vivants, tient-elle au mystère de la *superfœtation* ? C'est un point sur lequel on est partagé.

Les preuves de la superfœtation (phénomène qui a été contesté) se multiplient de plus en plus. En 1753, une femme de Louviers accoucha successivement en trois mois de trois enfants qui furent baptisés. En 1755, une femme de dix huit ans, mariée en Angleterre près de Katwyk sur mer, à un homme veuf de soixante ans, qui n'avait point eu d'enfants de sa première femme, y accoucha le matin d'un garçon vivant ; le même jour au soir elle fut encore délivrée d'un enfant de six mois, & le lendemain il en vint un troisième d'environ trois mois. Voici un autre fait presque incroyable, quoique récent. En 1755 le 21 Mars, on présenta à l'Impératrice de Russie, un Payfan Moscovite nommé *Jacques Kyrloff*, & sa femme. Ce payfan, marié en secondes nœces, étoit âgé de soixante & dix ans : sa première femme étoit accouchée vingt-une fois ; savoir, quatre fois de quatre enfants, sept fois de trois, & dix fois de deux : total cinquante-sept enfants qui vivoient alors. Sa seconde femme qui l'accompagnoit, comptoit déjà sept couches, une de trois enfants à la fois, & six de deux jumeaux chacune, ce qui faisoit quinze enfants pour sa part. Ainsi le Patriarche Moscovite avoit eu jusqu'alors soixante & douze enfants. Quelle étrange fécondité ! quelle vue peut avoir la Nature de produire deux jumeaux, un enfant à deux têtes, à deux corps, à quatre bras, &c. ? Voy. MONSTRE. Pourquoi les enfants ressemblent-ils tantôt à leur pere, tantôt à leur mere ? C'est à-peu-près les mêmes difficultés pour les différentes marques de naissance que l'on rapporte à une imagination frappée.

De la circoncision, de l'infibulation, & de la castration.

La circoncision, l'infibulation & la castration sont des faits trop essentiels dans l'histoire de l'homme, pour n'en point parler.

La circoncision est un usage extrêmement ancien, & qui subsiste encore dans la plus grande partie de l'Asie. On croit que les Turcs & plusieurs autres Peuples auroient naturellement le prépuce trop long, si l'on n'avoit pas la précaution de le couper ; & que sans la circoncision, certains Peuples, tels que les Arabes, seroient inhabiles à la génération.

La circoncision a lieu aussi pour les filles ; car dans quelques contrées d'Arabie,

d'Arabie , de Perse , d'Afrique , l'accroissement des nymphes devient trop considérable , & nuiroit aussi à la génération , si l'on ne prévenoit cet inconvénient par la circoncision.

Cette opération peut donc être fondée sur la nécessité , & elle a du moins pour objet la propreté ; mais l'infibulation & la castration ne peuvent avoir d'autre origine que la jalousie ou l'intérêt.

L'infibulation pour les garçons se fait en tirant le prépuce en avant ; on le perce , & on y met un anneau assez grand , qui doit rester en place aussi long-tems qu'il plaît à celui qui a ordonné l'opération , & quelquefois toute la vie. Ceux qui , parmi les Moines Orientaux , font vœu de chasteté , portent ainsi un très grand anneau , pour se mettre dans l'impossibilité d'y manquer. L'infibulation a lieu aussi chez certains peuples pour les filles & pour les femmes. On ne peut rien imaginer de bizarre & de ridicule sur ce sujet , que les hommes n'aient mis en pratique , ou par passion ou par superstition. Les Ethiopiens , plusieurs autres peuples de l'Afrique , & quelques autres nations de l'Asie , aussi-tôt que leurs filles sont nées , rapprochent , par une sorte de couture , les parties que la Nature a séparées , & ne laissent libre que l'espace qui est nécessaire pour les écoulements naturels : les chairs adhèrent peu-à-peu , à mesure que l'enfant prend son accroissement ; de sorte que l'on est obligé de les séparer par une incision , lorsque le tems du mariage est arrivé. On dit qu'ils emploient pour cette infibulation des filles , un fil d'amiante , parceque cette matiere n'est pas sujette à la corruption. Il y a certains peuples qui passent seulement un anneau : les femmes sont soumises comme les filles à cet usage outrageant ; la seule différence est que l'anneau des filles ne peut s'ôter qu'en le détruisant , & que celui des femmes a une espece de ferrure , dont le mari seul a , dit-on , la clef.

L'usage de la castration des hommes est fort ancien & généralement assez répandu ; c'étoit la peine de l'adultere chez les Egyptiens. Il y a plusieurs especes de castrations : les Hottentots coupent un testicule à leurs enfants , dans l'idée que ce retranchement les rend plus légers à la course ; dans d'autres pays , les pauvres mutilent entierement leurs garçons pour éteindre leur postérité , qui se trouveroit un jour dans la misere. Ceux qui , comme en Italie , n'ont en vûe que la formation ou perfection d'une sorte de voix qui dépare la Nature , se contentent de couper les deux testicules ; mais dans certains pays , & aujourd'hui dans toute l'Asie & dans une partie de l'Afrique , &c. ceux qui sont animés par la défiance qu'inspire la jalousie , ne croiroient pas leurs femmes en sûreté , si elles étoient gardées par des *Eunuques* de cette espece : ils ne veulent se servir que de ceux auxquels on a retranché toutes les parties extérieures de la virilité.

L'amputation n'est pas le seul moyen dont on se soit servi ; autrefois on empêchoit l'accroissement des testicules , & l'on en détruisoit l'organisation par le simple frottement , en mettant les enfants dans un bain d'eau chaude , fait de décoction de plantes. On prétend que cette sorte de cas-

tration ne fait courir aucun risque pour la vie. L'amputation des testicules n'est pas fort dangereuse ; on la peut faire à tout âge , cependant on préfère le tems de l'enfance : mais l'amputation entière des parties extérieures de la génération , est le plus souvent mortelle. On ne peut faire cette opération sur les enfants que depuis l'âge de sept ans jusqu'à dix : la difficulté qu'il y a de sauver ces sortes d'Eunuques dans cette opération , fait qu'ils coutent en Turquie cinq ou six fois plus cher que les autres. Quoique , selon Chardin , cette opération soit si douloureuse & si dangereuse passé l'âge de quinze ans , qu'à peine en réchappe-t-il un quart de ceux qui la subissent , Pietro della Vallé dit qu'en Perse , ceux à qui on fait subir cette infâme & cruelle opération , pour punition du viol & d'autres crimes de ce genre , en guérissent fort heureusement , quoiqu'avancés en âge , & qu'on n'applique que de la cendre sur la plaie.

Il y a à Constantinople , dans toute la Turquie , en Perse , des Eunuques dont le teint est gris : ils viennent pour la plupart du Royaume de Golconde , de la presque Isle en-deçà du Gange , des Royaumes d'Assan , d'Aracan , de Pégu & du Malabar. Ceux du golfe de Bengale sont de couleur olivâtre. Il y en a de blancs , mais en petit nombre ; ils viennent de Georgie & de Circassie. Les noirs viennent d'Afrique , principalement d'Ethiopie ; ceux-ci sont d'autant plus recherchés & plus chers , qu'ils sont plus horribles. Il paroît qu'il se fait un commerce considérable de cette espece d'hommes neutres dans la Société ; car Tavernier dit , qu'étant au Royaume de Golconde , en 1657 , on y fit jusqu'à vingt-deux mille Eunuques.

Les Eunuques auxquels on n'a ôté que les testicules , ne laissent pas de sentir de l'irritation dans ce qui leur reste , & d'en avoir le signe extérieur même plus fréquemment que les autres hommes ; mais cette partie ne prend qu'un très petit accroissement , & demeure à-peu-près dans le même état où elle étoit à l'âge où l'on a fait l'opération.

Si l'on considère avec attention ces différentes especes d'Eunuques , l'on reconnoît presque toujours que la fatale opération & ses suites leur ont causé des variations plus ou moins sensibles dans la configuration , indépendamment des effets physiques qu'elle produit sur l'homme.

Les Eunuques sont , dit M. Withof , timides , irrésolus , craintifs , soupçonneux , inconstants ; & cela parceque leur sang n'a pas reçu toute l'élaboration nécessaire en passant par les vaisseaux spermatiques : ainsi en s'éloignant des qualités de l'homme , ils participent aux inclinations de la femme , & leur esprit même est d'un sexe mitoyen. Ils ont cependant quelques avantages : ils deviennent plus grands & sont plus gras pour l'ordinaire que les autres hommes. Si les Eunuques abondent plus en matieres huileuses , ils sont aussi moins sujets à la goutte & à la folie , que les hommes qui abondent plus en sang & en humeurs atrabilaires : la liqueur oléagineuse qui circule abondamment chez eux , empêche les inégalités dans la trachée artère & dans le palais ; ce qui , joint à la flexibilité de l'épiglotte & des autres organes de la voix , rend la leur si sonore & si étendue , &

même si douce , qu'il est presque impossible à un Eunuque de prononcer distinctement la lettre *R*. Cet avantage factice suffit-il pour consoler ces malheureux de la barbarie de leurs peres ? On ne peut réfléchir sur tous les motifs qui produisent des Eunuques , sans jeter un cri de douleur & de pitié. Qu'on ne croie pas , au reste , qu'une aussi odieuse cruauté produise infailliblement le fruit qu'on en espere quelquefois (l'étendue factice & étrangere de la voix de dessus) ; de deux mille victimes sacrifiées au luxe & aux bifarrerries de l'art , à peine trouve-t-on trois sujets qui réunissent le talent & l'organe : toutes les autres créatures oisives & languissantes , ne sont plus que le rebut des deux sexes , des membres paralytiques de la Société , un fardeau inutile & flétrissant de la terre qui les a produits , qui les nourrit & qui les porte.

Il y a des rapports singuliers , dont nous ignorons les causes , entre les parties de la génération & celles de la gorge : les Eunuques n'ont point de barbe ; leur voix , quoique forte & perçante , n'est jamais d'un ton grave. Souvent les maladies secretes se montrent à la gorge. La correspondance qu'ont certaines parties du corps fort éloignées & fort différentes , & qui est ici remarquée , pourroit s'observer bien plus généralement ; mais on ne fait pas assez d'attention aux effets , lorsqu'on ne soupçonne pas quelles en peuvent être les causes : c'est sans doute par cette raison , dit M. de Buffon , qu'on n'a jamais songé à examiner avec soin ces correspondances dans le corps humain. Il y a dans les femmes une grande correspondance entre la matrice , les mammelles & la tête : combien n'en trouveroit-on pas d'autres , si de grands Médecins tournoient leurs vues de ce côté-là !

On peut observer que cette correspondance , entre la voix & les parties de la génération , ne se reconnoît pas seulement dans les Eunuques : la voix change dans les hommes à l'âge de puberté ; & les femmes qui ont la voix forte sont soupçonnées d'avoir plus de penchant à l'amour. Voyez , ci-après , *l'article ÉCONOMIE ANIMALE* , où est inséré le mécanisme de la voix.

Dans l'enfance il n'y a quelquefois qu'un testicule dans le scrotum , & quelquefois point du tout. On ne doit cependant pas toujours juger que les jeunes gens qui sont dans l'un ou dans l'autre de ces cas , soient en effet privés de ce qui paroît leur manquer. A l'âge de huit ou dix ans , ou même simplement à l'âge de puberté , la Nature fait un effort qui les fait paroître au dehors ; cela arrive aussi quelquefois par l'effet d'une maladie ou d'un mouvement violent , tel qu'un saut ou une chute , &c. Quand même les testicules ne se manifesteroient pas , on n'en est pas moins propre à la génération ; l'on a même observé que ceux qui sont dans cet état , ont plus de vigueur que les autres.

Il se trouve aussi des hommes qui n'ont quelquefois qu'un testicule , ce défaut ne nuit pas à la génération ; l'on a observé que le testicule qui est seul est alors beaucoup plus gros qu'à l'ordinaire. Il y a aussi des

hommes qui en ont trois ; ils sont , dit-on , beaucoup plus vigoureux & plus forts de corps que les autres. On peut voir par l'exemple des animaux , combien ces parties contribuent à la force & au courage : quelle différence entre un taureau & un bœuf , un belier & un mouton , un coq & un chapon !

Age viril.

Le corps acheve de prendre son accroissement en hauteur à l'âge de la puberté , & pendant les premières années qui succèdent à cet âge. Il y a des jeunes gens qui ne grandissent plus après la quatorzième ou la quinzième année de leur âge , d'autres croissent jusqu'à vingt & vingt-trois ans. Dans cet âge ils sont presque tous effilés , mais peu-à-peu les membres se moulent & s'arrondissent , & le corps dans les hommes est avant l'âge de trente ans dans son point de perfection pour les proportions de sa forme ; le corps de la femme parvient bien plutôt à ce point de perfection.

Le corps de l'homme bien fait doit être carré , les muscles doivent être durement exprimés , le contour des membres fortement dessiné , les traits du visage bien marqués. Dans les femmes tout est plus arrondi , les formes sont plus adoucies , les traits plus fins , & le teint plus éclatant. L'homme a la force & la majesté ; les graces & la beauté sont l'appanage de l'autre sexe.

Tout annonce dans tous deux les maîtres de la Terre : tout marque dans l'homme , même à l'extérieur , sa supériorité sur les êtres vivants ; il se tient droit & élevé , son attitude est celle du commandement ; sa tête regarde le Ciel & présente une face auguste , sur laquelle est imprimé le caractère de sa dignité : l'image de l'ame y est peinte par la physionomie ; l'excellence de sa nature perce à travers les organes matériels , & anime d'un feu divin les traits de son visage ; son port majestueux , sa démarche ferme & hardie annoncent sa noblesse & son rang ; il ne touche à la terre que par les extrémités les plus éloignées , il ne la voit que de loin , & semble la dédaigner.

Lorsque l'ame est tranquille , toutes les parties du visage sont dans un état de repos ; leur proportion , leur union , leur ensemble marquent encore assez la douce harmonie des pensées. Mais lorsque l'ame est agitée , la face humaine devient un tableau vivant , où les passions sont rendues avec autant de délicatesse que d'énergie , où chaque mouvement de l'ame est exprimé par un trait , chaque action par un caractère , dont l'impression vive & prompt devance la volonté , nous décele , & rend au dehors , par des signes pathétiques , les images de nos secrètes agitations.

La bouche & les levres sont , après les yeux , les parties du visage qui ont le plus de mouvement & d'expression ; les passions influent sur ces mouvemens , la bouche en marque les différens caractères par les différentes formes qu'elle prend ; l'organe de la voix anime encore cette partie ;

& la rend plus vivante que toutes les autres. Les bras , les mains & tout le corps entrent aussi dans l'expression des passions.

Quoique le corps de l'homme soit à l'extérieur plus délicat que celui d'aucun des animaux , il est cependant très nerveux , & peut-être plus fort par rapport à son volume , que celui des animaux les plus forts. On assure que les porte-faix ou crocheteurs de Constantinople portent des fardeaux de neuf cents livres pesans. On raconte mille choses prodigieuses de la légèreté des Sauvages à la course : l'homme civilisé ne connoît pas ses forces , il ne fait pas combien il en perd par la mollesse , & combien il pourroit en acquérir par l'habitude d'un fort exercice.

De la vieillesse , & de la mort.

M. Busching dit , d'après M. Süssmich , que dans un tems donné le nombre de ceux qui naissent , surpasse presque toujours celui de ceux qui meurent ; par conséquent le nombre des hommes va toujours en augmentant. C'est une chose connue , que sans les fléaux de la guerre , de la peste , de la famine , du célibat , &c. notre terre seroit infiniment plus peuplée. En campagne les listes des morts font voir qu'il naît plus de garçons que de filles : c'est le contraire à la Ville , où le nombre des femmes est ordinairement plus grand. Au reste l'espèce humaine est plus vivace dans les contrées septentrionales , que dans celles du midi.

Le corps de l'homme n'est pas plutôt arrivé à son point de perfection , qu'il commence à décheoir : le dépérissement est d'abord insensible ; mais avec le tems les membranes deviennent cartilagineuses , les cartilages deviennent osseux , les os deviennent plus solides , toutes les fibres plus dures , presque toute la graisse se consume , la peau se dessèche , devient écailleuse , les rides se forment peu-à-peu , les cheveux blanchissent , les dents tombent , le visage se déforme , le corps se courbe. Les premières nuances de cet état se font appercevoir avant quarante ans ; elles augmentent par degrés assez lents jusqu'à soixante , par degrés plus rapides jusqu'à soixante dix : la caducité commence à cet âge , & elle va toujours en augmentant ; la décrépitude suit ; & la mort termine ordinairement avant l'âge de quatre-vingt-dix ou cent ans la vieillesse & la vie. Le corps meurt donc peu-à-peu & par partie , son mouvement diminue par degrés , la vie s'éteint par nuances successives , & la mort n'est que le dernier terme de cette suite de degrés , la dernière nuance de la vie. Comme les os , les cartilages , les muscles & toutes les parties qui composent le corps , sont moins solides & plus mous dans les femmes que dans les hommes , il faudra plus de tems pour que ces parties prennent cette solidité qui cause la mort ; les femmes par conséquent doivent avoir une vieillesse plus longue que les hommes ; c'est aussi ce qui arrive : & on a observé , en consultant les tables que l'on a faites sur la mortalité du genre-humain , que quand les femmes ont passé un certain âge elles vivent

ensuite plus long-tems que les hommes. Ainsi il est d'expérience que la jeunesse des femmes est plus courte & plus brillante que celle des hommes, mais que leur vieillesse est plus fâcheuse & plus longue, *citiùs pubescunt, citiùs senescunt*. Au reste voyez les Tables de mortalité que M. de Parcieux a faites à ce sujet.

Cette cause de la mort naturelle est générale & commune à tous les animaux, & même aux végétaux. On peut observer dans le chêne que c'est le centre qui se désorganise le premier & tombe en poussière; car ces parties devenant trop compactes, ne peuvent plus recevoir de nourriture.

La durée totale de la vie peut se mesurer, en quelque façon, par celle du tems de l'accroissement; un arbre ou un animal qui prend en peu de tems tout son accroissement, périt beaucoup plutôt qu'un autre auquel il faut plus de tems pour croître. L'homme qui est trente ans à croître en hauteur & en grosseur, vit nonante ou cent ans; le chien qui ne croît que pendant deux ou trois ans, ne vit aussi que dix ou douze ans.

Les causes de notre destruction sont donc nécessaires, & la mort inévitable; il ne nous est pas plus possible d'en reculer le terme fatal, que de changer les loix de la Nature. Les hommes les plus vieux, sont ceux dont l'accroissement n'a été parfait que dans un âge déjà avancé, & dont les appétits, les passions ont été tranquilles. On en a des exemples en considérant les vies & les mœurs, 1°. de Henri Jankins, Anglois, mort en 1670, âgé de cent soixante-neuf ans; 2°. de Jean Rovin, né à Szatlova-Carants-Betcher, dans le Bannat de Temeswar, lequel a vécu cent soixante-douze ans, & sa femme cent soixante-quatre ans, ayant été mariés ensemble cent quarante-sept ans; le cadet de leur fils, quand Rovin mourut, avoit quatre-vingt-dix-neuf ans; 3°. de Pierre Zorten, paysan du même pays, mort âgé de cent quatre-vingt-cinq ans en 1724; le cadet de ses fils avoit alors quatre-vingt-dix-sept ans. On voit à Bruxelles, dans la Bibliothèque du Prince Charles, l'histoire & les portraits en pieds de ces trois centenaires.

Variétés dans l'espece humaine, &c.

La premiere & la plus remarquable de ces variétés est celle de la couleur; la seconde est celle de la forme; & la troisieme est celle du naturel des différens peuples. En parcourant la surface de la terre pour connoître les variétés qui se rencontrent entre les hommes de différens climats, & en commençant par le Nord, on trouve en Laponie & sur les côtes septentrionales de la Tartarie une race d'hommes d'une petite stature, d'une figure bizatre, dont la physionomie est aussi sauvage que les mœurs. Ces hommes qui paroissent avoir dégénéré de l'espece humaine, ne laissent pas d'être assez nombreux, & d'occuper de vastes contrées. Tous ces peuples ont le visage large & plat, le nez camus & écrasé, l'iris de l'œil jaune, brune & tirant sur le noir, les paupieres allongées & tirées vers les

temples , les joues extrêmement élevées , la bouche très grande , le bas du visage étroit , les lèvres grosses & élevées , la voix grêle , la tête grosse , les cheveux noirs & lisses , la peau basanée ; trapus quoique maigres , la plupart n'ont que quatre pieds de hauteur. Chez tous ces peuples , les femmes sont aussi laides que les hommes , & leur ressemblent si fort qu'on ne les distingue pas d'abord. Celles de Groenland sont de fort petite taille ; elles ont le corps bien proportionné , mais leurs mamelles sont molles , & si longues qu'elles donnent à tetter à leurs enfans par-dessus l'épaule ; le bout de ces mamelles est noir comme du charbon , & la peau de leur corps est de couleur olivâtre très foncée. Ces peuples , qui se ressemblent tous à l'extérieur , ont aussi tous à-peu-près les mêmes inclinations & les mêmes mœurs ; ils sont tous également grossiers & stupides. Ils sont tous dans l'usage de plonger les enfans dans l'eau froide au moment de leur naissance (ce qu'un grand-Homme appelle les baigner dans le Styx) , pour les rendre impénétrables aux traits des maladies. Cette coutume se pratique aussi par quelques Anglois.

Tous ces habitans du Nord ont un penchant naturel pour les lieux qui les ont vu naître : ce sentiment est gravé dans presque tous les hommes. Les Lapons vivent sous terre ou dans des cabanes , presque entièrement enterrées & couvertes d'écorces d'arbres ou d'os de poissons. Une nuit de plusieurs mois les oblige de conserver de la lumière dans ce séjour glacé : ils se plaisent même dans cette solitude affreuse. L'été ils sont obligés de vivre dans une épaisse fumée pour se garantir de la piquure des mouches. Avec cette manière de vivre si dure & si triste , ils ne sont presque jamais malades , & ils parviennent tous à une extrême vieillesse , verte & vigoureuse. La seule incommodité à laquelle les vieillards sont sujets , est la cécité ; cette incommodité est occasionnée par l'éclat continuel de la neige pendant l'hiver , l'automne & le printemps , & par la fumée dont ils sont aveuglés pendant l'été.

Dans le Nord de l'Europe les femmes sont fort fécondes ; on dit qu'en Suède elles ont jusqu'à vingt-huit ou trente enfans. Cette fécondité dans les femmes ne suppose pas qu'elles aient plus de penchant à l'amour , puisque les hommes mêmes sont beaucoup plus chastes dans les pays froids que dans les pays chauds. Tout le monde sait que les nations du Nord ont toujours été si fécondes , qu'il en est sorti d'immenses peuplades qui ont inondé toute l'Europe ; c'est ce qui a fait dire à quelques Historiens que le Nord étoit la pépinière des hommes , *Officina gentium*.

Le sang Tartare s'est mêlé d'un côté avec les Chinois , & de l'autre avec les Russes Orientaux , & ce mélange n'a pas fait disparaître en entier les traits de cette race , car il y a parmi les Moscovites beaucoup de visages Tartares ; & quoiqu'en général , cette nation soit du même sang que les autres nations Européennes , on y trouve cependant beaucoup d'individus qui ont la forme du corps carré , les cuisses grosses & les jambes courtes comme les Tartares. Les Calmouques , qui habitent dans le voisinage de la

mer Caspienne , entre les Moscovites & les grands Tartares , sont des hommes robustes , mais les plus laids & les plus difformes qui soient sous le Ciel ; ils ont le visage si plat & si large , que d'un œil à l'autre il y a l'espace de cinq ou six doigts ; leurs yeux sont extraordinairement petits , & le peu qu'ils ont de nez est si plat qu'on n'y voit que deux trous au lieu de narines ; ils ont les genoux tournés en dehors & les pieds en dedans. A mesure qu'on avance vers l'Orient dans la Tartarie indépendante , les traits des Tartares se radoucissent un peu. Les Chinois ne sont pas à beaucoup près aussi différents des Tartares que le sont les Moscovites , il n'est pas même sûr qu'ils soient d'une autre race. Si on les compare aux Tartares par la figure & par les traits , on y trouvera des caractères d'une ressemblance non équivoque. Les Chinois ont en général le visage large , les yeux petits , le nez camus , & presque point de barbe. Les Japonais sont assez semblables aux Chinois , ils sont seulement plus jaunes & plus bruns , parcequ'ils habitent un climat plus méridional : ces peuples ont à-peu-près le même naturel , les mêmes mœurs & les mêmes coutumes que les Chinois. L'une des plus bizarres , & qui est commune à ces deux nations , est de ferrer les pieds des filles dans leur enfance avec tant de violence qu'on les empêche de croître. Une jolie femme de ces pays doit avoir le pied assez petit pour trouver trop aisée la pantoufle d'un enfant de six ans.

Les Siamois , les Péguans , les habitans d'Aracan , de Laos & autres contrées voisines , ont les traits assez semblables à ceux des Chinois ; ils ne diffèrent que du plus ou moins par la couleur. Ces peuples ont , ainsi que tous les peuples de l'Orient , du goût pour les longues oreilles ; les uns tirent leurs oreilles pour les allonger , mais sans les percer ; d'autres , comme au pays de Laos , en agrandissent le tour si prodigieusement qu'on pourroit presque y passer le poing , en sorte que leurs oreilles descendent jusques sur leurs épaules. Les Siamois ont la coutume de se noircir les dents ; cette coutume leur vient de l'idée qu'ils ont que les hommes ne doivent point avoir les dents blanches comme les animaux ; ils se les noircissent avec une espèce de vernis qu'il faut renouveler de tems en tems : quand ils appliquent ce vernis , ils sont obligés de se passer de manger pendant quelques jours , pour donner le tems à cette drogue de s'attacher.

Les habitans du vaste Archipel , connu sous le nom d'Isles Manilles , & des autres Isles Philippines , sont peut-être les peuples les plus mêlés de l'Univers , par les alliances qu'ont faites ensemble les Espagnols , les Indiens , les Chinois , les Malabares & les Noirs. Les Noirs qui vivent dans les rochers & les bois de cette Isle , diffèrent entièrement des autres habitans : quelques-uns ont les cheveux crépus comme les Negres d'Angola , les autres les ont longs ; on en a vu , dit-on , plusieurs parmi eux qui avoient au croupion des queues longues de quatre ou cinq pouces. On voit aussi , au rapport de quelques Voyageurs , dans le Royaume de Lambri , de ces hommes qui ont des queues de la longueur de la main , & qui
ne

ne vivent que dans les montagnes. Quelques-uns disent aussi que l'on voit de ces hommes à queues dans l'Isle Formose ; (ces queues ne sont qu'un prolongement du coccyx). Voici un autre fait qui est également extraordinaire, c'est que dans cette Isle il n'est pas permis aux femmes d'accoucher avant trente-cinq ans, quoiqu'il leur soit libre de se marier long-tems avant cet âge. Lorsqu'elles sont grosses, les Prêtresses vont leur fouler le ventre avec les pieds pour les faire avorter ; ce seroit chez eux non-seulement une honte, mais même un crime, que de laisser venir un enfant avant l'âge prescrit par la Loi.

Les habitans de la Nouvelle Guinée sont noirs, ils ont le visage rond & large avec un gros nez plat : cependant leur physionomie ne seroit pas absolument désagréable, s'ils ne se défigureroient pas le visage par une espee de cheville de la grosseur du doigt & longue de quatre pouces dont ils se traversent les deux narines. Ils ont aussi de grands trous aux oreilles où ils mettent des chevilles comme au nez. Leurs femmes ont de longues mammelles qui leur pendent sur le nombril, le ventre extrêmement gros, les jambes fort menues, les bras de même.

Les habitans de la Nouvelle Hollande sont noirs comme les Negres, grands, droits, menus ; ils tiennent toujours leurs paupieres à demi-fermées, pour garantir leurs yeux des mouchérons qui les incommodent : ceux-ci sont peut-être les gens du monde les plus misérables, & ceux de tous les humains qui approchent le plus des brutes ; ils demeurent en troupes de vingt ou trente, hommes & femmes, pêle-mêle ; ils n'ont point d'habitation, ni d'autre lit que la terre, ils n'ont pour habit qu'un morceau d'écorce d'arbre attaché au milieu du corps en forme de ceinture, ils n'ont ni pain, ni grains, ni légumes ; leur unique nourriture est de petits poissons qu'ils prennent en faisant des réservoirs de pierre dans de petits bras de mer.

Les Mogols & les autres peuples de la presqu'Isle des Indes, ressemblent assez aux Européens par la taille & par les traits, mais ils en different par la couleur : les Mogols, hommes & femmes, sont olivâtres ; les femmes ont les jambes & les cuisses fort longues, & le corps assez court, ce qui est le contraire des femmes Européennes. Tavernier dit que lorsqu'on a passé Lahor & le Royaume de Cachemire, toutes les femmes du Mogol n'ont point de poils à aucune partie du corps, & que les hommes ont peu de barbe. On dit qu'au Royaume de Décan on marie les enfants extrêmement jeunes, les garçons à dix ans & les filles à huit, & il s'en trouve qui ont des enfants à cet âge : mais ces femmes cessent aussi ordinairement d'en avoir avant l'âge de trente ans. Il y a des femmes qui se font découper la peau en fleurs, & la peignent de diverses couleurs avec des jus de racines de leur pays, de manière que leur peau paroît comme une étoffe à fleurs.

Les Bengalois sont plus jaunes que les Mogols : on prétend que leurs femmes sont de toutes celles de l'Inde les plus lascives. On fait à Bengale un grand commerce d'Esclaves mâles & femelles : on y fait aussi beaucoup

d'Eunuques, soit de ceux auxquels on n'ôte que les testicules, soit de ceux auxquels on fait l'amputation totale.

Les habitans de la côte de Coromandel, ainsi que ceux du Malabar, sont très noirs. Les coutumes de ces différents peuples de l'Inde, sont toutes singulieres & bizarres. Les Baniens ne mangent rien de ce qui a eu vie : ils craignent de tuer le moindre insecte, même ceux qui leur sont le plus nuisibles.

Les habitans de Calicut sont olivâtres & ne peuvent prendre qu'une femme, tandis que les femmes nobles peuvent prendre autant de maris qu'il leur plaît. Les meres prostituent leurs filles le plus jeunes qu'elles peuvent. Il y a parmi les Calicutiens des familles qui ont les jambes aussi grosses que le corps d'un autre homme : la peau en est dure & rude comme une verrue ; avec cela, ils ne laissent pas d'être fort dispos. Cette race d'hommes, à grosses jambes, s'est plus multipliée parmi les Naires de Calicut, que dans aucun autre peuple des Indes : on en trouve cependant quelques-uns ailleurs, & sur-tout à Ceylan.

Les habitans de l'Isle de Ceylan sont un peu moins noirs que ceux de la côte de Malabar ; mais il y a dans cette même Isle des especes de Sauvages, que l'on nomme *Bédas*, & qui sont d'un blanc pâle comme quelques Européens : leurs cheveux sont roux : ils ne vivent que dans les bois les plus épais ; & s'y tiennent si cachés, qu'on a de la peine à les découvrir : il y a lieu de penser que ces Bédas de Ceylan, ainsi que les Kacrelas de Java & les Albinois du midi de l'Afrique, pourroient être de race Européenne ; il est très possible que quelques hommes & quelques femmes Européennes aient été abandonnés autrefois dans ces Isles, ou qu'ils y aient abordé dans un naufrage ; & que dans la crainte d'être mal-traités des Naturels du pays, ils soient demeurés eux & leurs descendants, dans les lieux les plus déserts de cette Isle, d'où ils ne sortent que le soir, ne pouvant souffrir la lumière, & continuent à mener la vie des Sauvages, qui, peut-être, a ses douceurs lorsqu'on y est accoutumé.

Les Maldivois sont bien formés & bien proportionnés : il y a peu de différence entr'eux & les Européens, à l'exception qu'ils sont de couleur olivâtre, ainsi que les femmes ; cependant comme c'est un peuple mêlé de toutes les nations, on y voit aussi des femmes très blanches. Les Maldivoises sont extrêmement débauchées, & mettent leur gloire à être indifférentes, infidèles, & à citer leurs bonnes fortunes : elles mangent à tout moment du *bétel* & beaucoup d'épices à leurs repas. Pour les hommes, ils sont beaucoup moins vigoureux qu'il ne conviendrait à leurs femmes.

Goa, qui est le principal établissement des Portugais dans les Indes, est le pays du monde où il se vendoit autrefois le plus d'Esclaves : on y trouvoit à acheter des filles & des femmes, de tous les pays des Indes ; ces Esclaves savent, pour la plupart, jouer des instruments, coudre & broder en perfection : il y en a de blanches, d'olivâtres, de basanées, de toutes couleurs ; celles dont les Indiens sont les plus amoureux, sont les filles Caffres de

Mosambique qui sont toutes noires. Il est à remarquer que la sueur de tous ces peuples Indiens, tant mâles que femelles, n'a point de mauvaise odeur ; au lieu que celle des Negres d'Afrique est des plus désagréables ; lorsqu'ils sont échauffés : elle a, dit-on, l'odeur des poireaux verts. Les femmes Indiennes aiment beaucoup les hommes blancs d'Europe ; & les préfèrent aux blancs des Indes & à tous les autres Indiens.

Les Persans sont voisins des Mogols : aussi les habitans de plusieurs Provinces de Perse ne diffèrent gueres des Indiens, sur-tout ceux des Provinces Méridionales ; mais dans le reste du Royaume, le sang Persan est présentement devenu fort beau, par le mélange du sang Géorgien & Circassien. Ce sont les deux Nations du monde, où la Nature forme les plus belles personnes ; aussi il n'y a presque aucun homme de qualité, en Perse, qui ne soit né d'une mère Géorgienne ou Circassienne. Comme il y a un grand nombre d'années que ce mélange a commencé à se faire, le sexe féminin s'est embelli comme l'autre, & les Persannes sont devenues fort belles & fort bien faites, quoique ce ne soit pas au point des Géorgiennes. Sans ce mélange, les gens de qualité de Perse seroient les plus laids hommes du monde, puisqu'ils sont originaires de la Tartarie, dont les habitans sont laids & mal faits.

On voit en Perse une grande quantité de belles femmes de toutes couleurs, qui y sont amenées de tous les côtés par les Marchands. Les blanches viennent de Pologne, de Moscovie, de Circassie, de Géorgie & des frontières de la grande Tartarie : les basanées, des terres du Grand Mogol, & de celles du Roi de Golconde & du Roi de Visapour : les noires viennent de la côte de Mélinde & de celles de la Mer Rouge.

Les peuples de la Perse, de la Turquie, de l'Arabie, de l'Egypte & de toute la Barbarie, peuvent être regardés comme une même nation, qui, dans le tems de Mahomet & de ses successeurs, s'est extrêmement étendue, a envahi des terrains immenses ; & s'est prodigieusement mêlée avec les peuples de ces pays. Les Princesses & les Dames Arabes qui ne sont point exposées au soleil, sont fort blanches, belles & bien faites : les femmes du commun sont brunes & basanées ; elles se peignent aussi la peau.

Les Egyptiens, quoique voisins des Arabes, & soumis comme eux à la domination des Turcs, ont cependant des coutumes fort différentes des Arabes. Par exemple, dans toutes les Villes & Villages le long du Nil, on trouve des filles destinées aux plaisirs des Voyageurs, sans qu'ils soient obligés de les payer : les gens riches se font, en mourant, un devoir de piété de fonder des Maisons d'hospitalité, & de les peupler de filles, qu'ils font acheter dans ces vues charitables. Les Egyptiennes sont fort brunes ; elles ont les yeux vifs : les hommes sont de couleur olivâtre.

En lisant l'histoire des peuples d'Afrique, on ne peut apprendre sans étonnement, que les habitans des montagnes de la Barbarie sont blancs ; au lieu que les habitans des côtes de la mer & des plaines sont basanés & très bruns. Cette petite élévation au-dessus de la surface de la terre, pro-

duit le même effet que plusieurs degrés de latitude sur sa surface.

Tous les peuples qui habitent entre le vingtième, le trentième & le trente-cinquième degrés de latitude du Nord de l'ancien Continent, ne sont pas fort différents les uns des autres, si l'on excepte les variétés particulières, occasionnées par le mélange d'autres peuples plus septentrionaux. Ils sont tous en général bruns, basanés, mais assez beaux & assez bien faits. Ceux qui vivent dans un climat plus tempéré, tels que les habitants des Provinces septentrionales du Mogol & de la Perse, les Arméniens, les Turcs, les Géorgiens, les Mingréliens, les Circassiens, les Grecs & tous les peuples de l'Europe, sont les hommes les plus beaux, les plus blancs & les mieux faits de toute la terre.

Le sang de Géorgie est encore plus beau que celui de Cachemire : on ne trouve pas un laid visage dans ce pays ; & la Nature y a répandu, sur la plupart des femmes, des graces que l'on ne voit point ailleurs : elles sont grandes, bien faites, extrêmement déliées à la ceinture : elles ont le visage charmant. Les hommes sont aussi fort beaux & grands : ils ont naturellement de l'esprit ; mais il n'y a aucun pays dans le monde où le libertinage & l'ivrognerie soient à un si haut point qu'en Géorgie. C'est particulièrement parmi les jeunes filles de cette nation, que les Rois & les Seigneurs de Perse choisissent ce grand nombre de concubines dont les Orientaux se font honneur. Il y a même des défenses très expresse d'en trafiquer ailleurs qu'en Perse, les filles *Géorgiennes* étant, si l'on peut parler ainsi, regardées comme une marchandise de contrebande, qu'il n'est pas permis de faire sortir hors du pays : il a été cependant stipulé entre le Grand Seigneur & le Roi de Perse, que le sérail Ottoman seroit rempli par choix & à volonté de jeunes *Géorgiennes*. Quoique les mœurs & les coutumes des Géorgiens soient un mélange de celles de la plupart des peuples qui les environnent, ils ont en particulier cet étrange usage, que les gens de qualité y exercent l'emploi de Bourreau ; bien loin qu'il soit réputé infâme en Géorgie, comme dans le reste du monde, c'est un titre aussi glorieux pour les familles de ce pays, que l'impudicité de leurs filles.

Les femmes de Circassie sont fort belles & fort blanches : elles ont si peu de sourcils, qu'on diroit que ce n'est qu'un filet de soie recourbé. L'été les femmes du peuple ne portent qu'une simple chemise, qui est ordinairement bleue, jaune ou rouge ; & cette chemise est ouverte jusqu'à mi-corps : elles ont le sein parfaitement bien fait : elles sont libres avec les étrangers ; mais cependant fidèles à leurs maris, qui n'en sont point jaloux.

Les Mingréliens sont aussi beaux que les Géorgiens & les Circassiens ; & il semble que ces trois peuples ne fassent qu'une seule & même race d'hommes. Il y a en Mingrelie, dit Chardin, des femmes merveilleusement bien faites, d'un air majestueux, de visage & de taille admirables : elles ont, outre cela, un regard engageant, qui caresse tous ceux qui les regardent, & elles tâchent d'inspirer de l'amour, sans cacher celui qu'elles sentent.

Les maris sont très peu jaloux : quand un homme prend sa femme sur le fait avec un galant , il a le droit de le contraindre à payer un cochon ; & d'ordinaire , il ne prend pas d'autre vengeance : le cochon se mange entre eux trois. Ils prétendent que c'est une très bonne & très louable coutume d'avoir plusieurs femmes & concubines , parcequ'on engendre beaucoup d'enfants que l'on vend argent comptant , ou qu'on échange pour des hardes & pour des vivres : voilà toute leur politique & toute leur morale. Au reste , ces Esclaves ne sont pas fort chers ; car les hommes , âgés depuis vingt-cinq jusqu'à quarante ans , ne coûtent que quinze écus ; & les belles filles , d'entre treize & dix-huit ans , vingt écus.

Les Turcs , qui achètent beaucoup de tous ces Esclaves , sont un peuple composé de plusieurs autres peuples. En général les Turcs sont robustes , & assez bien proportionnés : leurs femmes sont belles , blanches & bien faites. On dit que les Turcs , hommes & femmes , ne portent point de poil en aucune partie du corps , excepté les cheveux & la barbe : ils se servent du *rusma* pour l'ôter. *Voyez ce mot.*

Les femmes Grecques sont encore plus belles & plus vives que les Turques : elles ont de plus l'avantage d'une beaucoup plus grande liberté.

Les Grecs , les Napolitains , les Siciliens , les habitants de Corse , de Sardaigne & les Espagnols , étant situés à-peu-près sous le même parallèle , sont assez semblables pour le teint ; tous ces peuples sont plus basanés que les François , les Anglois & les autres peuples moins méridionaux. Lorsqu'on fait le voyage d'Espagne , on commence à s'apercevoir , dès Bayonne , de la différence de couleur : les femmes ont le teint un peu plus brun : elles ont aussi les yeux plus brillants. Les Espagnols sont maigres , assez petits : ils ont la taille fine , la tête belle. Les Voyageurs disent unanimement que la délicatesse de l'organisation fait de l'ame des François une glace qui reçoit tous les objets & les rend vivement. Tout , à la vérité , parle en eux : j'en appelle au témoignage de toutes les nations : la France est le temple du goût , du génie & du sentiment. On dit encore que de toutes les passions , l'amour est celle qui sied le mieux aux femmes & sur-tout aux Françaises ; il est du moins vrai qu'elles portent ce sentiment , qui est le plus tendre caractère de l'humanité , à un degré de délicatesse & de vivacité , où il y a peu de femmes d'autres nations qui puissent atteindre. Leur ame semble n'avoir été faite que pour sentir , elles semblent n'avoir été formées que pour le doux emploi d'aimer & d'être aimées. Leur amour n'est pas plus éphémère que chez nos voisins : les François ne sont pas moins favorisés de la nature. Leur taille est à-peu-près la même que celle des Anglois , mais ceux-ci passent pour être moins enjoués & plus philosophes. On voit souvent en Angleterre des hommes vivre plus d'un siècle , ou acquérir un embonpoint extraordinaire , témoin le Sr. Bright de la Province d'Essex , qui , à l'âge de douze ans pesoit cent quatre-vingt-quatre livres , à vingt ans trois cents trente-

fix, à vingt-neuf ans cinq cents quatre-vingt-quatre, & à trente ans six cents seize livres : cet homme avoit cinq pieds neuf pouces & demi de haut. Dans la même année (1754) mourut à Londres le nommé Pouvel , Boucher , natif de la Province d'Essex , il étoit âgé de trente-sept ans , & il pesoit quatre-cents quatre-vingts livres.

En revenant à l'Afrique , & examinant les hommes qui sont au-delà du Tropique , depuis la mer rouge jusqu'à l'Océan , on retrouve des espèces de Maures ; mais si basanés , qu'ils paroissent presque tous noirs : on trouve aussi des Negres. En rassemblant les témoignages des Voyageurs , il paroît qu'il y a autant de variété dans la race des Noirs que dans celle des Blancs. Ceux de Guinée sont extrêmement laids , & ont une odeur insupportable ; ceux de Soffala & de Mofambique sont beaux & n'ont aucune mauvaise odeur. On retrouve parmi les Negres , toutes les nuances du brun au noir , comme nous avons trouvé dans les races blanches toutes les nuances du brun au blanc.

Les Maures habitent au Nord du fleuve du Sénégal : ils ne sont que basanés ; les Negres sont au Midi , & sont absolument noirs. Les Îles du Cap Verd sont toutes peuplées de Mulâtres , venus des premiers Portugais qui s'y établirent , & des Negres qu'ils y trouverent : on les appelle *Negres couleur de cuivre* , parceque , quoiqu'ils ressemblent aux Negres par les traits , ils sont jaunâtres. Les Negres du Sénégal , près de la rivière de Gambie , que l'on nomme *Jalofe* , sont tous fort noirs & bien proportionnés : ce sont les plus beaux & les mieux faits de tous les Negres. Ils ont les mêmes idées que nous de la beauté : il n'y a que sur le fond du tableau qu'ils pensent différemment. Il y a parmi eux d'assez belles femmes , à la couleur près , que dans aucun autre pays du monde : elles ont beaucoup de goût pour les blancs. Au reste , ces femmes ont toujours la pipe à la bouche , & leur peau a aussi un peu d'odeur désagréable lorsqu'elle est échauffée.

Les Negres de l'Île de Gorée & de la Côte du Cap Verd , sont bien faits , comme ceux du Sénégal : ils sont un si grand cas de leur couleur , qui est en effet d'un noir d'ébène profond & éclatant , qu'ils méprisent les autres Negres qui ne sont pas si noirs , comme les Blancs méprisent les basanés. Ces Negres aiment passionnément l'eau-de-vie , dont ils s'enivrent souvent : ils vendent leurs enfants , leurs parents , & quelquefois ils se vendent eux-mêmes , pour en avoir.

Quoique les Negres de Guinée soient d'une santé ferme & très bonne , rarement arrivent-ils à une certaine vieillesse : ils paroissent vieux dès l'âge de quarante ans. L'usage prématuré des femmes est peut-être cause de la brièveté de leur vie. Rien n'est si rare que de trouver , dans ce peuple , quelque fille qui puisse se souvenir du tems auquel elle a cessé d'être vierge. Leur caractère est assez constant : cette nation est ignorante , & cependant pleine de sentiment , sur-tout dans l'art d'aimer. On doit même être surpris que des âmes si incultes puissent produire quelques vertus , & qu'il n'y germe pas plus de vices.

On préfère , dans nos Isles , les Negres d'Angola , à ceux du Cap Verd ; pour la force du corps ; mais ils sentent si mauvais , lorsqu'ils sont échauffés , que l'air des endroits par où ils ont passé en est infecté pendant plus d'un quart d'heure. Ceux de Guinée sont aussi très bons pour le travail de la terre , & pour les autres gros ouvrages. Ceux du Sénégal ne sont pas si forts , mais ils sont plus propres pour le service domestique , & plus capables d'apprendre des métiers. Les Nègres ont en général le nombril fort gros , & multiplient beaucoup.

Quoique les Negres aient peu d'esprit , ils ne laissent pas d'avoir , comme nous l'avons déjà dit , beaucoup de sentiment : ils sont gais ou mélancoliques , laborieux ou fainéans , amis ou ennemis , selon la manière dont on les traite. Lorsqu'on les nourrit bien , & qu'on ne les maltraite pas , ils sont contents , joyeux , prêts à tout faire , & la satisfaction de leur ame est peinte sur leur visage ; mais quand on les traite mal , ils prennent le chagrin à cœur , & périssent quelquefois de mélancolie. Ils portent une haine mortelle à ceux qui les ont maltraités : lorsqu'au contraire ils s'affectionnent à un maître , il n'y a rien qu'ils ne fussent capables de faire pour lui marquer leur zèle & leur dévouement. Ils sont naturellement compatissants , & même tendres pour leurs enfants , pour leurs amis , pour leurs compatriotes ; ils partagent volontiers le peu qu'ils ont , avec ceux qu'ils voient dans le besoin , sans même les connoître autrement que par leur indigence. Ils ont donc , comme on le voit , le cœur excellent , ils ont le germe de toutes les vertus. Je ne puis écrire leur histoire , dit M. de Buffon , sans m'attendrir sur leur état ; ne sont-ils pas assez malheureux d'être réduits à la servitude , d'être obligés de travailler toujours sans pouvoir rien acquérir ? faut-il encore les excéder , les frapper , & les traiter comme des animaux ? L'humanité se révolte contre ces traitements odieux , que l'avidité du gain a mis en usage. On les force de travail , on leur épargne la nourriture , même la plus commune. Ils supportent , dit-on , aisément la faim ; pour vivre trois jours , il ne leur faut que la portion d'un Européen pour un repas ; quelque peu qu'ils mangent & qu'ils dorment , ils sont également durs & forts au travail. Comment des hommes à qui il reste quelque sentiment d'humanité , peuvent-ils adopter ces maximes , en faire un préjugé , & chercher à légitimer par ces raisons les excès que la soif de l'or leur fait commettre ?

Il naît quelquefois , parmi les Negres , des blancs de peres & de meres noirs ; chez les Indiens couleur de cuivre , des individus couleur de blanc de lait : mais il n'arrive jamais chez les Blancs , qu'il naisse des individus noirs. Le Blanc paroît donc être la couleur primitive de la nature , que le climat , la nourriture & les mœurs altèrent & changent , & qui reparoît dans certaines circonstances , mais avec une si grande altération , qu'il ne ressemble point au blanc primitif. *Voyez l'article NEGRE.*

En tout , les deux extrêmes se rapprochent presque toujours : la Na-

ture , aussi parfaite qu'elle peut l'être , a fait les hommes blancs ; & la nature , altérée autant qu'il est possible , les rend encore blancs. Mais le blanc naturel ou blanc de l'espece , est fort différent du blanc individuel ou accidentel. On en voit des exemples dans les plantes , aussi bien que dans les hommes & les animaux : la rose blanche , la giroflée blanche , sont bien différentes , même pour le blanc , des roses ou des giroflées rouges , qui , dans l'automne , deviennent blanches , lorsqu'elles ont souffert le froid des nuits & les petites gelées de cette saison.

On ne connoît guere les peuples qui habitent les côtes & l'intérieur de l'Afrique , depuis le Cap Negre jusqu'au Cap des Voltes ; mais les Hottentots , qui sont au Cap de Bonne-Espérance , sont fort connus. Les Hottentots ne sont pas de vrais Negres , mais des hommes , qui , dans la race des Noirs , commencent à se rapprocher du blanc ; comme les Maures dans la race blanche , commencent à s'approcher du noir. Les Hottentots vivent errans , & sont de la plus affreuse mal-propreté. Ce sont des especes de Sauvages fort extraordinaires ; les femmes sur-tout , qui sont beaucoup plus petites que les hommes , ont une espece d'excroissance ou de peau dure & large , qui leur croît au-dessus de l'os pubis , & qui descend jusqu'au milieu des cuisses en forme de tablier. Toutes les femmes naturelles du Cap sont sujettes à cette monstrueuse difformité , qu'elles découvrent à ceux qui ont assez de curiosité ou d'intrépidité pour demander à la voir ou à la toucher. Les hommes , de leur côté , sont à demi-eunuques , parcequ'à l'âge de huit ans on leur enleve un testicule , dans la persuasion que cela les rend plus légers à la course. D'ailleurs ils sont braves , agiles , hardis , robustes & bienfaits ; les exercices de la guerre sont leur unique occupation , ils en sont si passionnés qu'ils traitent avec les nations voisines pour s'obliger à les défendre ; ce sont les Suisses de l'Afrique si l'on peut parler ainsi.

Il semble qu'on peut admettre trois causes , qui , toutes trois , concourent à produire les variétés que l'on remarque dans les différents peuples de la terre. La premiere est l'influence du climat ; la seconde , qui tient beaucoup à la premiere , est la nourriture ; & la troisieme , qui tient peut-être encore plus à la premiere & à la seconde , sont les mœurs. On peut regarder le climat comme la cause premiere & presque unique de la couleur des hommes ; mais la nourriture , qui fait à la couleur beaucoup moins que le climat , fait beaucoup à la forme. Des nourritures grossieres , mal-saines , peuvent faire dégénérer l'espece humaine ; chez nous-mêmes , les gens de la campagne sont moins beaux que ceux des villes ; & on peut remarquer que dans les villages , où la pauvreté est moins grande que dans les autres villages voisins , les hommes sont mieux faits & les visages moins laids. Les traits du visage de différents peuples , dépendent beaucoup de l'usage où ils sont de s'écraser le nez , de se tirer les paupieres , de s'allonger les oreilles , de se grossir les levres , de s'applatir le visage , &c.

En

En Amérique on trouve aussi des peuples qui défigurent de différentes manières le crâne de leurs enfants dès le moment de leur naissance. Les Omaguas, au rapport de M. de la Condamine (*Mém. de l'Académie des Sciences*. 1745, p. 423) ont la bizarre coutume de presser entre deux planches le front des enfants qui viennent de naître, & de leur procurer l'étrange figure qui en résulte, pour les faire mieux ressembler, disent-ils, à la pleine lune. Les Créées, nation de l'Amérique Septentrionale, vont tous nus, sont fort belliqueux, & se peignent des lézards, des serpents, des crapauds, &c. sur le visage pour paroître plus redoutables. Les Sauvages du détroit de Davis sont très grands, très robustes & fort laids, ils vivent communément plus de cent ans; leurs femmes se font des coupures au visage & les remplissent de couleur noire pour s'embellir. Le sang des animaux est une boisson agréable à ces peuples errans & carnivores. On trouve à l'article *Pierre à fard*, ce que les différents peuples mettent en usage pour s'embellir, ou pour se parer la peau.

Les habitants de la Floride sont assez bien faits, leur teint est de couleur olivâtre tirant sur le rouge, à cause d'une huile de roucou dont ils se frottent; ils vont presque nus, sont braves, & immolent au Soleil, leur grande divinité, les hommes qu'ils prennent en guerre, & les mangent ensuite. Leurs Chefs nommés *Paraoussis* & leurs Prêtres ou Médecins nommés *Jonas*, semblables aux Jongleurs du Canada, ont un grand pouvoir sur le peuple. Les Natchez, l'une des nations Sauvages de la Louisiane, sont grands & gros, leur nez est fort long, & le menton un peu arqué. Quand une femme chef, c'est-à-dire, *noble*, ou de la race du Soleil, meurt, on étrangle douze petits enfans & quatorze grandes pernes, pour être enterrées avec elle. On met dans leur fosse commune des ustensiles de cuisine, des armes de guerre & tout l'attirail d'une toilette. Les Caraïbes, peuples de l'Isle de Saint Vincent, ont, ainsi que les Omaguas, la tête applatie d'une manière difforme & monstrueuse; ils ne doivent peut-être leur couleur rougeâtre qu'au roucou dont ils peignent leur corps avec l'huile. Leurs cheveux sont noirs, jamais crepus ni frisés, & ne descendent qu'aux épaules: ils n'ont point de barbe, & ne sont point velus, aux jambes, aux bras, ni à la poitrine. Leurs yeux sont noirs, gros, faillans & d'un regard effaré: ils mettent, pour ainsi dire, leurs jambes en moule, en les liant par le haut & par le bas dès leur enfance: leur odeur est si désagréable qu'elle a passé en proverbe: leur intelligence est fort bornée. Ils ne se font baptiser une ou plusieurs fois, que pour avoir les présens qu'on leur fait à cette occasion. Les femmes ne mangent point avec leurs maris, ils s'en croiroient deshonorés. L'amour est pour eux comme la soif ou la faim. Enfin ils ont un usage qui étonne toujours; lorsque la femme est accouchée, elle se leve aussitôt, elle vaque à tous les besoins du ménage; & le mari se couche, & reste au lit pour elle pendant un mois entier, sans manger ni boire pendant les dix premiers jours. Au bout du

mois les parens & amis viennent voir ce prétendu malade , lui font des incisions sur la chair , & le saignent de toutes parts sans qu'il ose s'en plaindre : il n'ose pas encore dans les six premiers mois manger des oiseaux ni des poissons , de peur que le nouveau né ne participât des défauts naturels de ces animaux.

Il n'y a , pour ainsi dire , dans le nouveau Continent , qu'une seule race d'hommes , qui tous sont plus ou moins basanés. A l'exception du Nord de l'Amérique , où il se trouve des hommes semblables aux Lapons , & aussi quelques hommes à cheveux blonds , semblables aux Européens du Nord , tout le reste de cette vaste partie du monde ne contient que des hommes parmi lesquels il n'y a presque aucune diversité. Au lieu que dans l'ancien Continent , on trouve une prodigieuse variété dans les différents peuples. Il nous paroît , dit M. de Buffon , que la raison de cette uniformité dans les hommes d'Amérique , vient de ce qu'ils vivent tous de la même façon. Tous les Américains naturels étoient ou sont encore Sauvages ou presque Sauvages ; les Mexiquains & les Péruviens étoient si nouvellement policés , qu'ils ne doivent pas faire une exception. Quelque soit donc l'origine de ces Nations Sauvages , elle paroît leur être commune à toutes ; tous les Américains sortent d'une même souche , & ils ont conservé , jusqu'à présent , les caractères de leur race sans grande variation , parcequ'ils sont tous demeurés Sauvages , & qu'ils ont vécu à-peu-près de la même façon ; que leur climat n'est pas à beaucoup près aussi inégal pour le froid & pour le chaud , que celui de l'ancien continent ; & qu'étant nouvellement établis dans leur pays , les causes qui produisent des variétés , n'ont pû agir assez long-tems pour opérer des effets bien sensibles.

Ainsi on peut avancer avec beaucoup de fondement , que c'est du climat que dépendent les différences des peuples , prises de la complexion générale ou dominante de chacun , de sa taille , de sa vigueur , de la couleur de sa peau & de ses cheveux , de la durée de sa vie , de sa précocité plus ou moins grande relativement à l'aptitude de la génération , de sa vieillesse plus ou moins retardée , & enfin de ses maladies propres ou endémiques. On ne sauroit contester l'influence du climat sur le physique des passions , des goûts , des mœurs. Les plus anciens Médecins avoient observé cette influence , & il semble que les loix , les usages , le genre de Gouvernement de chaque peuple ont un rapport nécessaire avec ses passions , ses goûts , ses mœurs. Mais en nous attachant principalement aux affections corporelles de chaque Nation , relativement au climat sous lequel elle vit , les principales questions de Médecine qui se présentent sur cette matière , se réduisent à celles-ci : *Quels sont le tempérament , la taille , la vigueur , & les autres qualités corporelles particulières à chaque climat ?* Une réponse détaillée appartient proprement à l'Histoire Naturelle de chaque pays. On a cependant assez généralement observé que les habitans des climats chauds étoient plus petits , plus secs , plus vifs , plus gais , communément plus spirituels , moins laborieux , moins vigoureux ; qu'ils

avoient la peau moins blanche ; qu'ils étoient plus précoces , qu'ils vieillissoient plutôt , & qu'ils vieillissoient moins que les habitans des climats froids ; que les femmes des pays chauds étoient moins fécondes que celles des pays froids ; que les premières étoient plus jolies ; mais moins belles que les dernières ; qu'une blonde étoit un objet rare dans les climats chauds , comme une brune dans les pays du Nord , &c. que dans les climats très chauds l'amour étoit dans les deux sexes un desir aveugle & impétueux , une fonction corporelle , un appétit , un cri de la Nature , *in furias ignesque ruunt* ; que dans les climats tempérés il étoit une passion de l'ame , une affection réfléchie , méditée , analysée , systématique , un produit de l'éducation ; & qu'enfin dans les climats glacés , il étoit le sentiment tranquille d'un besoin peu pressant. Quant à la précocité corporelle , c'est une vérité d'expérience qu'elle est dûe à l'exercice précoce des facultés intellectuelles. Terminons ce paragraphe , & disons avec M. Venel , que les hommes nouvellement transplantés sont plus exposés aux incommodités qui dépendent du climat , que les naturels du pays : c'est encore une observation constante & connue généralement , que les habitans des pays chauds peuvent passer avec moins d'inconvéniens dans des régions froides , que les habitans de celles ci ne peuvent s'habituer dans les climats chauds.

Des Sens.

Selon l'observation de M. le Cat , dans son *Traité des Sens* , les machines particulieres , que la Nature a disposées dans toute l'étendue de l'économie animale pour procurer à notre ame les diverses sensations , nous étoient absolument nécessaires & pour notre être & pour notre bien être. Ce sont autant de sentinelles qui nous avertissent de nos besoins , & qui veillent à notre conservation au milieu des corps utiles ou nuisibles qui nous environnent : ce sont autant de portes qui nous sont ouvertes pour communiquer avec les autres êtres , & pour jouir du monde où nous sommes placés. Ce sont ces organes qui établissent la communication qui est entre nous & presque tous les êtres de la Nature. C'est à ces principes de nos connoissances & de nos raisonnemens , que nous devons notre principal mérite ; & ce mérite est proportionné à leur nombre & à leurs perfections : un plus grand nombre de sens ou des sens plus parfaits nous eussent montré d'autres êtres qui nous sont inconnus , & d'autres modifications dans ceux mêmes que nous connoissons.

Le corps animal , dit M. de Buffon , est composé de plusieurs matieres différentes , dont les unes , comme les os , la graisse , le sang , la lymphe , &c. sont insensibles , & dont les autres , comme les membranes & les nerfs , paroissent être des matieres actives , d'où dépendent le jeu de toutes les parties , & l'action de tous les membres. Les nerfs sont sur-tout l'organe immédiat du sentiment : toute la différence qui se trouve dans nos sensations ne vient que du nombre plus ou moins grand , & de la position

plus ou moins extérieure des nerfs ; ce qui fait que les uns de ces sens peuvent être affectés par de petites particules de matiere qui émanent des corps , comme l'œil , l'oreille & l'odorat ; les autres par des parties plus grosses , qui se détachent des corps au moyen du contact , comme le goût ; & les autres par les corps , ou même par les émanations des corps lorsqu'elles sont assez réunies & assez abondantes pour former une espece de masse solide , comme le toucher , qui nous donne les sensations de la solidité , de la fluidité & de la chaleur des corps.

Le toucher est la sensation la plus générale. Nous pouvions bien ne voir & n'entendre que par une petite portion de notre corps ; mais il nous falloit du sentiment dans toutes les parties , pour n'être pas des automates qu'on auroit montés & détruits , sans que nous eussions pu nous en apercevoir. La nature y a pourvu : par-tout où il y a des nerfs & de la vie , il y a aussi de cette espece de sentiment. Le toucher est comme la base de toutes les autres sensations : c'est le genre , dont elles sont des especes plus parfaites , car toutes les autres sensations ne sont véritablement que des especes de toucher. C'est par le toucher seul que nous pouvons acquérir des connoissances complètes & réelles ; c'est ce sens qui rectifie tous les autres sens dont les effets ne seroient que des illusions , si celui-ci ne nous apprenoit à juger : car lorsque l'on voit pour la première fois , tous les objets paroissent être dans les yeux , ils s'y peignent renversés : on ne peut en reconnoître la grandeur , la distance , la position , la forme que par le toucher ; aussi voit-on que les enfants cherchent toujours à toucher tout ce qu'ils voient. M. Chéselden apprit toutes ces vérités d'un homme à qui il eut le bonheur de redonner la lumière en lui faisant l'opération de la cataracte.

La peau , qui est l'organe du toucher , est un tissu de fibres , de nerfs & de vaisseaux , dont l'entrelacement en tout sens forme une étoffe à-peu-près de la nature de celle d'un chapeau. Cette tissure fibreuse est visible dans les cuirs épais. Toute la surface de la peau est garnie de mamellons nerveux : ces mamellons sont rangés sur une même ligne & dans un certain ordre ; & c'est cet ordre qui forme les sillons que l'on observe à la surpeau ; ce sont ces mamellons nerveux qui , réunis étroitement & exposés à l'air , deviennent à l'extrémité des doigts , des corps solides que nous appelons les *ongles*. Voyez ce mot & l'article PEAU.

La sensation du toucher peut devenir si parfaite dans l'homme , qu'on l'a vu , pour ainsi dire , quelquefois faire la fonction des yeux , & dédommager en quelque façon des aveugles de la perte de la vue. Il est parlé d'un Organiste de Hollande , qui distinguoit les couleurs des cartes par la finesse du toucher , ce qui le rendoit un joueur redoutable ; car en maniant les cartes il connoissoit celles qu'il donnoit aux autres , comme celles qu'il avoit lui-même. Il suffisoit au Sculpteur Ganibasius de Volterre qui étoit devenu aveugle , de toucher une figure pour en faire ensuite en argile une copie parfaitement ressemblante.

Le goût n'est qu'une espece de toucher , qui n'a pas pour objet les corps solides , mais seulement les suc ou les liqueurs dont ces corps sont imbus , ou qui en ont été extraits. Le goût (*gustus*) est ce sens admirable par lequel on discerne les saveurs , & dont la langue est le principal organe. On peut dire que la bouche , le gosier & l'estomac ayant beaucoup de sympathie entr'eux , ne sont proprement qu'un organe continu du goût.

L'odorat paroît moins un sens particulier qu'une partie ou un supplément de celui du goût. L'odorat est en quelque sorte le goût des odeurs , & l'avant-goût des saveurs. C'est sur la membrane pituitaire qui tapisse les cavités du nez , que se fait la sensation des odeurs. Les animaux ont l'odorat d'autant plus parfait , que les cornets du nez sont plus grands , & par conséquent tapissés d'une plus grande membrane.

Les hommes ont pour l'ordinaire l'odorat bien moins bon que celui des animaux , par la raison que nous venons de dire. Cependant la regle n'est pas absolument générale. Dans les Antilles il y a des Negres qui , comme les chiens , suivent les hommes à la piste , & distinguent avec le nez la piste d'un Negre d'avec celle d'un Européen. Au rapport du Chevalier Digbi , un garçon que ses parents avoient élevé dans une forêt où ils s'étoient retirés pour éviter les ravages de la guerre , & qui n'y vivoit que de racines , avoit l'odorat si fin , qu'il distinguoit par ce sens l'approche des ennemis , & en avertissoit ses parents. Depuis il changea de façon de vivre , & perdit à la longue cette grande finesse de l'odorat : il en conserva néanmoins une partie ; car étant marié , il distinguoit fort bien , en flairant , sa femme d'avec une autre , & il pouvoit même la retrouver à la piste. Un tel mari en Italie , dit M. le Cat , seroit un argus plus terrible que celui de la fable. Le Religieux de Prague , dont parle le Journal des Savants de 1684 , enchérit encore sur les observations précédentes. Non-seulement celui-ci connoissoit par l'odorat les différentes personnes ; mais ce qui est bien plus singulier , il distinguoit une fille ou une femme chaste , d'avec celle qui ne l'étoit point. Ce Religieux avoit commencé un *Traité nouveau des Odeurs* , lorsqu'il mourut ; & les Journalistes en regrettent la perte. Pour moi , dit encore M. le Cat , je ne fais si un homme si savant dans ce genre , n'auroit pas été dangereux dans la société.

Il semble donc que la perfection de l'organe de l'odorat des animaux dépende non-seulement de l'organe , mais encore du genre de vie , & entre autres de la privation des odeurs fortes , dont les hommes sont sans cesse entourés , & dont leur organe est comme usé ; enforte que les odeurs aussi foibles & aussi subtiles que celles dont on vient de parler , ne peuvent y faire impression.

L'ouïe est une faculté qui devient active par l'organe de la parole ; c'est en effet par ce sens que nous vivons en société , que nous recevons la pensée des autres , & que nous pouvons leur communiquer la nôtre : les organes de la voix seroient des instruments inutiles , s'ils n'étoient mis en mouvement par ce sens. Un sourd de naissance est nécessairement muet.

C'est en vain que l'air remué par les corps bruyants ou sonores, ou agité par le mouvement de celui qui parle, nous frapperoit de toutes parts, si la structure de l'oreille ne la rendoit pas propre à recevoir ces sensations.

Nous allons présenter ici succinctement les principales parties que la Nature emploie pour faire sentir les sons. C'est dans l'excellent *Trait des sens* de M. le Cat, qu'il faut voir la description anatomique & complète de cet organe.

La partie extérieure de l'oreille se nomme la *conque* ; sa forme est destinée à recevoir les rayons sonores en plus grande quantité. Le canal creux se nomme le *conduit auditif*, & aboutit au *tympan*, qui est une membrane mince, un peu concave du côté du conduit auditif. Immédiatement après la membrane du tympan, sont quatre osselets qu'on appelle, à cause de leur figure, l'un *os orbiculaire*, l'autre l'*étrier*, le troisième l'*enclume*, & le quatrième le *marteau*. Une partie de celui-ci qu'on a nommé le *manche*, aboutit au centre du *tympan*, & sert à le rendre plus ou moins. Lorsque cette membrane du tympan est lâche, les sons foibles s'y amortissent & ne passent pas outre ; ou bien s'ils passent, leur impression est si peu sensible, que l'ame n'y fait point d'attention ; mais si le tympan est bien rendu, comme il arrive quand on écoute avec attention, le moindre son se communique par cette même membrane à la masse d'air qui est derrière, dans une cavité que l'on nomme la *caisse du tambour* ; cette cavité est pleine d'air, & communique avec la bouche par un canal que l'on nomme la *trompe d'Eustache*. Il suit de cette structure, que l'air du tambour communiquant toujours avec l'air extérieur, fait équilibre à celui qui remplit le conduit auditif. A la caisse du tambour répond une autre partie de l'oreille que l'on nomme le *labyrinthe*, à cause de ses détours ; il est composé du *vestibule*, des *trois canaux semi-circulaires*, & du *limaçon*. Lorsque le son ou l'air agité par la parole, vient donc à émouvoir la membrane élastique du tympan, l'air qui est dans la caisse du tambour se trouve agité, & communique son mouvement à celui qui est dans le labyrinthe, dont toutes les parties sont revêtues des petites fibres du nerf auditif : c'est principalement dans la partie du labyrinthe que l'on nomme le *limaçon*, & qui a vraiment la figure de la coquille d'un limaçon, mais qui est divisée par une cloison ou lame membraneuse, que se fait la sensation des sons.

Une incommodité des plus communes dans la vieillesse, est la surdité. Il y a lieu de penser qu'elle est occasionnée, parceque la lame membraneuse du limaçon augmente en solidité à mesure que l'on avance en âge, ce qui rend l'ouïe dure. Lorsque cette lame s'ossifie, on devient entièrement sourd.

Un moyen de reconnoître si la surdité est occasionnée parceque la lame spirale du limaçon est devenue insensible, est de mettre une petite montre à répétition dans la bouche du sourd, & la faire sonner ; s'il entend ce son qui se communique par la trompe d'Eustache, la surdité sera certainement causée par un embarras extérieur dans le conduit auditif, auquel il est possible de remédier en partie.

Comme la propagation des sons se fait selon les mêmes loix que celle de la lumière, on a cherché à rassembler les rayons sonores par le moyen d'un cornet de figure parabolique propre pour se faire entendre de ceux qui ne sont pas entièrement sourds.

Le mécanisme de la vision n'est pas moins admirable que celui de l'ouïe. L'œil n'est que l'épanouissement du nerf optique : son globe est composé extérieurement de plusieurs membranes les unes sur les autres, qui tirent leur origine d'un nerf qui vient du cerveau, & qui porte le nom de *nerf optique* ; le dedans est rempli par trois humeurs de différente consistance, dont l'usage est de donner lieu à la réfraction des rayons de lumière, par le moyen desquels nous voyons les objets.

Le *nerf optique*, ainsi que les autres, a trois parties principales ; savoir, la *dure-mère*, qui l'enveloppe extérieurement ; la *pie-mère*, qui est comme une seconde enveloppe ; & enfin la *moëlle*, qui est une substance plus molle : ces trois parties se dilatent pour former le globe de l'œil, & portent alors différents noms.

La première, qui est une expansion de la dure-mère, se nomme *Sclérotique* ; elle forme cette partie antérieure de l'œil que l'on peut toucher immédiatement du doigt ; elle est transparente comme de la corne, ce qui la fait nommer aussi *cornée transparente*. Cette partie de l'œil, à cause de la saillie qu'elle a, procure à la vue une plus grande étendue. Si la cornée étoit plane & à fleur de l'orbite, l'animal ne verroit que les objets qui sont devant lui, à moins qu'il ne tournât la tête à tout instant ; au lieu qu'étant arrondie & saillante, elle fait voir distinctement ce qui est devant l'œil, & appercevoir au moins confusément ce qui est sur les côtés, jusqu'à une certaine distance.

L'*Iris* est ce cercle coloré que l'on apperçoit sous la cornée transparente ; & au milieu duquel il y a un trou rond, qu'on nomme la *prunelle* ou la *pupille*. L'iris est formée par l'épanouissement de la pie-mère ; cette iris varie de couleur dans les différents individus, & elle est composée de fibres musculaires, qui sont ou en cercles concentriques ou en rayons : leur usage est de dilater ou de rétrécir l'ouverture de la prunelle, afin de n'y laisser entrer que la quantité de rayons convenable, & que l'impression ne soit pas trop vive & ne fatigue pas l'organe. Aussi lorsque nous passons d'un lieu obscur dans un lieu éclairé, l'ouverture de la pupille se rétrécit, mais plus ou moins, suivant la sensibilité des yeux : au contraire, elle s'élargit lorsque nous passons du grand jour à l'obscurité. Ce phénomène s'observe d'une manière bien sensible dans les chats, dont la pupille est étroite & de forme ovale dans le jour, & ronde & très ouverte dans la nuit.

La couronne ciliaire, qui n'est elle-même qu'une partie de l'épanouissement de la pie-mère, tient suspendu, vis-à-vis la prunelle, un corps transparent, d'une figure lenticulaire, que l'on nomme le *cristallin*.

La partie médullaire du nerf optique s'épanouit aussi, & produit une

troisième membrane très fine & baveuse, qui tapisse tout l'intérieur de l'œil, en se terminant à la couronne ciliaire; c'est ce qu'on appelle la *retine*, partie de l'œil sur laquelle se fait vraiment la sensation des objets.

Toutes les parties dont nous venons de parler, partagent l'intérieur du globe en trois chambres. Les deux premières renferment une liqueur claire comme de l'eau, qu'on nomme l'*humeur aqueuse*. Derrière l'humeur aqueuse est le cristallin, qui est encaissé dans la couronne ciliaire, & se trouve suspendu vis-à-vis de la prunelle. Derrière le cristallin est la dernière chambre, qui contient une substance très limpide, d'une consistance assez semblable à celle de la gelée de viande, & qu'on appelle l'*humeur vitrée*.

Telle est la structure merveilleuse de l'œil : la lumière, réfléchie par les objets que nous voyons, passe par l'ouverture de la pupille, & elle subit, au travers de la cornée transparente, de l'humeur aqueuse, du cristallin & de l'humeur vitrée, les réfractions nécessaires pour que les objets viennent se peindre sur la rétine plusieurs ensemble, tous sans se confondre, avec leurs couleurs naturelles. Sans cet organe, toutes les merveilles du Ciel & de la Terre, qui viennent pour ainsi dire nous toucher nous-mêmes, n'existeroient plus pour nous : sans cet organe nous ne connoîtrions l'approche des corps que lorsque nous serions frappés ou terrassés par eux. Quelle merveille ! sur un espace de sept lignes d'étendue, vient se peindre un espace de sept lieues, lorsque monté sur une montagne on regarde un grand horizon ; cependant les villes, les plaines, les forêts, tout s'y peint distinctement. Il est mille choses encore plus admirables les unes que les autres sur la vision, mais qu'il seroit trop long de rapporter ici ; nous nous contenterons de dire qu'on distingue ordinairement trois sortes de vue ; savoir, 1°. la vue courte ou forte ; 2°. la vue longue ou foible ; 3°. la bonne vue ou parfaite. Ceux qui ont la vue courte sont appelés *Myopes*, ils peuvent voir fort nettement les objets qui sont fort proches, & ne font qu'entrevoir ceux qui sont éloignés : au contraire ceux qui ont la vue longue, & que l'on appelle *Presbytes*, voient mieux les objets éloignés que ceux qui sont proches, qu'ils ne sauroient distinguer, (l'on prétend que c'est la configuration particulière du *cristallin* qui fait qu'une personne est myope ou presbyte) : enfin ceux qui ont la vue bonne, & qui tiennent le milieu entre les myopes & les presbytes, voient fort bien les objets qui sont dans une médiocre distance. C'est cette sorte de vue que l'on peut considérer comme la plus parfaite, comme la plus propre à distinguer & à reconnoître les formes, les couleurs & les distances.

De l'Economie animale.

Les grands rapports généraux qui se trouvent entre l'économie animale du corps humain & celle des autres animaux, nous ont déterminés à présenter ici une légère esquisse des principaux phénomènes de cette admirable

ble machine du corps humain, où l'on reconnoît, d'une manière bien frappante, la main de la Divinité. Les merveilles que l'on entreverra, d'après ce court exposé, seront bien propres à animer la curiosité, & à exciter le desir de les étudier dans leurs détails.

Nous avons décrit les sens, par le moyen desquels l'homme communique avec l'Univers entier & avec ses semblables. Quelles foules de merveilles, lorsqu'on vient à examiner son économie intérieure ! tout y annonce une simplicité admirable, & en même-tems une composition difficile à débrouiller.

La machine animale est comme le cercle, qui n'a ni commencement ni fin : un ressort prête son action à l'autre qui lui doit son mouvement ; leur union conspire à former d'autres machines qui deviennent leur mobile ; enfin tous les ressorts réunissent leur mouvement dans chaque ressort, & chaque ressort partage aux autres son action & sa production. Le cerveau n'agit, par exemple, que par l'impulsion du cœur, qui seroit immobile sans le cerveau ; ces deux machines réunissent leur mécanisme pour former la respiration qui soutient leur action ou la détruit : les fluides qui traversent nos vaisseaux sont préparés par ces trois forces mouvantes, & les parties de ces fluides préparés animent le cerveau, donnent au cœur tous ses mouvements, & font marcher la respiration.

Si nous considérons présentement la charpente humaine, on voit autant de force que de légèreté réunie dans les os. Quel enchaînement dans ceux des vertèbres ! que de cavités, de trous sans nombre & presque imperceptibles, ménagés dans tous ces os pour donner passage aux vaisseaux qui portent la nourriture par-tout, & aux nerfs qui distribuent par-tout le sentiment !

La peau recouvre toute la machine animale ; c'est elle qui donne à notre corps toute sa beauté par sa blancheur & par son poli, & qui défend les parties qu'elle environne ; elle est l'organe du toucher, ainsi que nous l'avons dit plus haut ; elle est toute parsemée de pores par où se fait la transpiration insensible. Les pores de la transpiration, suivant Leuwenoeck, sont si nombreux & si petits, qu'il y en a cent vingt-cinq mille sur l'espace qu'occuperoit un grain de sable. Il sort par ces pores des vapeurs continues ; & suivant les expériences de Sanctorius, un homme qui mange & qui boit la quantité de huit livres, en perd cinq par la transpiration insensible. Sera-t-on étonné après cela, d'apprendre que cette transpiration arrêtée ou diminuée, occasionne la plupart des maladies.

Les muscles qui sont distribués dans toute notre machine, & qui ont leur attache aux os, ont une force qui surprend. Suivant le calcul du fameux Borelli, qui a fait un ouvrage sur le mouvement des animaux, lorsqu'un homme du poids de cent cinquante livres, s'élève en sautant à la hauteur de deux pieds, ses muscles agissent dans ce moment avec deux mille fois plus de force, c'est-à-dire, avec une force équivalente à un poids de trois cents mille livres ou environ. Le cœur, qui n'est que tout muscle,

à chaque battement ou contraction, par laquelle il pousse le sang dans les artères, & des artères dans les veines, où il subit des frottements immenses, agit avec une force équivalente à plus de cent mille livres pesant.

Le *cerveau*, que l'on regarde avec raison comme la partie principale du corps humain, est contenu dans le crâne, & divisé en deux parties; l'une supérieure, que l'on nomme le *grand cerveau*; & l'autre inférieure, que l'on nomme le *cervelet*. Voyez le mot CERVEAU. On reconnoît ces parties pour être l'origine d'où part tout le genre nerveux, source de la vie, de la force, du plaisir & de la douleur de l'animal. Le cerveau est le laboratoire des esprits vitaux. Mais par le secours de quelle partie du cerveau tous ces grands effets s'opèrent-ils? Sa nature merveilleuse s'est toujours dérobée aux recherches des plus grands hommes, & peut-être leur échappera-t-elle toujours. Au reste voilà des expériences qui prouvent que le sentiment & le mouvement ont leur principe dans la substance médullaire. 1°. Lorsque la moëlle du cerveau est comprimée par quelque cause que ce puisse être, par le sang, par l'applatiffement mécanique des os du crâne, par la concussion, ou par la commotion, on tombe en apoplexie. 2°. La moëlle du cerveau piquée, déchirée, donne des convulsions horribles. 3°. Cette même moëlle & celle de l'épine, blessées, coupées ou comprimées, produisent la paralysie des parties qui leur sont inférieures; heureusement que la moëlle du cerveau a pour rempart le crâne: celle de l'épine trouve le sien dans le canal des vertèbres. 4°. Si l'on comprime le cerveau ou qu'on le coupe jusqu'à la substance médullaire, l'action volontaire des muscles est interrompue, la mémoire & le sentiment s'éteignent, mais la respiration & le mouvement du cœur subsistent. 5°. Quant au cervelet, si l'on fait la même chose, la respiration & le mouvement du cœur cessent: de-là il s'ensuit que les nerfs destinés au mouvement volontaire partent du *cerveau*, & que les nerfs d'où dépendent les mouvements spontanés, sortent du *cervelet*. Mais est-on robuste, eu égard à la quantité du cervelet? Cela est vraisemblable: l'expérience nous manque cependant ici.

Les nerfs sont des corps longs, ronds & blancs, au milieu desquels se trouve un conduit destiné à recevoir les esprits vitaux. Il y a dans le corps humain quarante paires de nerfs: dix sortent du cerveau, & trente de la moëlle de l'épine. La troisième partie de nerfs qui vient de la moëlle de l'épine, comme cette moëlle vient du cerveau, dépend entièrement de notre volonté dans les mouvements qu'elle fait faire aux bras; c'est à notre gré qu'elle les fait agir ou qu'elle interrompt leur action: mais ceux qui tirent leur origine du cervelet, meuvent continuellement, & indépendamment de notre volonté, les organes d'où dépend notre vie. Nous n'avons aucun pouvoir sur l'action de ces nerfs d'où dépend notre existence; tels sont ceux qui se rendent au cœur.

Le diaphragme est une partie ample & musculeuse, qui sépare la cavité

du thorax d'avec celle de l'abdomen. Il est convexe du côté de la poitrine, & on peut le regarder comme le principal organe de la respiration, puisqu'en s'abaissant il dilate, & qu'en se relevant il rétrécit la cavité de la poitrine. Les mouvements du diaphragme sont soumis à notre volonté dans les grandes inspirations, par exemple dans le tems qu'on chante ou qu'on parle. Le diaphragme reçoit deux nerfs qui sortent de la moëlle de l'épine, & qui appartiennent par conséquent à ceux qui dépendent de notre volonté. Mais comme il est nécessaire que la respiration continue pendant le sommeil, & que la plus grande peine qui pût nous arriver, seroit d'être attentifs à chaque instant à notre respiration; il se rend au diaphragme des nerfs qui naissent de l'intercostal & viennent du cervelet, & qui en continuent le mouvement indépendamment de notre volonté.

Le suc nerveux, ce fluide subtile, qu'on nomme *esprits animaux*, dont la nature est inconnue, contribue, ainsi que le sang artériel, aux mouvements des muscles. La preuve en est, que si on lie l'artere où s'insere un muscle, le sang ne pouvant plus y entrer, ce muscle devient paralytique. Il en est de même quand on lie les nerfs qui y aboutissent : sans l'effet de ces deux fluides, nous n'aurions aucun mouvement.

La langue qui n'est composée que de fibres charnues, est un organe qui surprend par la variété prodigieuse de ses mouvements & de ses effets. Elle est le siege principal du goût : placée dans la bouche, par où passe le son en venant de la trachée-artere, elle le modifie, & fait naître la parole, par laquelle un homme peut communiquer à un autre les pensées de son ame. Nous comprendrons dans ce paragraphe ce qui concerne les organes de la voix. Tous les différents tons ou accents dépendent uniquement de l'ouverture plus ou moins grande de la glotte. Tel homme dont la voix est déplaisante, a le chant très agréable; mais si nous n'avons pas entendu chanter quelqu'un, quelque connoissance que nous ayons de sa voix & de sa parole, nous ne le reconnoîtrons pas à sa voix de chant, parcequ'il y a dans celle-ci plus que dans l'autre, un mouvement de tout le larynx. La différence entre les deux voix vient donc de celle qu'il y a entre le larynx assis & en repos sur ses attaches dans la parole, & ce même larynx suspendu sur ses attaches, en action & mû par un balancement de haut en bas & de bas en haut; ce qui produit dans la voix de chant une espece d'ondulation cadencée, où roulée ou soutenue, mais qui n'est pas dans la simple parole, quoique la voix du discours marche continuellement dans des intervalles incommensurables : ainsi la voix, soit du chant, soit de la parole, soit du simple cri, vient toute entiere de la glotte, pour le son & pour le ton. Nous devons à M. Dodard ces observations; mais la découverte que M. Ferrein a faite depuis sur les effets des rubans membraneux sur les bords de la glotte dans la production du son & des tons, fait voir qu'il reste des choses à trouver sur les sujets qui semblent épuisés. Sans sortir de la question présente, y a-t-il un fait plus sensible, & dont le principe soit moins connu, que la différence de la voix d'un homme & de celle

d'un autre ; différence si frappante , qu'il est aussi facile de les distinguer que les physionomies ? L'on pourroit même étendre cette différence à ces especes bizarres & factices (les Eunuques) que l'inhumanité a données pour rivales aux voix des femmes , si bien faites pour porter l'émotion jusqu'au fond de nos cœurs. . . . Mais revenons à notre sujet.

A la naissance de la langue , commencent deux canaux couchés l'un sur l'autre , & qu'on nomme l'*Œsophage* & la *Trachée artère*. Le premier conduit reçoit les boissons & les nourritures pour les porter dans l'estomac ; l'autre , plus intérieur & placé sous l'œsophage vers la poitrine , porte l'air aux poumons , & donne issue à celui qui en sort. Dès qu'il entre quelque autre matiere que de l'air dans la trachée , de la mie de pain , par exemple , on ressent à l'instant une toux convulsive. On a peine à concevoir que malgré le danger qu'il y a de laisser tomber le moindre corps dans la trachée , c'est cependant par dessus l'orifice de ce canal , que le Créateur a préparé à toutes nos nourritures la route qu'elles doivent prendre pour enfiler l'œsophage & l'estomac. Mais par un artifice dont la hardiesse est digne de l'Auteur de toute mécanique , il se trouve au haut de la trachée un petit pont-levis , qui se hausse pour le passage de l'air , soit qu'il entre par l'inspiration , soit qu'il sorte par l'expiration ; mais qui s'abaisse de manière à fermer exactement l'ouverture du canal , dès que la plus petite parcelle de solide ou de liquide se présente pour l'œsophage. La grande beauté de cette mécanique consiste en ce que la moindre portion de nourriture foule dans sa descente les nerfs du bas de la langue , dont l'action est toujours suivie de l'abaissement du pont sur la trachée , avant que la nourriture ou la boisson y arrive.

Mais ces merveilles qu'on ne peut entrevoir sans étonnement , sont dans tout le corps humain en aussi grand nombre que les organes , c'est-à-dire , innombrables. L'anatomie les observe attentivement ; elle leur assigne un nom , elle connoît l'action des plus sensibles , elle dispute sur l'âge des autres , & confesse que la structure de tous , quand on veut l'approfondir , est un abîme où la vue & la raison se perdent.

Jettons un coup d'œil sur la maniere dont la vie s'entretient & se renouvelle par le changement merveilleux qui se fait des aliments en notre propre substance.

Les aliments , après avoir été coupés & broyés dans la bouche , & avoir été humectés de la salive qui est destinée à en faciliter la digestion & la fermentation , sont portés , par le canal de l'œsophage , dans l'estomac. C'est là qu'ils séjournent quelque tems , & qu'ils se changent en une espece de bouillie , à l'aide des sucs que fournissent les arteres & les nerfs , dont le nombre est prodigieux dans l'estomac. Ces aliments , ainsi élaborés , passent dans les intestins , dont la longueur égale presque six fois la hauteur de l'homme ; longueur ménagée par la Nature , pour que le chile ait le tems , dans cette longue route , d'être séparé des matieres inutiles. Toute la longueur des intestins se trouve attachée au mésentere , qui est une

membrane platte & plissée en fraise : tandis que les fucs nourriciers se séparent des aliments , & passent par les ouvertures des veines lactées qui s'appliquent aux intestins par une multitude d'embouchures , les glandes des intestins humectent ces aliments desséchés ; & les mettent en état de pouvoir toujours continuer leur route , jusqu'à ce que tout le chile étant pompé , ils soient portés à l'extrémité des intestins pour être rejetés. Il faut observer que des conduits qui sortent de la vésicule du fiel & du foie introduisent continuellement dans la partie des intestins , que l'on nomme *duodenum* , la bile qui se mêle dans cet intestin avec les aliments que l'estomac y envoie. C'est là que ces fucs , ainsi que ceux du pancréas , produisent des effets sur lesquels on n'est point d'accord ; mais qui sont nécessaires sans doute , soit pour faciliter la séparation du chile d'avec les parties plus grossières , soit pour le préserver de corruption par l'amertume. Le chile entre , par la contraction des intestins , dans les vaisseaux lactés qui portent cette liqueur dans le réservoir de Pecquet : ce réservoir , dans l'homme , est composé de trois grandes cavités , formées par une peau très fine. Le chile monte par le canal torachique , le long de l'épine du dos ; mais avant de monter il se mêle avec la limphe apportée par des vaisseaux lymphatiques , qui viennent aboutir à ce réservoir. Ces liqueurs ainsi unies , montent donc le long du canal torachique , & se déchargent dans la veine souclavière : elles s'unissent au sang qui coule dans la même veine , & vont se rendre au cœur par la veine cave , dans le ventricule droit. Le tout ressort du cœur pour être porté dans tout le corps , y circuler & lui servir de nourriture. Un phénomène admirable , c'est de voir le chile s'élever contre les loix de la pesanteur dans le canal torachique , dont la membrane est trop foible pour pouvoir se contracter. Cette liqueur y est élevée par les battements de l'artere descendante , qui presse le canal torachique , & oblige ainsi la liqueur de monter. Quand une fois elle est élevée , elle ne peut retomber , parcequ'elle se trouve arrêtée par un grand nombre de valvules à peu de distance les unes des autres ; ces valvules s'ouvrent pour laisser monter la liqueur , qui par son poids , fait baisser ensuite ces mêmes valvules , & se ferme ainsi le passage à elle-même , lorsqu'elle veut redescendre. Les veines lactées & lymphatiques sont aussi remplies de ces merveilleuses valvules. Il se trouve de même à l'endroit où le chile entre dans la veine souclavière , une valvule qui empêche le sang de cette veine de tomber dans le canal du chile.

Le cœur est un muscle ferme & solide , placé au milieu de la poitrine , la base en haut & la pointe en bas. Il est enveloppé d'une espece de sac membraneux , que l'on nomme le *Péricarde* , & dont l'usage est de filtrer une liqueur qui humecte le cœur & en facilite les mouvements qui demandent une grande liberté : elle sert aussi à soutenir le cœur , qui , pour ainsi dire , est suspendu , & à le défendre contre le froid de l'air qui entre dans les poumons , au milieu des deux lobes desquels il est placé , & qui pourroit peut-être l'offenser.

C'est du cœur que partent de gros vaisseaux que l'on nomme *Arteres*, dont l'usage est de porter le sang dans toutes les parties du corps & jusqu'aux extrémités. Ces vaisseaux se divisent, se subdivisent, se ramifient d'une manière prodigieuse; & toutes ces ramifications, infiniment déliées, se trouvent abouchées à autant d'autres vaisseaux qu'on nomme *Veines*, qui rapportent le sang du cœur.

Celui-ci a deux cavités séparées l'une de l'autre par une cloison charnue fort épaisse. On donne à ces cavités le nom de *Ventricules*. Chaque ventricule est muni d'une oreillette, qui est aussi une espèce de cavité, dont l'usage est de recevoir le sang & de le décharger dans le ventricule qui correspond à chacune de ces cavités.

Le cœur a deux mouvements; l'un, par lequel il se dilate, & qu'on nomme *Diafsole*; l'autre, par lequel il se contracte, la pointe se rapprochant de la base, & qu'on nomme *Syssole*. Les oreillettes ont aussi leurs mouvements de dilatation & de contraction, mais dans un tems différent; c'est-à-dire qu'elles sont dilatées lorsque le cœur est contracté, & qu'elles sont en contraction lorsque le cœur est en dilatation.

A l'instant où le cœur se contracte, le ventricule droit chasse le sang dans l'artere pulmonaire, qui le porte aux poumons, où il se rafraîchit par le moyen de la respiration; le ventricule gauche chasse le sang dans l'artere nommée *Aorte*, qui le distribue dans toutes les parties du corps; aussi ce ventricule a-t-il des parois plus fortes que le ventricule droit. Après la contraction, il se forme une cavité dans les ventricules du cœur par la dilatation; à l'instant le sang ramassé dans les oreillettes, entre dans les ventricules, le cœur se contracte de nouveau pour pousser le sang; & c'est ce mouvement continuel de diafsole & de syssole qui forme le battement des arteres.

Le sang qui a été porté aux poumons par l'artere pulmonaire, doit revenir au cœur; il est rapporté, par les différentes ramifications des veines, à une grosse veine, qu'on nomme la veine *Pulmonaire*, qui se décharge dans l'oreillette gauche du cœur; & à l'aide de la contraction, il est poussé par le ventricule gauche dans l'aorte, qui le distribue jusqu'aux extrémités du corps, où il est reçu par les ramifications des veines qui se réunissent toutes en une branche principale, que l'on nomme la *Veine Cave*, & qui le rapporte dans l'oreillette droite du cœur, pour repasser de nouveau dans les poumons.

On estime que le ventricule gauche du cœur peut contenir environ deux onces de sang; ainsi à chaque contraction, le cœur pousse deux onces de sang dans l'aorte, qui en se gonflant, produit le battement. C'est l'opinion commune, qu'un homme a rarement plus de vingt-quatre livres de sang, & moins de quinze: dans la supposition de vingt-cinq livres, toute la masse du sang passe dans le cœur vingt-quatre fois par heure, c'est-à-dire, 576 fois durant vingt-quatre heures.

Plus on examine la mécanique du cœur, plus on l'admire. Il y a dans

cet organe onze valvules ; dont cinq sont destinées à y laisser entrer le sang , & à l'empêcher d'en sortir par le même endroit où il est entré ; les six autres laissent sortir le sang du cœur , & empêchent qu'il n'y revienne par la même voie. Ces valvules ont des formes différentes , & appropriées à leur usage ; elles sont placées dans les ventricules & dans les oreillettes ; en sorte que le sang qui est entré dans les oreillettes , ne peut ressortir que par les ventricules , & que ce même sang une fois dans les ventricules , ne peut plus rentrer dans les oreillettes : celui du ventricule droit est obligé de sortir par l'artere pulmonaire , & celui du ventricule gauche , par l'aorte. Il y a de semblables valvules dans les grosses veines , pour empêcher le sang de rétrograder , pendant qu'il est rapporté des extrémités vers le cœur ; mais il ne s'en trouve point dans les arteres , où elles feroient préjudiciables.

Tel est le mouvement admirable du cœur , dont la force , à chaque battement pour distribuer le sang dans toute l'économie animale , est égale à une force de cent mille livres pesant. Ce battement se fait environ deux mille fois par heure , sans jamais cesser , soit que nous veillions , soit que nous dormions , pendant toute notre vie. Les autres muscles se lassent & s'affoiblissent , après des efforts beaucoup moindres , qui ne durent souvent qu'un jour ; mais les muscles du cœur ne s'affoiblissent pas dans une longue suite d'années. En 1757 , le Professeur de Physique Alefeld démontra la présence de l'air dans le sang , par la pompe pneumatique , & foutint contre quelques Auteurs , que l'air entre dans le sang par le poumon , par le *thyme* , & par le *conduit de Pecquet* : il a donné même des preuves aussi simples que claires , que ce fluide y conserve sa vertu élastique ; il est entré enfin dans un détail des suites funestes & de la mort même qui arrive quelquefois dans le cas où l'on veut faire entrer de force & par violence l'air dans les vaisseaux , & dans le cas où l'air se sépare d'avec le sang & forme de grandes ampoules.

Il ne nous reste , pour avoir parcouru légèrement l'économie animale ; que de jeter un coup d'œil sur les glandes sécrétoires & excrétoires. On ne peut voir sans étonnement cette distribution & cette diversité de glandes qui séparent du sang , qui est en quelque manière insipide , des humeurs qui prennent tant de saveurs opposées , & dont l'usage est si différent dans notre économie. L'*urine* est salée , ainsi que les *larmes* & la *sueur* ; la *salive* est douce , la *bile* est amère ; elle paroît n'être autre chose que la partie saline du sang intimement mêlée avec des parties huileuses & du phlegme , ce qui la rend un corps savonneux , dont l'usage est de subtiliser le chyle , & de contribuer à la combinaison des parties huileuses & aqueuses. D'autres glandes , telles que celles des mammelles , extraient le lait des arteres ; ce lait , boisson si douce , nourriture si appropriée à l'enfant , n'est autre chose que du chyle , qui n'étoit pas encore mêlé avec le sang ; car il faut plusieurs heures pour qu'il puisse se combiner entièrement avec lui.

Tel est le tableau raccourci de l'histoire de l'homme, de son existence, de sa destination, de son domaine, de son gouvernement, de ses facultés physiques, de sa prééminence, &c. La nature de cet ouvrage exigeoit que nous missions des bornes à nos descriptions; nous l'avons fait, particulièrement sur le système de la génération; nous n'avons pas même discuté l'opinion de ceux qui l'établissent ovipare, tandis que d'autres la prétendent vivipare. Voyez la savante Thèse de M. Geoffroi (*Si l'homme a commencé par être ver.*), qui piqua tellement la curiosité des Dames du plus haut rang, qu'il fallut la traduire en François. Nous en avons fait de même à l'égard du siège de l'ame, que M. de la Peyronie place dans le corps calleux; ce petit corps blanc, un peu ferme & oblong, qui est comme détaché de la masse du cerveau, & que l'on découvre quand on éloigne les deux hémisphères l'un de l'autre. D'autres avant lui en avoient assigné le siège dans la glande pinéale; d'autres dans la moëlle allongée.

A l'égard de la nature & de la quantité des os qui composent la charpente humaine, nous avons cru devoir en parler à l'article SQUELETTE: l'ostéologie de l'homme mérite bien qu'on en parle séparément. Il en est de même à l'égard de la *barbe*, des *cheveux*, &c. dont on fera mention à l'article POIL. Quant aux différentes espèces de *peau*, *sur peau*, ou *cuticule*, leurs préparations & leurs usages dans les arts, voyez le mot PEAU. Nous exposerons à l'article Momie, les préparations que la Pharmacie en fait. Pour ce qui concerne la *graisse humaine* dont on se sert en Médecine, voyez au mot GRAISSE. La Médecine tire encore quelques autres remèdes des différentes parties de l'homme; le *crâne*, le *cerveau humain* donnent un sel & une eau anti-épileptiques, ainsi que les *cheveux* & le *sang*, mais tous ces remèdes sont aujourd'hui presque entièrement abandonnés. On tire de l'*urine* le fameux phosphore, connu sous le nom de phosphore d'Angleterre ou de Kunckel. Les *ongles* sont très vomitifs: le *lait* des femmes est restaurant, &c. Voyez tous ces mots, & ce qu'en ont dit les ouvrages des Chymistes modernes.

HOMME DES BOIS. Voyez HOMME SAUVAGE, & l'article SINGE.

HOMME MARIN, *Homo marinus*. Beaucoup de Voyageurs font mention d'hommes marins, auxquels ils ont donné les noms de *Tritons*, de *Néréides*, de *Syrenes*, de *Poissons femmes* ou *Amoïzes*: tous s'accordent à dire que ce sont des monstres marins, fort semblables aux hommes, du moins depuis la tête jusqu'à la ceinture.

On lit dans les *vélices de la Hollande*, qu'en 1430, après une furieuse tempête qui avoit rompu les digues de Westfrise, on trouva dans les prairies une femme marine dans la boue: on l'emmena à Harlem, on l'habilla & on lui apprit à filer, elle usa de nos alimens, & vécut quelques années, sans pouvoir apprendre à parler, & ayant toujours conservé un instinct qui la conduisoit vers l'eau: son cri imitoit assez les accents d'une personne mourante. L'Histoire générale des Voyages dit, qu'en 1560, des

des Pêcheurs de l'Isle de Ceylan prirent d'un coup de filet sept hommes marins & neuf femmes marines. Dimas Bosques de Valence, Médecin du Roi de Goa, qui les examina, & qui en fit l'anatomie en présence de plusieurs Missionnaires Jésuites, trouva toutes leurs parties intérieures très conformes à celles de l'homme terrestre. Toutes les descriptions de ces monstres marins, leur donnent la taille ordinaire d'un homme, mêmes configuration & proportions jusqu'à la ceinture, la tête arrondie, les yeux un peu gros, le visage large & plein, les joues plates, le nez fort camus, des dents très blanches, des cheveux grisâtres, quelquefois bleus, plats & flottans sur les épaules, une barbe grise & pendante sur l'estomach, qui est aussi garni de poils gris, comme dans les vieillards, la peau blanche & assez délicate. Le mâle & la femelle ont le sexe de l'homme & de la femme : on appelle *Tritons* les mâles, & *Syrènes* les femelles : celles-ci ont des mammelles fermes & arrondies comme les ont les Vierges ; les bras sont assez larges, courts & sans coudes sensibles, les doigts sont à moitié palmés, & leur servent de nageoires ; mais la partie inférieure, à prendre du nombril, est semblable à celle d'un poisson Dauphin, & elle se termine en queue large & fourchue. Nous doutons fort de tous ces faits. On trouve l'Histoire de semblables hommes marins, dans le 5^e. volume des *Mélanges d'Histoire naturelle*, & on laisse conjecturer que les hommes marins, dont on a donné en différens tems plusieurs relations, pourroient bien provenir d'une race particulière dont le premier pere & la première mere, étoient de véritables humains qui se seront habitués à la mer. Quand ceci seroit, quelles difficultés naitroient encore sur l'œuvre de la génération, celle de l'accouchement & la nourriture des nouveaux nés. Ces individus aquatiques se retireroient-ils exprès sur les Isles & les côtes inhabitées.

HOMME PORC-EPIC. M. le Docteur Ascanius a lu à la Société Royale de Londres la description d'un homme venu au monde bien constitué, & né de parents sains & bien conformés ; mais qui, six semaines après sa naissance, eut tout le corps chargé d'une infinité de petites excroissances, lesquelles se changerent peu-à-peu en especes de soies à demi transparentes, qui avoient la consistance de corne, & dont rien ne put arrêter le progrès. Ces soies avoient six lignes de longueur & deux ou trois de grosseur, & étoient implantées perpendiculairement dans la peau, comme dans les hérissons. La barbe de cet humain étoit noire ainsi que ses cheveux, & sa figure étoit intéressante. Mais voici un phénomène bien singulier : ces soies tomboient chaque année en automne, & renaissoient après. A l'âge de vingt ans, il fut attaqué d'une petite vérole confluente qui lui procura une mue générale sur le corps. Les soies repoussèrent aussi-tôt. Croiroit-on que cette espece d'homme sauvage est devenu amoureux d'une jeune fille qu'il a rendu sensible & dont il a eu six enfants tant filles que garçons, tous constitués comme lui, & également couverts de soies. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un garçon de cette

race d'homme , que les Anglois appellent *the porcupine-man*. On a envoyé de Lisbonne , aux Auteurs du Journal étranger , l'histoire d'une fille qui à l'âge de sept ans étoit d'une taille robuste & gigantesque. Son visage & tout son corps sont couverts de grands poils de diverses couleur & longueur , crepure & consistance. Ses cheveux n'ont rien d'extraordinaire.

HOMME SAUVAGE, *homo sylvestris*. C'est encore une espece de monstre , dont parlent un grand nombre de Voyageurs. Il vit , disent-ils , dans le milieu des bois , & à la parole près , il ressemble assez en grandeur & en figure à certains Barbares d'Afrique ; sa force est extraordinaire , il ne marche que sur deux pieds qu'il plie comme un chien à qui on a appris à danser ; il est fort adroit & léger à la course ; les Seigneurs des pays où il se trouve de ces hommes sauvages , leur font la chasse , comme on fait ici celle du cerf. Il a la peau fort velue , les yeux enfoncés , l'air féroce , le visage brûlé , & tous ses traits sont assez réguliers , quoique rudes & grossis par le soleil ; il se fert , comme nous , de ses deux bras : tout son corps est couvert d'une laine blanche , grise ou noire , il crie comme les enfants. Ces hommes sauvages sont , dit-on , d'un naturel fort tendre , & témoignent vivement leur affection & leurs transports par des embrassements ; ils trépignent aussi de joie ou de dépit quand on leur refuse ce qu'ils desirerent. Vraisemblablement cet homme sauvage , est l'homme des bois , c'est-à-dire , le *Barris* des Auteurs , le *Ourang outang* des Indiens , en un mot cette espece de singe à qui l'on donne quelquefois le nom de *vrai Satyre* , & qui est dit-on , assez entreprenant pour violer les filles & les femmes. On lit dans les *Mémoires de Trévoux* (Janvier & Février 1701) l'extrait d'une lettre écrite des Indes le 10 Janvier 1700 , où l'Auteur dit qu'étant le 19 Mai 1699 à la rade de Batavia , il vit sur le London , frégate Angloise qui revenoit de Borneo , l'enfant d'un de ces hommes sauvages qui n'avoit que trois mois ; il étoit haut de deux pieds , & tout couvert d'un poil fort court , il étoit fort camus , & avoit déjà autant de force qu'un enfant de sept ans : il en jugea par la résistance extraordinaire qu'il sentit en le tirant par la main , il ne sortoit de sa loge qu'avec peine & chagrin. Ses actions sembloient humaines ; quand il se couchoit , c'étoit sur le côté , appuyé sur une de ses mains , le poulx du bras lui battoit comme à nous.

M. de la Martiniere , dans son *Dictionnaire de Géographie* , rapporte qu'on prit un homme sauvage dans les bois d'Hanovre , & qu'on le porta en Angleterre , où George I le donna en garde à un particulier , mais cet homme sauvage mourut bientôt.

En 1661 quelques Chasseurs découvrirent dans une forêt de Lithuanie au milieu d'une troupe d'ours , deux enfants qui paroissoient avoir environ neuf ans , & dont les traits & la peau les firent reconnoître pour être de nature humaine. Les Chasseurs , après avoir mis en fuite les ours , ne purent se saisir que d'un de ces deux enfants , qui se défendoit beau-

coup avec les ongles & les dents : ils le présentèrent au Roi de Pologne. Cet individu étoit bien proportionné ; il avoit la peau blanche , les cheveux blonds , la physionomie agréable & belle. On le baptisa ; la Reine fut sa marraine & l'Ambassadeur de France son parrain , on lui donna pour nom de baptême celui de *Joseph* , & pour celui de famille *Ursin* , par allusion à la façon dont on prétend qu'il avoit été nourri. Mais quelque soin que l'on prît pour son éducation , on ne put l'appriivoiser entièrement , ni lui apprendre à parler. Il ne put jamais souffrir ni habits ni souliers : toutes ses inclinations , ses habitudes étoient sauvages , relativement à la raison , à la manière de se nourrir.

Le *Mercur de France* , (Décembre 1731) fait aussi mention d'une jeune fille sauvage trouvée dans les bois de Songi près Châlons en Champagne. On en a donné une histoire plus détaillée en 1755. On voit dans cette Histoire le caractère & les ressources de l'homme sortant des mains de la Nature. Cette petite fille qui n'avoit que neuf à dix ans , pressée par la soif entra dans le Village , elle n'avoit à sa main qu'un bâton court & gros par le bout comme une masse ; comme elle étoit presque nue , & qu'elle avoit les mains noires ainsi que le visage , les Payfans qui la prirent pour le diable , lacherent contre elle un dogue dont le collier étoit armé de pointes de fer ; elle l'attendit sans crainte , & d'un coup de bâton elle l'étendit mort sur la place ; elle regagna la campagne , elle se sauva sur un arbre où elle grimpa avec la légèreté des écureuils : on la prit par l'ordre du Seigneur , on l'emmena au Château où on lui donna un lapin en poil , qu'elle écorcha & mangea tout crud. On eut ensuite le plaisir de lui voir prendre des lievres à la course & de la voir plonger dans la rivière où elle alloit chercher le poisson qu'elle mangeoit tout crud. On apprit d'elle par la suite qu'elle avoit eu autrefois une compagne , mais qu'étant dans les terres , elle aperçut un chapelet qu'elle voulut ramasser pour s'en faire un bracelet , & que sa camarade qui desiroit aussi l'avoir , lui avoit donné un coup de masse sur la main ; mais que celle-ci lui avoit donné à l'instant un pareil coup de masse au front , & l'avoit renversée noyée dans son sang. Touchée de compassion elle courut chercher des grenouilles , en écorcha une , lui colla la peau sur le front & banda la plaie avec une lanière d'écorce d'arbre qu'elle avoit arrachée avec ses ongles ; la blessée prit le chemin de la rivière & disparut sans qu'on ait su depuis ce qu'elle est devenue. On conjecture que cette jeune fille étoit venue des terres Arctiques , & qu'elle étoit de la nation des Esquimaux. Elle vit encore à Paris sous le nom de Mademoiselle Leblanc.

On cite plusieurs autres exemples semblables d'hommes & femmes sauvages ou des bois , qui prouvent qu'on a en effet trouvé quelquefois des hommes sauvages , que des événements particuliers avoient éloignés de leurs retraites ordinaires. Mais il ne faut pas confondre le véritable homme sauvage avec de grands singes , ou d'autres animaux brutes qui ont quelque ressemblance extérieure avec l'homme par la forme , par les

gestes , par les façons d'agir , &c. Ce qui distingue essentiellement l'homme d'avec la brute , aux yeux du Naturaliste , c'est l'organe de la parole & la perfectibilité.

HÖRNBERG : la plupart des Minéralogistes disent que c'est la *Pierre de corne*. Voyez ce mot. On l'appelle aussi *Hornstein* : ces mots sont usités chez les Mineurs Allemands & Suédois.

HOTAMBŒIA : nom qu'on donne au *serpent puant de Ceylan* : il est d'une couleur jaune , il n'incommode personne par sa morsure , à moins qu'on ne l'irrite : mais peu de gens s'occupent de cette besogne ; car il exhale de sa gueule une vapeur si infecte , qu'on est obligé de fuir.

HOUATTE ou HOUETTE. Voyez APOCIN.

HOUBLON ou VIGNE DU NORD , *lupulus*. Plante serpentante , très précieuse , & qui est connue de tout le monde ; ses racines sont menues & s'entortillent les unes avec les autres. Il en sort des tiges foibles , très longues , tortillées , velues & rudes ; elles embrassent étroitement les perches & les plantes sur lesquelles elles grimpent : ses feuilles qui sont amères , sortent des nœuds deux à deux , opposés , rudes , communément découpées en trois ou cinq parties , portées sur des queues assez longues. L'espece qui porte les fleurs n'a point de graines , & celle qui porte des graines , n'a point d'étamines. Les fleurs naissent dans le mâle , de l'aisselle des feuilles ; elles sont en grappes comme celles du chanvre , pâles , sans pétales , composées de plusieurs étamines & d'un calice à cinq feuilles : elles sont stériles. L'espece femelle porte des fruits qui sont comme des pommes de pin , composés de plusieurs écailles membraneuses , pâles , jaunâtres , attachés sur un pivot commun , à l'aisselle desquels naissent de petites graines applaties , rousses , d'une odeur d'ail , amères & enveloppées dans une coiffe membraneuse.

Cette plante est très commune en différents pays , & croît dans les haies & les près. En Angleterre , en Allemagne , en Flandres , on sème & on cultive le houblon avec grand soin & beaucoup de dépense ; on le fait soutenir par de grands échelas , ou des perches à la manière des vignes.

Le houblon se plaît dans un terrain humide , peu pierreux , mais gras & bien fumé : on doit le labourer à l'entrée de l'hiver , & à la fin faire dans le plant des trous d'environ un pied en tous sens , & à quatre pieds de distance ; vers la fin de Mars on met dans ces trous du fumier , celui de pourceau y est très bon. L'année suivante lorsque le houblon a poussé à la hauteur d'un pied , on fiche en terre de petites perches , comme pour ramener des haricots , ensuite on jette de nouvelle terre autour de chaque plante ; au mois de Mai , on donne un troisième labour : vers le mois de Décembre , on met un demi pied de fumier sur chaque motte de houblon , on bêche la terre & on renfouit le fumier. En Mars , on bêche encore , & à la fin du mois on le taille , c'est-à-dire , qu'on coupe tout le vieux bois à rase du cœur de la plante ; en Avril , on plante à côté de chaque motte de houblon , de grosses perches de bois blanc , & on y lie

9-90

9-75

3-00

0-00

17-25

6-75

24-00

35-70

59-75

3-90

63-6

5-0

68-6

2-45

3-20

74-05

1-20

75-75

76-75

77-00

78-00

114-95

2-20

1-75

114-95

27-20

87-75

114-95


27-20

87-75

114-95

27-20

87-75



le houblon avec de bon fil ; en Septembre & dès qu'il jaunit , ce qui en marque la maturité , on coupe avec la faucille les sarments à deux pieds de terre ; puis on détache les fruits : mais ce n'est guere qu'à la troisième année qu'on peut espérer beaucoup de rapport de cette plante.

Il y a une rosée farineuse & mielleuse , qui tombe en été au lever du soleil , dans le tems que le houblon est en fleur ; elle fait sécher & périr les feuilles , & ruine quelquefois la récolte. Pour prévenir ces mauvais effets , on doit aussitôt arracher les feuilles de houblon : car les semences repoussent d'autres feuilles ; par ce moyen on sauve quelquefois les deux tiers de la récolte ordinaire.

Toute cette plante devient beaucoup plus belle par la culture ; ses épis sont chargés de fleurs , ses écailles & sa graine sont plus grandes ; ses épis , que nous avons comparés à des pommes de pin , & que l'on appelle souvent , mais improprement *fleurs* , se recueillent aux mois d'Août & de Septembre : on les sèche dans un four préparé pour cela , on les renferme ensuite dans des sacs , on les vend en cet état , & on les garde pour faire la biere. On mange les jeunes pousses de houblon qui paroissent au commencement du printemps : on les fait cuire dans de l'eau comme les asperges , & on les mange à la même sauce : elles purifient la masse du sang. Ses feuilles & ses racines sont aussi d'usage en Médecine ; les fruits frais ont une odeur agréable , & contiennent une matiere grasseuse , résineuse , aromatique , qui paroît être le principe de leur odeur & de leur amertume.

Tout le monde fait l'usage que l'on fait des fruits du houblon pour assaisonner la biere , afin qu'elle ne s'aigrisse & ne se gâte pas ; ils empêchent , par leur sel volatil & par leur huile aromatique , qu'elle ne prenne un goût de chaux : ils atténuent sa viscosité , & la font couler par la voie des urines : ils lui communiquent une très grande amertume , mais qui disparoît peu-à-peu , & la biere en devient plus forte & plus vineuse.

On regarde la biere faite avec le houblon , comme plus salutaire & de meilleur goût ; elle est plus apéritive , plus amie de l'estomac , & plus propre à la digestion ; cependant elle porte plus à la tête , enivre , elle jette dans l'assoupissement , & produit même le cochemar. Ces effets sont d'autant plus marqués , qu'il y a plus de houblon dans la biere , & qu'elle est plus amere : au reste , la nature du houblon y fait aussi beaucoup , puisque celui qui vient d'Isenac dans la Thuringe , est d'une amertume mordicante , au lieu que celui de Brunswick est plus doux : on prétend que la biere faite avec le houblon augmente les paroxismes de ceux qui ont le calcul ; au lieu que l'*aile* , espece de biere où il n'entre point de houblon , les adoucit : c'est aux Nations qui font usage de la biere au houblon à vuider ce procès.

Les feuilles , les fruits & les jeunes pousses du houblon , sont apéritifs , très propres à lever les obstructions de la ratte & à lâcher le ventre :

ces remèdes conviennent aussi dans le scorbut, & pour les vices de la peau; appliqués extérieurement, ils sont excellents dans les luxations, les tumeurs œdémateuses, les contusions & dans les accès de la goutte. Il y a apparence que les tiges du houblon macérées ou rouies donneroient une filasse aussi bonne que celle de l'ortie, & plus longue que celle du chanvre.

HOUILLE. Voyez CHARBON DE TERRE OU DE PIERRE.

HOUPEROU, est un poisson de l'Amérique, fort dangereux. Thevet dit qu'il dévore tous les autres poissons, excepté un seul, qui est petit, & qui le fuit toujours, soit par sympathie, soit pour se mettre à l'abri de quelques autres poissons. Quand les Sauvages pêchent tout nus, ils redoutent avec raison le houpperou: car s'il les rencontre, il les noie ou les étrangle, ou s'il ne fait que les toucher de la dent, il emporte la pièce. Ce poisson a sous la gorge deux appendices qui ressemblent à des tétines de chèvre. Le houpperou paroît être un *goulu*, & le petit poisson un *remore*. Voyez ces mots.

HOURITE, est un poisson des Isles de l'Afrique, dont parle Dapper, & dont on fait une grande consommation à Madagascar. Le poisson hourite que nous avons vu chez un Curieux de Zélande, ressemble beaucoup à un éperlan, qui auroit des taches bleues.

HOUX, *aquifolium*. Est un arbrisseau toujours verd, qui croît aux lieux incultes, ombrageux, dans les forêts; il s'y élève quelquefois à la hauteur d'un arbre, sur-tout lorsqu'il est cultivé. Son tronc & ses branches, qui sont lisses & pliantes, sont couvertes de deux écorces; l'écorce extérieure des branches est verte, & celle du tronc est cendrée le plus souvent; l'intérieur est pâle: l'une & l'autre répandent une odeur désagréable & puante, lorsqu'on les enlève: on fait avec ces branches flexibles des houssines & des manches à fouet. Le bois est dur, solide, blanchâtre, mais noirâtre dans le centre, si pesant qu'il reste au fond de l'eau, comme le buis & le gayac. Ses feuilles sont d'un beau verd; unies, presque semblables à celles du laurier, mais plus petites, sinuées tout autour, anguleuses & hérissées de pointes longues & roides, dont le nombre diminue dans la vieillesse de l'arbrisseau. Ses fleurs sont petites, nombreuses, d'une seule feuille & en rosette, découpées en quatre quartiers; le pistil se change en une petite baie ronde, creusée, rouge, douceâtre, d'un goût désagréable, remplie de quatre petits osselets blancs, triangulaires & oblongs.

M. Martin, Professeur de Botanique à Cambridge, a donné à la Société de Londres ses observations sur le sexe du *houx*: ce Docteur détruit l'ancienne opinion qui portoit à croire que le houx étoit une plante hermaphrodite. Le célèbre Linnæus le place parmi les plantes qui ont quatre organes réciproques sur la même fleur; mais M. Martin en examinant les fleurs de six plantes de houx disposées deux à deux dans son

jardin , remarqua que chaque paire avoit une plante mâle & une femelle. Les fleurs mâles ont quatre étamines jaunes , chargées de poussière , les fleurs femelles sont caractérisées par un ovaire & par quatre petits filaments que quelques Botanistes avoient pris pour des étamines. M. Watson , qui a voulu s'assurer par lui-même de l'exactitude de l'observation précédente , a reconnu qu'il y avoit effectivement beaucoup de houx dont les uns étoient mâles & les autres femelles , mais qu'il y en avoit dont les fleurs sembloient réunir les deux sexes : il dit encore que les houx ont comme le murier , plusieurs manieres de se multiplier.

On cultive le houx , sur-tout dans les pays du Nord , pour servir d'ornement dans les jardins. Le houx panaché est une espece de houx , dont la feuille est tachetée de jaune. La racine , l'écorce & les baies du houx sont rarement d'usage en Médecine : on en fait cependant des décoctions émollientes , utiles pour la toux invétérée , & pour fomenten les articulations qui se sont durcies après avoir été luxées. Un mélange de biere & de lait dans lequel on a fait bouillir les pointes des feuilles de houx , est merveilleusement utile pour la colique & les tranchées des intestins.

Les Anglois font , de la maniere suivante , avec de l'écorce de houx , la glu propre à prendre les oiseaux à la pipée. Au mois de Juin & de Juillet on pele une certaine quantité d'arbres de houx dans le tems de la sève : on jette la premiere écorce brune , & on prend la seconde ; on fait bouillir cette écorce dans de l'eau de fontaine pendant sept à huit heures , jusqu'à ce qu'elle soit attendrie ; on en fait des masses que l'on met dans la terre , & que l'on couvre de cailloux , en faisant plusieurs lits les uns sur les autres , après avoir préalablement fait égoutter toute l'eau ; on les laisse fermenter & pourrir pendant quinze jours ou trois semaines , jusqu'à ce qu'elles se changent en mucilage ; on les retire & on les pile dans un mortier , jusqu'à ce qu'on puisse les manier comme de la pâte ; après cela on les lave dans de l'eau courante , & on les pêtrit pour enlever les ordures : on met cette pâte dans des vaisseaux de terre pendant quatre ou cinq jours , pour qu'elle jette son écume & qu'elle se purifie ; ensuite on la met dans un autre vaisseau convenable , & on la garde pour l'usage. La meilleure glu est verdâtre , & ne doit point avoir de mauvaise odeur. Dodonnée assure que la glu faite avec l'écorce de houx , n'est pas moins nuisible , prise intérieurement , que celle que l'on fait avec le gui ; car elle est fort tenace , elle colle tous les intestins , elle empêche la sortie des excréments , & elle cause la mort , sans autre qualité destructive que sa substance gluante. La glu appliquée extérieurement , résout , amollit & fait aboutir. Voyez à l'article GLU , la préparation d'une bonne glu artificielle.

HOUX FRELON ou **PETIT HOUX**, *Ruscus*, sive *Bruscus*. Cette plante , qui croît aux lieux rudes & pierreux , dans les bois , dans les forêts & dans les haies , se nomme encore *fragon*, *housson*, *myrte-sauvage* ou *épineux*, & *buis piquant* ; sa racine est grosse , tortue , raboteuse , dure , serpentante , blanche & garnie de grosses fibres , d'un goût âcre , un peu

amer. Elle pousse plusieurs tiges à la hauteur de deux pieds , rameuses , pliantes , difficiles à rompre , cannelées , & divisées en plusieurs rameaux. Ses feuilles sont semblables à celles du mirthe , mais plus fermes , plus rudes , pointues , piquantes , nerveuses , sans odeur , sans queues , toujours vertes , d'un goût amer & astringent. Au milieu des feuilles naissent des fleurs d'une seule piece , découpées en six parties , jaunâtres ; il leur succede des baies rondes , grosses comme des pois , un peu molles , & qui rougissent en mûrissant , d'un goût douceâtre , contenant une ou deux semences dures comme de la corne.

Cette plante fleurit en Avril & Mai : il sort de sa racine , au printems , quelques rejettons tendres & verts , qui peuvent être mangés comme des asperges. Si on les laisse croître , ils deviennent feuillus , ligneux & pliants : on en fait des balais. Autrefois les paysans couvroient avec le houx les viandes & les autres choses qu'ils vouloient défendre contre les rats & les fouris ; car ces animaux destructeurs ne pouvoient y pénétrer qu'en se piquant bien fort.

Toutes les parties de cette espece d'arbrisseau sont d'usage en Médecine , & sont propres pour diviser les humeurs crasses , en les faisant passer par les urines. Sa racine est une des *cinq racines apéritives majeures* , qui sont celles d'ache , d'asperges , de fenouil , de câprier (quelquefois de persil) & de petit houx : on s'en sert communément à la dose de demi-once dans les tisannes , apozèmes & bouillons apéritifs , qu'on prescrit dans la jaunisse , l'hydropisie , les pâles couleurs & la gravelle. La conserve des baies de petit houx , est bonne pour l'ardeur d'urine & dans la gonorrhée.

HUART ou HUARD. Oiseau aquatique , ainsi nommé parcequ'il prononce ce mot très distinctement en chantant : on en trouve beaucoup dans la riviere de Mississipi. C'est une espece d'aigle qui rode le long des étangs. *Voyez AIGLE.*

HUETTE ou HULOTTE, *Ulula*. Oiseau nocturne , ou espece de hibou qui se retire dans les creux des arbres : il est de la grosseur d'une poule. Son plumage est cendré & cannelé de noir ; ses jambes sont velues jusques sur les ongles qui sont cendrés & crochus. L'envergure est fort grande , le bec courbé & luisant. Il ne ferme l'œil qu'avec la paupiere d'en haut : ses yeux sont noirs , environnés de petites plumes blanches. Sa tête , d'une énorme grosseur , est bien garnie de plumes. *Voyez les mots CHAT-HUANT, FRÉSAIE & HIBOU.*

HUILE DE CADE. *Voyez* à l'article GENEVRIER.

HUILE MINÉRALE DES BARBADES ou DE GABIAN , ou DE TERRE. *Voyez* PÉTROLE & NAPHTÉ.

On donne aussi le nom d'*huile* à différentes substances inflammables , plus ou moins grasses & fluides ou concretes , qu'on tire d'une grande quantité de végétaux , soit par expression , soit par distillation. On en tire aussi de quelques animaux par liquéfaction.

Les *huiles par expression* les plus en usage dans les arts , sont celles d'œillette

lette ou de pavot, de hêtre, de sésame ou jûgeoline, de moutarde, de semences froides, d'olives, de noix, de navette, de colza, d'amandes, de pignons, de lin, d'avelines, d'acajou : il y en a qui sont presque toujours concretes, comme celles de ben; ou butireuses, comme celles de cacao, de coco ou de palmier, d'aouara, de muscade & de baies de laurier.

Les *huiles par distillation* les plus en usage, sont appellées du nom d'*essences*; telles sont les huiles de canelle, de girofle, de néroly, de cédra, de bergamote, de citron, de lavande, de genievre, d'origan, de couli-lawan. Entre ces sortes d'huiles, il y en a qui sont souvent congelées, telle est celle d'anis : il y en a d'empyreumatiques & de pesantes, comme celle de gayac; d'empyreumatiques & de légères, comme celle de cade, &c. Mais une propriété bien singulière que n'ont point nos huiles essentielles de l'Europe, & que possèdent uniquement les huiles de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amérique, sur-tout celles des plantes aromatiques, c'est d'être plus pesantes que l'eau, & de se précipiter au fond sans rien perdre de leurs vertus. L'huile de girofle, celle de canelle, &c. en fournissent des exemples.

Les *huiles des animaux* se tirent par liquéfaction de quelques-unes de leurs parties; telles sont celles de morue & de baleine, de chien de mer & de marsouin : on les appelle souvent *huiles de poisson*. Le *beurre* de vache & le *blanc* de baleine ne sont que des espèces d'huiles animales épaissies, & la cire que les abeilles ramassent dans le nectaire des plantes, n'est qu'une huile végétale concrete. On peut aussi consulter le mot PLANTE de cet ouvrage, où l'on verra que la Nature a assigné le réservoir des huiles végétales, soit dans les fleurs, soit dans les fruits, ou dans l'écorce de l'arbre, &c. Quant aux propriétés des huiles que nous venons de citer en exemple, les unes servent à éclairer à peu de frais; d'autres à préparer des laines ou à corroyer les cuirs : il y en a d'usage en Médecine, dans les aliments, dans les liqueurs de table, de toilette, & dans les parfums; d'autres enfin qui lient admirablement bien les couleurs, & servent à immortaliser les ouvrages des Peintres, &c. Souvent on altere les huiles essentielles qui sont rares ou chères, soit avec de l'huile grasse de ben, soit avec de l'esprit-de-vin, ou avec quelqu'autre huile essentielle de peu de valeur. Voici la manière de reconnoître cette falsification : une goutte d'huile essentielle pure mise sur du papier, doit s'évaporer à une douce chaleur, & ne laisser au papier ni graisse ni transparence : elle doit aussi se dissoudre entièrement dans l'esprit-de-vin; mais elle ne doit pas rendre l'eau laiteuse, ni donner au linge qui en feroit imbibé, une odeur thérébinthinée.

HUILE DU STYRAX D'AMÉRIQUE. *Voyez* LIQUIDAMBAR.

HUITRE, *Ost·eum*. Est un genre de coquillage bivalve que tout le monde connoît. Il approche beaucoup du genre des coquillages operculés : ses deux battans sont composés de plusieurs feuilles ou écailles. L'écaille

de l'huître est épaisse, robuste, pesante, quelquefois d'une grandeur considérable, d'une figure presque ronde, ordinairement raboteuse & inégale, à battants presque toujours inégaux, rudes & âpres en dehors, lisses & argentés en dedans, dont l'un est plus ou moins creux, & l'autre applati, attachés ensemble dans leur milieu par un ligament.

Dans l'Histoire Naturelle que nous avons donnée des coquilles à l'article COQUILLE de cet Ouvrage, nous nous sommes réservés à décrire les particularités de chaque genre de coquillage à leur article séparé. Nous allons continuer de remplir ici cet engagement.

Différences dans la structure des coquilles d'Huîtres.

C'est dans une collection de ces coquilles, qu'on en peut voir la variété infiniment agréable. Les huîtres sont souvent garnies de pointes & de parties hérissées : quelques-unes représentent un gâteau feuilleté ou un hérisson ; d'autres ont des excroissances ou des parties en zigzag, imitant l'oreille de cochon ou la crête de coq ; d'autres sont groupées sur des rochers, sur des madrepores. Les huîtres ont un caractère générique qui les doit faire distinguer des comes avec lesquelles on les trouve presque toujours confondues chez les Auteurs. Voyez le mot CAME.

L'huître est composée de plusieurs croutes ou lames formant une surface raboteuse : sa coquille supérieure est plus platte que l'inférieure ; elle a un bec qui s'élève à une de ses extrémités. Ce bec qui sert aussi à distinguer la différence des huîtres, est quelquefois allongé, applati, recourbé, & terminé par un angle aigu : dans d'autres le bec est très petit, posé en dessous, & presque entièrement caché. L'huître se ferme exactement, nonobstant ses surfaces raboteuses & les pointes dont elle est souvent garnie. Les espèces les plus singulières des huîtres, sont celles qu'on appelle le *marteau*, l'*oiseau* ou *hirondelle*, la *pelure d'oignon*, le *pied d'âne*, la *feuille*, l'*oreille de cochon* ou la *crête de coq*, la *selle polonoise*, la *vître chinoise*. Voyez chacun de ces mots. La diversité des pointes & des tubercules qu'on observe sur la robe des huîtres & leurs belles couleurs, ne sont peut-être que des variétés, & ne forment pas des espèces. La nature de l'huître est d'être adhérente aux rochers ou à quelque autre corps, par le moyen de la même liqueur glutineuse dont elle a été formée. On soupçonneroit avec assez de vraisemblance, que les *pintades*, l'*hirondelle*, le *marteau*, &c. ne sont pas exactement des huîtres, ayant pour caractère une échancrure par où passe une sorte de *byssus* qui sert à les attacher ; mais ce byssus est fort différent de celui de la *pinne marine*. Voyez ce mot.

Description de l'Huître commune : frai, & saison de la maladie de ce coquillage. Huîtres vertes.

L'huître est composée de toutes les parties qu'ont les autres animaux à

coquilles : c'est un coquillage immobile par son poids, qui ne s'ouvre que d'un pouce au plus pour respirer, prendre l'eau par ses suçoirs & les aliments qui lui sont nécessaires, que l'on dit consister en sucs de petits animaux, de plantes & de certaines parties d'une terre limoneuse. Il n'y a que la partie supérieure de l'huître qui ait un mouvement ; l'inférieure est immobile & sert de point de résistance. L'huître perdrait son eau si elle n'étoit couchée sur le dos. L'ouverture de sa bouche est entre les ouïes ; elle est bordée de grandes levres chargées de suçoirs, ce qui forme une espèce de fraise transparente & dure, qui tapisse des deux côtés les parois intérieures des deux valves. Elle conserve beaucoup d'eau dans son réservoir, & c'est ce qui prolonge sa vie hors de la mer. Le ligament à ressort qui fait le jeu des coquilles, est renfermé entre les deux battants, positivement dans le talon ou sommet de la coquille. Les deux écailles n'ont point de charnière ; le muscle tendineux qui les réunit, leur en tient lieu. Les quatre feuilletts pulmonaires servent à l'huître à se décharger d'une humeur superflue, & à aspirer un nouveau suc. L'huître a la chair molle & une membrane blanche, contenant une matière marbrée d'un jaune brunâtre, qui paroît être les intestins. On présume que c'est de cette matière épaisse & coagulée, que sort l'humeur laiteuse qui perpétue l'espèce & produit la semence. Cette humeur laiteuse passe par différents degrés d'accroissement avant que de laisser entrevoir les deux écailles renfermées dans son centre. On verra dans un moment que cette masse glaireuse, vivifiée par de petits vers rouges & portée par les flots agités sur les branches des mangliers qui bordent les côtes stériles de la mer dans l'Isle de Cayenne, &c. produit des huîtres qui donnent des perles & paroissent pendre des branches de ces arbres. L'huître n'a que deux tendons ou attaches d'une couleur violette foncée, qui la joignent à ses deux écailles, dont la supérieure est ordinairement plate ; l'autre est creuse, & contient tout le corps de cet animal : elle a été anatomisée par Lister & Willis.

S'il est difficile de découvrir les parties de la génération de cet animal, il n'est pas plus facile de distinguer les mâles d'avec les femelles. Il paroît même que les huîtres ne pouvant quitter le lieu où elles ont pris naissance, sont dans l'impuissance de s'unir : ainsi elles doivent être hermaphrodites, & il ne peut exister de variété dans les sexes de ces individus. On fait seulement qu'au mois de Mai ces animaux jettent leur *frai*, qui est de figure lenticulaire. On apperçoit avec un bon microscope, dans cette substance laiteuse, une infinité d'œufs, & dans ces œufs de petites huîtres déjà routes formées. Le frai ou la semence des huîtres s'attache à des rochers, à des pierres, à de vieilles écailles, à des morceaux de bois & à d'autres choses semblables, dispersées dans le fond de la mer : nous en avons vu se fixer dans des bouteilles de verre, dans des moules à sucre, dans des souliers & sur un fusil, qu'on avoit jettés exprès dans la mer à la fin de Mars : le frai avoit été déposé sur ces matières dans l'intervalle de cinq semaines.

On conjecture avec assez de vraisemblance , que les œufs commencent à se couvrir d'écailles dans l'espace de vingt-quatre heures.

Les huîtres sont malades & maigres après avoir frayé ; mais au mois d'Août elles ont repris leur embonpoint. Lister & Willis prétendent que la maladie de l'huître se connoît dans le mâle à une certaine matiere noire , qui paroît dans les ouies ; & dans les femelles , à la blancheur de cette matiere.

Au mois de Mai , il est permis aux Pêcheurs , suivant les Réglements , de pêcher toutes sortes d'huîtres ; & comme l'on compte souvent sur une seule pierre ou une seule écaille vingt petites huîtres , il leur est enjoint , pour entretenir la multiplication de l'espece , de les remettre à la mer : le mois de Mai passé , ils ne peuvent pêcher que des huîtres d'une grandeur raisonnable. Quant au frai qu'ils ont détaché des pierres , & aux huîtres encore tendres , ils les mettent comme en dépôt dans un certain détroit de mer , où elles croissent & s'engraissent de maniere qu'en deux ou trois ans elles parviennent à leur perfection.

Pour donner aux huîtres la couleur verte , les Pêcheurs les renferment le long des bords de la mer dans des fosses profondes de trois pieds , qui ne sont inondées que par les marées hautes à la nouvelle & pleine lune , y laissant des especes d'écluses par où l'eau reflue jusqu'à ce qu'elle soit abaissée de moitié. Ces fosses verdissent , soit par la qualité du terrain , soit par une espece de petite mousse qui en tapisse les parois & le fond , ou par quelqu'autre cause qui nous est inconnue ; & dans l'espace de trois ou quatre jours , les huîtres , qui y ont été enfermées , commencent à prendre une nuance verte. Mais pour leur donner le tems de devenir extrêmement vertes , on a l'attention de les y laisser séjourner pendant six semaines ou deux mois. Les huîtres vertes que l'on mange à Paris , viennent ordinairement de Dieppe. Les meilleures & les plus estimées sont celles qu'on pêche en Angleterre ; on en transporte aussi en Xaintonge vers les marais salans , où , par le séjour qu'elles y font , elles acquierent une couleur verdâtre , & prennent un goût beaucoup plus délicat qu'auparavant. Il suffit donc , comme on vient de le voir , pour rendre les huîtres vertes , de les faire parquer dans des anses bordées de verdure. Ces huîtres vertes sont très recherchées & avec raison. Il faut cependant se méfier de la couleur verte artificielle que des imprudents savent leur donner.

Opinions sur la nature des Huîtres de nos côtes , & sentiments sur celles des Indes , qui croissent aux branches des palétuviers ou mangliers , &c.

Des Auteurs ont rangé l'huître parmi les zoophytes ou plantes animaux , & ont cru qu'elles croissoient & décroissoient avec la lune. La plupart des modernes ont réfuté ce sentiment : l'un d'entr'eux dit qu'il n'y a que les

huîtres & les moules , soit solitaires , soit en masses , auxquelles on puisse refuser un mouvement progressif , comme ne sortant jamais de leur place , à moins qu'on ne les détache exprès. L'huître étant en masse ne peut se mouvoir , étant , dit-il , attachée par son byssus (qui est dans ce coquillage une bave collante) aux autres huîtres : elle est assise sur l'angle aigu de sa pointe comme sur un pivot : il n'y a que la valve supérieure qui ait quelque liberté , & l'huître ne fait rien sortir. Les huîtres s'attachent à tout ce qu'elles trouvent : elles ne demandent qu'un point d'appui ; les rochers , les pierres , les bois , les productions marines , tout leur est propre : souvent même elles se collent les unes aux autres , au moyen d'une espece de glu qui sort du poisson & qui est extrêmement forte.

M. Adanson , qui a fait des observations particulieres sur les coquilles , dit que la plupart des huîtres , qui vivent éloignées les unes des autres , sont dans l'impuissance de se joindre par la copulation , & que cependant elles engendrent leurs semblables ; d'où l'on peut conclure que ces animaux n'ont besoin d'aucun sexe pour se reproduire , ou que chaque individu les réunit tous deux.

Les Voyageurs ont débité faussement qu'à la Chine on sème dans des especes de marais le frai exprimé des huîtres pilées & hachées : le fait est impossible. Mais il est vrai qu'aux environs de Constantinople , dans le Bosphore de Thrace , on sème , pour ainsi dire , tous les ans des huîtres toutes entieres. Ce sont les Grecs principalement qui y amènent des navires pleins d'huîtres qu'ils jettent à la pelle dans la mer pour en avoir des provisions à souhait.

On trouve des huîtres en abondance aux environs du Sénégal en Afrique : les Negres se servent de leurs écailles pour en former de la chaux. Au village de Joal , Royaume de Barbossen , il se trouve aussi dans les marigots quantité d'huîtres de mangliers , mal-faites , mais bonnes & délicates. A Gambie & dans les fleuves qui confinent au Sénégal , il se trouve des huîtres en quantité , & qui sont plus ou moins estimées ; car il y en a de grandes & de mal-faines. Il y a à la Concession du Sénégal , des montagnes de coquilles d'huîtres , dont on fait de la chaux , ainsi que dans les environs. M. Adanson , dans son *Histoire des Coquillages du Sénégal* , dit qu'il n'y a pas dix ans que l'on trouvoit encore des huîtres sur les racines des mangliers du Niger , près de l'Isle du Sénégal ; & qu'aujourd'hui on en trouve encore dans le fleuve de Gambie & dans les rivières de Bissao. On sert ces racines toutes garnies d'huîtres , sur les tables du pays. On rencontre encore à Saint-Domingue & sur toute la côte du Port-au-Prince , des mangliers , dont les tronçons qui baignent dans l'eau , sont garnis d'huîtres feuilletées , ordinairement cramoisies , jaunes , rouges , leur charniere est dentée , &c. Pour les avoir , on fait plonger un Negre ; & avec une espece de serpe , il coupe les parties du bois qui en sont chargées. On trouve aussi à la côte d'Or quantité d'huîtres , dont les écailles servent à faire de la chaux ; les Anglois qui y sont établis , s'en servent pour leurs édifices : mais en 1707

les Hollandois , dans la seule vue de leur ôter ce secours , bâtirent un Fort de sept ou huit canons . avec une garnison pour la garde des huîtres . La mer & la rivière d'Issini produisent une grande abondance d huîtres , & d'une monstrueuse grosseur . On en trouve dans l'Isle de Tabago & à la côte de Coromandel , de plusieurs especes qui sont attachées au roc , & qui sont très bonnes à manger . Il y a d'autres huîtres qui portent des perles : elles sont sous l'eau , à la profondeur de quatre ou cinq brasses ; des Negres plongeurs les attrapent en plongeant : on appelle cette coquille *Mere de perles* , *Pintade blanche* , *Nacre de perles* . Voy. ces mots & le mot PERLES .

Les huîtres de *mangliers* , que les Anglois nomment *mangrove* . tiennent à l'extrémité des branches de l'arbre de ce nom , qui croît au bord de la mer ; & le grand nombre de coquillages qui tiennent à ces branches , les courbe de plus en plus , de sorte que ces animaux sont rafraîchis deux fois le jour par le flux & le reflux de la mer . Ces huîtres n'ont point de goût ; leurs coquilles sont transparentes & nacrées : des Espagnols s'en servent en guise de verre . Il y a plusieurs sortes d'huîtres dans l'Isle de Cayenne : les unes y sont appelées *huîtres de Senamary* (rivière qui sépare Cayenne d'avec Surinam) ; elles sont fort grandes ; on les détache des rochers à coups de serpe : on nomme les autres *rer* , c'est-à-dire *huîtres de paletuviers* . On voit aussi , dit-on , deux sortes d'huîtres à la Guadeloupe : la première est assez semblable aux nôtres ; la seconde est toute platte , & a une petite houppe de poils dans le milieu , comme un petit barbillon (c'est la conque anatifere) . Ces huîtres sont tellement âcres , qu'il est impossible d'en manger .

Huîtres fécondes & stériles. Vers accoucheurs de ces coquillages.

On distingue dans les Ports de mer deux sortes d'huîtres : les fécondes & celles qui ne le sont pas . Une petite frange noire qui les entoure , est la marque de leur fécondité & de leur bonté : les friands ne les manquent point , & les trouvent plus succulentes au goût . Dans la saison où les huîtres fécondes jettent leurs œufs , ou , comme parlent les Pêcheurs , leurs grains , elles sont laiteuses , désagréables & mal-saines . En Espagne il est défendu d'en draguer & d'en étaler aux marchés , à cause des accidents qu'elles pourroient causer à ceux qui inconsidérément en feroient usage .

M. Deslandes dit que dans la saison où les huîtres jettent leurs œufs , elles sont remplies d'une infinité de petits vers rougeâtres . Ceux qui remuent de gros tas d huîtres pendant la nuit , apperçoivent quelquefois ces vers sur leurs écailles ; ils paroissent comme des particules lumineuses , ou comme de petites étoiles bleuâtres : on voit facilement ces petits vers pendant le jour , par le moyen d'un microscope ou d'une loupe . M. Deslandes a aussi observé que tous les grands coquillages bivalves , sur-tout certaines grosses moules qui , dans l'Océan s'attachent au fond des vaisseaux , sont pendant la nuit des phosphores naturels . Mais de quel usage

peuvent être ces petits vers rougeâtres aux huîtres fécondes , & seulement dans la saison où cette fécondité se déclare ? M. Deslandes conjecture qu'ils leur servent , pour ainsi dire , d'*accoucheurs*. M. de Réaumur & d'autres leur ont donné aussi ce nom , en disant qu'ils excitent , d'une manière qui nous est inconnue , les organes destinés à la génération. Pour s'en assurer , M. Deslandes a répété plusieurs fois l'expérience qui suit.

Cet Observateur a pris des huîtres fécondes , & les a mises , vers le mois de Mai , dans un réservoir d'eau salée : elles ont laissé à l'ordinaire une nombreuse postérité. Il en a répété ensuite l'expérience avec d'autres huîtres fécondes , dont il avoit retiré tous les petits vers qui y étoient renfermés : ces dernières huîtres n'ont rien produit , & la stérilité a régné dans le réservoir où elles avoient été placées. Ces vers accoucheurs , dont M. de Réaumur & d'autres Naturalistes ont parlé , sont tout-à-fait différents de certains vers blanchâtres & luisants , qu'on trouve aussi dans les huîtres. Ces derniers vers ressemblent à une grosse épingle , & ils ont depuis cinq jusqu'à huit lignes de long. Il est très difficile de les examiner en entier ; car au moindre attouchement & à la moindre secousse , ils se résolvent en une matière gluante & aqueuse , qui s'attache même aux doigts.

Ennemis des Huîtres.

Les huîtres ont pour ennemis , les crabes , les étoiles marines , la grenouille pêcheuse ou le baudroi , les pétoncles & les moules : l'algue & la vase les font également périr dans leur naissance. Lorsque l'huître entr'ouvre son écaille pour renouveler son eau , le crabe de vase , toujours porté à lui dresser des pièges , lui jette une petite pierre qui empêche que sa coquille ne se referme , & ainsi il a la facilité de prendre l'huître & de la manger.

Qualités des Huîtres , & leurs propriétés en Médecine.

L'huître , dit Belon , est le meilleur des testacées ; les Anciens & les Modernes l'ont regardée comme un mets exquis. Macrobe dit qu'on en servoit toujours sur les tables des Pontifes Romains : Horace a fait l'éloge des huîtres de Circé ; les Anciens vantoient aussi celles des Dardanelles , du lac Lucrin , du détroit de Cumes , & celles de Venise. Apicius , qui a écrit sur la Cuisine , avoit l'art de conserver les huîtres , puisqu'il en envoya d'Italie en Perse à l'Empereur Trajan , & qui à leur arrivée étoient aussi fraîches que le jour de leur pêche.

On a vu dans les paragraphes précédents , que chaque côte du Monde habité fournit des huîtres dont les écailles sont de différentes couleurs : ces mêmes huîtres ont des goûts différents. Il y a des huîtres en Espagne qui sont de couleur rousse ou rouge ; d'autres en Illyrie de couleur brune , &

dont la chair est noire : dans la mer rouge il y en a de couleur d'iris , & en d'autres endroits la chair & l'écaille sont noires.

Quant aux qualités des huîtres , on les doit choisir nouvelles , d'une grandeur médiocre , tendres , humides , délicates , d'un bon goût , & qui aient été prises dans les eaux claires & nettes , sur-tout vers les embouchures des rivières ; car les huîtres aiment l'eau douce , elles y engraisent beaucoup & y deviennent excellentes. Celles au contraire qui se trouvent fort éloignées des rivières , & qui manquent d'eau douce , sont fort dures , amères , & d'une saveur désagréable. Chez nous on préfère les huîtres de Bretagne à toutes celles des autres côtes de France : celles de Xaintonge passent pour être plus âcres ; celles de Bordeaux , qui ont la tête noire , sont d'un goût exquis : on dit cependant que celles d'Angleterre sont préférables à toutes celles de l'Europe. Le Chancelier Bacon dit que les huîtres de Colchester étant mises dans des puits qui ont coutume d'éprouver le flux & reflux de la mer , sans toutefois que l'eau douce leur manque , s'engraissent & croissent davantage. Toutes les huîtres qui se débitent à Paris , excepté les vertes , ont été draguées à Cancale en Bretagne.

Quoique les huîtres ne soient pas généralement du goût de tout le monde , l'opinion commune est qu'elles excitent l'appétit , *irritamentum gula* , & provoquent les urines : elles se dissolvent à la vérité dans l'estomac , sans y produire beaucoup de chyle ; mais elles sont saines aux personnes d'un bon tempérament : cuites en fricassée ou en friture , ou marinées , elles conviennent également à presque toutes sortes d'estomacs. Les Scorbutiques s'en trouvent très bien : on prétend qu'elles excitent à la luxure.

On fait usage des écailles de l'huître , calcinées ou non calcinées & porphyrisées , pour absorber les acides de l'estomac. On en fait une excellente chaux pour cimenter , & dont on se sert aussi pour engraisser certaines especes de terre. On trouve souvent dans la terre ces écailles plus ou moins altérées , & dans différents états de dureté.

HULOTTE. Voyez HUETTE.

HUMUS. On donne ce nom à la couche de terre végétale qui sert d'enveloppe à notre globe ; elle en couvre la surface environ jusqu'à un demi-pied de profondeur : elle est formée en grande partie de terre proprement dite , & de la décomposition des substances étrangères ; communément de la pourriture des végétaux , & de la destruction des animaux. Cette terre est une espece de terreau naturel : sa couleur varie ; mais après que l'*humus* a été calcinée dans le feu , elle paroît blanche , à moins qu'il ne se trouve quelques parties métalliques qui puissent colorer ou masquer toutes les particules terreuses. Voyez le mot TERRE.

HUPPE ou PUTPUT , ou PUPU , *Upupa*. Est un fort bel oiseau de passage , nommé ainsi à cause de la huppe ou crête qu'il a sur la tête , ou à raison de son cri ordinaire, La huppe pèse environ trois onces ; elle a ,
depuis

depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, un pied de longueur : son envergure est d'un pied & demi ; son bec est de deux pouces, noir, pointu, un peu voûté ; l'iris de ses yeux est de couleur noisette : sa tête est ornée d'une très belle crête, haute de près de deux pouces, composée d'un double rang de petites plumes, dont la couleur est rousse tirant sur le noir & le châtain, & qu'il peut redresser ou abaisser à son gré. Cet oiseau a la figure du corps approchante de celle d'un pluvier : le col est de couleur rousâtre pâle ; la poitrine blanche, bariolée de raies noires ; la queue longue de quatre pouces, noire, bariolée de taches blanches & fauves ; le croupion blanc ; le plumage des épaules bigarré de blanc & de noir, de même que les ailes : les jambes sont courtes, mais les pieds sont assez grands.

Nous avons observé cet oiseau fréquemment en Alsace, & aux environs de Cologne & de Francfort ; nous l'avons même rencontré entre Londres & Edimbourg, quoique Turner dise que la huppe ne se trouve point en Angleterre. Cet oiseau n'est point fort sauvage ; quand on le trouve le long des grands chemins, il ne s'effarouche pas beaucoup à la vue des hommes : il se pose la plupart du tems à terre. Aristote prétend que la huppe construit son nid d'ordure, & principalement d'excréments humains, dont elle l'enduit tout autour en guise de boue ; elle le fait dans un creux d'arbre : sa ponte est de quatre œufs cendrés. On ne voit guère la huppe qu'en été ; car aussi-tôt qu'elle a fait ses petits, elle s'en va dans un pays plus chaud que le nôtre, & s'y tient durant notre hiver : elle prononce en chantant *put put* ; quoique sa voix soit enrouée, on l'entend de loin : son vol est assez léger & bas ; elle bat l'air de ses ailes à la manière des vanneaux : sa chair n'est pas fort bonne à manger. Aldrovande dit qu'en Italie il a souvent vu des huppes exposées aux marchés.

La huppe se nourrit de vers, de boutures de bois, de chenilles & de petits scarabées : elle se retire dans les lieux déserts des bois ; cependant on l'apprivoise facilement, mais elle marche de mauvaise grâce. C'est un plaisir, quand elle est privée, de voir comme elle se couche en étendant ses ailes devant le feu, & comme elle fait jouer sa belle crête : elle fait aussi la chasse aux mouches & aux souris. La couleur de son plumage change un peu dans la durée de l'été. D'après la manière de vivre & de repailler de la huppe, des Auteurs l'ont nommée *bécasse d'arbre*, ou *coq merdeux* ou *puant*.

Le savant Aldrovande, curieux de savoir par quel moyen la huppe peut élever & abaisser sa crête à son gré, a disséqué une tête de huppe, & y a trouvé un muscle qui lui a paru unique, cutané & fibreux, en manière de pannicule charnu, naissant de la base du crâne, plus charnu dans son principe à la partie inférieure vers le front, plus membranéux à la partie supérieure vers le sommet de la tête, dans lequel les plumes de la tête sont implantées assez profondément : quand on tiroit ce muscle vers le sommet

de la tête, il redressoit la crête; & quand on le tiroit du côté opposé, vers le bec, il l'abaissoit.

Les Auteurs ne donnent qu'une propriété notable à la huppe, qui est d'être très bonne contre la colique, prise en substance ou en bouillon.

On trouve dans les Indes Occidentales des huppes admirablement belles, & principalement celles de l'Isle de la Trinité & de l'Isle des Rats. La crête ou huppe de ces oiseaux est de couleur d'or vif, leur queue noire, le reste du plumage ondoyé de diverses couleurs, le tour des joues rouges comme de l'écarlate. Sa nourriture est le fruit d'un arbre nommé par les Sauvages *Pinéabsou*. Voyez ce mot.

La *huppe de montagne* est un oiseau solitaire qui se nourrit de cigales, d'autres petits insectes, & de grenouilles : son plumage est d'un verd foncé; sa tête est jaune, marquée de taches sanguines : sa huppe emplumée est semblable à la crinière d'un cheval; le bec est rouge, & les pieds bruns. Albin dit que cet oiseau est la corneille des bois des Cantons Suisses.

On trouve aussi dans les Indes Orientales, un oiseau de paradis huppé : il est très rare. Dans le Mexique on donne le nom d'*oiseau huppé* ou *couronné*, à une huppe. Voyez OISEAU DE PLUMES DU MEXIQUE.

HURA ou SABLIER, *arbor fructu crepitans*. Est une très belle espèce de noyer que l'on a transportée des Indes dans l'Amérique. Sa fleur est composée d'une seule feuille en forme d'entonnoir, & légèrement découpée en douze parties; son fruit est globuleux, un peu large, gros comme une orange, & divisé également en douze segments, qui contiennent chacun une semence : on voit de ces fruits dans les cabinets de tous les Curieux.

HURIO. Est un grand poisson de l'espèce cétacée, qui se trouve dans le Danube; il est sans écailles & presque entièrement cartilagineux : il s'en trouve qui pèse jusqu'à quatre cents livres : on en tire de l'ichthyocolle ou colle de poisson, qui est semblable à celle que fournit l'*esturgeon du Boristene*. Voyez ce mot.

HUTLA. Petite espèce de lapin de l'Isle Espagnole : il a les oreilles courtes, & la queue d'une taupe. Voyez au mot LAPIN.

HYACINTHE, *Hyacinthus-gemma*. Est une pierre précieuse, d'un rouge tirant sur le jaune, diaphane, vitrescente, plus légère & plus tendre que le grenat. Il y en a de différentes grosseurs & couleurs : on les distingue en orientales & en occidentales.

L'*hyacinthe orientale* est d'un jaune rougeâtre, qui tient un peu de la couleur écarlate, de la cornaline & du vermillon, un peu moins du rubis que du grenat, parcequ'on y distingue, au moyen du spectre solaire, une légère nuance de violet colombin. Cette hyacinthe est resplendissante, & reçoit un poli vif : on lui donne le nom de *belle hyacinthe*, quand elle est d'une couleur orangée ou aurore mêlée de rouge : on la trouve en Ara-

bie , en morceaux de la grosseur d'un pois , & quelquefois de la grosseur d'une aveline. On la rencontre encore près de Cananor , de Calecut & de Cambaya. Les Lapidaires & les Amateurs recherchent celle dont la couleur tient quelque chose de la flamme rouge & jaune du feu , qui est bien délavée , & qui n'a point de noirceurs.

L'*hyacinthe occidentale* est moins dure que la précédente ; elle a une couleur plus safranée ou orangée ; elle tire un peu sur la fleur du souci ou de jacinthe : elle nous vient de Portugal.

Dans le commerce on en voit de claires comme le succin , de laiteuses comme l'émail , d'un jaune grainé comme le miel ; ce qui les fait appeller par les Marchands , *hyacinthes succinées* ou d'*émail* , ou *miellées* ; elles sont tendres , mal nettes , & soutiennent peu le feu. On nous les envoie de Silésie & de la Bohême : les Lapidaires les taillent à facettes , de manière à en cacher les défauts.

Ce que l'on appelle *jargon d'Auvergne* & *hyacinthe de Compostelle* , ne sont que des crystaux à facettes , & colorés : on rencontre communément le jargon dans le Vivarais près du Puy.

L'hyacinthe est un des cinq *fragments précieux*. Voyez ce mot.

HYACINTHE , plante. Voyez JACINTHE.

HYBOUCOYHU. Est un fruit de l'Amérique , de la figure & de la grosseur d'une datte , mais qui n'est point bon à manger. Les habitants en tirent une huile qu'ils conservent dans un vaisseau , qui est fait d'un fruit creusé , & dont on retire la chair nommée *carameno* en langage Indien. Cette huile est particulièrement employée pour une maladie du pays , qui provient d'un grand nombre de petits vers de la grosseur des cirons , lesquels s'amassent sous la peau , & forment des tumeurs cuisantes , grosses comme des fèves , & qui causent des accidents fâcheux. Voyez DRACONCULE. Cette huile est encore nervale , & propre pour fortifier les membres fatigués , même pour mondifier les plaies & les ulcères.

HYDRE. La plupart des Ecrivains donnent ce nom à un serpent à sept têtes , dont l'existence paroît absolument contre l'ordre de la Nature. Cependant Séba en décrit un qu'il dit avoir été vu en 1720 à Hambourg , & qu'on proposoit à acheter au prix de dix mille florins. Conrad Gesner , dans son *Histoire des Animaux* , L. IV , pag. 459 , représente aussi un hydre à sept têtes , avec deux pattes & la queue bouclée. Il raconte que cet horrible serpent aquatique à sept têtes , fut apporté de Turquie à Venise en 1530 , qu'il fut exposé publiquement à la vue de tout le monde , & qu'ensuite il fut envoyé au Roi de France : on ne l'estimoit pas moins de six mille ducats. Nous ne finirions pas si nous prétendions rapporter de semblables exemples sur l'hydre , mais qui nous paroissent un tissu de fables & de fictions.

Plusieurs Auteurs disent avec plus de vraisemblance , que l'hydre est un serpent aquatique qui se trouve dans les lacs , dans les marais & rivières : c'est le serpent d'eau de l'Inde , *natrix indicus* , qui vit sur la terre

& dans l'eau ; il ressemble à un petit aspic terrestre , mais il n'a pas la tête si large. On prétend que la morsure de ce serpent d'eau est dangereuse , qu'on en meurt en trois jours après avoir souffert cruellement : les remèdes ordinaires sont la thériaque , le mithridate , & particulièrement les alkalis volatils. D'Ablancourt dit que quand on en est mordu , le meilleur remède est de couper aussi-tôt la partie affligée , avant que le venin ait affecté les autres parties. Quant à notre *serpent d'eau* , il n'est aucunement dangereux. *Voyez* au mot CHARBONNIER.

M. Linnæus donne le nom d'*hydre* à une espèce de polype verdâtre , qui se trouve en Uplande , Province de la Suède , dans des fossés. Quand on le coupe en morceaux , il en renaît autant d'hydres entiers qui prennent vie. *Voyez* POLYPE.

Les Voyageurs Hollandois donnent le nom d'*hydre d'eau* à un poisson qui se trouve ordinairement aux environs de la ligne , & qui est long de quatre à cinq pieds. Ils disent que cet animal a tant de force dans les dents , que s'il saisit un homme par le bras ou par la jambe , il l'entraîne au fond de l'eau. Sa gueule est grande ; ses dents sont aiguës : on le prend avec un gros hameçon de l'épaisseur du doigt , où l'on attache un morceau de chair ; mais c'est moins son goût qu'il faut consulter , que celui de certains petits poissons qui le précèdent toujours , & qui vont fuser l'amorce avant que l'hydre y touche ; s'il ne leur arrive aucun mal , alors l'hydre s'en approche hardiment , & s'accroche en voulant avaler l'amorce. Verhocum Hollandois , dans son voyage des Indes Orientales en 1607 , en rencontra beaucoup , & défendit aux équipages de se baigner , parcequ'on est souvent surpris par ces animaux. Quantité de ses Matelots refuserent d'en manger , d'autres en trouverent la chair fort bonne : ils leur ouvrirent le ventre pour en ôter les entrailles , qu'ils jetterent dans la mer , où elles furent aussi-tôt dévorées par d'autres hydres.

HYDROPHILE, *Hydrophilus*. Insecte aquatique & coléoptère , à antennes en masse , perfoliées , & plus courtes que les antennules : ses pieds sont en nageoires & velus. La larve de l'hydrophile a six pattes écailleuses , & le corps composé d'onze anneaux : elle est fort vorace , très agile , & mange les autres insectes aquatiques. Il faut prendre l'insecte parfait avec précaution : outre que ses mâchoires pincent , il a encore sous le corselet une longue pointe très piquante , qu'il enfonce dans les doigts en faisant des efforts pour marcher en reculant. Cet insecte dépose ses œufs qui sont assez gros , dans une coque soyeuse que l'on rencontre assez souvent dans l'eau.

HYENE, *Hyæna*. Il n'y a point d'animal sur lequel on ait fait autant d'histoires absurdes , que sur celui-ci : nous n'allons présenter de cet animal , que les faits les plus vrais , d'après M. de Buffon.

L'hyène a été confondue par plusieurs Voyageurs & plusieurs Naturalistes avec d'autres animaux , tels que le *chacal* , la *civetie* & le *glouton* ou *goulu de terre* ; mais dont cependant elle diffère beaucoup , quoiqu'elle ait avec eux quelques rapports.

L'hyene est à-peu-près de la grandeur du loup, mais son corps est plus court & plus ramassé; elle a la tête plus quarrée & plus courte que lui : ses oreilles sont longues, droites, nues; & ses jambes, sur-tout celles de derriere, sont plus longues : elle a les yeux placés comme ceux du chien; le poil du corps long, une criniere de couleur gris obscur, mêlée d'un peu de fauve & de noir, avec des ondes transversales. Elle est peut-être de tous les quadrupedes le seul qui n'ait que quatre doigts, tant aux pieds de derriere qu'à ceux de devant : elle a, comme le blaireau, une ouverture sous la queue, mais qui ne pénètre point dans l'intérieur du corps; c'est cette ouverture qui avoit fait dire que cet animal étoit mâle & femelle.

Cet animal sauvage & solitaire demeure dans les cavernes des montagnes, dans les fentes des rochers, dans des tanières qu'il se creuse lui-même sous terre. Il est d'un naturel féroce; & quoique pris tout petit, il ne s'apprivoise pas. Il vit de proie, comme le loup, mais il est plus fort, & paroît plus hardi; il attaque quelquefois les hommes, il se jette sur le bétail, fuit de près les troupeaux, & souvent rompt dans la nuit les portes des étables & les clôtures des bergeries. Ses yeux brillent dans l'obscurité, & l'on prétend qu'il voit mieux la nuit que le jour; son cri, au rapport de Kämpfer, témoin auriculaire, imite le mugissement du veau.

L'hyene se défend contre le lion, ne craint pas la panthere, terrasse l'once. Lorsque la proie lui manque, elle creuse la terre avec les pieds, & en tire par lambeaux les cadavres des animaux & des hommes. On la trouve dans presque tous les climats chauds de l'Asie & de l'Afrique. L'animal appelé *farasse* à Madagascar, paroît différer de l'hyene, que quelques-uns regardent comme le *dabach* des Anciens.

On doit mettre au rang des absurdités qu'on a débitées sur cet animal, qu'il fait imiter la voix humaine, retenir le nom des Bergers, les appeler, les rendre immobiles, faire courir les Bergeres, leur faire oublier leurs troupeaux, les rendre folles d'amour, &c. Tout cela, dit M. de Buffon, peut arriver sans hyene.

On dit que l'on vit une hyene dans le Lyonnais & les Provinces voisines vers les derniers mois de 1754 & pendant 1755 & 1756 : à ce sujet le Pere de Tolomas Jésuite, donna une dissertation sur l'hyene, dans laquelle il a détaillé les absurdités dont nous venons de parler; mais il ajoute, d'après Abraham Echelenfis, que l'hyene se prend très facilement au son des instruments; qu'au son de la musique elle sort de sa taniere, se laisse caresser, & qu'on lui jette adroitement un licol & une museliere : tout ceci tient bien des absurdités précédentes. Quant à l'animal, qui, lorsque nous écrivions ceci, exerçoit depuis plus de quinze mois sa férocité carnivore sur les habitants du Gevaudan, & que l'on a désigné sous le nom d'hyene, il est à présumer que c'est un loup levrier, dont l'espece peut avoir multiplié. *Voyez LOUP LEVRIER.*

HYPOCISTE. *Voyez CISTE.*

HYSOPE, *Hyssopus*. On distingue communément trois especes d'hysope ; mais comme elles ne different que par la couleur , la description d'une seule suffira pour les autres.

L'hysope pousse plusieurs tiges qui s'élevent à un pied ou un peu plus de hauteur ; ces tiges sont garnies de feuilles longues , étroites , plus grandes que celles de la sariette. Ses fleurs sont en gueule , & naissent en maniere d'épi , mais tournées toutes d'un côté , de couleur ou blanche , ou bleue , ou rose , suivant l'espece : il leur succede des semences qui ont quelquefois l'odeur de musc.

On emploie cette plante pour faire des bordures dans les jardins , où elle répand une odeur aromatique fort agréable , principalement avant qu'elle entre en fleur. Elle est incisive , vulnéraire , fortifiante : on la fait entrer dans le vin aromatique , propre à dissiper l'enflure des plaies ; ce vin est très propre aussi à dissoudre le sang grumelé & extravasé.

HYSOPE DES GARIGUES. Voyez **HÉLIANTHEME**.

HYSTEROLITHE, *Hystera petra*. On donne ce nom à des pierres qui représentent les parties naturelles de la femme. L'*hysterolithe* autrement dite *pierre de la matrice* , n'est que le noyau & l'apophyse d'une espece de térébratule appelée *ostreo pectinite* : on en trouve communément de plus ou moins aîlées & ventruës sur deux montagnes ; l'une voisine de Coblenz , & l'autre de Catalogne : nous y en avons ramassé qui sont toutes ferrugineuses.

HYVOURAHÉ. Est un grand arbre du Bresil , dont on emploie l'écorce pour les maux vénériens. L'écorce du hyvourahé est de couleur argentée en dehors & rouge en dedans : il en sort , avec ou sans incision , un suc laiteux d'un goût doux de réglisse. On prétend que l'arbre dure long-tems , & qu'il est quelquefois quinze ans sans porter du fruit , même après en avoir porté. Son fruit est une sorte de prune de couleur d'or , d'une grosseur médiocre , tendre , & d'une saveur assez agréable. Il renferme un petit noyau : les malades le souhaitent beaucoup à cause de son bon goût. *Hyvourahé* , dans le langage des Bresiliens , signifie une *chose rare*.



J A A

J A C

JAAIA, nom que les Negres donnent au *paréturier* des Afriquains. Les Anglois l'appellent *mangrove*. Voyez *ces mots*.

JABEBIRETTE, est une espece de raie du Bresil : elle a la queue longue ; la couleur de dessus est d'un cendré brun ; celle de dessous est blanche. Sa chair est assez bonne : les Cayenois appellent le jabebirette , *raie bouclée*. Voyez à l'article RAIE.

JACA ou JACHA, est un grand arbre des Indes, nommé au Calecut *jaceros* ; dans l'Inde Orientale , *jaaca* & *jaqua* ; & par d'autres , *cachicicara*. Il croît en Malabar , à Java & aux Manilles , le long des eaux. Son fruit naît sur toute la longueur de son tronc & sur ses plus grosses branches. Il est plus gros qu'une courge , & même plus que tous les autres fruits connus : on en voit qui pèsent cent livres. Sa couleur est verte , obscure : il a une grosse écorce dure & entourée de toutes parts , comme de pointes de diamant , lesquelles finissent en une épine courte & verte , dont l'aiguillon est noir. Ce fruit étant mûr rend une odeur si pénétrante qu'on la sent de cent pas à la ronde : il y en a de deux especes ; l'un appelé *barca* , qui est de consistance solide , c'est le meilleur ; un autre appelé *papa* ou *gyrasal* , qui est mollasse , c'est le moindre. Ces fruits sont blancs en dedans ; la chair en est ferme & divisée en petites cellules pleines de châtaignes un peu longues , & plus grosses que les dattes ; couvertes d'une pelure grise ; blanches en dedans , comme les châtaignes communes ; d'un goût âpre & terreux , étant mangées vertes ; mais étant rôties , elles ont un très bon goût. Toutes ces châtaignes sont environnées d'une chair un peu visqueuse , & assez semblable à la pulpe du *durio*. Le goût du barca ressemble assez à celui du melon ; mais ce fruit est de dure digestion , & il excite , quand on en mange souvent , une maladie pestilentielle , que les Indiens appellent *morxi*. Au reste , ces châtaignes sont astringentes & prolifiques. Les Espagnols , établis aux Manilles , nomment le fruit du jacha *nangeas* , & les Chinois *po-lo mye* ; ils se servent d'une hache pour le couper , & en préparent les noyaux ou châtaignes , qui sont quelquefois jaunes comme de l'or , avec le lait de *noix de coco*. Voyez *ce mot*.

JACARA ou JACARÉ, est le nom qu'on donne à Bengale & au Bresil à une espece de crocodile ou cayman , nommé *akaré* à Cayenne : il sent le musc d'assez loin ; ce qui sert , en quelque sorte , d'avertissement aux Voyageurs pour se tenir sur leurs gardes , afin de n'être pas surpris par un animal si vorace & si dangereux. Toutes les rivières qui dégorgent dans celles d'Oyapoc en sont remplies. Voyez CAYMAN & CROCODILE.

JACARANDA est un grand arbre des Indes , dont il y a deux espe-

ces : toutes les deux ont des fruits qui sont d'une figure fort irrégulière & de la grandeur de la main , & se nomment *manipoy*. Ces fruits se mangent cuits , & passent pour un bon stomachique. Les gens du pays se servent d'une substance verte qu'il contient , au lieu de savon. Les bois de ces arbres sont différents ; l'un est blanc & l'autre noir ; mais tous deux sont beaux , très marbrés & fort durs : il n'y a que le noir qui soit odorant. Ces bois sont d'usage en marqueterie.

JACÉE , *jacea*. Cette plante , également connue sous le nom d'*ambrette sauvage* , croît dans les prés & aux autres lieux herbeux & incultes. Sa racine est ligneuse , vivace , fibreuse , d'une saveur astringente , & qui cause des nausées. Les premières feuilles , qui sortent de la racine , ont quelque chose de commun avec celles de la chicorée. Sa tige est haute de trois ou quatre pieds , ronde , droite , rougeâtre , dure , cannelée , & remplie de moëlle : ses feuilles , placées sur la tige , sont nombreuses , sans ordre , oblongues , découpées & verdâtres. Des aisselles de ses feuilles , il s'élève de petits rameaux , garnis de petites feuilles , semblables aux précédentes ; ils portent à leur sommet , une , deux ou trois fleurs à fleurons , en tuyaux purpurins & fort ferrés. A ces fleurs succèdent des semences rougeâtres ou grisâtres , garnies d'aigrettes.

Les Italiens mettent cette plante parmi les vulnéraires , & ils l'appellent *herba delle ferite* : elle convient en gargarisme pour guérir les aphtes de la bouche , les tumeurs de la gorge , des amygdales & de la luette ; elle est encore utile pour les hernies.

JACÉE ou AMBRETTE SAUVAGE. Voyez à la fin du mot AMBRETTE.

JACÉE ORIENTALE. Voyez l'article BEHEN.

JACHERE. Les Agronomes nomment ainsi la partie des terres qui se repose alternativement tous les ans dans un corps de Ferme , c'est-à-dire , qui ne porte point de grain pendant une année entière , & qui sert cependant de pâturage aux bestiaux.

JACINTHE , *hiacinthus*. La jacinthe est une de ces fleurs chéries des Amateurs de la belle nature , & elle le mérite à bien des titres. Sa diligence ordinaire à fleurir aux premiers jours du printemps , célérité qu'on peut augmenter ou retarder pour la tenir plus long-tems sur le théâtre des fleurs ; son odeur suave & variée ; l'avantage qu'elle a de former un bouquet parfait d'une seule de ses tiges ; la constance de son état , qui ne dégénère pas ; la facilité de se multiplier par ses oignons ; la grande diversité de ses parures ; enfin sa propriété de végéter dans l'eau comme dans la terre ; tant d'avantages réunies ne peuvent la rendre que très recommandable.

La jacinthe est originaire de l'Orient , & se trouve aussi dans les Indes. Sa beauté la fait rechercher dans tous les pays ; les Amateurs l'élèvent aujourd'hui en France , en Allemagne , en Angleterre , sur-tout en Hollande ,

lande, & particulièrement dans la ville de Harlem, où cette plante est en grande réputation; aussi les Fleuristes Hollandois en font-ils l'objet d'un commerce assez important.

La jacinthe est composée d'un oignon, de racines, de fanes, de tiges, de fleurs & de graines. L'oignon est une bulbe écailleuse, & formée de différentes peaux, dont les unes couvrent les autres. Lorsque l'oignon a poussé ses racines, il fait paroître en dehors des feuilles qui, quoiqu'inégales, selon les especes, sont en général longues, étroites, luisantes, pliées en gouttiere. Du centre de ces feuilles, s'élève une tige à-peu-près ronde, luisante, sans nœuds, moëlleuse, plus ou moins forte, qui croît depuis trois jusqu'à douze pouces de hauteur. L'extrémité de cette tige supporte les fleurs qui different en grandeur, en coloris & en nombre, suivant les diverses especes. Ces fleurs sont des tuyaux oblongs, évasés par le bout, ouverts & découpés en six parties, rabattus sur les côtés, comme aux lys; ce sont les jacinthes simples. A chaque fleur succede un fruit presque rond & relevé de trois coins, qui contient des semences de la figure d'un pepin de raisin.

On divise les jacinthes en simples & en doubles; dans les doubles, le tuyau de chaque fleur contient plus ou moins de feuilles, selon la beauté & l'espece. Toutes ces feuilles sont formées par les étamines, qui acquierent de l'ampleur & se changent en pétales. Il y a d'aimables diversités de couleurs dans les jacinthes: il y en a de blanches, de bleues, de couleur de rose, de rouge; le plus ou moins d'intensité dans les teintes ou demi-teintes forme autant de variétés, que l'attention d'un Fleuriste zélé, met souvent à profit pour grossir ses catalogues. Certaines couleurs sont plus rares que d'autres dans certaines fleurs; ce sont alors ces couleurs dont les Amateurs sont si curieux. On est parvenu depuis quelques années à découvrir la couleur jaune dans quelques jacinthes; aussi fait-on grand cas de celles-ci.

La grosseur d'un oignon & sa peau bien saine, donnent plutôt un relief à la belle jacinthe, que les vices contraires ne sont des motifs suffisants pour la faire mépriser. Il faut qu'une belle jacinthe double porte un nombre suffisant de fleurons sur sa tige, c'est-à-dire, quinze, vingt, ou au moins douze. Les fleurons doivent être grands, courts, unis, larges de feuilles, ou évasés, bien remplis; ceux qui forment une houppe, tiennent un rang distingué. Les jacinthes simples ont aussi leur mérite, parcequ'elles sont plus hâtives au moins de trois semaines que les doubles: les belles especes forment un bouquet entier, agréablement tourné, lorsque trente, quarante ou cinquante fleurons sont disposés avec la plus charmante symétrie: elles ont de plus l'avantage de fournir une semence utile.

L'exposition la plus avantageuse pour placer les jacinthes, est celle du soleil levant ou du midi; elles y profitent de l'influence des rayons du soleil, soit directement, soit par réflexion. Les effets du soleil à son midi

sont si avantageux , qu'un Académicien de Londres a proposé de placer les espaliers contre un mur incliné à l'horison environ de trente-quatre degrés , afin que les fruits , ainsi exposés , jouissent à plein des bienfaits du soleil à midi ; moment où il leur est le plus favorable.

La jacinthe ne demande à être arrosée , que lorsqu'elle en a un besoin réel ; & il lui faut de l'eau courante ; l'eau dormante lui est mortelle. Les Auteurs d'Agriculture proposent bien de recettes différentes , pour le mélange de terres propres aux jacinthes. Une composition bien simple & très bonne , c'est de prendre trois parties de terre neuve ou de taupinière , deux parties de débris de couche bien terrautées , & une partie de sable de rivière.

Une observation essentielle & générale pour la culture de toutes les fleurs , c'est d'avoir beaucoup d'égard à la température des climats où les fleurs ont pris naissance ; car il est toujours à propos de leur en fournir une égale , ou d'en approcher , autant qu'on peut , par des attentions particulières , suivant le goût , les facultés & les pays.

Le véritable tems de planter les oignons de jacinthe , est le mois d'Octobre ; l'usage le plus ordinaire est de les couvrir de quatre pouces de terre. On donne plus de profondeur à quelques sortes hatives , & moins à quelques tardives pour que les unes & les autres puissent fleurir en même-tems. C'est sur-tout dans l'ordre élégant , qu'un industrieux Fleuriste peut donner à ses jacinthes en les plantant , que paroît son goût & son savoir : il mélange , avec art , les différentes especes ; il les écarte , les rapproche , ou les associe de façon , que toutes les couleurs se fassent valoir réciproquement , & brillent avec tout leur éclat. Pour conserver aux fleurs des jacinthes leurs couleurs , il faut les mettre à l'abri du soleil , sous une tente ; car sans cette précaution l'ardeur du soleil dans son midi rendroit tout d'un coup leur couleur pâle , & feroit passer les fleurs bien plus vite.

Lorsque le riche spectacle de ces fleurs est passé , & que les fanes commencent à jaunir , on leve les oignons de terre , sans en séparer les caïeux , opération que l'on réserve pour le tems du plantage : on enlève toutes les enveloppes chancreuses ; si quelques oignons sont altérés , il faut les nétoyer jusqu'au vif.

Comme j'ai reconnu , dit l'Auteur du *Traité des Jacinthes* , dont nous donnons ici un extrait , par plusieurs expériences , que les insectes sont la cause du mal , ou l'augmentent ; je mets ces oignons tremper dans de l'eau distillée de tabac , ou dans une forte décoction de tanaïsie ; je les laisse dans ce bain salutaire environ une heure , qui suffit pour étouffer les animalcules ; & je laisse ensuite sécher ces oignons , ainsi que ceux qui sont bien sains , dans un lieu bien aéré , mais à l'ombre. Ensuite je les enferme dans une boîte. Cette attention est suffisante pour la conservation des oignons que l'on veut planter en Octobre.

Si l'on a dessein de les planter plus tard , il faut alors les mettre dans

une boîte remplie de sable fin, bien desséché, & les mettre par couches alternatives de sable & d'oignons. Ces oignons, ainsi préparés & gardés dans un lieu bien sec, peuvent ensuite être plantés dans les mois d'Avril, de Mai & de Juin, pour donner leur fleur dans ceux de Juillet & d'Août. On ne doit pas néanmoins conclure de ce procédé, qu'on puisse garder les oignons de jacinthes, comme les griffes ou pattes de renoncules & d'anémones, au-delà de l'année. La perte des oignons seroit le fruit des nouvelles tentatives que l'on voudroit faire sur cela.

Quand le nombre des caïeux oblige de les détacher des maîtres oignons, s'ils sont encore petits, on en forme des pépinières, & on les plante à un ou deux pouces de distance l'un de l'autre, sous un pouce seulement de terre. Si leur taille est avantageuse, on les distribue parmi ceux d'où ils ont été tirés; dans ce nombre, l'oignon, qui pèse une once & demie, est celui qui fleurit, pour l'ordinaire, le mieux. Il y en a qui parviennent à peser jusqu'à deux onces & demie, ce qui est leur dernière grosseur; & dans cet état, ils peuvent encore fleurir cinq ou six fois. L'oignon fleurit ainsi un certain nombre d'années, parceque plusieurs germes, qui étoient dans l'oignon, se développent chacun à leur tour, jusqu'à ce qu'enfin il en soit entièrement privé. On dit en avoir vu quelques-uns qui ont duré jusqu'à treize ans.

On peut dire, en quelque sorte, que l'oignon de jacinthe ne périt pas de vieillesse, puisque tout usé qu'il est, il rajeunit dans sa postérité. Cette vertu productrice est surprenante; chaque peau, & même chaque partie de peau, paroît la posséder. On observe en effet qu'une peau, se séparant par la force de la croissance ou par une incision, les parties séparées forment ensuite de petits oignons. Cette observation a indiqué le moyen singulier de multiplier considérablement quelques especes indolentes. Voici comment on y parvient. Un peu avant le tems de lever les oignons, on tire de terre celui dont on souhaite des productions: on fait dans son fond une incision en croix, qui aille jusqu'au tiers du volume; on remet ensuite cet oignon à sa place, le recouvrant d'un pouce de terre: on l'y laisse pendant quatre semaines; après quoi, on le retire, on le fait sécher; & en son tems, on le plante comme à l'ordinaire. Il est vrai qu'il ne portera pas de fleurs l'année suivante; mais il se divisera, de façon que lorsque l'on le levera, au lieu d'un oignon, on en trouvera, six, huit, & quelquefois jusqu'à dix, qui, après deux années de culture, auront acquis toute leur perfection. On peut même faire un plus grand nombre d'incisions à l'oignon, & en retirer de cette manière jusqu'à vingt ou trente; mais cette dernière division n'est pas sans danger pour le chef.

On se procure, pendant l'hiver, un petit théâtre de fleurs, en mettant des oignons de jacinthes dans des carafes d'eau. On doit les mettre dans l'eau dès le mois d'Octobre, avoir soin que l'oignon ne plonge qu'à moitié, & tenir toujours l'eau à ce niveau, en y en ajoutant, & la

renouvellant tous les quinze jours ; une pincée de nitre , ajoutée à chaque fois , ne gâte rien. Pour les voir fleurir de bonne heure , il faut choisir les especes les plus diligentes par elles-mêmes. Ces oignons , qu'on a rendus ainsi précoces à donner leurs fleurs , ne sont point perdus par cette fatigue ; pourvu qu'on ait soin de les tirer de l'eau aussi-tôt que leur fleur est passée. Il faut les mettre tout de suite dans la terre , & les y laisser jusqu'au tems qu'on en retire les autres : ils s'y rétablissent très bien , & fleurissent , dit-on , en terre l'année suivante. On a vu des jacinthes doubles , qui , après avoir fleuri dans l'eau , ont donné de la graine ; tandis que la même espece de jacinthe , plantée quinze ans de suite en terre , n'avoit jamais pu grainer : ainsi on peut regarder ce procédé comme une méthode avantageuse , pour obtenir ces semences si précieuses.

C'est par le moyen des semences que les Fleuristes obtiennent ces variétés dont ils sont si curieux. On apprendra , avec étonnement , que les semences de jacinthes ne donnent point de fleurs semblables à l'oignon qui a fourni la graine ; jusques-là que le plus souvent les semences des Jacinthes blanches en font naître de bleues , & celles des bleues n'enfantent que des blanches. La source du beau vient des Jacinthes simples : on doit choisir , par préférence , pour obtenir de la semence , celles qui ont deux ou trois feuilles dans le milieu de leurs fleurons : elles ont plus de disposition à donner des fleurs doubles ; il est très rare de voir les fleurs doubles donner de la graine.

On doit semer en Octobre , & recouvrir la semence d'un pouce de terre ; ce n'est guère que vers la quatrième année que les oignons commencent à fleurir. Tous ces oignons sont bien éloignés d'être de la même beauté ; si dans un millier de ces fleurs , quatre ou cinq méritent l'affection du Fleuriste , il doit croire ses soins récompensés , sur-tout , si dans ce petit nombre encore , il se trouve de ces rares beautés , de ces productions privilégiées de la Nature. Il est vrai que parmi les autres , tout n'est pas à rebuter ; on y en trouve qui , sans être de la première beauté , méritent cependant l'attention du Fleuriste. C'étoit autrefois un usage en Hollande de ne donner un nom à la fleur nouvelle , qu'avec beaucoup de cérémonie & de gaieté. On invitoit tous les Curieux du voisinage ; chacun opinoit à son gré , les voix étoient recueillies , & la pluralité l'emportoit.

Les oignons de Jacinthes sont sujets à plusieurs maladies , dont les unes sont mortelles , & dont les autres peuvent être guéries. La plus cruelle est une corruption qui se forme dans les suc de l'oignon , & se manifeste extérieurement autour des racines ou à la pointe de l'oignon , par un cercle quelquefois brun & quelquefois de couleur de feuille morte. Lorsque cette maladie se déclare à la pointe de l'oignon , il faut le couper jusqu'à ce qu'on n'apperçoive plus rien de corrompu ; quand même , par cette amputation , l'oignon se trouveroit réduit à moitié , il peut encore

revenir. Lorsque le mal commence dans l'endroit qui unit l'oignon aux racines , il n'y a gueres lieu d'en espérer. Le moyen d'éviter ces maladies , est 1°. de ne point planter les Jacinthes dans un endroit où l'eau séjourne en hiver ; 2°. de ne pas mêler à la terre , des fumiers de cheval , de brebis ou de cochon , à moins qu'ils ne soient dénaturés par la vétusté ; 3°. de ne point se servir de terre où l'on auroit planté plusieurs fois des Jacinthes en peu de tems ; 4°. de ne pas planter de bons oignons auprès de ceux qui sont infectés de ce mal. Quelquefois l'oignon se corrompt en terre , & devient gluant & puant. Si ce mal pénètre l'intérieur , on perd l'oignon : on peut y remédier auparavant en enlevant les parties malades.

Tubéreuse ou Jacinthe des Indes.

La tubéreuse que les Indes ont donnée à l'Italie , & que l'Italie a fait passer jusqu'à nous , est estimable par sa figure , par son odeur & par sa durée. Elle ressemble aux jacinthes par la forme & par la découpe de ses tuyaux ; mais elle en diffère par l'étendue de ces mêmes tuyaux , qui sont une fois plus grands que ceux de la jacinthe : ils ne portent point sur une queue comme ceux de la jacinthe , mais tiennent immédiatement à la tige. La conformation est à-peu-près la même dans les graines & dans le logement des graines : la différence est sensible entre les tiges & les oignons. La tige de tubéreuse s'élève de trois à quatre pieds , tandis que celle des jacinthes reste basse. L'oignon de la tubéreuse est charnu , & non point par écailles comme celui des jacinthes. La jacinthe fleurit au printemps , & la tubéreuse ne fleurit qu'en été & en automne , à moins qu'on ne l'avance à l'aide de la chaleur.

Il y a des tubéreuses doubles & simples : les unes & les autres sont blanches ; car la rougeur dont certaines paroissent enluminées , est un relief qu'elles reçoivent de l'Art & non de la Nature , comme nous le dirons plus bas.

La tubéreuse à fleur double a de particulier qu'elle est sujette à perdre de sa parure en perdant du nombre de ses pétales ; mais elle reprend quelquefois sa beauté dans de nouveaux caïeux. L'oignon de la tubéreuse ne fleurit qu'une seule fois , apparemment parcequ'il ne contient qu'un seul germe de fleurs : mais ces oignons qui ne donnent plus de fleurs , mis en terre , fournissent des caïeux ; & ceux-ci étant mis en terre , deviennent à la seconde année , oignons portants ou en état de fleurir.

Ici , & mieux encore le long de nos côtes Méridionales , la tubéreuse exige peu de soins : elle peut être établie en pleine terre , & y donne de très beaux bouquets , qui répandent une odeur suave & pénétrante. Comme la tubéreuse est originaire des pays chauds ; elle aime la chaleur & redoute le froid : on ne doit la mettre en terre qu'en Mars , & la garantir des gelées. Plus les oignons ont de force & de grosseur , plus la fane , la tige & les fleurs deviennent belles.

Le génie des tubéreuses est d'avoir entr'elles des progrès inégalement rapides, quoique fournies des mêmes nourritures, & plantées de même. Les unes sont en fleurs, tandis que les autres ne font que paroître; il arrive même que les fleurs d'une même tige ne paroissent que successivement : celles du bas fleurissent les premières, & ainsi de suite. Quelques tubéreuses fleurissent fort tard; & étant mises dans des pots, elles donnent des fleurs assez avant dans l'hiver. Le plus avantageux est de planter les tubéreuses dans des pots : on en jouit de cette manière à volonté, en mettant les pots dans une couche de fumier. Quand on a mis les oignons en terre, il faut les ôter vers le mois d'Octobre, de peur qu'ils ne soient surpris par les gelées.

Il est un ingénieux moyen de relever la blancheur du teint de la jacinthe des Indes, par une légère nuance de rouge, qui l'embellit & la fait, pour ainsi dire, méconnoître. On met une tige de tubéreuse dans le suc colorant exprimé des baies d'une plante nommée par Tournefort *Phytolaca Americana fructu majori*, qui est une espèce de morelle de Virginie. Cette plante dure plusieurs années, & ses baies sont mûres vers les mois d'Août & Septembre. Il faut observer que si le suc exprimé des baies du phytolaca est trop épais, il ne peut monter, à cause de sa viscosité; s'il est au contraire délayé avec trop d'eau, la teinture manquera de force, & la fleur ne rougira que bien peu. Lorsque la liqueur est d'une liquidité moyenne, les fleurs prennent un coloris emprunté de ce suc, qui en montant laisse, le long de la tige, des traces de son ascension. On peut en user de même pour les jacinthes ordinaires. On peut aussi rendre blanches les jacinthes bleues : il ne faut pour cela qu'exposer les fleurs à la fumée du soufre allumé; & si on fait employer avec adresse cette petite ruse, on diversifiera agréablement les tiges; on laissera dans leur état naturel quelques fleurons, & on en décolorera d'autres en total, ou par parties seulement : ces bigarrures procurées aux jacinthes, tandis qu'elles sont sur leur pied, sont admirées par ceux qui ignorent la simplicité du secret qui les produit.

JACKAL. C'est un animal de l'Inde, que plusieurs Européens prennent pour un grand chat sauvage : les Horrentots le nomment *Tanli* ou *Kenli*, & les Portugais *Adiva*; il est d'une force extraordinaire. Dapper dit que le lion mène toujours cet animal avec lui; ce qui est peu croyable. Le jackal n'est point l'hyenè; c'est le chacal des Voyageurs. Voyez CHACAL.

JACOBÉE ou HERBE DE SAINT JACQUES, *Jacobaea*. Cette plante ainsi nommée, parcequ'on en trouve fréquemment sur les chemins de Saint Jacques en Galice, croît aussi chez nous aux lieux humides & dans les champs. Sa racine est très fibreuse, & si fortement attachée dans la terre, qu'on a de la peine à l'en tirer. Ses tiges sont nombreuses, hautes de trois ou quatre pieds, cannelées, un peu coronneuses & rougeâtres, garnies de beaucoup de feuilles placées sans ordre, mais découpées profondément, d'une couleur verte-brune, d'un goût aromatique & un peu acerbé, très désagréable. Ses fleurs naissent aux sommités des tiges; elles sont disposées

en parasol , radiées , jaunes , composées d'un amas de fleurons entourés d'une couronne de demi-fleurons. A ces fleurs succèdent des semences rougeâtres , oblongues , & garnies d'aigrettes. On distingue plusieurs sortes de jacobées : celle des Alpes est la même plante , connue sous le nom de *consoude dorée*.

Cette plante est vulnérable , résolutive & détersive ; elle est propre à appaiser les douleurs des inflammations : presque tous les Botanistes recommandent extérieurement la jacobée pour les plaies & les ulcères invétérés & fordides.

JACOBIN. C'est le pigeon à chaperon , ou pigeon jacobin. *Voyez* PIGEON.

JACUA-ACANGA. C'est une très belle espece d'héliotrope du Bresil , que les Portugais appellent *Fedagoso* : ses feuilles ressemblent à celles du *nepta* (cataire) , ses graines à celles du plantain : ses fleurs sont bleues & jaunes. Cette plante croît aux lieux sablonneux ; elle est estimée consolidante & résolutive.

JACURUTU. L'oiseau du Bresil que Marggrave a décrit sous ce nom , est une espece de *Duc*. *Voyez* ce mot.

JADE, *Jade*. C'est une pierre verdâtre ou olivâtre , ou d'un bleu-blanchâtre , de la nature du silex , plus dure que le jaspe , susceptible d'un beau poli , faisant feu avec l'acier ; huileuse à la vue & au toucher. On la trouve dans l'Amérique méridionale : ce n'est peut-être qu'une agate verdâtre , ou un silex demi-transparent : cette pierre a différentes dénominations.

Les Turcs & les Polonois font un grand cas de cette pierre sous le nom de *Jade* ; ils en ornent souvent les manches de leurs sabres , coutelas & autres instruments.

Les Indiens de la Nouvelle Espagne ont tant d'estime pour cette pierre , qu'ils la portent pendue au col , taillée pour l'ordinaire en bec d'oiseau. On voit dans les Cabinets des Curieux , des vases de cette pierre , faits par les Indiens. On ignore l'art avec lequel ces Peuples ont su les former & y percer , malgré l'extrême dureté de la matiere , des trous quelquefois de six à sept pouces de profondeur , & sans aucun outil de fer ; tandis que nos Ouvriers sont obligés de travailler le jade avec l'égriffée , qui est la poudre de diamant.

Boëce de Boot a vanté le jade sous le nom de *pierre divine* ; d'autres Auteurs , sous le nom de *limon verd pétrifié de la riviere des Amazonnes* , & particulièrement sous celui de *pierre néphrétique*. Il y a à Paris des gens qui se mêlent de vendre cette pierre en petites plaques , sous ces différens noms , comme un remède propre à chasser la pierre du rein , à guérir l'épilepsie & toutes sortes de maladies. Tant de vertus du jade , si vantées , pour ne pas dire , exagérées , ne devroient , selon Voiture , trouver de partisans que dans un pays où il n'y a pas d'autre remède ; & où l'on doit plutôt attendre du secours des pierres que des hommes.

JAGRA. Espece de sucre tiré du palmier à Cocos. *Voyez* COCO.

JAGUACINI. Animal du Bresil, assez semblable au renard pour la grandeur, la couleur & la figure. Sa principale nourriture sont les cancre & les écrevisses : il mange aussi des cannes à sucre, dont il fait un grand dégât ; mais comme cet animal dort fort & long-tems, on le prend facilement.

JAGUAR, ou *Jaguara*. Animal quadrupede du Nouveau-Monde, qui ressemble assez à l'once par la grandeur de son corps, par la forme & par la plupart des taches dont sa robe est semée, & même par le naturel. Le fond de son poil est d'un beau fauve, comme celui du léopard, & non pas gris comme celui de l'once ; il a la queue plus courte que l'un & l'autre : lorsque l'animal est jeune, son poil est crépé ; mais lisse, lorsqu'il devient adulte.

Lorsque cet animal a pris tout son accroissement, il est de la grandeur d'un dogue ordinaire ou de moyenne race. C'est cependant l'animal le plus formidable, le plus cruel ; c'est en un mot le tigre du Nouveau Monde.

Le jaguar vit de proie comme le tigre ; mais il ne faut, pour le faire fuir, que lui présenter un tison allumé ; & même lorsqu'il est repu, il perd tout courage & toute vivacité : un chien seul suffit pour lui donner la chasse. Il n'est léger, agile, alerte que quand la faim le presse.

Les Sauvages, naturellement poltrons, redoutent sa rencontre : ils prétendent qu'il a pour leur chair un goût de préférence ; & que quand il les trouve endormis avec des Européens, il respecte ceux-ci, & ne se jette que sur eux. On dit quelque chose de semblable du léopard ; mais on prétend qu'il préfère les hommes blancs aux noirs, qu'il semble les connoître à l'odeur, & qu'il les choisit la nuit comme le jour.

JALAP. *Voyez* BELLE DE NUIT.

JALOUSIE, *Symphonia*. Est l'amarante de trois couleurs ou *tricolor*, qu'on cultive dans les jardins à cause de sa grande beauté : ses feuilles sont faites comme celles de la blette ; mais elles sont colorées ou comme enluminées de verd, de jaune & d'incarnat. Les enfants font, de la tige de cette plante, des tuyaux, dont ils se servent pour produire une maniere de son ou d'harmonie ; c'est d'où lui vient son nom latin. *Voyez* AMARANTE.

JAMBOLOM. Espece de myrte indien, dont le fruit ressemble à de grosses olives : on le confit au vinaigre pour exciter l'appétit ; le goût en est fort âpre. *Voyez* MYRTE.

JAMBON. *Voyez* MÉLOCHIA.

JAMBON ou JAMBONNEAU, *Perna*. Espece de coquillage bivalve, du genre des moules : les bords de sa coquille sont plus épais du côté qu'elle s'ouvre que vers la charniere. Cette coquille est toujours couverte de boue : on en voit dans les lieux où la mer a flux & reflux. La chair de ce coquillage est tendre & assez bonne à manger : ceux qu'on trouve dans des endroits à l'abri du vent, sont meilleurs que ceux qui vivent dans des eaux continuellement agitées.

M. Adanson, qui fait un genre particulier de ce coquillage bivalve, dit que le jambonneau vit attaché aux rochers, aux plantes marines & à d'autres corps solides du fond de la mer.

JAMBOS. Est le fruit d'un arbre des Indes, que les Portugais ont nommé *jambeyro*. Ces fruits sont appelés par les François établis aux Indes, *jambes rosades*, par les Malabares & les Canarins *jamboli*, par les Arabes *tupha Indi*, par les Perses *tuphat*, & par les Turcs *alma*. On en distingue plusieurs sortes, dont les meilleurs ont une odeur de rose; les uns avec un noyau, d'autres sans noyau. Ils se mangent à l'entrée de la table comme le melon. L'arbre qui les porte n'est jamais sans fleurs & sans fruits: les uns & les autres se confisent au sucre: leur noyau est gros comme celui d'une pêche. Les feuilles sont un très bel ombrage; & les fruits, dont le fol de cet arbre est continuellement jonché, forment un aspect charmant.

JANAKA. Est un animal cornu & terrestre, du pays des Negres en Afrique. Dapper dit qu'il est de la grosseur d'un cheval, mais plus court & plus gras: son col est assez long, roussâtre & moucheté de blanc: il fait de grands sauts en marchant. Ses cornes sont aussi longues que celles des bœufs.

Il y a encore deux autres sortes de ces animaux qui sont plus petits, & qu'on appelle *Cilla-vandoh*: ils sont de la grosseur de nos cerfs: ils ont, dit-on, aux côtes, ainsi que la précédente espèce, des vessies qui leur servent à respirer, & qui les empêchent de se lasser lorsqu'ils courent ou qu'ils sautent.

JANDIROBE. Herbe rampante des parties méridionales de l'Amérique, dont le fruit ressemble à la poire de coing: la chair est blanche, & contient trois amandes, dont on tire une huile jaune, qui est d'un grand secours dans quelques contrées, pour frotter les corps dans les douleurs qui viennent du froid.

JANG. Animal de la Chine qui se trouve dans les montagnes de la province de Nanking: sa forme est celle d'un bouc; son nez & ses oreilles sont très visibles; mais on a beaucoup de peine à découvrir sa bouche, tant elle est petite & cachée.

JANIPABA ou GENIPANIER, *Geniba fructu ovato*. PLUM. & BARR. C'est un arbre singulier du Brésil, qui change de feuilles tous les mois. Il devient grand; ses fleurs sont blanches & campaniformes. Il porte des fruits semblables à l'orange, & remplis de graines. Ce fruit étant verd a une saveur amère; mais étant mûr, il devient jaune en dehors & en dedans: sa saveur est alors bonne, d'un goût de poire de coing, & se fond dans la bouche; son jus est clair comme de l'eau, &, quoique blanc d'abord, il devient noir ensuite, & les Sauvages s'en servent pour se colorer la peau, lorsqu'ils vont à la guerre, pour paroître plus effroyables à leurs ennemis. Les femmes peignent aussi, avec ce suc, leurs maris en noir, quand ils sont las de la couleur rouge. Cette même teinture portée sur de l'étoffe ou du papier est d'abord ineffaçable; mais elle se détruit d'elle-

même vers le neuvième jour. Ce jus peut aussi servir d'encre pour écrire.

JANOVARE. C'est un animal de l'Amérique, grand comme un chien-mâtin, & fort lesté à la course : sa tête est étroite, sa queue fort ample ; il a les oreilles courtes, le col gros & long, les pattes d'un chien : la couleur de son poil est d'un roux jaune, cendré. Le janovare attaque toutes les bêtes féroces moins fortes que lui. Ceux qui habitent les forêts en redoutent beaucoup la fureur, car quand ils le poursuivent, s'ils manquent de le tuer, ils courent risque de leur vie.

JAPU. Oiseau du Brésil de la forme de la grive : il a le plumage noir, & une tache jaune au milieu de chaque aile ; les jambes & les pieds sont noirs, le bec citron, les yeux fort bleus : son nid est composé de graminées, de crins de cheval & de poils de cochon ; il lui donne la figure d'une gourde étroite par le haut, & le pend ordinairement au bout des branches des arbres : par cette adresse ses œufs & ses petits sont à l'abri de la rapine des singes.

JAQUETTE - DAME. Nom donné à la pie-agasse ou pie-griesche : *Voyez au mot PIE.*

JARARA. Dans le Brésil on donne ce nom à différentes sortes de couleuvres longues de cinq pieds, & qui sont aussi venimeuses que la vipère d'Espagne. Leurs dents, où est le plus dangereux venin, sont cachées dans la gueule : ce venin est jaunâtre, il fait mourir les hommes les plus robustes en vingt-quatre heures. Les morsures ont un doigt de profondeur : le remède est d'écorcher l'animal qui a mordu, lui ôter la queue, la tête & les intestins, & faire cuire sa chair dans de l'eau d'une racine appelée *Jureba*, avec du sel, de l'huile, du poireau, de l'anis, & d'en donner au malade à manger.

Ces sortes de couleuvres multiplient beaucoup. Ray dit qu'on en a ouvert qui portoient treize matrices.

JARGON. C'est le nom particulier qu'on donne au diamant jaune ; il est moins dur que le diamant blanc.

On donne aussi le nom de *Jargon d'Auvergne* à de petits cristaux d'hya-cinthe brillants, qui se trouvent dans le Vivarais près du Puy.

JARS. C'est le mâle de l'oie, comme le *coq* est le nom du mâle de la poule. *Voyez OIE.*

JASMIN, *Jasminum*. Cette espèce de plante, ainsi nommée du mot hébreu *samin*, qui signifie *parfum*, est distinguée en plusieurs espèces. Il y a des jasmins robustes, qui résistent très bien en pleine terre ; tels sont le *jasmin blanc*, & deux espèces de *jasmins jaunes* ; mais il y en a d'autres qu'on ne peut conserver que dans les serres.

Les fleurs de jasmin sont en forme de tuyau, divisées en cinq pièces ovales ; il leur succède des baies ovales qui contiennent deux petites semences. Les feuilles du jasmin sont de figures très différentes dans les différentes espèces ; mais elles sont presque toujours opposées sur les branches, & le plus souvent composées de folioles qui sont rangées par paires, & attachées à un filet commun terminé par une seule feuille.

Le *jasmin blanc* est un arbrisseau sarmenteux propre à couvrir des berceaux ; dans le mois de Juin il est orné d'une multitude de fleurs blanches , qui ont l'odeur la plus suave : cette odeur est si délicieuse qu'on a tâché de la transporter dans les différents fluides. Ces fleurs ne fournissent point d'eau odorante par la distillation : ainsi ce qu'on appelle *Essence de jasmin*, qu'on nous apporte d'Italie & de Provence , n'est qu'une huile de ben aromatisée par les fleurs des jasmins. Pour cet effet , on imbibe du coton d'huile de ben , & on dispose ce coton lits par lits , en les entremêlant de lits de fleurs de jasmin ; le coton s'imbibé de l'odeur. On en exprime ensuite l'huile , qui alors est fort aromatique & conserve assez long-tems cette odeur , pourvu que les flacons soient bien bouchés. On peut , en s'y prenant à-peu-près de même , faire contracter au sucre une odeur de jasmin. Pour faire acquérir à l'esprit de vin cette odeur de jasmin , qu'il n'acqueroit point même par la distillation , il ne s'agit que de verser de l'esprit-de-vin sur l'huile de ben aromatisée , & ensuite agiter le mélange ; l'odeur de jasmin abandonne entièrement l'huile grasse , & passe dans l'esprit-de-vin ; mais celui-ci laisse échapper cette odeur avec la plus grande facilité.

Les jasmins se multiplient aisément de marcottes & de drageons enracinés , & même de bouture. On peut multiplier les especes rares en greffant sur les *jasmins communs* ; c'est ainsi que les Génois nous fournissent beaucoup de *jasmins d'Espagne jaunes & blancs* , dont l'odeur est si suave , des *jasmins d'Arabie* & des *Açores* , le *jasmin Zambac* ou à *feuilles d'orangers* ; ils les greffent en fente.

Les fleurs du jasmin blanc sont béciques : on prétend que ses feuilles , appliquées en cataplasme , amollissent les tumeurs squirrheuses ; prises en décoction , elles sont narcotiques anodines.

L'on nous apporte aussi d'Amérique une plante sous le nom de *Quamoclit* ou de *Jasmin rouge* ; c'est une espece de *convolvulus* ou de *lizeron* : l'arbre du café est aussi une espece de *jasmin*.

JASPE, *Jaspis*. Le jaspe est ou un caillou de roche simple ou une espece de silex agate dur & indestructible , de différentes couleurs , peu ou point transparent , faisant feu avec l'acier , susceptible d'être travaillé & poli. On en distingue plusieurs sortes ; savoir ,

Le *jaspe d'une seule couleur* ; il y en a de blanc , de jaune , de rouge , de verd , de bleu & de noir : celui qui est verd acquiert au feu la propriété de reluire dans le feu. On croit , mais à tort , que le *lapis lazuli* , autrement dit *Pierre d'azur* , est un jaspe bleu. Voyez LAPIS LAZULI.

Le *jaspe fleuri* est composé de plusieurs couleurs , qui quelquefois sont mêlées ensemble , ce qui fait chatoyer la pierre ; quand elles sont distinctes & séparées , cela fait paroître la pierre panachée & mouchetée de différentes couleurs. Il y a du jaspe fleuri de toutes les couleurs , c'est-à-dire , où l'on remarque une couleur dominante , ce qui fait dire *jaspe fleuri rouge* ou *jaune* , &c.

Le *jaspe sanguin*, si vanté des Auteurs, est un jaspe dont le fond opaque & verd est rempli de taches rouges; s'il est moucheté en jaune, on l'appelle *jaspe panthere*.

Le *jaspe héliotrope*, non moins vanté que le précédent, est verdâtre & bleuâtre, parsemé de points rouges; quelques personnes, trop faciles à persuader, portent ces jaspes en amulettes pour briser la pierre du rein, & se préserver d'épilepsies, d'hémorrhagies, &c.

Le *jaspe agate* semble être un silex plus épuré, moitié opaque & moitié demi-transparent : selon la pureté & l'arrangement des veines de ce jaspe, on le nomme *jaspe calcédoine* ou *jaspe-onix*, ou *agate jaspée*.

Les jaspes ont un poli plus ou moins éclatant, selon la finesse ou l'homogénéité du grain qui les compose. Le caillou d'Egypte dont la pâte est toujours fine, n'est qu'un jaspe à fascies & fort opaque.

On trouve cette pierre par couches ou lits, & par sillons, qui forment des bancs de rochers : on en trouve aussi en morceaux de différentes grosseurs, arrondis, & qui ont été roulés dans les torrents. C'est dans les Indes qu'on trouve les plus beaux jaspes : on en rencontre aussi en Bohême, en Allemagne, en Sibérie, en Angleterre, en France : nous en avons trouvé dans les Pyrénées & dans la forêt de l'Estrelle en Provence, ainsi que dans l'Auvergne.

Les pierres précieuses ne sont pas les seules pierres qu'on met en usage pour le luxe : toutes les especes de jaspes servent depuis long-tems à la parure ; on en forme des ornements qui sont très agréables, sur-tout quand, dans l'assemblage de plusieurs petits morceaux de cette pierre, l'on fait entrer quelques fragments de jade, ou d'agate, ou de cristaux, & que le discernement y préside dans l'opposition des couleurs. Les jaspes ont été de tout tems la pierre sur laquelle le ciseau des plus habiles Sculpteurs s'est exercé. La gravure, art aussi perfectionné de nos jours qu'il l'étoit du tems des Romains & des Grecs, relève beaucoup la beauté de cette pierre opaque dans les bijoux qui en sont faits, tels que des cachets, des bagues, &c. Presque tous les Anciens avoient chacun leur cachet de jaspe, sur lequel étoient représentées quelques figures. Aujourd'hui l'on fait des vases, des dessus de tables, & de petites statues de jaspe. Voyez les articles SILEX, AGATE & CAILLOU.

JATARON. Mr. Adanson donne ce nom à un genre de coquillage bivalve, connu sous celui de *Vieille ridée* ; *Concha rugosa*.

JAVARIS. Espece de pourceau sauvage qui se trouve dans l'Isle de Tabago & au Brésil : il est semblable en tout au *Tajacu*. Voyez ce mot.

JAVELOT. Voyez ACONTIAS.

JAUNE D'ŒUF. Espece de prunier de la Guyane, qui paroît être le même que le *rucma* des Indiens, & que le *lucuma* qui est cultivé dans le Jardin du Roi : cet arbre est très beau, très élevé, fort droit & touffu : ses racines sont longues & profondes : son écorce est gersée & d'un verd grisâtre : ses feuilles sont alternes, vertes & nerveuses : son fruit a la figure

d'un cœur arrondi & applati par les deux bouts : son diametre a trois pouces dans sa largeur & environ deux dans sa longueur : sa chair qui est mollassé, douceâtre, d'un blanc sale, & couverte d'une peau fort mince, renferme au milieu deux ou trois noyaux de figure ovoïde, & de couleur jaunâtre ; ce qui lui a fait donner le nom de *jaune d'œuf*. Ce fruit est si nourrissant, que deux personnes exilées sur le grand Islet pour avoir tramé une conspiration, & condamnées à y mourir de faim, y vécurent pendant trois mois, nourries de ce seul fruit, & en meilleure santé qu'elles n'y étoient arrivées : c'est dommage qu'un tel fruit fasse tomber les peaux de la bouche quand on en mange.

JAVOT. Voyez GABOT.

JAYS ou JAYET, *Gagates*. C'est une espèce de bitume fossile très noir, qui a une consistance & une dureté suffisantes pour être taillé & poli. Ce bitume est sec, uni & luisant dans ses fractures ; il s'enflamme dans le feu & y exhale une vapeur très forte : étant frotté, il répand une odeur charbonneuse ou de pissasphalte, & il acquiert la propriété d'attirer le papier, la plume, la paille, &c. Le jayet, quoique compacte, est léger, il nage sur l'eau : on le trouve par couches inclinées comme le charbon de terre & à des profondeurs assez considérables : le toit qui le couvre immédiatement, est presque toujours recouvert d'une efflorescence vitriolique, quelquefois accompagné de pyrites ou de soufre, & de substances qui ont évidemment le tissu ligneux. D'après les observations que nous avons faites sur ce bitume, tant en Irlande, qu'en Wirtemberg, & dans le Duché de Foix, nous sommes portés à croire que le jayet a la même origine que les charbons de terre, le succin, le naphte, &c. Peut-être n'est-ce qu'une pétrole qui a subi l'évaporation par une chaleur souterraine, & qui s'est endurcie dans l'état où nous voyons le jays.

C'est à Wirtemberg qu'on travaille la plus grande quantité du jayet qui est dans le commerce : on en fait des pendants d'oreilles, des brasselets, des bijoux de deuil, des boîtes & d'autres ornements semblables, qui reçoivent un assez beau poli : le jayet est l'*ambre noir* des boutiques & l'*agate noire* d'Anderfon.

IBIBOBOCA. Nom que les Bresiliens donnent à un genre de serpents de leur pays : les habitants les estiment beaucoup, non-seulement à cause de la beauté merveilleuse de leur robe, qui ressemble à une broderie faite à l'aiguille, & nuancée de diverses couleurs ; mais aussi parcequ'ils ne font de mal à personne, quoiqu'armés de bonnes dents, & que d'ailleurs ils mangent les fourmis, qui sont si incommodes dans ce pays ; & enfin parceque leur chair fournit un mets exquis.

On prétend cependant qu'il n'y a que ceux de la petite espèce qui ne sont point dangereux ; les Bresiliens & les Portugais disent même que le grand ibiboboca, qu'ils nomment *Kuilkahuilia*, livre bataille à tous les animaux qu'il rencontre, & il s'entortille autour de leur col avec tant de force, qu'il les étrange. Lorsque des hommes le rencontrent à l'impro-

viste, & qu'ils montent pour l'éviter sur le premier arbre prochain, ce gros serpent embrasse alors cet arbre, & le serre au point qu'il rompt son propre corps, & qu'il en meurt. On assure que les *ibiboboca* de la petite espèce bâtissent dans les lieux cachés des retraites disposées par étages, & avec beaucoup de symétrie. Ces domiciles sont faits comme les fours de Boulangers; l'appartement le plus grand est dans le milieu du corps de l'édifice; & il est destiné pour un *ibiboboca* de la grande espèce qui leur tient lieu de Roi. La morsure de l'*ibiboboca* ne fait pas mourir sur-le-champ. On se sert dans le pays de la poudre d'une plante appelée *nhambus*, étendue dans le suc des feuilles du *caapéba*, qu'on fait distiller sur la plaie; par ce moyen on en guérit.

IBIJARA. Espèce d'amphisbène du Brésil, nommé aussi *Bodety-cega* ou *Cobra de las cabeças* par les Portugais. Ce serpent est de la grosseur du petit doigt & très court: sa couleur est blanche & chatoyante comme de la pyrite de cuivre: ses yeux sont presque imperceptibles: il jette un poison mortel par la tête & par la queue; les Portugais assurent qu'il n'y a point de remède à son venin. Ce serpent vit sous terre & se nourrit de fourmis & de cloportes.

IBIJAU. Oiseau de nuit du Brésil: c'est le *noiribo* des Portugais, & le *tette-chevre* des Américains. Voyez **TETTE-CHEVRE**.

IBIRACOA. C'est un serpent du Brésil très redoutable: son venin est si violent, que celui qui en est mordu, jette abondamment le sang par les yeux, les oreilles, les narines, le gosier, & aussi par toutes les parties basses de son corps, & il meurt bientôt après. On distingue trois espèces d'*ibiracoa*, qui ne different que par la bigarure de leur peau, qui est admirablement bien nuancée.

IBIS. C'est un grand oiseau de l'Égypte, que la plupart des Auteurs ont confondu avec la cigogne; mais l'*ibis* est plus petit: il a le col & les pieds plus longs à proportion: son plumage est d'un blanc sale & un peu roussâtre presque par-tout le corps: les grandes plumes du bout des ailes sont noires: tout le tour de la tête est dégarni de plumes, mais revêtu d'une peau rouge & ridée: son bec est gros à son origine, coupé par le bout, recourbé en dessous dans toute sa longueur & dans ses deux parties, & de couleur aurore: les côtés du bec sont tranchants, durs & capables de couper les lézards, les grenouilles, & particulièrement les serpents, dont il se nourrit. C'est pour cela qu'anciennement les Égyptiens avoient mis l'*ibis* au nombre des animaux qu'ils adoroient comme leurs Dieux: ils l'embaumoiient après sa mort. Le bas des jambes de l'*ibis* est rouge, écailleux. Cet oiseau bâtit son nid sur les palmiers les plus hauts. L'*ibis* a cela de particulier, qu'il ne boit jamais d'eau qui soit troublée; c'est pour cela que les Prêtres Égyptiens se purifioient ordinairement avec l'eau où ces oiseaux avoient bu. On a prétendu que les hommes devoient à cet oiseau l'invention des lavements, parcequ'il se seringue d'eau salée avec son bec, lorsqu'il a besoin de ce remède; mais ce fait paroît douteux.

La chair de l'ibis ne sent pas mauvais, quoiqu'on la garde long-tems après la mort de l'oiseau : elle est rouge comme la chair du faumon.

L'ibis noir, vû de près, paroît d'un bleu verdâtre mêlé d'un peu de pourpre : des Auteurs veulent que ce soit une espece de *courlis*. Voyez ce mot.

Quoiqu'on dise que l'ibis ne vit pas dans notre pays, on en a cependant nourri un pendant plusieurs mois à Versailles. M. Perrault en a donné la description anatomique dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris*.

ICAQUE. C'est un prunier des Isles Antilles, dont le fruit est assez semblable à notre prune de damas : les Sauvages en font tant de cas, que vers le tems de sa maturité, on fait la garde avec des armes, pour empêcher que les vagabonds voisins n'en viennent cueillir. On appelle aussi ce fruit *Prune des anses*.

ICHNEUMON ou MANGOUSTE, vulgairement appelé RAT DE PHARAON, ou RAT D'EGYPTE, *Mus Egypti*. C'est un petit quadrupède digité, du genre des belettes, qui se trouve abondamment en Egypte, & dans les montagnes qui séparent l'Arabie d'avec l'Egypte : son nom arabe est *garbua*. La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'un pied neuf pouces ; celle de sa queue de plus d'un pied & demi : ses jambes de devant ont environ cinq pouces de long ; les pieds, qu'on appelle les *maines*, sont très courts & touchent peu à terre. Ceux de derriere sont plus longs. Tout son corps, excepté le ventre, qui est d'un roux jaunâtre, est couvert de poils variés depuis leur origine jusqu'à leur extrémité, de noirâtre & de blanchâtre. L'ichneumon a la tête oblongue, le museau court : l'ouverture de la gueule placée au-dessous du museau est très petite ; il a la langue, les dents & les parties naturelles comme le chat ; ses moustaches sont très copieuses, il en a trois rangs : son poil est aussi rude que celui du loup : ses oreilles sont courtes & tendres ; elles sont, ainsi que les pieds, de couleur de chair : il a les jambes noires avec cinq griffes aux pieds de derriere ; sa queue est longue, quadrée & épaisse autour des reins. La femelle fait autant de petits qu'une chienne. Au dehors du fondement, le mâle & la femelle ont une ouverture remarquable & indépendante des conduits naturels ; c'est une espece de poche dans laquelle se filtre une humeur odorante : on prétend que cet animal ouvre cette poche, lorsqu'il fait trop chaud, pour se rafraîchir. Cette ouverture avoit fait croire à quelques personnes que ces animaux étoient hermaphrodites.

L'ichneumon a reçu des honneurs divins de la part des Egyptiens, à cause de la grande utilité dont il est, en détruisant les œufs de crocodiles quoique cachés dans le sable : il mange même les jeunes crocodiles, espece d'animaux dont la multiplication est très nombreuse, & qui donneroient tout à craindre s'ils n'étoient détruits dès leur naissance par les ichneumons. Mais comme la fable est toujours à côté de la vérité, on a dit que

L'ichneumon entroit dans le ventre du crocodile lorsqu'il dormoit, & n'en sortoit qu'après avoir déchiré ses entrailles. L'ichneumon ne sauroit souffrir le vent; dès qu'il le sent souffler, il se retire dans sa caverne: il se garantit du froid en s'exerçant à sauter: il est hardi & se dresse lorsqu'il voit quelqu'autre animal; il attaque de gros chiens, des chameaux mêmes: il marque beaucoup de haine pour l'aspic & pour tous les serpents; quand il les veut combattre, il a l'adresse de se veautrer dans la boue, ou de se plonger dans l'eau, & de se rouler ensuite sur la poussière, qu'il laisse sécher au soleil afin de s'en faire une espèce de cuirasse. Cet animal a un appétit si véhément, qu'il ne craint point d'attaquer même les serpents les plus venimeux. Avant de devenir le vainqueur de sa proie, il reçoit quelquefois des morsures cruelles & dangereuses; mais lorsqu'il commence à ressentir les impressions de leur venin, il va chercher des antidotes, & particulièrement une racine que les Indiens ont nommée de son nom, & qu'ils assurent être un des plus puissants remèdes contre la morsure de la vipère.

Quoique l'ichneumon soit difficile à apprivoiser, on en élève en Egypte, comme on fait ici des chats, & on les porte vendre à Alexandrie. L'ichneumon d'Egypte approche pour la forme extérieure de la belette; il a même l'air plus vif, plus familier: il joue & badine volontiers avec les hommes, & plus agréablement qu'un chien; cependant quand il mange, il est traître & colere; alors il gronde presque toujours, & se jette avec fureur sur ceux qui veulent le troubler: comme il aime les œufs de poule, & qu'il n'a pas la gueule assez fendue pour les saisir, il tâche de les casser en les jettant en l'air, ou en les roulant sur la terre de cent manières différentes: s'il trouve une pierre autour de lui, il lui tourne aussi-tôt le dos; puis élargissant ses jambes de derrière, il prend l'œuf avec celles de devant, & le pousse par-dessous le ventre pour le casser contre la pierre.

Nous avons dit qu'on appelle ses pieds de devant *main*s, parcequ'il s'en sert comme les loirs, pour prendre sa nourriture; ces mains lui servent aussi pour puiser de l'eau & pour boire, les doigts étant courbés. Cet animal marche sans faire aucun bruit, & varie sa démarche selon le besoin; quelquefois il s'élève sur ses jambes, raccourcit son corps, & tient la tête haute; d'autres fois il a l'air de ramper & de s'allonger comme un serpent; souvent il s'assied sur les pieds de derrière, & plus souvent encore il s'élance comme un trait sur la proie qu'il veut saisir.

On voit des espèces d'ichneumons beaucoup plus petits que ceux de l'espèce précédente.

Kolbe dit que celui du Cap de Bonne-Espérance a la grandeur d'un chat, la forme de la musaraigne ou souris de campagne, le corps couvert de poils longs, roides, & tachetés de noir & de jaune. Il est très commun dans les campagnes du Cap. C'est un grand destructeur de serpents & d'oiseaux: il accompagne volontiers le furet, pour sucer & vider les œufs de ces animaux.





L'*ichneumon* ou *mangouste* des Indes orientales , est très mal-propre ; il n'aime qu'à chercher & flairer fortement ; il creuse la terre avec le dessus de son museau , qui est en petit assez semblable à celui du cochon : sa tête ressemble à celle de la belette ; il approche beaucoup du renard par la couleur de son poil ; le bout de sa queue est frisé , couvert de poils rudes & piquants. Il est d'un caractère fort sauvage ; il mord cruellement , & déchire tout ce qu'il rencontre : paresseux pendant le jour , il dort tranquillement dans sa caverne , d'où il sort le soir en flairant ; il grimpe aux arbres , croque les araignées , les vers , les racines tendres des arbres ; il entre dans les poulailliers , & y suce le sang des poules ; il regagne sa tanière vers le lever du soleil.

L'*ichneumon* d'Amérique ou l'*yzquiepatl* , ou *quasje* des Américains , ressemble assez pour la figure & les mœurs à celui du Ceylan.

Ces animaux ne peuvent supporter le froid : il dorment toujours le jour , & veillent pendant la nuit.

Ceux qui desireroient de voir les figures de l'*ichneumon* & de l'*hippopotame* aux prises avec le crocodile , réunies dans une même sculpture , peuvent aller aux Tuileries examiner la statue qui représente le Nil avec ses quatorze petits enfants : cette troupe d'enfants , placés les uns plus bas , les autres plus haut , sur le Dieu du Nil qui est panché sur son urne , sont les symboles des différentes crues du Nil , qui sont de quatorze coupées , & en même tems si avantageuses à l'Égypte. Sur le lit de marbre de ce groupe , se voit aussi le *lotus* , plante dont les Égyptiens font une sorte de pain ou de galette : enfin on y voit l'*ibis* , l'*ichneumon* , &c.

ICHNEUMONS (Mouches). Ce nom d'*Ichneumon* , qui fut donné originairement par les Égyptiens à l'animal quadrupède que nous venons de décrire , & que ces peuples jugerent digne de leur adoration , à cause du service qu'il leur rendoit en cassant les œufs de crocodile , a été transporté par les Naturalistes à un genre entier de mouches vives & hardies , qui ne vivent que de chasse , & dont plusieurs nous rendent de très grands services , ainsi que nous aurons lieu de le voir. Ces mouches sont armées de deux fortes dents ; elles ont quatre aîles ; leur ventre ne tient à la poitrine que par un filet très fin : elles ont d'assez longues antennes , qu'elles agitent continuellement ; ce qui les a fait nommer aussi *mouches à antennes vibrantes* : ce caractère frappant les fait aisément distinguer des autres espèces de mouches. La chasse favorite des ichneumons est celle qu'elles font aux araignées , sur lesquelles elles tombent comme des vautours.

Il seroit inutile , & presque impossible de parcourir toutes les différentes espèces de mouches ichneumons. Il suffit de savoir que leur nombre est prodigieux , qu'il y en a de toutes les grandeurs , depuis celle de la mouche demoiselle jusqu'à celle du plus petit moucheron. La plupart des mouches ichneumons ont la même forme ; leur ventre est séparé de la poitrine par un filet , ainsi que nous l'avons dit. De ces mouches ichneumons , les unes n'ont point de queue apparente ; d'autres en ont , & souvent de très longues.

Ce sont les femelles des ichneumons qui sont pourvues de ces queues, qui renferment une espèce d'aiguillon, ou plutôt une véritable tarière, capable de pénétrer les chairs les plus compactes, & quelquefois aussi des corps qui ont la dureté de la pierre. Les unes portent cet instrument renfermé dans le corps, les autres le portent tout entier au dehors; ce qui fait que même quelques ichneumons femelles n'ont point ces queues apparentes.

Lorsqu'une mouche ichneumon est pressée du besoin de pondre ses œufs, elle va se poser sur une chenille ou sur un ver, dont le corps est quelquefois plus grand que le sien. L'insecte a beau s'agiter, se tourmenter, la mouche enfonce sa tarière, & coule un œuf au fond de la petite plaie qu'elle vient de faire : la chenille en reçoit de cette manière vingt ou trente, suivant que la mouche est plus ou moins petite; car les mouches plus grosses n'en mettent qu'un ou deux, suivant la force des vers qui doivent naître de ces œufs.

D'autres mouches ichneumons se contentent de coller un ou plusieurs œufs sur le corps de la chenille : les vers ou larves sortent toujours par la pointe de l'œuf qui touche immédiatement le corps de la patiente, & s'y enfouissent. Ils y trouvent leur nourriture à l'instant de leur naissance, car ils se nourrissent du corps même de la chenille.

La structure de la tarière de ces mouches ichneumons est très curieuse; on l'observe aisément dans les *mouches à longue tarière*. Cette queue, que l'on avoit prise autrefois pour un ornement, ou comme quelque chose de propre à diriger leur vol, est composée de trois filets, dont les deux collatéraux sont creusés en gouttière, & servent d'étui pour contenir une tige ferme, solide, dentelée par le bout, le long de laquelle regne une cannelure qui est le canal par lequel l'insecte fait descendre l'œuf. Ces mouches à longues tarières s'attachent aux endroits où elles reconnoissent les nids de *guêpes* ou d'*abeilles maçonnes*, soit qu'ils soient placés dans le bois, ou qu'ils soient construits de mortier ou de sable; elles se placent sur ces nids, & en faisant faire plusieurs demi-tours à droite & à gauche à leur tarière, qu'elles soutiennent avec leurs pattes de derrière, de peur qu'elle ne soit brisée, elles pénètrent dans le fond du nid, & y déposent un ou plusieurs œufs, d'où doivent naître des vers qui mangeront ceux pour qui l'abeille ou la guêpe avoit pris tant de précaution afin de les mettre à l'abri de tous ennemis.

Il y a des mouches ichneumons si petites, & qui ont une tarière si forte, qu'elles percent les œufs de papillon, & y déposent leurs œufs : on voit avec surprise sortir d'un tas d'œufs de papillons, une multitude de petites mouches.

La chenille qui recelle dans son corps un si grand nombre d'ennemis, n'en paroît pas d'abord fort incommodée. Lorsqu'on vient à ouvrir cette chenille, on trouve toutes les parties intérieures entières, ce qui donne lieu de penser que ces vers ne vivent que des liqueurs qui servent à l'en-

retien & à l'accroissement de la chenille , mais qu'ils les corrompent & qu'ils les empoisonnent par leur séjour. On voit avec étonnement , au bout de quelques jours , auprès du cadavre de la chenille , quelquefois une vingtaine ou une trentaine de petites coques de soie d'un beau jaune , ou de quelqu'autre couleur. Ce sont les vers des ichneumons qui se sont filé ces coques pour subir leur métamorphose.

Les mouches ichneumons font quelquefois périr un très grand nombre de chenilles ; on en a eu la preuve dans l'automne de l'année 1731 , & le printemps de 1732 : ces années furent si favorables aux chenilles , que leur multiplication donna de justes inquiétudes. Le public en fut alarmé , & les Magistrats y apportèrent par de sages réglemens , tout le remède que la prudence humaine pouvoit suggérer. Mais ce qui faisoit multiplier ainsi les chenilles , fit aussi multiplier , dans la même proportion , les mangeurs de chenilles. Les trois quarts & plus des chrysalides que l'on ouvroit (car il est bon d'observer que les chenilles qui ont le corps rempli de ces œufs étrangers , subissent leur métamorphose ordinaire) , avoient toutes des vers dans le corps qui les rongeoient. Ces vers étoient nés des ichneumons , & ils firent plus de besogne que le travail des hommes pour nous délivrer de cette peste.

Il n'est pas rare de voir dans les jardins une chenille attachée sur une feuille , & auprès d'elle de petites coques de la grosseur d'un grain de froment , rondes , blanches , que l'on prendroit pour des œufs que la chenille couve : la chenille paroît pleine de vie lorsqu'on la touche , mais elle est cependant dans un état de langueur , & paroît fixée sur le lieu par les soies de la coque qu'ont filée les vers qui sont sortis de ses flancs.

Il y a une coque de vers d'ichneumons qui est des plus curieuses ; elle se trouve le plus ordinairement suspendue comme un lustre , par un fil long de trois ou quatre pouces , à quelques branches de chêne ; car c'est sur cet arbre que vit la chenille dans le corps de laquelle la mouche ichneumon dépose son œuf. Cette coque est traversée par une bande blanche dans son milieu : dès qu'on la détache & qu'on la pose sur la main , elle saute à terre , où elle continue encore de faire plusieurs sauts qui se succèdent les uns aux autres. C'est de cette espèce de coque dont M. Carré avoit parlé dans les Mémoires de l'Académie : il en avoit vu un jour plusieurs sautillant le long d'une allée , mais il n'en avoit point découvert la mécanique.

Cette coque contient un ver sauteur ; qui en s'élançant l'élève en l'air , & l'élève quelquefois jusqu'à trois ou quatre pouces en hauteur & autant en longueur : on peut s'en assurer aisément , en présentant une pareille coque aux rayons du soleil ; elle est assez transparente pour permettre à un œil pénétrant de voir ce qui se passe au dedans.

Il y a de certains petits ichneumons qui se distinguent de tous les autres insectes , par les préludes amoureux qui précèdent leur accouplement. Dans les tendres moments qui invitent à perpétuer l'espèce , les mâles préviennent leurs femelles par des empressements & des signes redoublés

& très expressifs de l'amour le plus vif; ils donneroient des leçons aux amants les plus passionnés.

ICHTYOCOLLE. *Voyez* à l'article ESTURGEON.

ICHTYODONTES. *Voyez* GLOSSOPÊTRES.

ICHTYOLITES. Nom qu'on donne à des poissons pétrifiés, qu'on trouve assez fréquemment dans les carrières d'ardoise, ou de pierres feuilletées. Quelquefois ces poissons sont en relief, adhérents à la pierre; d'autres fois la pierre se sépare, & on voit le relief d'un côté & l'empreinte de l'autre: souvent aussi on n'a que l'empreinte que le poisson a laissée avant que d'être détruit. On a outre cela des parties de poissons très reconnoissables, des têtes, des ouies, des nageoires, des queues, des arêtes, des squelettes, des vertèbres, des dents & des mâchoires. Il n'y a point de cabinet de fossiles où l'on ne montre de ces poissons, ou quelques-unes de leurs parties, & souvent même minéralisés.

On donne le nom d'*ichthyomorphes* ou d'*ichthyopolites* aux pierres qui représentent des empreintes de poissons: elles sont plus communes que les ichtyolites en relief. On donne le nom d'*ichthyospondiles* aux vertèbres des poissons.

ICHTYOPHAGES. On donne ce nom aux animaux qui ne vivent que de poissons; de même qu'on nomme *sarcophages* ceux qui ne vivent que de chair.

ICICARIBA. *Voyez* à l'article RÉSINE ELEMI.

IDOLE DES MAURES. Nom que les Hollandois ont donné à un poisson que les Maures ont en si grande vénération, que quand ils en prennent dans leurs filets, ils le rejettent à la mer. Les Chrétiens qui vivent parmi les Maures, n'ont pas pour ce poisson la même vénération, puisqu'ils en mangent une bonne quantité. Ce poisson a une espèce de dard sur le dos: il a le grouin d'un cochon, & des dents dans la gueule.

JEAN-LE-BLANC, *Pyrargus*. Est l'aigle à queue blanche, qu'on appelle aussi *oiseau de S. Martin*. Cet oiseau est redouté des paysans, par les dommages qu'il leur cause; il mange leur volaille encore plus hardiment que le milan: à le voir voler, on le prendroit pour un héron; il bat des ailes, & ne s'élève pas aussi haut que la plupart des oiseaux de proie: soir & matin il vole contre terre dans les basses-cours, le long des bois & aux bords des forêts, en cherchant la volaille, les perdrix, les jeunes lapins & les petits oiseaux. *Voyez* à l'article AIGLE.

JEK ou JEREPEMONGA. Est un serpent aquatique du Brésil, qui se tient souvent dans l'eau sans faire aucun mouvement: il est d'une substance si visqueuse, que tous les animaux qui touchent sa peau, s'y collent de manière qu'on a peine à les en arracher; ainsi il en fait aisément sa proie. Ruïsch dit que ce serpent sort quelquefois de l'eau pour se mettre sur le rivage, où il s'entortille; & que si quelqu'un alors y porte la main pour le prendre, elle s'y attache; & s'il en approche l'autre main, croyant s'en débarrasser, elle y demeure pareillement attachée: aussi-tôt ce serpent

s'étend de sa longueur, & retournant dans la mer, emporte avec lui sa prise & en fait sa pâture.

JEKKO ou GEKKO, espece de lézard de l'Isle de Ceylan. Le Jekko a les pieds plus élevés & la queue plus courte que la Salamandre ordinaire : il a cinq doigts à chaque pied, il est couvert de petites écailles, quelquefois sa queue est ronde & par anneaux. Il y a encore le *jekko étoilé*, qui est une espece de salamandre aquatique de l'Arabie, ou la salamandre cordyle d'Egypte.

JET-D'EAU MARIN, est une production singuliere du Cap de Bonne-Espérance, qu'on prendroit d'abord pour une éponge ou pour une masse de mousse ; elle tient assez fort aux rochers pour résister aux vents & aux vagues ; sa couleur est verdâtre : ce jet-d'eau marin distille de lui-même une humeur aqueuse. Ce qui nous le fait regarder comme un zoophyte, c'est que dans l'intérieur il renferme une substance charnue informe, qu'on prendroit pour un gésier : on ne lui découvre aucun signe de vie animale ; mais pour peu qu'on le touche, il pousse, par deux ou trois petits trous, d'assez beaux jets d'eau, & recommence autant de fois qu'on y porte la main, jusqu'à ce que son réservoir soit entierement épuisé : tout ceci indique que c'est une espece d'holoturie ou un zoophyte.

JEUX DE LA NATURE, *lusus naturæ*. Les Naturalistes donnent ce nom à des pierres que l'on tire du sein de la terre, & qui ont différentes configurations, assez relatives aux productions organisées des autres regnes de la Nature.

On peut distinguer deux especes de *pierres figurées* : il y en a qui ne doivent leur figure qu'à de purs effets du hazard : c'est ce qu'on appelle proprement *jeux de la Nature* ou *du hazard*. Des circonstances tout-à-fait naturelles, & qui ont pu varier à l'infini, paroissent avoir concouru pour faire prendre à la pierre molle dans son origine, des figures singulieres, parfaitement étrangères au regne minéral, & qui se sont conservées même après que la pierre a acquis un certain degré de dureté. Ces pierres figurées sont en très grand nombre. La Nature en les formant a agi sans s'assujettir à aucunes regles : la figure qu'on y remarque n'est donc que la suite de purs accidents, & n'est point soumise aux loix d'un modele : mais, il faut convenir ici que souvent l'œil préoccupé d'un Curieux qui forme un Cabinet, ou d'un Naturaliste enthousiaste, croit y appercevoir & remarquer des choses qu'on n'y trouveroit peut-être pas en les examinant sans préjugés, sans complaisance & de sang froid. On peut regarder comme des *pierres figurées* de cette premiere espece, les marbres de Florence, sur lesquels on croit voir des ruines de Villes & de Châteaux ; les cailloux d'Egypte qui présentent en apparence des payfages, des grottes. On pourroit placer ici le *gamites* ou *pierre de mariage* de Pline, où l'on voyoit deux mains qui se joignoient ; les *denderites* ou *pierres herborisées* ; quelques pierres qui ressemblent à des fruits, à des os, ou qui portent l'image de quelques autres substances végétales ou animales.

Il y a des pierres figurées qui tirent leur origine de corps étrangers au regne minéral , lesquels on servi comme de moule à une matiere pierreuse encore molle. Celle-ci en a pris & conservé l'empreinte intérieure à mesure qu'elle s'est durcie : souvent le moule s'est détruit par le tems. Dans ce cas il n'a resté du corps qui a servi de moule que la figure. On doit ranger dans cette seconde espece , un grand nombre de pierres qui ressemblent à des coquilles , des madrepores , du bois , des poissons , &c. ou qui portent l'empreinte de ces substances ; empreinte qu'il ne faut pas confondre avec les *fossiles* proprement dits.

Il y a aussi des pierres figurées qui représentent des choses artificielles , comme si elles avoient été jettées en moule ou travaillées par un Sculpteur. Celles-ci ne doivent quelquefois cette configuration extraordinaire , qu'à certaines especes de madrepores , qui , comme l'on fait , ont des formes bizarres & variées à l'infini : communément elles n'ont point de type dans la nature , & elles ne sont redevables qu'à l'art des hommes de la figure qu'on y remarque. On a observé que la plupart des pierres figurées se trouvent dans des lits de marne. *Voyez à l'article JEUX DE LA NATURE , pag. 326 , Vol. II. de notre Minéralogie. Voyez aussi les mots PIERRE DE CROIX , GEODES , PRIAPOLITES , PIERRES TAILLÉES , DENDERITES , EMPREINTES , PIERRES FIGURÉES , FOSSILES , PÉTRIFICATIONS , & l'article STALACTITES dans ce Dictionnaire.*

IF ou YF , *Taxus* , arbre fort connu , qui ressemble au sapin & à la pesse , & qui croît aux lieux montagneux , pierreux & escarpés , aux pays chauds , comme en Languedoc , en Provence & en Italie : on le rencontre aussi en Suisse , en Angleterre & en d'autres pays , dans les montagnes & forêts ombrageuses. Sa racine est grosse , dure & profonde : elle pousse un tronc élevé , qui forme un arbre toujours verd. Cette tige principale acquiert souvent une grosseur très considerable : Ray cite deux ifs très âgés , dont l'un avoit plus de 30 pieds de tour , & l'autre 59 pieds de circonférence au tronc , c'est-à-dire 20 pieds de diametre. Le bois de l'if est fort dur , rougeâtre , veiné , incorruptible , propre à faire des cannes , des tables , des tasses , & plusieurs autres meubles. Ses feuilles sont semblables à celles du sapin ; mais plus foibles , plus pointues , & disposées comme les dents d'un peigne ; luisantes en dessus , d'un verd noirâtre , d'un goût un peu amer. Ses fleurs , qui paroissent au printems , sont des chatons d'un verd pâle , composés de quelques sommets remplis d'une poussiere très fine ; taillés en champignon , & recoupés en quatre ou cinq crenelures ; ces chatons ne laissent aucune graine après eux. Les fruits naissent sur le même pied , mais dans des endroits séparés ; ces fruits , qui mûrissent en automne , sont des baies molles , rougeâtres , pleines de suc , creusées sur le devant en grelot , d'une belle couleur d'écarlate , qui ne renferment qu'une semence ovale , dont l'écorce est dure , brunâtre , & contient une moëlle d'un goût assez agréable , mais foible , & tirant sur l'amertume.

On ne connoît qu'une espece d'if, mais qui donne une variété, à feuilles panachées. L'if vient de marcotte, ou mieux encore de graine, mais elle reste plus d'un an en terre sans lever. Gesner dit qu'il reprend aisément, si on le transplante tout petit, & il dure plus d'un siècle. Les grands ifs ne sont plus de mode que dans les grandes allées ou dans les parcs : on les réduit en pyramides de trois ou quatre pieds de haut pour les parterres. Ces pyramides faisoient autrefois un des principaux ornemens des jardins.

Les arcs les plus estimés chez les Anciens, étoient faits de bois d'if, & encore aujourd'hui nos Menuisiers & nos Tourneurs en font grand cas. Evelyn dit que ce bois ne le cede à aucun autre en bonté pour faire des dents de roues de moulin, des essieux de charrettes, & même des instruments de musique. Les Allemands en décorent leurs étuves.

Dioscoride, Galien & Pline, suivis de toute l'antiquité, ont regardé l'if comme un poison. Jules-César, dans le 6 *Liv. de ses Commentaires*, dit que Cativulcus Roi des Eburoniens, s'empoisonna avec le suc d'if. Matthiole & J. Bauhin rapportent nombre d'expériences, qui confirment ses mauvaises qualités. Le P. Schoot, Jésuite, assure que si l'on jette de l'if dans de l'eau dormante, les poissons en deviennent tout étourdis, de sorte qu'on peut les prendre avec la main. J. Bauhin a également observé cette vertu narcotique sur les bestiaux. Ray semble confirmer cette expérience, en parlant d'un if fort touffu, qu'on cultivoit dans le jardin de Pise : il dit que les Jardiniers, qui avoient soin de tondre cet arbre, ne pouvoient rester plus de demi-heure à faire ce travail, sans ressentir une violente douleur de tête, qui les empêchoit de continuer leur ouvrage. On lit dans les Affiches de 1754, que vers la fin de l'année 1753 plusieurs chevaux étoient entrés dans un verger voisin de la ville de Bois-le-Duc en Hollande, qu'ils y mangerent des branches d'if, & quatre heures après, sans aucun autre symptôme que des convulsions qui durèrent une ou deux minutes, ils tombèrent l'un après l'autre. Jusqu'ici tout paroît concourir à ranger l'if dans la classe des poisons.

Cependant, si l'on écoute Lobel & Camerarius, & encore plus l'expérience, on reconnoîtra bientôt que cet arbre n'est pas dangereux dans tous les pays. Lobel rapporte, qu'en Angleterre les enfants mangent impunément, tous les jours, des fruits de l'if, & que ces mêmes fruits servent de nourriture aux pourceaux. Le Botaniste Anglois Gerard dit en avoir mangé, avec plusieurs personnes, sans qu'il en ait ressenti aucun trouble, & qu'il a dormi souvent à l'ombre de cet arbre sans mal de tête & sans aucun accident : on voit tous les jours des enfants manger des baies d'if, au Jardin Royal des Plantes de Paris, sans qu'il en résulte aucune incommodité.

Tant de faits si contraires, nous portent à croire que cet arbre n'a aucune qualité venimeuse par lui-même ; & que s'il est dangereux dans d'autres pays, on doit l'attribuer au climat qui lui donne cette

mauvaise qualité. Aussi Dioscoride dit que l'if, qui naît en Italie & dans la Gaule Narbonnoise, est venimeux ; mais il convient qu'il ne l'est pas ailleurs : il en est de même du *napel*, qui n'est dangereux que dans certains climats.

IGNAME ou **INHAME**, espece de plante de la Négritie, dont les Nègres & quelques Sauvages de l'Amérique, où il s'en trouve aussi, se nourrissent.

L'igname est regardé à la Guyane, comme une liane. Sa racine est longue d'un pied & demi dans les bonnes terres : elle se plante en Décembre ; on peut, six mois après, l'arracher : on connoît sa maturité, lorsque les feuilles se flétrissent ; on la coupe en morceaux ; on la mange rôtie sous la braise ; ou bien quand elle est d'une grosseur moyenne, on la fait bouillir entiere avec le bœuf salé : elle sert quelquefois de pain ; on en fait aussi des bouillies agréables. Les Nègres en font du *langou* & du *pain*. *Maiss. Rust. de Cayenne.*

IGNARUCU est un animal amphibie, qui se trouve quelquefois au Bresil, & communément dans les rivières de Saint-François & de Paragua. Cet animal, qui est ennemi de l'homme, a la forme d'un crocodile : il vit dans l'eau, & peut aussi se retirer sur terre dans les buissons ; il grimpe même sur les arbres. Il est d'une couleur noirâtre : son corps est uni & tacheté, comme la peau d'un serpent. L'ouverture de sa gueule est grande ; ses dents sont d'une médiocre grandeur & menuës ; ses ongles sont étroits & arqués, mais trop foibles pour faire du mal : ses œufs, qu'il fait en grande quantité, sont d'un fort bon goût : sa chair est très douce, & passe pour un mets délicieux en Amérique. Les Espagnols, qui en avoient horreur, & qui n'en mangeoient point autrefois, ont appris des Américains le cas qu'il en faut faire ; aussi en font-ils usage aujourd'hui. L'ignarucu peut vivre dix jours, & même quelquefois vingt, sans boire ni manger.

IGUANE. Voyez **LEGUANA**.

ILE ou **ISLE**, *insula*. Nom donné à une portion de terre environnée d'une mer, d'une rivière, d'un fleuve, mais qui s'élève au dessus des flots. Le plus grand nombre des isles de la mer se trouvent entre les Tropiques. Les isles ne sont en général que les sommets les plus élevés des chaînes montueuses qui sillonnent par diverses ramifications la partie du globe que la mer recouvre. Les parties de la continuation de ces chaînes marines forment des bas-fonds, des écueils & des rochers à fleur d'eau : en sorte que ces terres plus ou moins proéminentes nous tracent sensiblement la route que suivent ces chaînes de montagnes sou-marines. On pourroit inférer de ceci que les détroits ne sont que l'abaissement naturel ou bien la rupture forcée des montagnes, qui forment les promontoires. Ce qui tend à le confirmer, c'est que les détroits sont les endroits où la mer a le moins de profondeur ; on y trouve une éminence continuée d'un bord à l'autre ; & les deux bassins que ce détroit réunit, augmentent

en profondeur par une progression constante ; ce qu'on peut voir dans le pas de Calais & dans le détroit de Gibraltar. Voyez DÉTROIT, MONTAGNE & l'article TERRE. Il est digne de remarque que les grands amas d'isles qui présentent une multitude de pointes peu éloignées les unes des autres , sont voisins des continents , & sur-tout dans de grandes anses formées par la mer. Les isles solitaires sont au milieu de l'Océan. Les isles flottantes , que l'on voit dans la partie supérieure de la mer Adriatique , se forment des racines de roseaux , arrachées , chariées & qui se sont entrelassées. La plupart des îlots qui se forment tous les jours près la terre ferme , proviennent des dépôts des rivières. Dans les pays où les pluies sont très fréquentes & très abondantes , à la Martinique , par exemple , où l'on compte plus de quarante rivières presque toutes navigables , on y voit une multitude d'îlots , dont les uns ont été formés par de pareils dépôts , les autres sont la suite & l'effet des tremblemens de terre. Toutes les isles de la Martinique éprouverent ce désastre en 1727.

IMBRICATA est un coquillage bivalve du genre des *cœurs*. Voyez FAITIERE.

IMBRIN est un oiseau des parages de l'Isle de Feroë , & qui ne sort jamais de l'eau , disent les Actes de Copenhague , parceque ses ailes sont trop petites pour voler , & ses pieds trop foibles & trop en arrière pour soutenir le poids de son corps. Les gens du pays croient que c'est une espèce d'alcyon , nommé vulgairement *Jis fugl* ; mais l'imbrin est plus gros : il excède même la grosseur d'une oie : son plumage est gris , à l'exception d'un cercle blanc au col. On a encore remarqué qu'il a sous chaque aile un creux capable de contenir un œuf ; l'on présume qu'il y tient ses œufs cachés , & qu'il les couve ainsi. Cet oiseau ne fait jamais plus de deux petits. On ne voit guère ces oiseaux sur les côtes , qu'à l'approche d'une tempête ; leurs cris font connoître aux habitants l'endroit où ils sont. On amorce les jeunes imbrins , en leur présentant des morceaux de linge blanc pour les attirer à la portée du fusil ; mais les vieux ne sont pas la dupe de cette ruse.

IMMA , espèce d'ochre rouge , ferrugineuse , dont les Teinturiers & les Peintres se servent en Perse , & que les femmes du pays emploient aussi pour se colorer le visage. Cette terre se tire particulièrement de la montagne de Chiampa , près de Bander-Abassi.

IMMORTELLE , *elichrysum*. C'est une plante qui s'élève à la hauteur d'un pied , dont les tiges sont très dures , lanugineuses , garnies de feuilles étroites , velues & blanchâtres. Les fleurs naissent aux sommités des tiges , ramassées en manière de tête , composées de plusieurs fleurons réguliers , soutenus par des calices écailleux fort secs : il y en a de jaunes , de blanches & de rouges : c'est de la différence de ces couleurs , qu'on l'a nommée quelquefois *amaranthe jaune* ou *bouton d'or* , *éternelle* ou *bouton blanc* , &c. Cette fleur est nommée , avec raison , *immortelle* ; car elle se conserve plusieurs années sans se flétrir ni se pourrir ; effet qu'il faut attri-

buer à ce que les pétales des fleurs sont dans un état de siccité , semblable à celui que l'on procure à d'autres fleurs , en les faisant dessécher dans un bain de sable. *Voyez FLEURS.*

L'immortelle croît naturellement aux lieux secs , en Languedoc , à Montpellier , en Provence : elle fleurit en Septembre. Son odeur est forte & agréable : la graine qui succède à chaque fleuron , est pareillement odorante , oblongue , fauve & garnie d'une aigrette : sa racine est simple , bien nourrie , ligneuse , ayant une odeur approchante de celle de la gomme elemi. Cette plante est apéritive , vulnérable & hystérique. On replante l'immortelle en Septembre , comme beaucoup d'autres fleurs. Selon M. Adanson , les *xeranthema* ou *immortelles à fleur rougeâtre & blanchâtre* , ne diffèrent des chardons qu'en ce que l'enveloppe commune de leurs fleurs & de leurs feuilles est sans épines.

IMPANGUEZZE. *Voyez EMPAKASSE.*

IMPERATOIRE ou BENJOIN FRANÇOIS , *imperatoria major* , est une plante qui se plaît dans les Alpes , les Pyrénées & sur le Mont-d'Or. Sa racine , qui est fameuse en Médecine , serpente obliquement : elle est de la grosseur du pouce , & très garnie de fibres , genouillée , brune en dehors , blanche en dedans , d'un goût très âcre , aromatique , un peu amer , qui pique fortement la langue , & qui échauffe toute la bouche. Les feuilles sont composées de trois côtes , arrondies , vertes , grandes , partagées en trois , & découpées à leurs bords. La tige s'élève à la hauteur de deux pieds : elle est cannelée , creuse , & porte des fleurs en rose , disposées en parasol : il leur succède des fruits formés de deux graines applaties , presque ovales , un peu rayées & bordées d'une aîle très mince.

L'IMPÉRATEUR , qu'on cultive dans les jardins , a moins de force que celle des montagnes. Lorsqu'on fait une incision dans la racine , dans les feuilles & la tige de l'impératoire , il en découle une liqueur huileuse , d'un goût aussi âcre que le lait du tithymale.

La racine & la graine donnent dans la distillation beaucoup d'huile essentielle , qui surpasse , par son odeur & par ses vertus celle de l'angélique. La racine est sudorifique , dissipe les vents de l'estomac , des intestins & de la matrice. Hoffman la vante comme un remède divin pour rétablir les règles des femmes , & pour guérir la stérilité ou la froideur des hommes : elle aide la digestion & facilite la respiration ; mais son principal usage est dans les maladies qui viennent de poison & dans les coups d'instruments empoisonnés , même dans l'apoplexie : cette racine entre dans l'orviétan & la thériaque.

IMPITOYABLE ou MANGE ROSE , est une larve tellement pernicieuse aux jeunes & tendres boutons de rose , qu'elle consume en peu de tems le cœur des roses & toute la substance , de façon que ces fleurs n'arrivent jamais à leur perfection quand elles ont été une fois attaquées par ces fortes d'insectes.

IMPOSTEUR. Ce nom a été donné par les Indiens à un poisson qui ref-

semble à la carpe par la forme de sa tête, & qui tient cachée dans sa bouche une espece de langue, faite en dard, qu'il fait sortir lorsque la faim le presse & dont il se sert pour prendre les petits poissons : il en avale jusqu'à douze à la fois ; ensuite il retire son long aiguillon, & nâge la bouche fermée, jusqu'à ce qu'un nouveau besoin & l'occasion demandent qu'il en fasse usage. Les Voyageurs disent que les Indiens font grand cas de ce poisson, & que sa chair est un mets délicieux. *Voyez* RUISCH. (*de Pis. T. II.*)

INCRUSTATIONS, *incrustata*. Nom qu'on donne à des concrétions pierreuses, feuilletées ou grainelées, plus ou moins compactes, de différentes duretés, qui revêtent, en maniere de dépôt, diverses substances, & qui se forment dans le sein de certaines eaux, lesquelles tiennent en dissolution des molécules terreuses, ou pierreuses, ou salines, ou minérales, ou métalliques. *Voyez la théorie de cette mécanique naturelle à l'article* STALACTITES.

INDE, *indicum*. Nom que l'on donne à une fécule ou à un suc épais, bleu, ou de couleur d'azur foncé, & qu'on nous apporte en masse ou en pâte sèche des Indes Occidentales.

Cette pâte féculente est tirée des feuilles de la plante nommée *anil* par les Espagnols, laquelle croît au Brésil. Elle est haute d'environ deux pieds ; ses feuilles sont rondes, assez épaisses, petites & verdâtres ; ses fleurs sont semblables à celles des pois rougeâtres ; il leur succède des gousses longues & recourbées, contenant quatre ou six semences, oblongues & olivâtres. Toute cette plante a un goût amer & piquant : des Voyageurs disent que c'est une espece de fain-foin, qui d'abord ne s'élève qu'à la hauteur de deux pieds & demi ; mais qui, lorsqu'on ne le coupe pas, prend forme d'arbrisseau, & pousse un grand nombre de rameaux. Les Indiens disent que l'anil est vulnérable & céphalique.

Il y a plusieurs especes d'inde, le meilleur est celui qu'on appelle *inde de Serquisse* ou de *Cirkest*, du nom du village Indien où il se fait : on choisit l'inde en morceaux quarrés applatis, peu durs, nets, nâgeant sur l'eau, inflammables, d'une belle couleur bleue ou violette foncée, surchargée de purpurin ; semblable en cela à l'indigo. *L'indigo en marons*, qu'on appelle *indigo d'Agra*, est encore d'une assez bonne qualité.

On fait usage de l'inde dans la teinture, dans la peinture : on l'emploie broyé & mêlé avec du blanc pour faire une couleur bleue ; car si l'on s'en servoit sans mélange, il teindroit en noirâtre. L'on ne doit pas s'en servir dans la peinture à l'huile, parcequ'il se décharge & perd une partie de sa force en séchant, mais à la détrempe il produit des effets admirables ; il est absolument nécessaire pour peindre le ciel, la mer, & pour toutes les parties fuyantes d'un tableau. On le broie quelquefois avec du jaune tiré de la graine d'Avignon, &c. pour faire une couleur verte. Les étoffes de soie, de fil, de laine & de coton reçoivent une variété de couleurs admirables de l'emploi de l'inde, comme de l'indigo & du mélange qu'on en

fait avec d'autres couleurs. Les blanchisseuses emploient l'inde pour donner une couleur bleuâtre à leur linge : les Médecins en ordonnoient autrefois dans les bains pour fortifier les nerfs.

On donne aussi le nom d'inde à la fécule du pastel ou guesde; & encore au bois d'inde. Voyez PASTEL & BOIS D'INDE.

INDIGO. C'est une fécule tirée aussi de l'anil, & qui ne differe de l'inde, dont il est parlé à l'article précédent, qu'en ce qu'il a été extrait de l'écorce des branches, de la tige & des feuilles de la plante, au lieu qu'on n'a employé que les feuilles pour tirer l'inde. Les Marchands distinguent plusieurs especes d'indigo; le meilleur & le plus estimé est celui qu'on appelle *indigo-gatimalo*, du nom d'une ville des Indes Occidentales, où l'on le prépare : il doit être léger, net, peu dur, nageant sur l'eau, inflammable, & se consumant presque entièrement. Sa couleur est d'un beau bleu : quand on le frotte sur l'ongle, il y reste une trace qui imite le coloris de l'ancien bronze.

Ce que l'on appelle *bleu de Java*, est un *inde* que les Hollandois préparent avec l'indigo. Il paroît que l'on travaille de l'indigo en Malabar, mais les échantillons que nous en avons reçus, sont bien inférieurs à toutes les especes d'indes connues.

M. de Préfontaine, *Mais. Rust. de Cay.* dit qu'on cultive beaucoup la plante de l'indigo dans nos Colonies Françaises, c'est même une des meilleures cultures de l'Amérique, & en même tems une des plus délicates. Elle exige une bonne qualité de terre, & beaucoup d'attention de la part du Cultivateur. Le terrain doit être plat, uni, humide & très gras. L'indigo se sème en tems humide, dans des trous alignés à un pied de distance, auxquels on donne trois pouces de profondeur. Les Negres semeurs mettent dix graines dans chaque trou, qu'ils recouvrent soigneusement avec leurs pieds : on voit ordinairement sortir la plante six jours après. Il faut avoir soin de sarcler les mauvaises herbes. Au bout de deux mois l'indigo est bon à être coupé, ce qui se connoît par la facilité que les feuilles ont à se casser, & par leur couleur vive foncée : on coupe l'indigo par un tems humide. La plante peut durer deux ans : on la coupe avec des faucilles, & on met ce qui a été coupé dans de grands morceaux de toile pour le porter à la manufacture. L'indigo coupé avant sa maturité donne une plus belle couleur, mais il rend beaucoup moins : s'il est coupé trop tard on perd encore plus, & on a un indigo de mauvaise qualité. Cette plante, dit M. de Préfontaine, est sujette à une espece d'insecte qui vient par vol comme une nuée, & la mange totalement dans peu de tems. Cet insecte est commun, sur-tout à S. Domingue. La seule ressource de l'habitant est de couper son indigo dans l'état où il est : on le jette dans l'eau avec les petits animaux qu'on en sépare par ce moyen. On emploie encore, pour la destruction de ces chenilles, une autre méthode qui paroît singulière : sitôt que l'indigo en est attaqué, on laisse entrer des cochons dans la piece d'indigo; ces animaux avec leur nez font remuer la tige, & en font tomber les insectes, sur lesquels ils se jettent avidement.

Il faut, pour fabriquer l'indigo, avoir trois cuves posées les unes sur les autres à des hauteurs différentes, & près d'un réservoir d'eau : la première s'appelle *trempoire*, la seconde *batterie*, & la troisième *diablotin* ; c'est celle où le produit des deux autres se rassied, & dans laquelle l'indigo s'acheve. Cette opération se réduit à macérer la plante dans la première cuve où elle fermente, à decanter l'eau devenue bleue dans la seconde cuve, & à agiter l'eau à force de manivelle, jusqu'à ce que la partie colorante & errante s'agglomère en petits grains. L'adresse de l'indigotier consiste à saisir l'instant convenable : pour cet effet, pendant que les Negres battent, il tire de l'eau de la batterie dans une tasse de crystal, & il examine si la fécule se précipite, ou si elle est encore errante. Dans le premier cas il faut cesser de battre, dans l'autre il faut continuer. L'opération étant faite, l'eau s'éclaircit, la fécule se précipite ; on lâche l'eau, & la fécule ou matière boueuse tombe dans la troisième cuve où elle se rassied. Dans cet état on la prend avec une cuillier, & on en emplit des chausses de figure conique de la longueur de quinze à vingt pouces, afin que l'humidité s'évaporant, l'indigo acquière une consistance de pâte. On vuide alors ces chausses dans des caissons quarrés ou oblongs d'environ deux à trois pouces de profondeur : on fait sécher l'indigo à l'air, mais à l'ombre. Une trop grande humidité ne lui est pas moins contraire, car il se corromproit ; au soleil il perdrait sa couleur : enfin on le coupe en petits pains quarrés pour l'envoyer en France.

INDIGO BATARD. C'est une espèce de *barbe de Jupiter*. Voyez ce mot.

INDIGO DE LA GUADELOUPE. La plupart des Botanistes donnent ce nom à une espèce d'*anonis*.

INDIGOSAUVAGE. Cette plante vient naturellement dans la Guiane. Les Créoles disent que sa racine écrasée & appliquée sur les dents, en amortit la douleur.

INSECTE, *Insectum*. Que de Réaumurs ne faudroit-il pas pour épuiser cet article ! En général, on donne ce nom à de petits animaux composés d'anneaux ou de segments. Les parties des insectes sont assez distinctement organisées, pour qu'on y puisse distinguer une tête, des cornes mobiles ou antennes (*tentacula*), une poitrine ou corselet (*thorax*), un ventre, des pieds, & souvent des ailes, sur-tout dans ceux qui se métamorphosent : toutes ces parties, comme coupées, tiennent les unes aux autres par de menus filaments, qui sont autant de canaux ou d'étranglements, ou d'intersections minces, & dont la mécanique éloigne ou approche les anneaux les uns des autres dans une membrane commune qui les assemble, de sorte que toutes ces parties ou lames écailleuses semblent jouer & glisser les unes sur les autres. Cette définition ne détermine pas encore l'idée qu'on doit se former des insectes, & il est peut-être difficile d'employer un terme qui embrasse tout à la fois le genre entier des insectes ; car on a besoin de plus d'un caractère pour se former une notion exacte de ces animaux & de leur constitution.

Le premier, selon M. Rœfel, est que l'animal dont il est question, n'ait ni ossements, ni arrêtes (sa peau, souvent écailleuse, en fait l'office) : 2°. qu'il soit pourvu d'une trompe, ou d'un aiguillon, ou d'une bouche, dont les mâchoires s'ouvrent ou se ferment, non d'en-haut ou d'en-bas, mais de la gauche à la droite, & de la droite à la gauche : 3°. qu'il soit privé de paupieres, ou d'équivalent : 4°. qu'il ne respire pas l'air par la bouche, mais qu'il le pompe & l'exhale par la partie supérieure de son corps, & par de petites ouvertures sur les flancs, qu'on appelle *stigmates* ou *points à miroirs* : observation qu'on peut répéter sur tous les insectes, dans un verre clair, rempli d'eau. Cette dernière définition des insectes est encore insuffisante pour bien des Lecteurs : considérons-les sous un autre point de vue.

Divisions des Insectes.

Il y a diverses sortes d'insectes : ceux qui s'occupent de l'étude de ces animaux, les distinguent en *insectes aquatiques* & en *terrestres* : il n'y en a qu'un petit nombre dans l'une & l'autre espèce qui ne se métamorphosent pas, ou qui gardent leur forme première. Les uns sont sans antennes & sans pieds (*apodes*), tels que les *sangsues*, les *vers*, les *limaces* & les *moules*, &c. Ceux qui sont pourvus de pieds n'en ont pas moins que six (*hexapodes*). Ceux qu'on appelle *polypodes*, en ont au moins dix. Enfin il y en a qu'on appelle *centipedes*, & *millepedes*, à cause du grand nombre de leurs pieds. C'est effectivement des scolopendres & des jules, qui ont jusqu'à 70 & 120 pattes de chaque côté. Les pattes des insectes sont articulées & terminées par deux, quatre & quelquefois six petites griffes crochues & fort aiguës, qui servent à cramponner l'animal. Indépendamment de ces griffes ou ongles, le dessous du pied est encore garni de petites brosses ou pelottes spongieuses, qui servent à tenir l'insecte sur les corps les plus lisses.

Parmi les insectes qui ont des pieds, les uns sont ailés, les autres ne le sont pas ; & de ceux-ci, il y en a qui le deviennent, dès qu'ils ont changé de forme, comme les chenilles transformées en papillons ; ceux à qui il ne vient point d'ailes, sont ces espèces de chenilles appelées *scolopendres*, & quelques autres de même nature.

Parmi les insectes qui ont des ailes, il y en a qui les portent toujours tendues, comme les papillons, les mouches, les abeilles & autres : d'autres les tiennent cachées & renfermées dans un étui ; telles sont les cantharides & les espèces de scarabées : de ceux-ci, il y en a qui ont deux ailes ; & les autres quatre.

Les Naturalistes trouvent encore, dans les insectes, des caractères qui ont des détails suffisants pour servir à distribuer les genres en espèces : ce sont ceux des ailes, dont nous avons dit quelque chose.

On distingue dans ce genre d'animaux, 1°. ceux dont les ailes membraneuses sont renfermées sous des étuis solides & écailleux, opaques &

colorés, tels que les escarbots, le cerf-volant, le dermestes, le hanneton, le capricorne, l'altise, le chrysomele, les cantharides, le bupreste, la calandre & le grillon, sous le nom de *Coléopteres*. Leur bouche est armée d'une mâchoire dure & aiguë, & ils ont six pieds.

2°. Ceux qui n'ont que des moitiés d'aîles, (c'est-à-dire dont les élytres ou aîles supérieures ont des demi-étuis durs & écailleux, ou des étuis à moitié mols, & qui ne recouvrent que la moitié du corps, ou des aîles inférieures,) tels que les pro-cigales & les cigales, la punaise de bois, le kermès, le scorpion de marais, les cochenilles, sous le nom d'*Hémipteres*. Dans cette section, la trompe de la bouche est longue & aiguë; elle est encore repliée en dessous, & s'étend entre les pattes. *V. HÉMIPTERE*.

3°. Ceux qui ont les quatre aîles farineuses, c'est-à-dire, chargées d'une poussière organisée & écailleuse, tels que les papillons diurnes & nocturnes, sous le nom de *Lépidopteres*. Leur trompe est plus ou moins longue, & souvent recourbée en spirale.

4°. Ceux qui ont les quatre aîles membraneuses, nerveuses, nues & sans poussière, tels que les guêpes & les mouches ichneumons, les demoiselles, les abeilles, les fourmis volantes, sous le nom d'*Hyménopteres*. Cette section est nombreuse, & est désignée par quelques-uns sous le nom de *Névropteres*: la plupart des insectes qu'elle contient ont la bouche armée de mâchoires, plus ou moins grande, & souvent accompagnée d'appendices semblables à des antennules.

5°. Ceux qui ont deux aîles, tels que les mouches communes, les taons, les tipules, les cousins, sous le nom de *Dipteres*. Ces insectes ont les trompes de la bouche diversement figurées, suivant les différents genres; mais tous ont sous l'origine de leurs aîles des espèces de petits balanciers.

6°. Ceux qui sont sans aîles, tels que les poux, les cloportes, les puces, les cirons, les araignées, sous le nom d'*Apteres*. A l'égard des insectes qui vivent dans l'eau, & qui sont *testacées* ou *crustacées*, on leur donne cette épithète avec le nom d'*insectes* ou *vers aquatiques*, &c.

Cette méthode, qui est en partie celle de M. Linnæus, laisse encore à désirer bien des choses, puisqu'il y a des insectes dont les aîles sont plus ou moins entières, dures, tendres, poudreuses ou lisses: quelques-uns des insectes ont des poils, des piquants; des boutons; des antennes plus ou moins longues, enfilées ou velues; d'autres ont des pinces pour saisir leur proie, ou des dents, ou un aiguillon, qui leur sert à se défendre, ou à manger, ou à pondre; enfin il y a des insectes qui ne ressemblent presque point à des animaux, tels que les *gallinsectes*, les *progal'insectes*, &c. Voyez ces mots.

Ne pourroit-on pas distinguer les insectes, en insectes à *quatre aîles*, à *deux aîles*, à *aîles à étuis*, *sans aîles*, en *vers nus*, & ceux qui sont *couverts de croûtes*?

A l'égard de quelques autres termes moins familiers, & dont on se sert dans la description d'un insecte, en voici la liste. *Antennes*: voyez ce mot,

& à l'article PAPILLON. Les *barbillons* sont les antennes qui sont sur les côtés de la bouche de quantité d'insectes. La *chrysalide* est détaillée à l'article NYMPHE. Les *balanciers* sont ces petits filets mobiles, terminés par un bouton, qui se trouvent à l'origine des ailes de tous les insectes à deux ailes. Le *corselet* est cette partie qui, chez l'insecte, répond à la poitrine des grands animaux. L'*écusson* (*scutellum*) est cette pièce triangulaire qui se trouve à la naissance du corselet ou des ailes des coléoptères. Les *élytres* sont les écussons écailleux des ailes des coléoptères. À l'égard de la *larve* & des *métamorphoses*, voyez ces mots, ou celui de NYMPHE.

Autres considérations sur la structure du corps des insectes.

Il y a tant de diversités dans la seule figure extérieure du corps des insectes, qu'il est peut-être impossible d'épuiser cette variété. Nous nous contenterons de faire observer que le corps des uns, comme celui des araignées, est de figure à-peu-près sphérique; & celui des autres, comme des scarabées de Sainte-Marie, ressemble à un globe coupé par le milieu: il y en a qui sont plats & ronds, comme le pou des chauve-souris; d'autres ont la figure ovale. Le ver qui se trouve dans les excréments des chevaux, a celle d'un œuf comprimé: le mille-pieds rond ressemble au tuyau d'une plume. Beaucoup ont le corps quarré, plat; plusieurs sont courbés comme une faucille, & pourvus d'une longue queue, comme celle de la fausse-guêpe. Quelques-uns de ceux qui n'ont point de pieds, ont en divers endroits de petites pointes qui leur en tiennent lieu; ils s'en servent pour s'accrocher & se tenir fermes aux corps solides. Le corps des insectes qui vivent dans l'eau, est naturellement couvert d'une espèce d'huile qui empêche l'eau de s'y arrêter & de retarder leur mouvement; d'autres, comme l'araignée blanche des jardins, ont le corps entouré d'un rebord rouge qui en fait le cercle; quelquefois ils sont ornés de petits tubercules qui les empêchent d'être blessés lorsqu'ils entrent & sortent de leur trou, comme dans la chenille blanche à taches jaunes, qui vit sur le faule. Enfin l'on en voit qui, comme les chameaux, ont une bosse sur le dos; telles sont les araignées qui ont encore à la partie postérieure du corps des mamelons dont elles tirent leurs fils: d'autres insectes ont cette même partie ou unie, ou revêtue de poils: quelques uns ont le derrière ou couvert d'une espèce d'écusson, ou garni d'une membrane roide qui leur sert de gouvernail pour se tourner en volant du côté qu'il leur plaît; elle est à ces insectes, ce que la queue est aux oiseaux. La partie postérieure est encore le lieu où de l'aiguillon, ou de la pincette faite en faucille, ou de la fourche à deux dents, ou de ces sortes de barbillons pointus, droits ou courbes, & qui leur servent tantôt pour appercevoir ce qui les approche par derrière, tantôt pour s'accrocher, tantôt pour pousser leur corps en avant.

*Description de différents organes des Insectes , tels que les yeux à réseau ,
les stigmates , la voix & l'oreille.*

L'histoire que nous nous proposons de donner ici de ces organes , mérite quelque attention de la part du lecteur ; nous avons réuni ces différens articles sous un même point de vue , parcequ'ils sont propres à la plupart des insectes : à l'égard des organes qui sont particuliers à chaque espece d'insecte , nous en traitons sous le nom de l'insecte même.

Les yeux à réseau sont peut-être , de toutes les parties des insectes , la plus propre à nous faire voir avec quel prodigieux appareil la Nature les a formés , & à nous montrer en général combien elle produit de merveilles qui nous échappent. Les plus grands Observateurs microscopiques n'ont pas manqué d'étudier la structure singulière de ces yeux. Ceux des mouches , des scarabées , des papillons & de divers autres insectes , ne diffèrent en rien d'essentiel. Ces yeux sont tous à-peu-près des portions de sphere ; leur enveloppe extérieure peut être regardée comme la cornée. On appelle *cornée* , l'enveloppe extérieure de tout œil , celle à laquelle le doigt toucheroit , si on vouloit toucher un œil , les paupieres restant ouvertes. Celle des insectes dont nous parlons , a une sorte de luisant qui fait voir souvent les couleurs aussi variées que celles de l'arc-en-ciel. Elle paroît à la vue simple , unie comme une glace ; mais lorsqu'on la regarde à la loupe , elle paroît taillée à facettes comme des diamants : ces facettes sont disposées avec une régularité admirable , & dans un nombre prodigieux. Lewenoeck a calculé qu'il y en avoit 3181 sur une seule cornée d'un scarabée , & qu'il y en avoit plus de 8000 sur chacune de celles d'une mouche. Ce qu'il y a de plus merveilleux , c'est que toutes ces facettes sont vraisemblablement autant d'yeux ; de sorte qu'au lieu de deux yeux , que quelques-uns ont peine à accorder aux papillons , nous devons leur en reconnoître sur les deux cornées , 34650 , aux mouches 16000 , & aux autres plus ou moins , mais toujours dans un nombre aussi surprenant.

Voici deux expériences de ces savants Observateurs , qui prouvent incontestablement que chaque facette est un cristallin , & que chaque cristallin est accompagné de ce qui forme un œil complet. Ils ont détaché les cornées de divers insectes , ils en ont tiré avec adresse toute la matiere qui y étoit renfermée ; & après avoir bien netoyé toute la surface intérieure , ils les ont mises à la place d'une lentille de microscope. Cette cornée ainsi ajustée & pointée vis-à-vis d'une bougie , faisoit voir une des plus riches illuminations. M. Puger ayant mis & tenu au foyer d'un microscope , l'œil d'un papillon ainsi préparé , un soldat vu à ce microscope paroissoit une armée de près de 17325 soldats ; un pont étoit autant multiplié , & formoit un nombre infini d'arches. Lewenoeck a poussé la dissection jusqu'à faire voir que chaque cristallin a son nerf optique. Comment , dira-t-on , un insecte avec des milliers d'yeux , peut-il voir l'objet simple ? Lorsque nous

saurons au juste comment nous-mêmes avec deux yeux, nous voyons les objets simples, il nous sera aisé de concevoir que les objets peuvent paroître simples à des insectes avec des milliers d'yeux. La Nature qui a voulu que leurs yeux ne fussent point mobiles, y a suppléé par le nombre & par la position. Malgré ces milliers d'yeux dont sont composées les deux orbites, la plupart des mouches ont encore trois autres yeux placés en triangle sur la tête, entre le crâne & le col. Ces trois yeux qui sont aussi des crySTALLINS, ne sont point à facettes; ils sont lisses, & paroissent comme des points : ces différentes grosseurs des yeux dans le même insecte, les différentes places accordées aux uns & aux autres, conduisent à présumer avec quelque vraisemblance, que la Nature a favorisé les insectes d'yeux propres à voir les objets qui sont près d'eux, & d'autres pour voir les objets éloignés; qu'elle les a, pour ainsi dire, pourvus de microscopes & de telescopes. Il faut observer que la plupart de ces yeux à facettes sont couverts de poils, que l'on peut soupçonner de produire l'effet des cils de nos yeux, c'est-à-dire, de détourner une trop grande quantité de rayons de lumière, qui ne serviroient qu'à embarrasser la vue.

Si quelqu'un doutoit que ces globes à facettes fussent l'organe de la vue, voici des expériences démonstratives. M. de Réaumur mit une couche de vernis opaque sur les yeux à réseau de plusieurs abeilles d'une même ruche; ces abeilles furent mises dans un poudrier avec quelques-unes de leurs semblables, dont les yeux n'étoient point couverts, & à quelques distances de la ruche. Les premières voloient çà & là, ou ne voloient point du tout, tandis que les autres alloient droit à la ruche. Si on jettoit une de ces mouches aveugles en l'air, elle s'élevoit verticalement à perte de vue, sans qu'on sût ce qu'elle devenoit; semblables à ces corneilles, qui voulant saisir la viande mise au fond d'un cornet englué, s'en font une coëffe, & ainsi aveuglées, s'élèvent à perte de vue, & retombent, dit-on, sans forces & presque mortes. Les mouches dont on avoit verni simplement les yeux lisses, voloient de tous côtés sur les plantes sans aller loin, mais ne s'élevoient point verticalement.

Les *stigmates* dont on doit la découverte à MM. Bazin & de Gêr, sont des ouvertures en forme de bouches, que l'on voit à l'extérieur des insectes. Ce sont leurs poulmons, leurs organes de la respiration. La différence n'est que dans le nombre & les places qu'elles occupent; les mouches les ont sur le corselet & les anneaux; le ver à soie & les autres insectes de son espèce en ont dix-huit le long des côtés du corps; la courtillière en a vingt. Il y a des vers qui portent leurs poulmons au bout d'une corne. De ces ouvertures, nommées *stigmates*, partent en dedans du corps une infinité de petits canaux formés d'une fibre argentine, roulée sur elle-même, en forme de tireboure. Ces canaux se ramifient prodigieusement, & portent l'air dans toutes les parties du corps de l'animal; cet air ressort ensuite par les pores de la peau. Il y a quelques nymphes aquatiques qui ont, au lieu de stigmates, des espèces d'ouïes semblables à celles des poissons, des

pannaches auxquels aboutissent les poulmons aériens, & qu'elles font jouer presque continuellement avec une légèreté surprenante. Lorsqu'on bouche les stigmates d'un insecte avec de l'huile, il périt à l'instant, parcequ'on le prive des organes de la respiration.

M. Lyonet pense que les insectes auxquels la Nature a donné une espèce de voix, ou, pour parler plus juste, la faculté de former certains sons, comme elle l'a donnée aux cigales, aux cousins, aux bourdons, aux grillons, aux sauterelles, & à plusieurs scarabées, ont aussi reçu le sens de l'ouïe pour entendre ces sons : nous ne leur connoissons, il est vrai, aucune oreille extérieure ; mais encore ne sauroit-on inférer qu'ils n'en ont point ; elles peuvent être déguisées & rendues méconnoissables par leur forme & par la place qu'elles occupent. Des animaux dont la voix ne se forme point par le gozier, qui respirent par le corselet, par les côtés, par la partie postérieure ; des animaux parmi lesquels on en voit qui ont les yeux sur le dos & les parties génitales sur la tête, des animaux de cet ordre peuvent fort bien avoir les oreilles par-tout ailleurs que dans les endroits où l'on s'attendroit à les trouver.

Comme l'usage de tous les membres des insectes ne nous est pas connu, peut-être y en a-t-il parmi ceux dont nous ignorons la destination, qui leur sont donnés pour recevoir l'impression des sons, encore moins pouvons-nous assurer que les insectes n'ont point d'oreilles intérieures : cet organe, s'ils en ont un, doit être en eux délicat & comme imperceptible. Il y a sans doute dans le chant des insectes, des modulations, des différences que les organes épais de notre ouïe ne peuvent pas toujours saisir ; car il n'est pas dans l'ordre que tous les différents insectes chantent sur le même ton, le combat, la retraite & la victoire, la douleur & le plaisir : on peut même croire que les insectes ont aussi des moyens qui nous sont inconnus, & qui servent à exprimer leurs diverses passions.

Copulation & génération des Insectes.

Tous les insectes sont très féconds, & paroissent penser dès leur naissance à s'accoupler & à perpétuer leur espèce ; ils semblent même n'avoir point d'autre but. Les parties de la génération de ces petits animaux, sont ordinairement placées à l'extrémité du ventre, au derriere dans les mâles ; l'on en voit cependant qui les portent par devant sous le ventre, même d'autres à la tête. Ces parties sont ordinairement couvertes d'un poil extrêmement fin, à cause de leur délicatesse infinie. Les moyens que les insectes emploient pour parvenir à leur multiplication, sont assez différents. La génération des *pucerons*, le bizarre accouplement des mouches appelées *démoiselles*, des araignées, & quantité d'autres aussi singuliers, font comprendre combien la Nature est féconde & inépuisable en inventions mécaniques. Pour cette opération importante, les uns, comme la fourmi, se rassemblent & forment des espèces de Colonies & de Répu-

bliques; d'autres vont à l'écart; & avant comme après le moment de jouissance, ils font retentir les champs d'un sifflement aigu, qu'on prendroit en quelque sorte pour le son d'une flûte : il y en a dont l'entrevue se passe en silence. Les vers luifants dans les nuits de l'été, paroissent comme un phosphore dans les buissons : cette lueur leur annonce réciproquement & le desir de multiplier, & le lieu où ils peuvent se trouver; il en est de même à l'égard des autres animaux qui sont luifants pendant la nuit. Les mâles sont communément plus petits que les femelles, mais les antennes de celles-ci sont moins grandes & moins belles; quelquefois aussi elles sont dépourvues d'aîles. Dans la plupart des insectes mâles, si l'on presse le ventre, on fait sortir par l'ouverture qui est à son extrémité, deux especes de crochets assez durs, lesquels en s'entrouvrant, font paroître la véritable partie sexuelle : les crochets servent à l'insecte à s'accrocher & à se cramponner après sa femelle, même à la stimuler pendant l'acte amoureux; le ventre de la femelle comprimé ne laisse voir qu'une especes de canal qui lui sert de vagin.

Si les insectes vivent peu de tems, ils ont en récompense la vie plus dure, & naissent en très grande quantité : les *cirons* multiplient au nombre de mille en quelques jours. *L'éphemere*, cette mouche dont la vie est si courte, n'emploie pas toute cette durée à voler sur les eaux; la Nature a voulu que ce tems lui suffise pour ses plaisirs, son accouplement & la ponte de ses œufs. Il y a certaines mouches vivipares qui sont si fécondes, qu'elles donnent naissance à deux mille autres à chaque portée : l'on voit aussi des mouches ovipares, telle que l'abeille, qui produisent jusqu'à quarante mille œufs fécondés. Quoique les insectes soient très petits & qu'ils occupent un très petit espace dans le monde, ils ne laissent pas que de former en très peu de tems des nuées d'insectes qui pourroient infester des pays, s'ils ne devenoient la proie des oiseaux, des reptiles, des poissons & des araignées, & s'ils ne périssent la plupart immédiatement après la fécondation & la ponte : effectivement dès que l'accouplement est accompli, les mâles paroissent épuisés, languissants; & comme ils sont alors inutiles, ils achevent de payer le tribut à la Nature, ils meurent. Les femelles ne survivent à leurs mâles que l'instant nécessaire pour la ponte ou pour l'accouchement, suivant que l'animal est ovipare ou vivipare.

Lieux où les Insectes déposent leurs œufs, &c.

La plupart des insectes ne portent point de petits dans leur ventre, & ils ne couvent pas leurs œufs : il y a beaucoup plus de ces animaux *ovipares* que *vivipares*. Voyez ces mots & celui d'ŒUF. La queue creuse & pointue des femelles, leur sert de conduit pour pondre leurs œufs dans les corps où elles veulent les introduire. Comme les œufs ne descendent point par la pression de l'air, la Nature y a formé plusieurs demi-anneaux opposés, qui facilitent cette descente. Les insectes les resserrent successivement

en commençant par celui qui est le plus près du ventre , & font tomber les œufs d'un anneau à l'autre par une espece de mouvement péristaltique. La fente de ce canal est beaucoup moins visible pendant que l'animal est en vie , que lorsqu'il est mort. Toutes les femelles d'insectes n'ont pas un pareil canal : celles qui déposent leurs œufs sur la surface des corps , les font passer immédiatement par les parties génitales ; il n'y a que celles qui les déposent dans la chair , dans d'autres insectes , &c. qui aient besoin d'un semblable tuyau ; encore ne sert-il pas toujours de canal aux œufs. L'on trouve certains insectes aquatiques , dont les mâles ont ce canal aussi bien que les femelles : ils s'en servent comme d'un soupirail , par lequel ils respirent un air frais. On les voit souvent avancer sur la superficie de l'eau l'ouverture de ce canal , & l'on remarque même que quand ils sont rentrés sous l'eau , il s'élève de petites bulles d'air qu'ils en laissent échapper.

Dès qu'un instinct particulier a fait rassembler par troupes les mâles avec les femelles , celles-ci ne mettent bas leurs œufs qu'après avoir choisi un lieu qui puisse fournir de lui-même la pâture nécessaire à leurs petits nouvellement éclos , & satisfaire à tous leurs autres besoins pendant qu'ils sont jeunes : si ces œufs ne sont pas déposés dans des logettes , ils sont au moins collés fortement sur un point d'appui. La prévoyance de la Nature est en cela d'autant plus admirable , que la mere meurt souvent après qu'elle a pondu. Les papillons diurnes & nocturnes , les chrysomèles , les charançons , les punaises , les pucerons , les insectes du kermès déposent leurs œufs sur les feuilles des plantes , & chaque famille choisit l'espece de végétal qui lui convient ; de sorte qu'il n'y a presque point de feuillage qui ne nourrisse son insecte particulier , & il y a plusieurs de ces animaux qui occupent toutes les parties de l'arbre ou de l'arbrisseau ; les uns choisissent les fleurs , les autres le tronc ; ceux-ci les feuilles , & ceux-là les racines.

Les feuilles de certains arbres ou de certaines plantes , quand les œufs des insectes y ont été déposés , s'élèvent en forme de noix , pour loger commodément les petits qui viennent d'éclore. Certains charançons déposent leurs œufs dans l'intérieur des feuilles d'une plante appelée la *patte d'oie* ; il en sort des vers qui rampent entre les faces supérieure & inférieure de ces feuilles , & qui s'y creusent des routes secrètes , comme la taupe fait sous terre pour se mettre à couvert des injures de l'air & des oiseaux : ces vers ainsi renfermés dans le parenchyme des feuilles , marchent & butinent en sûreté.

Dès que la psylle a déposé ses œufs sur les branches du sapin , on voit qu'il s'y élève des tubérosités monstrueuses , écailleuses , qui servent de berceau aux petites larves. Il y en a une autre espece qui met bas les siens sur la véronique , dont les feuilles aussi-tôt après se resserrent & s'arrondissent en forme de petite tête. La psylle du buis en piquant les feuilles de cet arbre , les fait courber & creuser en calotte : c'est-là que la larve & la

nymphes de cet insecte déposent par l'anus une matière blanche sucrée comme la manne. La tipule place ses œufs sur le bout des branches du genévrier, où il s'élève une espèce de petit logement à trois faces; ou bien sur les feuilles de peuplier, ce qui fait croître aussitôt un bouton rouge. Le puceron dépose les siens sur les feuilles du peuplier noir, lesquelles se boursoufflent & se changent en une espèce de poche. Certaines mouches placent leurs œufs dans les fruits encore verts du poirier, du prunier, du bigarreau; de sorte que ces fruits étant mûrs ou presque mûrs, on y trouve souvent les larves de ces insectes.

Ce ne sont pas seulement les plantes que les insectes choisissent pour se loger & faire leurs pontes. Les fourmis déposent en terre leurs œufs, & les exposent au soleil pour les faire éclore; les araignées enveloppent leurs œufs d'un tissu soyeux, très fin & délicat; les moucheron les déposent sur l'eau qui croupit; le monocle ou le perroquet d'eau multiplie souvent sur de pareilles eaux, & en si grande quantité, qu'à voir les pelotons rouges de ces insectes, on les prendroit pour des caillots de sang; l'escarbot dépose ses œufs dans le fumier & l'ordure; le dermeste ou scarabée disséqueur, & les teignes, dans les fourrures à poil & à plume; certaines mouches, dans des trous de fromage; la mouche abeilliforme met bas les siens dans les excréments, &c. D'autres insectes mettent bas leurs œufs en certains endroits du corps des animaux vivants: la mite les place entre les écailles des poissons; les mouches ichneumons déposent leurs œufs ou dans l'œuf d'un papillon, ou sous la peau des chenilles. Il y a quatre espèces de taons, dont les uns les déposent sur le dos du bœuf, qui en est cruellement tourmenté; d'autres sur le dos du renne, ce qui le fait courir sur les montagnes de neige & de glaçons en faisant des ruades, pour tâcher de se débarrasser de ce fardeau si léger, mais si incommode: la troisième espèce fait sa ponte dans les narines des brebis, & la quatrième se tient cachée dans les boyaux ou dans le gozier des chevaux, d'où elle ne sort qu'au commencement de l'été suivant, en molestant beaucoup ces animaux.

Tous les quadrupèdes sauvages ont une vermine qui leur est particulière, aussi-bien que les oiseaux, les poissons & les insectes; l'eau même a la sienne.

Métamorphoses ou développements des Insectes.

Les oiseaux, les quadrupèdes, &c. naissent avec la même forme qu'ils auront toute leur vie. Quelques insectes sont dans le même cas, mais c'est le plus petit nombre. En général, tous les insectes qui n'ont point d'ailes (excepté la puce seule) sortent du sein de leur mère sous la même forme qu'ils conserveront jusqu'à la mort. Les cloportes, les araignées, les tiques, les poux, les scolopendres, &c. ne diffèrent de leur mère que par la grandeur: dans la jeunesse, comme dans leur âge parfait, la figure est la même.

On fait qu'entre les insectes, il y a des vers qui naissent d'œufs, & d'autres de rejettons vifs; tels que les polypes. On fait aussi que la Nature, par une loi admirable, fait passer presque tous les œufs des insectes par différentes métamorphoses, après qu'ils ont été placés dans l'endroit qui leur est propre. Mais examinons ces changements: par exemple, quand l'œuf du papillon a été déposé sur la feuille d'un chou, cet œuf se change d'abord en chenille rampante à seize pieds, qui broute les feuilles, & qui ensuite se change elle-même en une nymphe ou chrysalide, sans pieds, unie, de couleur d'or; enfin en un animal parfait, c'est un papillon blanc ou bigarré de plusieurs sortes de couleurs, qui vole, qui a six pieds, & qui suce les fleurs. Est-il rien de si admirable dans la Nature, que de voir un animal qui se présente sur la scène du monde sous trois formes parfaitement distinctes? L'on diroit que ces petits animaux sont composés de deux ou trois corps organisés tout différemment, dont le second se développe après le premier, & dont le troisième naît du second. Cependant il paroît plus naturel de croire que c'est toujours le même animal, & que la différence d'organisation n'est qu'extérieure. Ces sortes d'insectes étant susceptibles d'un accroissement subit, ils ont été pourvus de trois enveloppes les unes sur les autres. La première peau extérieure venant à crever lorsque l'insecte est un peu grossi, l'animal paroît enveloppé de celle qui étoit pliée, & resserrée dessous: celle-ci devenant à son tour trop étroite, se fend comme la première, & l'insecte paroît avec la troisième. Voyez au mot NYMPHE, les moyens qu'emploie la Nature dans ces transformations: ces détails sont des plus curieux. Voyez aussi le mot LARVE.

Les insectes sont les seuls d'entre les animaux, ou du moins ils nous paroissent être les seuls qui changent de formes, & qui après avoir rampé pendant un certain tems, cessent de manger, & se construisent une maison, une prison, ou même une espèce de cercueil dans lequel ils demeurent ensevelis plusieurs semaines, quelques-uns pendant plusieurs mois, d'autres pendant des années entières, sans mouvement, sans action, & en apparence sans vie; mais qui après cela éprouvent une sorte de résurrection, se dégagent de leurs enveloppes, s'élèvent dans les airs, & prennent une vie nouvelle & plus noble; car avant leur métamorphose, ils ne sont évidemment ni mâles ni femelles, ils n'engendrent qu'étant transformés. Quelques insectes, tels que le ver à soie & l'araignée, ont le secret de tirer des filets de leur corps, qui leur servent ou d'aîles, ou de vêtements, ou de tombeau dans l'état de nymphe ou de chrysalide. On prétend avoir remarqué que l'endroit où l'on a vu les pieds d'une chenille, devient après la transformation, celui où sont placés le dos & les aîles du papillon; & que là où la chenille avoit le dos, le papillon qui en provient, a les pieds.

La plupart des insectes, au sortir de l'œuf, ne sont autre chose que des vermisseaux, sans pieds; les autres qui ont des pieds sont des chenilles ou de fausses chenilles. Les premiers sont à la charge des peres

& des meres qui prennent soin de leur apporter à vivre , lorsqu'ils n'ont pas été déposés sur des matieres propres à les nourrir. Entre les insectes , plusieurs quittent leur habit & se rajeunissent cinq à six fois sous une peau nouvelle : on appelle ces différens âges , *l'état moyen des insectes*.

Marche des Insectes.

Pour se former une idée de la marche des insectes , il faut savoir que les uns rampent , que les autres sautent , & que d'autres volent ; & pour en avoir des exemples frappans , il suffit de considérer la marche saillante & en forme de croix de la sauterelle ; le saut parabolique de la puce ; le mouvement de la tipule , qui danse sur l'eau sans se mouiller les pattes ; celui du scarabée d'eau , qui trace des cercles avec une extrême légèreté ; les sauts que fait le scarabée des maréchaux , mis sur le dos , pour se retrouver sur ses pattes ; le trépignement de l'émerobe , & la course de l'araignée , qui s'élance horizontalement d'une muraille à l'autre , sans autre point d'appui que son fil. Le papillon diurne ne marche qu'en voltigeant verticalement dans les airs ; le phalene porte ses aîles abaissées , & la tipule horizontalement dans les airs. Les fourmis se promènent en grandes troupes pour chercher des vivres & des matériaux qu'elles apportent dans leurs magasins souterrains. Lorsque les vers & les chenilles veulent aller d'un endroit à l'autre , ils allongent la peau musculeuse qui sépare les premières boucles d'avec les suivantes ; ils portent le premier anneau à une certaine distance ; puis en se contractant & se ridant , ils font venir le second anneau ; par le même jeu ils amènent le troisième , & successivement tout le reste du corps ; c'est ainsi que ces petits animaux , même sans pieds , marchent & se transportent où il leur plaît , sortent de terre & y rentrent au moindre danger , avancent & reculent selon le besoin. Plusieurs insectes ont les pieds de derrière plus longs & plus forts que ceux du milieu ; ce qui leur facilite le moyen de sauter , ou leur donne le premier effor du vol.

*Ruses , ravages , armes & combats des Insectes , soit pour leur défense ,
soit pour leur nourriture.*

Parmi les insectes , comme chez tous les autres animaux , regnent les antipathies , les inimitiés , les ruses & les combats : les plus gros font la guerre aux petits ; ceux-ci plus foibles deviennent la proie & la victime des plus forts. Tous ces animaux sont zoophages & se mangent réciproquement , ou se détruisent d'une autre manière ; malheur à celui d'entr'eux qui perd ses aîles & son aiguillon dans une bataille , car ces membres ne reviennent plus , & l'insecte s'affoiblissant sans cesse , meurt bientôt. Les insectes sont armés de pied-en-cap ; ils sont en état de faire la guerre , d'attaquer & de se défendre : des dents en scie , un dard ou éguillon ,
pinces ,

pinces, cuirasse, aîles, cornes, ressort dans les pattes; chacun fait où trouver son salut. Mais qui pourroit se lasser d'admirer les manéges merveilleux & singuliers de ces petits animaux?

Les cornes des insectes sont à pointe fine, & different de leurs antennes en ce qu'elles n'ont point d'articulations dans leur longueur. Plusieurs de ces animaux n'ont qu'une corne, placée sur la tête, & qui s'élève directement en haut ou se recourbe en arriere & en faucille, comme on le voit dans le *scarabée-rhinoceros*; d'autres en ont deux placées au devant de la tête, s'étendant vers les côtés, ou s'élevant en ligne droite. Ces cornes sont ou courtes, unies & un peu recourbées en dedans, ou elles sont branchues comme celles du cerf volant. Quelquefois elles sont égales en longueur, & d'autres fois elles sont plus grandes l'une que l'autre. L'on trouve aussi des insectes qui ont trois de ces cornes qui s'élèvent perpendiculairement; tel est l'*enena du Brésil*, dont *Margave, Hist. Brasil. L. VII. c. ij*, donne la description.

Tous les insectes ne portent pas leurs cornes à la tête; car on en voit qui les ont des deux côtés des épaules près de la tête. Enfin dans quelques-uns de ces animaux, elles sont immobiles, & mobiles dans d'autres. Ceux-ci peuvent par ce moyen ferrer leur proie comme avec des tenailles, & ceux-là écarter ce qui se trouve en leur chemin. Il regne à tous ces égards des variétés infinies pour le nombre, la forme, la longueur, la position, la structure, les usages des cornes dans les diverses especes d'insectes. Nous devons au microscope une infinité de curieuses observations en ce genre; mais comme il n'est pas possible d'entrer dans ce vaste détail, nous renvoyons le Lecteur aux Ouvrages des savants Naturalistes qui en ont traité.

Tous les insectes, si l'on en excepte un très petit nombre, sont cruels & voraces, & nuisent à tous les animaux, même à l'homme. Les Histoires sacrées & prophanes sont remplies d'exemples de Peuples qui ont été contraints d'abandonner leur pays natal pour avoir été trop incommodés par les fauterelles, par les scorpions, par les scolopendres, ou par les punaises, les pucès, les araignées, les abeilles. Le scarabée des maréchaux dégorge, de toutes ses articulations, une liqueur grasse & visqueuse, dont l'odeur fait enfuir tous les insectes qui approchent de lui. Chaque espece fait détruire à sa maniere les différentes productions de la terre. Des légions de chenilles & de vers ravagent, en peu de tems, les prairies; une espece dévore les racines du houblon, une autre les fleurs, une autre perce les habits; les tipules rongent les plantes qui commencent à naître dans les campagnes; d'autres insectes se forment dans l'intérieur des feuilles, des sentiers & des galleries: les limaçons, les insectes appelés *Gribouri* par les Vignerons, & la *Bêche*, détruisent les sèps en hiver & les raisins en été; les *charençons* consument les bleds dans les épis; le perce oreille & la larve du hanneton détruisent les herbes potageres; la chenille ravage les choux; le ver à soie les feuilles de mûrier; le chryso-

mêle les asperges ; le scarabée dissequeur les peaux & les viandes. Quelques-uns , qui sont ordinairement remplis de différentes larves de mouches & d'insectes à étuis , n'attaquent & ne dévorent que les animaux morts , & dont les chairs commencent déjà à fermenter. Une autre espèce de scarabée , & particulièrement la *vrillette* , réduit en poussière les tables des maisons & les différens meubles de bois. Sa larve logée dans l'intérieur des vieux arbres les ronge , & les réduit en une espèce de tan , dans lequel elle se transforme , & y bat comme une montre de poche. La mite gruge le fromage & la farine , &c. Il suffit de nommer les punaises de Paris , les tarentules de la Pouille , les scorpions d'Afrique , les cousins de la North-Hollande , les chiques de l'Amérique , les taons de la Laponie , les grillons des cabanes des Villages , les mites de la Finlande , la vermine des enfants , les cirons qui tracent des sillons dans la chair humaine , les chenilles qui désolent les arbres fruitiers , & les teignes qui rongent les étoffes. L'araignée entortille , par la texture admirable de ses fils , l'insecte qu'elle attend souvent pendant une journée pour en faire sa proie ; mais elle tombe à son tour entre les griffes de la guêpe ichneumone , son ennemi capital. L'émérobe ou phryganée , dans son premier âge , se trouve parmi les poissons , ses plus cruels ennemis ; mais il se couvre tout le corps d'atômes sablonneux & de feuilles pour tromper l'avidité de ses ravisseurs ; en le voyant étendu sur les eaux , on le prendroit pour un très petit morceau de bois pourri , & non pour un animal vivant qui devient mouche sur le soir : d'autres insectes savent se racourcir ou paroître au besoin plus grands qu'ils ne sont effectivement , parceque leur corps est composé de pattes qui s'allongent en se dépliant , ou se racourcissent en rentrant les unes sur les autres , comme faisoient les brassarts & les cuissarts dans nos anciennes armures.

La tortue (*Cassida*) , & la chrysomèle , qui a le col comprimé , marchent sous le masque , tout couverts de leurs excréments , pour n'être point reconnues des oiseaux : les petites cigales se cachent sous leur propre écume : la punaise à museau pointu a le corps tout couvert de brins de toute espèce , & , pour mieux se déguiser , marche tantôt d'une façon , tantôt d'une autre ; de sorte qu'à force de se masquer ainsi , de fort bel insecte qu'elle étoit , elle devient plus hideuse qu'une araignée.

La teigne d'où naît le phalene , ou papillon nocturne , se loge dans le tissu le plus fin des tapisseries , des étoffes , même dans les peaux emplumées , afin de les ronger à son aise ; & comme il est très susceptible d'accroissement , il fait élargir sa demeure aux dépens de l'étoffe.

La pinne-marine , pour n'être pas dévorée par le polype à huit pattes , loge dans sa coquille un petit cancre , appelé *pinnotere* ; ce satellite est pourvu de très bons yeux , il va à la picorée pour son hôte & pour lui-même , & dès qu'il apperçoit le polype , il jette un cri pour avertir la pinne-marine de fermer ses valves.

Le *formica-leo* demeure dans le sable , vit sans boire , se contente d'une

très légère nourriture , se cache dans la terre par la crainte qu'il a des oiseaux , & se tient au centre d'une petite fosse qu'il creuse dans un sable sec & mobile , & qu'il façonne en forme de cône renversé. Les fourmis qui passent par-là , tombent dans le trou & deviennent la proie de l'animal qui s'y tient caché.

Le pou de bois , improprement appelé *pou pulsateur* , se tient dans le vieux bois & dans les livres ; il y entre par les trous que les vers ont faits , & y fait encore de plus grands dégâts.

L'on ne peut considérer sans étonnement la queue formidable du scorpion ; & l'adresse avec laquelle il met en mouvement ses rames , lorsqu'il s'agit de se battre , de se défendre ou de s'enfuir.

Le puceron qui se nourrit de plantes , est dévoré par certaines mouches ; le taon détruit ces mouches : les demoiselles font la guerre aux taons , & celles-ci sont la proie des araignées : le perroquet d'eau , qui se plaît dans l'eau corrompue , sert de nourriture aux moucheron ; ceux-ci aux grenouilles , &c. le papillon nocturne est mangé par la chauve-fouris.

La blatte , nommée *kacherlacki* à Surinam , court la nuit pour butiner ; dévore les souliers , les habits , les viandes , & sur-tout le pain , dont elle ne mange que la mie. Cet animal qui croît aussi à la Martinique , y est appelé *ravet* ; il ronge les papiers , les livres , les tableaux & les hardes ; il gâte , par ses ordures & sa mauvaise odeur , tous les endroits où il se niche : comme il vole par-tout , & plus la nuit que le jour , il se prend dans les toiles de la grosse araignée. Celle-ci fond sur ces blattes d'une manière surprenante , les lie avec ses filets , & les suce de telle manière , que quand elle les quitte il ne reste plus rien que leur peau & leurs ailes bien entières , mais séches comme du parchemin. Tout ceci démontre que les insectes ont presque tous des goûts exclusifs.

Habitations des Insectes.

Entre les insectes , plusieurs meurent à l'entrée de l'hiver ; d'autres qui sont d'un naturel plus chaud , telles que les abeilles & les cantharides , passent l'hiver dans des crevasses : les uns vivent en troupes sous terre , & mangent l'herbe ; d'autres vivent dans les bois , & mangent les feuilles des plantes , ou sont solitaires & sucent le sang des animaux qu'ils habitent , ce qui produit sans doute les différentes odeurs qu'ils répandent. En quel endroit ne trouve-t-on pas des insectes ! on en rencontre dans la laine , les habits , la vieille cire , le papier , les livres , même dans les fruits : la plupart des *gallinsectes* & *progallinsectes* , dont la durée de la vie est fixée à un an , habitent ordinairement dans la bifurcation des plantes qui passent l'hiver.

Utilités des Insectes.

Quoique ce genre d'animaux passe pour être généralement nuisible , il y en a cependant qui méritent quelque exception , comme servant à nos besoins réels ou factices , tels sont les cantharides , les vers de terre , la sangsue , le cloporte , le coccus de Pologne , la cochenille du Mexique , le kermès du Languedoc , l'abeille , le ver à soie , les animaux à coquilles & des coraux , même ceux des crustacées , celui qui nous procure la résine lacque , & plusieurs autres ; dont l'espèce de gouvernement , l'économie , les mœurs & l'industrie pourroient servir d'exemple aux hommes dans quantité d'occasions.

En consultant chacun des noms des insectes , leur histoire fera voir que les uns savent filer & ont deux quenouilles ; d'autres font des filets , & ont pour cela une navette & des pelotons : il y en a qui bâtissent en bois , & ont deux serpes pour faire leur abattis : ceux qui travaillent en cire , font voir que leur atelier est garni de ratissoires , de cuillers & de truelles : plusieurs d'entr'eux , outre la langue pour goûter & lécher , ou la trompe pour faire l'office de chalumeau , ou la scie pour abattre , ou les tenailles dont-ils ont la tête munie , ont à l'extrémité de la queue une tarière mobile , propre à percer & à creuser. Leurs antennes & leurs cornes sont des membres très délicats , qui en mettant leurs yeux à couvert , les avertissent du danger & leur font connoître leur route dans l'obscurité. Les mouvements de ces petits animaux ne sont ni de caprice ni fortuits , ils sont pleins d'ordre & de dessein , & tendent tous au but pour lequel la nature a formé chacun de ces animaux.

Quand les moucheron dépose ses œufs dans l'eau croupie , les vers qui éclosent y consomment tout ce qui s'y trouve de pourriture. La vermine multiplie prodigieusement sur la tête des enfans galeux , mais elle leur est avantageuse en ce qu'elle détruit le superflu des humeurs. Les scarabées , pendant l'été , emportent tout ce qu'il y a d'humide & de visqueux dans les excréments des troupeaux : de sorte qu'il n'en reste plus qu'une poussière , que les vents dispersent sur la terre , ce qui n'est pas un médiocre avantage ; car sans cela , bien loin que ce fumier engraisât les plantes , il ne croît rien par-tout où il y en auroit.

Tel est le coup d'œil général qu'on peut jeter sur l'Histoire des Insectes , dont l'étude , si méprisée du commun des hommes , a rendu les noms de Gêner & de Linnæus aussi fameux chez les Suédois , que celui de Réaumur l'est chez les François. Lister , en les étudiant , s'est rendu immortel chez les Anglois , ainsi que Swammerdam chez les Hollandois , Frisch chez les Allemands & Redi chez les Italiens.

Les Ecrits de Lewenhoëch , de Bradeley , d'Harvey , de Nédham , de

Derham, de Malpighi, de Lessers, de Lyonnet, de Bonnet, &c. font voir que les Insectes font un des principaux chefs-d'œuvres de la Nature, & que la grandeur & la sagesse du Créateur éclatent jusque dans ses plus petits ouvrages.

Eminet in minimis maximus ipse Deus.

INSECTES PÉTRIFIÉS, *entomolithi*. Sous ce nom on comprend les zoophytes, les insectes volatiles, les différentes productions à polypier, les coquilles & les crustacées que l'on trouve dans la terre, conservés dans différents états; & moins celles qui sont en empreinte ou en relief, que celles qui sont en nature. Les zoophytes fossiles nous donnent des trochites & entroques, &c. Les productions à polypier fossiles donnent des lithophytes, des coraux, différentes madrepores, &c. Les coquilles fossiles ou testacites donnent différentes especes dans les univalves, les bivalves & les multivalves. Les crustacées fossiles donnent des crabes, des hommars. Les insectes volans donnent des empreintes de mouches à aîles nerveuses ou à étuis. On trouve aussi des vers marins fossiles, c'est-à-dire, des vermiculites, &c. Voyez chacun de ces mots.

JOCASSE. Voyez au mot GRIVE.

JONC, *juncus*. Plante dont on distingue plusieurs especes. Les joncs proprement dits, sont de la famille des liliacées, & paroissent tenir le milieu entre les gramens & les lis. Ils ont tous une maîtresse racine, rampante & fibreuse. Leur calice est composé de six feuilles distinctes, rangées au tour du pistil.

JONC AIGU ou PIQUANT, *juncus acutus*, est une plante qui croît dans les marais proche de la mer, & en plusieurs autres lieux aquatiques; sa racine est composée de grosses fibres; elle pousse beaucoup de tiges à tuyaux, à la hauteur de deux pieds, grosses, roides, pointues, composées d'une écorce épaisse, & d'une moëlle un peu dure, blanchâtre, enveloppée depuis la racine par des especes de graines feuilletées, qui ont jusqu'à près d'un pied de longueur. Ses fleurs sont en étoile & placées vers le sommet des tiges: il leur succede une capsule relevée de trois coins, & qui renferme des semences: cette plante est astringente & narcotique.

JONC D'EAU, *scirpus*, est le plus grand des joncs lisses; il convient à un grand nombre d'ouvrages: on s'en sert pour lier différentes sortes de choses. C'est une plante aquatique, dont les racines sont longues, grosses, nouées, rampant dans la terre, rouges brunâtres en dehors, blanches en dedans; elles poussent plusieurs tiges, hautes de six à sept pieds, pointues, grosses comme le petit doigt, droites, rondes, verdâtres, unies, pyramidales, remplies de moëlle blanche; portant en leurs sommités des fleurs, disposées en maniere d'épis: il leur succede des semences, grosses comme celles du millet, triangulaires, ramassées l'une contre l'autre, & formant ensemble une tête: ce jonc est astringent.

JONC ÉPINEUX. *Voyez* GENEST ÉPINEUX.

JONC FLEURI, *butomus*. Sa racine est grosse, nouée, blanche & fibreuse ; elle pousse des tiges hautes de quatre pieds : ses feuilles sont longues, étroites & sortent de la racine : ses fleurs naissent aux sommets des tiges, en maniere d'ombelles, de couleur purpurine, & disposées en rose : il leur succède un fruit membraeux, composé le plus souvent de six graines, remplies de semences oblongues & menues. Ce jonc convient pour la morsure des bêtes venimeuses : le bœuf en est fort friand.

JONC MARIN, *juncus marinus*. On donne ce nom à une espece de jonc aigu. La partie de ce jonc qui a poussé la dernière, est la plus tendre ; c'est une bonne nourriture pour toute sorte de bestiaux, après avoir été pilée dans une auge, ou autre machine semblable.

JONC ODORANT. *Voyez* SCHÆNANTE.

JONC ORDINAIRE ou DES JARDINS, *juncus lavis*. Les tiges & les feuilles de ce jonc sont plus menues, plus cassantes, & la plante en est moins aiguë & moins piquante que celle du *jonc aigu* : ses fleurs naissent en bouquets épars. Cette plante est assez commune dans les marais ; elle sert, ainsi que le *jonc aigu*, à faire des cables, des cordages, & à lier des paquets d'herbes.

Observations sur les Joncs.

En général les tiges des joncs sont vertes & rondes ; elles ne sont que peu ou point feuillues ni branchues, & naissent dans les eaux ou proche de celles qui croupissent.

Les joncs marins, qu'on appelle *sainfoin d'Espagne* ou *landes*, croissent dans les landes & terres les plus stériles, même sans qu'on les ait semés ; mais celui qui vient de semence est meilleur : on donne l'un & l'autre aux bestiaux, haché & pilé. On doit couper les joncs, ainsi que les roseaux, par un beau tems, & on les laisse sur pied, pendant trois ou quatre jours, afin qu'ils séchent. On se sert aussi des joncs à la campagne pour couvrir des toits de peu d'importance, & pour faire des paillaçons, des corbeilles, des balais, &c. La plupart des joncs deviennent gros comme le pouce, lorsqu'on les laisse trois ans sans les couper. On doit en semer la graine au mois de Mars, parmi quelques menus grains, & on les recolté au mois d'Août suivant. *Voyez* LANDES & SAINFOIN.

JONQUILLE, *narcissus juncifolius*. Plante qui donne une fleur qui vient sur tige & qui fleurit en Mars. Il y en a de diverses sortes : la première est la *jonquille à grandes fleurs* ; sa racine est bulbeuse, blanche, couverte d'une membrane noire ; elle pousse des feuilles longues, étroites, quelquefois arrondies, fort douces au toucher, flexibles, ressemblant à celles du jonc. Il s'élève d'entre elles une tige, qui au printems porte en son sommet des fleurs semblables à celles du narcisse ordinaire, mais plus petites, jaunes par-tout, très odorantes.

La *jonquille à petites fleurs* ne diffère de la première, qu'en ce qu'elle est moins grande en toutes ses parties, & qu'elle rapporte moins de fleurs.

La *jonquille à fleur double*, diffère des autres en ce qu'elle jette beaucoup de fleurs doubles, qui ont de la ressemblance avec celles de l'*anémone*.

Les jonquilles en général se perpétuent de semence, mais plus promptement par les oignons, qu'on couvre d'une terre légère à la hauteur d'un pied : on les arrose modérément : on les leve au mois de Septembre, & on en coupe les filets & les cheveux. Les blanches & les jaunes doubles viennent mieux dans des pots qu'en planches.

Dioscoride prétend que la racine des jonquilles est vomitive. Cette plante est appelée *jonquille*, à cause de la ressemblance de ses feuilles avec celles du jonc.

JONTHLASPI : est une plante sarmenteuse qui tient du violier ou girofflier & du thlaspi : c'est une espèce de thlaspi cotonneux vivace, qu'on distingue en grand & petit. Voyez THLASPI.

JOTAVILLA : nom que les Italiens ont donné à une espèce d'alouette très rare, & dont le chant est des plus agréables ; la niaise est meilleure que la bocagère pour le chant : cet oiseau se fait entendre la nuit. Le mâle porte une huppe ; & il a l'ongle de derrière si long, qu'il passe les genoux. Cet oiseau fait d'ordinaire son nid dans les vallées où les arbres sont très feuillus : sa ponte est de cinq œufs : sa vie est de dix ans : voyez ALOUETTE.

JOUA : est un oiseau de l'Afrique, de couleur brune, de la grosseur d'une alouette, & qui fait ordinairement ses œufs sur les grands chemins & dans les routes frayées. Les Negres de Sierra-leona qui mangent de toutes sortes d'oiseaux, estiment celui-ci si sacré, qu'ils n'osent y toucher, non plus qu'à ses œufs, persuadés qu'ils perdroient à leur tour leurs enfants. (*Histoire Générale des Voyages.*)

JOUBARBE, *sedum*. De toutes les espèces de joubarbe connues, nous n'en citerons que trois qui sont en usage : savoir, 1°. la *grande joubarbe*, 2°. la *trique-madame*, 3°. la *vermiculaire brûlante*.

La GRANDE JOUBARBE, *sedum majus vulgare* : est une plante basse qui croît sur les vieux murs, & sur les toits des chaumières. Sa racine est petite & fibreuse, elle pousse plusieurs feuilles oblongues, grosses, grasses, pointues, charnues, pleines de suc, attachées contre terre à leur racine, toujours vertes, comme disposées en rose, un peu velues. Il s'élève de leur milieu une tige à la hauteur d'environ un pied, droite, assez grosse, rougeâtre, moëlleuse, revêtue de feuilles semblables à celles d'en bas, mais plus pointues. Cette tige se divise vers sa sommité en quelques rameaux réfléchis, qui portent, après le solstice d'été, des fleurs à cinq pétales, disposées en rose & de couleur purpurine. Elles sont suivies par des fruits composés de plusieurs gaines, ramassées en manière de tête

& remplies de semences fort menues , qui se sechent en automne.

Le suc de cette plante mis à évaporer , exhale une odeur urineuse ; ce suc est rafraîchissant & astringent : on en mêle dans les bouillons d'écrevisses ou de tortues , qu'on fait prendre aux fievreux hectiques. Dans quelques contrées d'Afrique , on guérit la dyssenterie en faisant avaler au malade dix onces du suc de cette plante. La grande joubarbe , écrasée & appliquée sur les hémorroïdes , en appaise l'inflammation ; elle calme aussi les douleurs de tête & les délires. M. Tournefort assure que rien n'est meilleur pour les chevaux fourbus , que de leur faire boire une chopine de suc de joubarbe.

LA PETITE JOUBARBE OU TRIQUE-MADAME , *sedum minus teretifolium album* : croît aussi sur les toits & les murailles exposées au soleil ; sa racine est menue & fibrée : elle pousse plusieurs petites tiges , dures , ligneuses , rougeâtres ; ses feuilles sont languettes , succulentes , vermiculaires. Ses fleurs paroissent en été : elles sont petites , à plusieurs feuilles , disposées en rose au sommet des branches ; elles sont de couleur jaune blanchâtre. Il leur succede de petits fruits à graines ramassées en tête & remplis de petites semences.

On cultive cette plante dans les jardins , parcequ'on en met dans les salades ; son suc rougit le papier bleu , & a presque les mêmes vertus en Médecine , que celui de la grande joubarbe.

LA VERMICULAIRE BRULANTE , ou PAIN D'OISEAU , *Sedum parvum acre, flore luteo* , croît presque par-tout suspendue par ses racines , ou couchée sur les vieilles murailles , sur les toits des maisons basses ou des chaumières , ou aux lieux pierreux , arides ou moussieux. Sa racine est également petite & fibreuse ; ses feuilles sont peu épaisses , mais succulentes , pointues & triangulaires : ses tiges sont basses & menues ; elles portent en leurs sommets dans l'été de petites fleurs jaunes , en étoiles , à cinq feuilles , auxquelles succèdent de petites graines , comme dans les précédentes : la plante se seche & périt l'hiver.

Cette plante a un goût piquant , chaud & brûlant , ce qui lui a fait donner aussi le nom de *Poivre des murailles*. Elle est excellente pour déterger les gencives ulcérées des scorbutiques : elle fait un peu vomir : appliquée extérieurement , elle résout les tumeurs scrophuleuses & les loupes naissantes.

JOUBARBE DES VIGNES. Voyez ORPIN.

JOUEUR DE LYRE. C'est un serpent de l'Amérique à bandes circulaires , dont la peau est d'un brun-obscur , couverte d'écailles en lozanges , & cerclée d'espace en espace. Cet animal par ses doux & mélodieux sifflemens , attire à lui les petits oiseaux , pour en faire sa proie. *Seba , Thef. II. Tab. 42. n°. 3.*

JOUFLU , *Bucculentus*. C'est un poisson des Indes , peu long , & qui a environ cinq pouces de largeur. Selon Ruisch , on le nomme en Hollandois *Dix-mail* , parcequ'il a la mâchoire fort épaisse. Sa couleur est
jaune ,

jaune, mêlée de taches blanches argentées : sa chair est assez agréable à manger.

JOUI. C'est une liqueur alimenteuse & restaurante, fluide comme du bouillon, noire, d'une faveur agréable, salée & juteuse. Lémery dit que c'est une composition, dont la base est du jus de bœuf exprimé quand il a été rôti : on n'en fait pas davantage ; le reste de la préparation n'est connu que des seuls Japonnois, qui le tiennent secret, & vendent cette liqueur fort cher à tous les Indiens & autres Peuples qui veulent en avoir. Les Orientaux riches en assaisonnent presque tout ce qu'ils mangent, pour rendre leurs mets plus agréables, & pour s'exciter à la luxure. Cette liqueur est très rare en Europe ; cependant on pourroit en apporter aisément, puisqu'elle se conserve pendant douze ans.

JOUR, Dies. C'est l'espace de tems que le soleil est sur l'hémisphère. Voyez ce qui est dit du *Soleil*, à la suite du mot *PLANETTE*. Le *jour* est aussi pris quelquefois pour la lumière, *Lux*. Voyez *LUMIERE*.

IPECACUANHA. Cette plante est une espèce de violier, qu'on a trouvé dans le nouveau Monde vers le milieu du dernier siècle : elle a été long-tems connue dans le commerce François, sous le nom de *Becongulle*, ou de *Mine d'or végétale*. Les Portugais l'appellent *Cypo de Camaras*. Guillaume Pison & Marcgrave l'avoient apportée du Brésil en Europe ; on en fit peu d'usage jusqu'en 1686, qu'un Marchand étranger nommé *Garnier*, en apporta de nouveau : comme il en vantoit extraordinairement les vertus, M. Adrien Helvetius, Médecin de Reims, l'essaya, & en obtint les plus heureux succès. C'est de lui que Louis XIV l'acheta pour en rendre l'usage public.

On distingue deux sortes d'*ipécacuanha*, par rapport au pays d'où on le tire ; l'une vient du Pérou, l'autre du Brésil ; mais eu égard à sa couleur, on en distingue trois espèces, la grise ou blonde, la brune, la blanche.

L'IPÉCACUANHA BRUN, *Ipecacuanha fusca Brasiliensis*, est une racine tortueuse, plus chargée de rugosités que l'*ipécacuanha* gris, plus menue cependant, brune ou noirâtre en dehors, blanche en dedans, légèrement amère : on apporte l'*ipécacuanha* brun du Brésil à Lisbonne. Cette plante qui se plaît dans les lieux obscurs, dans les forêts épaisses, près des lieux où sont les mines d'or, a une tige d'une demi-coudée, qui n'est presque jamais branchue : elle est couchée sur terre, & garnie vers son extrémité de trois ou cinq feuilles ovales & opposées. La fleur est à cinq découpures : ses fruits sont des baies noires, arrondies.

L'IPÉCACUANHA GRIS, *Ipecacuanha cinerea Peruviana*, est une racine épaisse de deux ou trois lignes, tortueuse, & comme entourée de rugosités, d'un brun-clair ou cendré, dure, cassante, résineuse, ayant dans son milieu un petit filet qui tient lieu de moëlle, d'un goût âcre, amer, & d'une odeur foible. Les Espagnols en apportent tous les ans du Pérou, où cette racine naît aussi aux environs des mines d'or. On croit que cette ra-

ciné est le *Bexuquillo* ou *Béconguille* des Espagnols. Pison dit que la plante de cette racine est basse, semblable au pouliot; ses feuilles sont velues; ses fleurs sont petites, blanches, & disposées par anneaux.

L'IPÉCACUANHA BLANC, ou FAUX IPÉCACUANHA, est une racine que l'on trouve sous ce premier nom dans les boutiques: elle est menue, ligneuse, lisse, sans amertume, & d'un blanc jaunâtre: on nous l'envoie des Indes. Lémery dit qu'on a bien de la peine à recueillir ces sortes de racines, & que dans le pays on n'emploie à ce travail que des hommes condamnés à mort.

On donne encore le nom d'*Ipécacuanha* à d'autres especes de plantes, entr'autres au grand *Ulmaria* de la Virginie; mais on ne se sert aujourd'hui que de l'*ipécacuanha* du Pérou & de celui du Brésil. Ce remède est usité, non-seulement contre les dysenteries & les flux de ventre invétérés, qu'il guérit quelquefois dans l'espace d'un jour, mais encore contre un grand nombre de maladies qui viennent de vieilles obstructions.

On préfère l'*ipécacuanha* gris ou du Pérou à tous les autres, parcequ'il purge plus doucement, & que celui du Brésil excite un vomissement bien plus violent. Quand on pile cette racine pure, la poudre subtile qui en exhale, fait éternuer, pleurer, moucher & cracher.

Cette racine contient un mucilage ou un extrait gommeux très-visqueux, & un extrait résineux. M. Geoffroy pense que la principale vertu de l'*ipécacuanha* dépend de sa substance gommée; mais toutes les deux coopèrent à chasser la matiere morbifique. Les habitants du Brésil n'en font usage qu'en infusion; les Européens en prennent la poudre dans du vin ou dans du bouillon: on la prend aussi en bol à la dose de dix grains. M. de Tournefort a observé que ce remède agit mieux sur des gens de ville, que sur des soldats & des paysans. Au surplus, l'*ipécacuanha* ne doit être administré que par un Médecin prudent, qui sache préparer son malade selon les différentes circonstances. En Espagne & en Portugal, les Dames enceintes ne font usage que de l'*ipécacuanha* blanc; comme le plus doux de tous: dans les Indes, les feuilles de ces plantes sont regardées comme une panacée végétale.

IPPO. Nom que donnent les Mahomérans civilisés de Macassar à une substance gomme-résineuse, noire comme la poix navale, & qui provient d'un arbre qui croît dans l'Isle de Célèbes, située dans la mer du Sud. Ce sont les *Térégias*, peuple sauvage de Célèbes, qui apportent ce poisson aux Naturels de Macassar, qui ont coutume d'en porter avec eux lorsqu'ils voyagent. Voici la manière dont ils s'en servent: ils ont une sarbacane faite d'un bois rouge & dur, qu'ils nomment *Sampitan*; ils font entrer dans cet instrument à vent un hameçon entaillé, fait en fer de lance, & enduit du poison *ippo*, que l'on a liquéfié dans une racine de galanga. Les *Térégias*, lorsqu'ils recueillent ce poison, ont toujours soin de ne pas s'exposer au vent qui vient de l'arbre; ils le reçoivent dans des cannes creu-

ses , afin d'empêcher que l'air n'y touche : pour peu que ce suc soit éventé , il perd beaucoup de son activité : aussi les traits qu'on apporte en Angleterre , ayant été exposés plus d'un ou de deux mois à l'air , ne produisent aucun effet. Les Grands du pays de Macassar ont fait quantité de recherches pour trouver le contre-poison de l'*ippo-récent* , mais toujours inutilement.

IPSIDA. C'est un oiseau barboteux , qui est plus petit qu'un merle. Il a le bec long , gros , droit , noir & aigu ; la tête noire-verdâtre ; le dos d'un beau bleu-clair ; le milieu du ventre roux & blanc. La structure des pieds de cet oiseau est singulière ; car les doigts de dehors ont trois jointures , & ceux qui sont placés en dedans n'en ont qu'une. L'*ipsida* se nourrit de poissons ; il fait son nid sur le bord des rivières ; cet oiseau est fort rare. On voit un grand *ipsida* des Indes dans le Cabinet d'Histoire Naturelle de Leyde. Ray en parle.

IRIS, *Iridis*. Plante liliacée dont on distingue plusieurs espèces. Leur racine est ou traçante , ou bulbeuse , ou tuberculaire. Les fleurs sont ordinairement en épi , en corymbe , ou solitaires , ou en ombelle , au sommet des tiges , & accompagnées chacune de deux écailles. Voyez HERMODACTE, SAFRAN, GLAYEUL, IRIS, &c.

IRIS BULBEUX, *Xiphion* aut *Chamoletta*. Cette plante , qui croît en Espagne , ressemble beaucoup au glayeul puant , à l'exception de sa racine , qui est bulbeuse , en forme d'oignon noirâtre en dehors , blanc en dedans , composé de plusieurs tuniques , & d'un goût doux : cet oignon est fort émollient.

IRIS DE FLORENCE, *Iris Florentina*. C'est une racine blanche ; d'une odeur de violette , d'un goût amer & âcre , en morceaux oblongs , genouillés , un peu aplatis , de la grosseur du pouce. On nous l'apporte de Florence , où sa plante croît sans culture. On dépouille sur le lieu cette racine de son écorce , qui est d'un jaune rouge , & de ses fibres ; c'est pourquoi l'iris mondé paroît toujours pointillé. On prétend que les Florentins lessivent cette racine avant de nous l'envoyer , & que c'est le seul moyen de lui donner sa bonne odeur.

La plante d'où on la tire ne diffère pas de l'iris ordinaire par la figure de ses racines ; de ses feuilles & de ses fleurs , mais seulement par la couleur ; car les feuilles de l'iris de Florence tirent plus sur le verd de mer : les fleurs ont peu d'odeur , elles sont d'un blanc de lait. On appelle aussi cette plante *Flambe blanche*.

IRIS ORDINAIRE ou **FLAMBE**, *Iris nostras*. Cette plante , qui croît sur les murailles & en plusieurs autres lieux , a une racine qui se répand obliquement sur la superficie de la terre : elle est épaisse , genouillée , charnue , de couleur fauve , garnie de fibres , d'une odeur âcre & forte étant récente , mais qui devient assez agréable lorsqu'elle a perdu son humidité. Les feuilles qui sortent de cette racine sont larges d'un pouce , longues de plus d'un pied , & finissent en pointe comme une épée. Entre ces feuilles s'élève une tige haute d'environ deux pieds , droite , ronde , lisse , ferme ,

branchue , partagée par quatre ou cinq nœuds , garnis de feuilles qui embrassent la tige. Les fleurs commencent à paroître vers le printems , & sortent de la coëffe membraneuse qui les enveloppoit ; elles sont grandes , à une seule feuille , d'une couleur cendrée-verdâtre en dehors , violette ou purpurine en dedans , avec des veines blanches : à ces fleurs succèdent des fruits oblongs , relevés de trois côtes , & remplis de semences arrondies , placées les unes sur les autres.

Les Fleuristes distinguent les especes d'iris en communes , en simples & en doubles : elles viennent de Perse , d'Angleterre , de Suisse , d'Italie , &c. Les unes fleurissent en Avril , les autres en Mai : leurs fleurs changent de figure & de couleur , & contribuent à l'ornement d'un jardin ; on les multiplie par le moyen des cayeux détachés de leurs racines , lorsque les tiges sont desséchées. Cette fleur demande une terre légère.

Il n'y a guere que les racines de ces plantes qui soient en usage : tant qu'elles sont fraîches , elles sont diurétiques ; mais étant sèches , elles n'ont plus cette vertu. On se sert du suc de l'iris de notre pays , comme d'un hydragogue ; il purge par le vomissement & par les selles ; il est utile dans l'hydropisie : mais ce remede est fort âcre , & ne convient pas aux vieillards , ni aux enfants , ni aux femmes enceintes.

La poudre de l'iris de Florence facilite l'expectoration : on la fait entrer dans les sternutatoires & les poudres narcotiques.

Les Parfumeurs font beaucoup d'usage de cette espece d'iris , pour donner une odeur de violette à leurs parfums : des personnes en mettent aussi dans leur bouche pour remédier à la puanteur de l'haleine. Dans le Languedoc & la Provence on tire la pulpe de la racine d'iris ordinaire , après l'avoir fait cuire , & on l'étend sur des toiles pour les parfumer. On tire de la fleur bleue de l'iris , une espece de pâte ou de fécule verte , qu'on appelle *verd d'iris* ; on s'en sert pour peindre en miniature.

IRIS PUANT. Voyez GLAYEUL PUANT.

ISATIS. Espece d'animal intermédiaire entre le *renard* & le *chien* , qui habite les pays du Nord , se construit un terrier comme le renard , & a aussi avec le chien plusieurs rapports de conformité.

L'*isatis* ressemble tout-à-fait au *renard* pour la forme générale du corps : il a , ainsi que lui , la queue très longue & très belle ; mais sa tête ressemble davantage pour la forme à celle du chien : cependant ses narines & sa mâchoire inférieure ne sont pas revêtues de poils , ses oreilles sont presque rondes ; il a cinq doigts & cinq ongles aux pieds de devant , & quatre seulement aux pieds de derriere. La verge du mâle n'est pas plus grosse qu'une plume à écrire ; elle a un os ainsi que celle du chien , ce qui est cause , qu'ainsi qu'eux , il ne peut point se séparer l'instant d'après l'accouplement , à cause du gonflement des parties. Ses testicules sont de la grosseur d'une amande.

Ces animaux s'accouplent au mois de Mars. La femelle porte neuf semaines , ainsi que les chiennes , & elle produit ordinairement sept ou huit

petits , qui font quelquefois de couleur différente en naissant , & qui doivent aussi différer de couleur lorsqu'ils seront arrivés à leur état de perfection : ceux qui doivent devenir blancs , font de couleur jaunâtre en naissant ; & ceux qui doivent être bleus-cendrés , naissent noirâtres. Lorsque la fourrure de ces animaux , dont on fait usage en pelleterie , est arrivée à son état de perfection , le poil a deux pouces de longueur ; mais ce n'est que dans l'hiver que leur fourrure est belle , parcequ'alors le tems de la mue est passé. Les jeunes *isatis* qui doivent devenir tout blancs , ont , dès le mois de Septembre , c'est-à-dire quatre mois après leur naissance , une bande brune longitudinale , & une autre transversale sur le dos : ce sont ces especes d'*isatis* qu'on a nommées *renards croisés*.

Les *isatis* habitent les pays les plus froids , les plus montueux de la Laponie , de la Sibérie , de la Norwege , & même de l'Islande ; on les voit aussi sur les bords des mers glaciales. Pendant le tems de leurs amours , qui durent quinze jours ou trois semaines , ils n'habitent point leur terrier ; mais après ce tems-là ils s'y retirent , & ménagent plusieurs issues à ces terriers , qui sont étroits & profonds.

Ces animaux se nourrissent , ainsi que les renards , d'oiseaux , de lievres qu'ils chassent avec autant de finesse. Ils se jettent à l'eau & traversent les lacs pour trouver des nids d'oies , de canards , &c. dont ils mangent les œufs & les petits.

ISIS. Quelques-uns donnent ce nom aux coralloïdes articulées.

ISLES. Voyez ILE.

ISTHME. C'est une langue de terre resserrée entre deux mers. Les principaux isthmes sont celui de Suez & celui de Panama. Le premier est produit en partie par la mer Rouge , qui semble être l'appendice & le prolongement d'une grande anse avancée de l'Est à l'Ouest , & en partie par la Méditerranée. L'autre est de même produit par le golfe du Mexique , qui présente une large ouverture de l'Est à l'Ouest. Les isthmes réunissent de grandes portions de continents à d'autres , & des presqu'îles aux continents. Peut-être que les isthmes ne sont proprement que le prolongement des chaînes de montagnes soutenues à une certaine hauteur : l'isthme de Panama ne paroît formé que par l'abaissement & le retrécissement de la chaîne des Cordelières , qui va se continuer du Pérou dans le Mexique. Voyez MONTAGNE , & l'article TERRE.

JUBIS. Nom que l'on donne dans le commerce de Provence , aux raisins en grappes & séchés au soleil , que les Epiciers vendent à Paris pendant le Carême.

IVE ou IVETTE, *Chamapitis*. C'est une petite plante fort basse , dont il y a deux especes.

L'IVETTE ORDINAIRE, *Chamapitis lutea vulgaris*. Cette plante qui croît aux lieux incultes & sablonneux , a l'odeur de la résine qui découle du pin ou du mélese : sa racine est menue , fibrée & blanche ; elle pousse plusieurs tiges couchées sur terre , velues , & longues de neuf pouces. Ses feuilles

naissent des nœuds des tiges, deux à deux; elles sont découpées, velues, & d'un jaune verd. Ses fleurs, qui naissent des aisselles des feuilles, sont jaunes; elles sont suivies par des semences oblongues, enfermées quatre dans une capsule.

L'IVETTE MUSQUÉE, *Chamæpitis moschata*, vient communément dans les environs d'Aix & de Montpellier, parmi les olivettes. Ses tiges qui sont ligneuses & velues, se répandent sur la terre; sa fleur est de couleur pourpre; ses graines sont noires, ridées & un peu recourbées: toute cette plante est fort amère, d'une odeur de musc, sur-tout dans le tems des grandes chaleurs, & dans les pays méridionaux.

Ces deux ivettes sont d'usage dans les boutiques, & ont les mêmes vertus apéritives, vulnéraires, hystériques, & propres pour les nerfs: elles excitent si puissamment les regles & la sortie du fœtus mort, qu'on en interdît l'usage aux femmes grosses, de peur qu'elles ne fassent des fausses couches.

JUGOLINE ou SÉSAME, *Sesamum*. Est une espèce de digitale, qui naît en Syrie, en Candie, en Egypte & aux Indes. Son fruit est une coque anguleuse, qui contient beaucoup de semences oblongues, blanches, moëlleuses, huileuses, douces, & un peu nourrissantes: on en tire par expression une huile bonne à brûler, à manger, & propre à fortifier les nerfs. Les Egyptiens se servent de la plante en fomentation pour la pleurésie, & pour exciter les regles: ils emploient sa semence, comme le millet, dans les aliments propres à augmenter la semence. En Guiane, où l'on nomme cette plante *ouangue*, les Negres réduisent en farine sa graine, & en font une sorte de bouillie assez nourrissante & de bon goût. Ils en retirent l'huile par le moyen de l'eau chaude, & on l'estime aussi bonne que celle d'olive.

JUIF. Poisson de l'Isle de May en Afrique, dont la chair est excellente: il a la bouche double; celle d'en haut ne lui sert pas à avaler, mais elle est remplie de petits canaux qui pompent l'air. Ses nageoires ressemblent à celles de la morue. *Hist. gén. des Voyages*, L. V. p. 151. Ce poisson ne feroit-il pas le *marteau*? Voyez ce mot.

JUJUBIER, *Ziziphus*. Est un arbre que les Arabes & les nouveaux Grecs ont cultivé, & qui est actuellement fort commun en Languedoc, & particulièrement en Provence, aux Isles d'Hyères vers Toulon. Il est de la grandeur d'un olivier, & tortueux: son écorce est raboteuse, rude, crevassée; ses branches sont amples, inégales, munies d'épines très roides: ses feuilles sont alternes, oblongues, un peu dures, luisantes, garnies de trois nervures, & dentelées sur leurs bords. Ses fleurs sortent des aisselles des feuilles, trois à trois ou quatre à quatre; elles sont en roses: leur calice est d'une seule pièce partagée en cinq quartiers, duquel s'élève un pistil qui se change en un fruit oblong, de la figure & de la grandeur d'une olive, d'abord verdâtre, ensuite jaunâtre, enfin rouge; il n'y a que la pellicule de cette couleur. Ce fruit renferme une pulpe blanchâtre, molle, fongueuse, d'un goût doux & vineux: au milieu de cette moëlle

est un noyau oblong , graveleux , très dur , qui contient deux amandes lenticulaires , dont l'une avorte le plus souvent.

On fait la cueillette de ces fruits , appelés *jujubes* , dans leur maturité ; & étant récents , ils servent de nourriture familière & agréable aux peuples des pays où ils croissent. On en expose au soleil sur des claies & sur des nattes de paille , jusqu'à ce qu'ils soient ridés & secs ; & en cet état , on les envoie aux Droguistes & aux Apoticaire pour l'usage de la Médecine.

Les jujubes , par leur mucilage doux , apaisent les irritations de la poitrine & des poumons , calment les toux fâcheuses , adoucissent la pituite âcre : elles sont utiles aussi pour les reins , & pour l'ardeur des urines & de la vessie.

Augustin Lippi a observé trois autres espèces de jujubiers que celui que nous avons décrit. 1^o. Le jujubier d'Alexandrie à feuilles larges , dont le fruit est fort gros ; 2^o. celui dont le fruit est petit ; 3^o. le jujubier de Memphis qui est extrêmement grand , & dont le fruit est plus gros que celui des autres espèces.

IULE, *Julus*. Cet insecte désigné par M. Linnæus sous le nom de *Scolopendre* , en approche effectivement par sa figure allongée & par le grand nombre de ses pattes ; mais il en diffère par la forme de son corps qui est rond , cylindrique , & par ses antennes qui ne sont jamais composées que de cinq anneaux. Ses pattes sont courtes , menues & nombreuses. Avec cet appareil de pattes qui ressemblent à une frange de poils , l'insecte marche cependant moins vite que la scolopendre. L'on diroit qu'il rampe plutôt qu'il ne marche. Sa peau est dure , crustacée & renitente : il s'en dépouille comme la scolopendre , avec laquelle on le trouve souvent sous les pierres & dans la terre. On connoît deux espèces plus petites d'*iules* autour de Paris : l'une noirâtre , lisse , a deux cents pattes ; & l'autre jaunâtre , en a deux cents quarante. Chaque anneau , quelquefois strié , donne naissance à deux paires de pattes. L'*iule* étant en repos , se replie sur lui-même comme un serpent. Si on touche cet insecte , il se roule en spirale , de façon que ses pattes sont en dedans. Voyez SCOLOPENDRE.

JULIANE ou JULIENNE , *Hesperis hortenſis*. Plante qui croît dans les jardins & dans les haies : elle se multiplie de graine , de bouture & de plant enraciné. Ses fleurs sont de couleur tantôt blanche , tantôt purpurine , & tantôt de couleurs diversifiées : leur odeur qui est suave & très agréable , se fait sentir davantage après le soleil couché que pendant le jour. Leurs siliques ne sont point applaties comme celles du giroflier jaune. On jouit rarement de la beauté des fleurs de cette plante à Paris , parce que les Jardiniers la brûlent avec le fumier de cheval. On donne aussi à la juliane le nom de *violette giroflée des dames* , ou *giroflée musquée*. Voyez GIROFLIER JAUNE.

JUMAR ou GEMARS , est , selon l'opinion vulgaire , une bête de charge engendrée d'un taureau & d'une jument , ou d'un taureau & d'une

ânesse , ou d'un âne & d'une vache. Cet animal a , dit-on , le muſle & la queue de vache , les reins larges , le pied de cheval , des eſpeces de cornes naiſſantes : il eſt extrêmement fort , & peut porter ſept ou huit cents livres. Des Auteurs diſent que cette bête de charge ſe trouve en Auvergne & en Eſpagne , & qu'elle n'engendre point. Mais parceque cet animal , ſ'il exiſte , n'a point produit dans nos climats , doit-on inférer , dit M. Adanſon , que tous les *jumars* ſont des individus ſtériles , & qu'il n'y en aura jamais de féconds , tandis que nous avons devant les yeux l'exemple d'autres animaux dont les bâtards multiplient , tels que ceux provenus du ſerin avec le chardonneret , du mulot , &c. On pourroit peut-être étendre encore ces exemples ſur nombre d'autres animaux qui ſerviroient de preuve à la poſſibilité de ces mutations ou de ces créations de nouvelles eſpeces dans les animaux ; & il paroît probable qu'avec du tems & des combinaifons on feroit reparoitre des eſpeces d'animaux formées du tems des Anciens , & qui ont ceſſé d'exiſter faute des circonſtances favorables pour les entretenir.

JUMENT , eſt la femelle du cheval. *Voyez* ce mot.

JUNCO , eſt le moineau de jonc. *Voyez* ce mot.

IVOIRE. *Voyez* ELÉPHANT , & à l'article YVOIRE.

IVRAIE. *Voyez* YVRAIE.

JUPITER. *Voyez* au mot PLANETE.

JURUCA , eſt la tortue franche du Breſil. Celle que les Portugais nomment *cayado de agoa* , eſt une autre eſpece de tortue du Breſil , qui eſt très petite. *Voyez* l'article TORTUE.

JUSQUIAME , *Hyoscyamus*. Plante qui a une odeur forte , défagréable , qui appeſantit la tête , & dont on diſtingue deux eſpeces principales dans les boutiques.

La JUSQUIAME NOIRE ou HANNEBANE , ou POTELÉE , *Hyoscyamus niger vulgaris* , croît par-tout dans les champs , le long des chemins aux environs des villages , &c. elle a une racine épaiſſe , ridée , longue , branchue , brune en dehors , blanche en dedans : elle pousse des tiges hautes d'un pied ou environ , rameuſes & velues. Ses feuilles ſont nombreuſes , amples , molles au toucher , cotonneuſes , d'un verd gai , découpées profondément en leurs bords , d'une odeur forte & puante , principalement étant frottées dans les mains : leur ſuc rougit le papier bleu. Ses fleurs ſont rangées ſur les tiges en longs épis , de couleurs mêlées jaune & purpurine : chacune d'elles eſt , ſelon M. Tournefort , une campane découpée irrégulièrement en cinq parties , ſoutenue par un calice velu , formé en gobelet. A cette fleur ſuccede un fruit caché dans le calice , de la figure d'une marmite , à deux loges , ſur lequel eſt placé un couvercle qui ſe ferme exactement. Ce fruit eſt rempli en dedans de pluſieurs petites graines , cendrées , arrondies , ridées , applaties , d'une ſaveur gluante , & d'une odeur narcotique.

La JUSQUIAME BLANCHE DU LEVANT , *Hyoscyamus albus* , differe de la

la précédente, en ce qu'elle est plus petite, moins rameuse; ses feuilles sont plus molles, mais plus coronnées; ses fleurs & ses graines sont blanches & plus petites: elle croît principalement aux pays chauds & vers Orange, le long du Rhône.

La plupart des Auteurs instruits que l'usage interne de la jusquiame, sur-tout de la noire, cause un dérangement cruel dans l'économie animale, des anxiétés, & même qu'elle procure la mort aux animaux qui en mangent; conseillent de ne se servir de cette plante qu'extérieurement, à l'exception de la graine. La jusquiame en cataplasme est émolliente & résolutive, adoucit les humeurs, & exhale une vapeur soporeuse & stupéfiante, qui fait dormir comme le fait le pavot.

M. Storck, Médecin de la Cour de Vienne, si connu par les belles expériences qu'il a faites sur l'usage interne de la ciguë, de la pomme épineuse & de l'aconit, qu'il fait prendre avec succès, depuis quelques années, dans beaucoup de maladies qui ne cedent point à d'autres remèdes, a aussi travaillé sur l'usage interne de l'extrait de jusquiame. Son premier essai fut fait sur un chien: tant qu'il ne lui administra l'extrait qu'en petites doses, l'animal n'en parut rien ressentir; mais à plus forte dose, il commença à boire & manger avec avidité, puis il devint craintif & languissant: il avoit les yeux menaçants, sa marche étoit chancelante, il heurtoit tout ce qu'il rencontroit comme s'il ne voyoit point; à ce phénomène succéda le sommeil, & ensuite un vomissement, un tremblement, une défaillance, une déjection d'excréments liquides; enfin il parut immobile. Tous ces symptômes étoient à-peu-près semblables à ceux qu'avoient éprouvés, le 25 Mars 1649, les Bénédictins du Couvent de Rhinow, qui avoient mangé d'une salade dans laquelle leur Jardinier avoit mis, par mégarde, quelques feuilles de jusquiame, qu'il avoit prise pour de la chicorée blanche. Mais au bout d'un second sommeil, le chien parut plus tranquille, & il fut bientôt dans son état naturel, éveillé, gai, plein d'appétit, & toujours alerte. Cet animal ayant continué à se bien porter, M. Storck jugea que l'extrait de jusquiame, pris à petite dose, ne peut faire de mal; mais qu'une forte dose cause des accidents très funestes. D'après cette connoissance, M. Storck prit, pendant huit jours, tous les matins à jeun, un grain d'extrait, sans que sa santé ni sa vue éprouvassent le moindre changement; il avoit seulement, pendant cette huitaine, le ventre plus libre & un beaucoup plus grand appétit. Un tel essai sur lui-même étoit bien capable de le porter à faire prendre de cet extrait à ses malades, dans le cas où les autres médicaments n'auroient point de succès.

M. Storck a opéré, par le moyen de cet extrait, plusieurs guérisons, dont on trouve le détail dans un petit corps d'Observations, qui se vend chez Didot le jeune, à Paris. On y remarque que ce remède peut convenir particulièrement aux personnes qui ont des tremblements convulsifs, des soubresauts involontaires, des frissons & des syncopes, des terreurs subites, &c.

Quoiqu'il ne soit pas de notre ressort d'apprécier les vertus de la jusquiame, & malgré l'authenticité des cures que M. Storck a opérées par son moyen, nous conseillons encore de se méfier de ce remède; à moins qu'on ne soit dans les mains d'un sage Médecin, tel que M. Storck lui-même.

Qu'une personne tienne sur le feu des racines ou des tiges, ou des feuilles de jusquiame, même les graines, la vapeur qui en résulte suffit pour jetter dans une perplexité affreuse. Quelle cruelle alternative: le salut au milieu des poisons! Nous terminons cet article en avertissant qu'il y a des Charlatans qui guérissent les maux de dents, soit en y portant de la poudre de la graine de jusquiame, soit en leur faisant recevoir la vapeur de cette graine, qu'on jette sur les charbons ardents. Combien de personnes en ont été soulagées à la vérité, mais combien d'entr'elles ont été depuis sujettes aux vertiges & à la stupidité! c'est procurer un mal réel & fixe, en échange d'une douleur passagère. Si par imprudence ou par hasard, l'on avoit pris de la jusquiame, & qu'elle commençât à exercer ses qualités nuisibles, il faudroit aussi-tôt avoir recours aux vomitifs & aux adoucissants.

JYNX. Oiseau de passage, qui est une espèce de coucou. Il est connu des Ornithologistes, sous le nom de *tercot* ou *torcot*, ou *turcot*.

IZARI ou AZALA, est la garance du Levant. Voyez à l'article GARANCE.

IZQUEPOLT. Espèce de renard des Indes, qui fait son séjour dans les antres des rochers, & qui ne dévore que la tête des scarabées & des vermisses. Cet animal est aussi singulier que la bête puante, qui se trouve à la Louisiane. Quand il marche, il exhale une odeur fétide; & dès qu'il se voit poursuivi, il éjacule son urine & ses excréments à plus de huit pas de distance, & fait fuir ainsi ceux qui le poursuivent. Les taches que son urine & ses excréments font sur les habits, sont ineffaçables, & conservent toujours leur mauvaise odeur. Ruisch dit que la chair & les excréments de cet animal sont excellents pour guérir d'une maladie contagieuse, qu'il nomme *lues hispanica*.



K A A

K A K

KAAB. En Norwege on donne ce nom au *veau marin* ou *phocas*. Voyez ces mots.

KAAT ou LYCION. Voyez CATÉ INDIEN.

KABASSOU. C'est le tatou à douze bandes. Voyez à l'article ARMA-DILLE.

KABÉLIAU ou CABÉLIAU. Voyez MORUE.

KAIR. Nom que les Indiens donnent à une espece de *merlu* ou *merluche*. Voyez MERLU.

KAKATOU ou CATACOUA. Oiseau oriental des Isles Moluques : il est huppé & d'une blancheur citronnée. On transporte ces oiseaux en vie de Ceram & des Isles Moluques à Batavia, & de là en Hollande : nous en avons vu à Amsterdam quelques-uns de vivants ; ils avoient sur la tête une belle huppe composée de longues plumes blanchâtres. Le bec, les jambes, le nombre des doigts du pied, & leur forme, tout nous a paru assez semblable à ces mêmes parties dans le perroquet. Le kakatou est doué, comme cet animal, de la faculté d'apprendre à parler.

KAKERLAQUE, *Blatta*. Est un insecte volant fort connu en Amérique, aux Indes orientales, & des Marins, parceque les vaisseaux n'en sont que trop fréquemment infestés. Ces petits animaux sont du genre des mirtes. Il y en a une espece qui se multiplie beaucoup en Europe dans les cuisines. Voyez aussi ce que nous avons dit au mot BLATTE.

Les kakerlaques en Amérique, sont d'assez grands insectes, dont le corps est applati : le corps des mâles est caché sous des ailes, & celui des femelles est à découvert, parcequ'elles n'ont point d'ailes. Celles de notre pays, plus connues sous le nom de *mirtes*, sont bien moins grandes que celles des autres parties du monde ; elles ne sont pas non plus si malaisantes, on ne les redoute même dans nos cuisines que comme une malpropreté : mais dans nos Isles, elles s'introduisent de tous côtés, elles tachent tout, & n'épargnent ni habits, ni linges ; elles dévorent aussi les souliers, les viandes, & le pain dont elles ne mangent que la mie. Les kakerlaques aiment sur-tout les choses douces, & particulièrement l'anas : elles jettent leur semence par tas, & l'enveloppent d'une fine raie, comme font en Europe certaines araignées. C'est un plaisir que de voir au terme de l'éclosion, les jeunes animaux formés en dedans, ronger leur coque & en sortir avec précipitation ; alors ils ne sont pas plus gros qu'une fourmi : ces jeunes kakerlaques se fourrent facilement par les fentes ou par la serrure dans les coffres & dans les armoires, où elles rongent & détruisent tout ; mais heureusement, dit M. Cossigny, que les guêpes ichneumones attaquent & tuent ces insectes destructeurs.

Quand la guêpe ichneumone, après avoir rodé de différents côtés, soit

en volant, soit en marchant, comme pour découvrir du gibier, apperçoit un kakerlaque, elle s'arrête un instant, pendant lequel les deux insectes semblent se regarder; mais bientôt l'ichneumone s'élance sur l'autre, dont elle saisit le museau ou le bout de la tête avec ses serres ou dents, elle se replie ensuite sous le ventre de sa proie pour la percer de son aigillon: dès qu'elle sent y avoir répandu le poison fatal, elle quitte cette ennemie, & s'en éloigne; mais après avoir fait divers tours, elle revient la chercher, bien certaine de la trouver où elle l'a laissée. La kakerlaque naturellement peu courageuse, a alors perdu ses forces; elle est hors d'état de résister à la guêpe ichneumone, qui la saisit par la tête, & marchant à reculons, la traîne jusqu'à ce qu'elle l'ait conduite à son trou.

A Surinam & à la Martinique, on donne le nom de *kakerlakki* ou de *ravet* à cette même *blatte* qui court la nuit pour butiner. Dans les Indes orientales, les fourmis noires molestent cruellement les kakerlaques. Lorsque le hasard leur en offre quelqu'un d'estropié ou de mort, elles le saisissent douze ensemble, le traînent au trou de la fourmillière, & l'y font entrer souvent dépecé, ne pouvant l'y introduire en entier.

KAKONGO. Poisson de la forme d'un saumon, lequel se trouve dans les rivières de Congo & d'Angola en Afrique: sa chair est grisâtre & très grasse. Les Pêcheurs sont obligés de porter ce poisson au Roi du pays.

KALI. Nom qu'on donne assez communément à la plante appelée *soude*. Voyez ce mot, & à l'article PINIPINICHI.

KAMBEUL. Les Negres du Sénégal donnent ce nom à un coquillage univalve, qui est du genre des *limaçons*, selon M. Adanson. M. d'Argenville le place dans la famille des *buccins*. Voyez ces mots.

KAN-KAN. Nom que les Ethiopiens & bien des Voyageurs donnent à la *civette*. Les Negres de Guinée l'appellent *kastor*, & les Portugais *gato de algalia*. Voyez CIVETTE.

KANNA. C'est une racine qui croît au Cap de Bonne-Espérance. Les Hottentots la recherchent avec passion. Le Pere Tachard suppose que c'est le gins-geng des Chinois; en effet, elle a à-peu-près les mêmes propriétés. Les Hottentots qui la mâchent, en ressentent les mêmes effets, que les Turcs de l'opium. (*Histoire des Voyages*).

KAOLIN, *terra calcarea Chinensis*. Est une terre composée, blanche, farineuse, graveleuse, brillante, & dont on se sert en Chine dans la composition de la fameuse porcelaine de ce pays, conjointement avec le *petunse*. Voyez ce mot.

Par l'analyse que nous avons faite du kaolin de la Chine, nous avons reconnu que la partie farineuse est calcaire; les paillettes brillantes sont du mica; les parties graveleuses sont de petits cristaux de quartz; & la partie empâtante qui sert de ciment, est argilleuse. Nous avons trouvé quantité de terre semblable sur les couches de granite qui se voient aux villages du grand & petit Hertrey près d'Alençon. Peut-être que ce kaolin n'est qu'un mauvais granite détruit: on s'en sert dans le pays d'Alençon

pour faire la poterie & la grosse fayence. Dans nos voyages en Bretagne, en Allemagne & en Suisse, nous avons aussi rencontré du kaolin semblable à celui d'Alençon. Cette terre est désignée dans Wallerius sous le nom de *marne à porcelaine* : au moins elle est très semblable à celle dont cet Auteur parle sous ce nom.

KAOUANE. C'est la plus grande tortue de mer ; elle se défend de la patte & de la queue : elle est aussi connue aux Antilles & à Cayenne, sous les noms de *canuaneros* & *juracua*. Voyez TORTUE.

KARABÉ. Voyez AMBRE JAUNE. Les trochisques de karabé qui viennent du Levant, ne sont qu'une sorte de gomme de peuplier : on donne aussi le nom de *faux-karabé* à une espèce de *copal*. Voyez RÉSINE COPAL. Le karabé de Sodome est l'*asphalte* : voyez ce mot.

KARÁMBOLE. Est un fruit qui croît aux Isles Manilles & à la côte de Coromandel, qui a une odeur de coing, & dont on fait une excellente conserve au sucre. On le confit aussi au vinaigre.

KARA-NAPHTI. Voyez PÉTROLE.

KARAPAT ou CARAPAT. Voyez l'article PALMA-CHRISTI, & celui de RICIN.

KARATAS. Est une très grande plante de l'Amérique, ou une espèce d'aloès, dont les feuilles sont fort amples & terminées en pointes triangulaires : ces feuilles bouillies donnent une espèce de fil qui sert à faire de la toile & des filets pour les Pêcheurs. Il y a deux autres espèces de karatas : une dont les feuilles sont creuses & contiennent si bien l'eau de la pluie, qu'elles sont d'une grande ressource dans les lieux secs ; une autre qui porte un fruit en forme de gros clou, dont le goût tire sur celui de la pomme de reinette, & dont on fait d'excellentes confitures. Voy. ALOÈS.

Dans le pays de Cayenne on donne le nom de *bois de mèche* à une espèce de *karatus*, dont la moëlle sert d'amadou aux Negres. M. de Préfontaine (Maïf. Rust. de Cay.) dit que la feuille du bois de mèche, chauffée sur la cendre & appliquée sur la partie affligée de rhumatismes, soulage beaucoup. C'est encore un spécifique pour les blessures. Le fruit de cette plante s'appelle *citron de terre* : *citron*, parcequ'il a le goût acide ; *de terre*, parcequ'il faut la fouiller pour le trouver.

KARIBOU ou CARIBOU. Nom qu'on donne à une espèce de cerf qui se trouve au Canada, & qui tient de l'animal qu'on appelle *renne* dans le Nord. Voyez RENNE, CERF & CARIBOU.

KATALEPTIQUE, *Dacokephalon*. Plante de Virginie fort singulière, parceque de tel côté que l'on tourne ou retourne ses fleurs, elles y restent, comme si leur pédicule étoit articulé à dessein de se prêter à ces positions peu naturelles, & comme il arrive aux personnes attaquées de la maladie appelée *katalepsie*. Voyez la théorie de ces sortes de mouvements bizarres, à la suite de l'article PLANTE, & même celui de SENSITIVE.

KAYOUROURÉ. Est le singe appelé *macaque blanc* dans l'Isle de Cayenne, & qui est du genre des cercopitheques. Voyez ce mot.

KENNA. Espèce de troëfine des Indes. *Voyez* ALCANA.

KERATOPHYTE ou CÉRATOPHYTE. Nom qu'on donne à des *li-tophytes* ou productions organisées, de corps marins polypiers; leur substance ressemble à du bois, mais leur nature tient de la corne: il y en a de reticulés ou en réseau, de rameux, & d'autres en forme de buissons. *Voyez* ce que nous en avons dit à l'article CORALLINES.

KERFA. Divers Auteurs prétendent que c'est la canelle gérosée. *Voyez* ce mot.

KERMÈS, *Chermes*. Genre d'insecte connu sous le nom de *galle-insecte*. *Voyez* ce mot. Les individus de ce genre ont une trompe qui sort du corselet entre la première & la deuxième paire de pattes, deux ailes droites, élevées dans les mâles seulement, l'extrémité du ventre garnie de filers. La femelle étant jeune, court sur les feuilles & les tiges; mais au bout de quelque tems, elle se fixe à un endroit de l'arbre, elle y devient parfaitement immobile: enfin son corps parvient à se gonfler, sa peau s'étend, les anneaux disparaissent, elle se sèche & devient lisse; en un mot elle devient semblable aux galles ou excroissances qu'on trouve sur les arbres: voilà le propre des galles-insectes. Leur peau desséchée ne sert plus que de coque, sous laquelle sont renfermés les œufs de l'animal. On distingue le *kermès des racines*, appelé *cochenille de Pologne*, celui des orangers appelé par les Jardiniers, *punaise de citronnier*; il y a encore le kermès de la clématite, celui du pêcher, de la vigne, du sapin, du coudrier, de l'orme, du tilleul, du chêne, du néflier, du charme, de l'érable: enfin il y a une espèce de kermès, long, étroit, & formé presque comme une écaille de moule; il vient sur les arbres.

KERMÈS DE PROVENCE, *Chermès*, aut *coccus tinctorius ilicis*. Est la plus renommée des gallinsectes. La figure du kermès approche de celle d'une boule, dont l'on auroit retranché un assez petit segment. Cet insecte vient sur les feuilles épineuses & les tendres rejettons d'une très petite espèce de chêne verd, *ilex cocci glandifera*, arbrisseau qui s'élève environ à deux ou trois pieds, & qui croît sur les collines pierreuses de Provence, du Languedoc, même en Espagne & dans l'Isle de Candie. *Voyez* CHÊNE VERD.

Les femelles du kermès sont plus aisées à trouver que les mâles. Elles ressemblent dans leur jeunesse à de petits cloportes: elles pompent leur nourriture en enfonçant profondément leur trompe dans l'écorce de l'arbre; alors elles courent avec agilité: mais quand l'insecte a acquis toute sa croissance, il paroît comme une petite coque sphérique membraneuse, attachée contre l'arbrisseau; c'est-là qu'il doit se nourrir, muer, pondre, & terminer ensuite sa vie. Les habitants du pays qui ne font la récolte du kermès que dans la saison convenable, considèrent cet animal dans trois états différents d'accroissement: 1°. vers le commencement du mois de Mars: en langage provençal, on appelle le kermès, *vermeou*, & on dit que que dans ce tems *lou vermeou groue*, c'est-à-dire, que le ver couve; alors

il est moins gros qu'un grain de millet : 2°. dans le mois d'Avril, les gens du pays disent que *lou vermeou espelis*, c'est-à-dire, qu'il commence à éclore (M. Emeric remarque ici que par *vers éclos*, il faut entendre le *ver* qui a pris tout son accroissement) : 3°. vers la fin de Mai, on trouve sous le ventre de l'insecte, mille huit cents ou deux mille petits grains ronds, qu'on appelle dans le pays *freiffet*; ce sont des œufs qui venant ensuite à éclore, donnent autant d'animaux semblables à celui dont ils sont sortis. Ces œufs sont plus petits que la graine de pavot; ils sont remplis d'une liqueur d'un rouge pâle; vus au microscope, ils semblent parsemés d'une infinité de points brillants couleur d'or: il y en a de blanchâtres & de rouges. Les petits qui sortent des œufs blancs sont d'un blanc sale; leur dos est plus écrasé que celui des autres: les points qui brillent sur leur corps, sont de couleur d'argent. M. de Réaumur dit qu'il y a moins de ces kermès blancs que des rouges, & que c'est à tort que les gens du pays les appellent *la matre dou vermeou*, c'est-à-dire, la mere du kermès. Les petits œufs étant secoués, il en sort autant de petits animaux entièrement semblables à l'insecte d'où ils proviennent: ils se dispersent sur l'*ilex*, jusqu'à ce qu'au printemps suivant ils se fixent dans les divisions du tronc & des rameaux pour y faire leurs petits. On doit observer que quand le kermès acquiert une grosseur convenable, alors la partie inférieure du ventre s'élève & se retire vers le dos en formant une cavité, & de cette manière il devient semblable à un cloporte à demi roulé. C'est dans cet espace vuide qu'il dépose ses œufs, après quoi il meurt & se dessèche. A peine les œufs sont-ils éclos, que les petits animaux veulent sortir de dessous le cadavre de leur mere pour chercher leur nourriture sur les feuilles, non en les rongant comme les chenilles, mais en les suçant avec leurs trompes.

Nous avons parlé ci-dessus de la femelle du kermès, il convient maintenant de parler de son mâle, qui dans les commencements lui ressemble parfaitement: bientôt après s'être fixé comme elle, il se transforme dessous sa coque en une nymphe, qui devenue insecte parfait souleve la coque & en sort le derriere le premier: alors c'est une petite mouche qui ressemble en quelque manière au cousin, son corps est couvert de deux grandes ailes transparentes; il saute brusquement comme la puce, & cherche en volant ses femelles immobiles, qui l'attendent patiemment pour être fécondées: les a-t-il trouvées, il se promene plusieurs fois sur quelques-unes d'elles, va de sa tête à sa queue pour l'exciter; alors la femelle, fidelle & soumise au vœu de la nature, répond aux caresses de son mâle, & l'acte de la fécondation a lieu.

La récolte du kermès est plus ou moins abondante, selon que l'hiver a été plus ou moins doux; on a remarqué que la nature du sol contribue beaucoup aussi à la grosseur & à la vivacité du kermès; celui qui vient sur des arbrisseaux voisins de la mer, est plus gros & d'une couleur plus vive, que celui qui se trouve sur des arbrisseaux qui en sont éloignés. Des femmes arrachent avec leurs ongles le kermès avant le lever du soleil. Il

faut veiller dans ce tems de récolte à deux choses ; 1°. aux pigeons , parcequ'ils aiment beaucoup le kermès , quoique ce soit pour eux une assez mauvaise nourriture : 2°. on doit arroser de vinaigre le kermès que l'on destine pour la teinture , & le faire sécher. Cette manœuvre lui donne une couleur rougeâtre. Sans cette précaution , l'insecte une fois métamorphosé en mouche , s'envole & emporte la teinture. Lorsqu'on a ôté la pulpe ou poudre rouge , on lave ces grains dans du vin , on les fait sécher au soleil , on les frotte dans un sac pour les rendre lustrés ; ensuite on les enferme dans des sachets , où l'on a mis , suivant la quantité qu'en a produit le grain , dix à douze livres de cette poudre par quintal. Les Teinturiers achètent plus ou moins le kermès , selon que le grain produit plus ou moins de cette poudre. La première poudre qui paroît , sort d'un trou qui se trouve du côté par où le grain tenoit à l'arbre : ce qui paroît s'attacher au grain , vient d'un animalcule qui vivoit sous cette enveloppe & qui l'a percée , quoique le trou ne soit pas visible : les coques du kermès sont la matrice de ces insectes. C'est ce qu'on appelle *graine d'écarlate* , dont on tire une belle couleur rouge , la plus estimée autrefois avant qu'on se servît de la cochenille.

En Angleterre , on trouve aussi des especes différentes de kermès , mais du même genre , sur les sarments de vignes , sous des branches de laurier-cerise , de prunier & de cerisier : la couleur en est brune. Elles sont communément avec une espece de mere semblable à une fourmi. Lister dit , que si on coupe adroitement avec un rasoir le bout d'un de ces coccons , on y trouve quelquefois cinq , six , ou un plus grand nombre de petits vers qui se métamorphosent en des especes d'abeilles très petites & noires. La couleur de cette sorte de kermès est peu stable , les coques les plus noires , sont les plus riches en couleur ; elles sont contiguës aux arbres , sans en être des excrescences : semblables en cela à la cochenille qu'on peut transporter sur d'autres arbres.

Les coques de kermès changent de couleur ; de jaunes elles deviennent d'un brun foncé ; elles sont remplies , non d'excréments & de pulpe , mais de mittes qui vraisemblablement produisent une différence extérieure dans les especes de kermès.

Comme les coques de kermès ramassées de bonne heure & séchées , ressemblent à la cochenille , cela fait soupçonner que la cochenille est une espece de kermès : Lister fonde cette conjecture , sur ce que la poudre écarlate qu'on retire des coques en les tamisant , est un composé de mittes , qu'il faut distinguer du ver qui se change en mouche. *Voyez la Collection Académique d'Angleterre , Tome III , p. 73 , 325 , 538 , &c.*

Le kermès est un insecte , non-seulement utile pour la teinture de la laine , & même de la soie , mais qui entre encore dans la confection d'al-kermès ; & les Médecins le regardent comme un bon remede cordial & propre à arrêter le vomissement.

Voici la préparation du kermès pour l'usage de la Médecine. On pile
ces

ces coques nouvelles & bien succulentes dans un mortier de marbre , on les laisse ensuite digérer dans un lieu frais , pendant sept ou huit heures ; alors on les exprime , & on en retire un suc qui , dépuré & édulcoré avec le double de sucre , forme une conserve liquide & cordiale , connue sous le nom de *syrop de kermès*. Si on se contente de prendre l'espece de *pulpe* fraîche ou de *poudre rouge* dont il est mention ci-dessus , qu'on la presse doucement entre les doigts , alors on en formera des pastilles que l'on fera sécher au soleil : voilà ce qu'on appelle *pastel d'écarlate* , ou *écarlate de graine* , & que l'on envoie dans les pays étrangers. *Voyez* les articles COCHENILLE , GALLINSECTE & CHÊNE VERD.

KERMÈS DU NORD ou KERMÈS DES RACINES. *Voyez* COCHENILLE DE POLOGNE. On donne aussi le nom de *kermès* à une préparation de l'antimoine , qu'on nommoit autrefois *poudre des Chartreux* : mais ce kermès est minéral. *Voyez* le *Dictionnaire de Chymie*.

KETMIE , *Ketmia vesicaria*. Plante qui croît dans presque tous les pays chauds , & qui est d'usage en Amérique & en Afrique. On ne la cultive dans nos jardins que par curiosité. Sa racine est fibrée ; ses tiges sont hautes d'un pied , & velues ; ses feuilles , assez semblables à celles de l'alcée , sont découpées , velues en dessous , & d'un goût visqueux : ses fleurs ressemblent à celles de la mauve , & sont de couleur jaunâtre , mêlée d'un peu de purpurin ; il leur succede des fruits qui contiennent en plusieurs loges , des semences menues & noirâtres. Cette plante est émolliente.

L'ambrette est aussi une kermie. *Voyez* AMBRETTE.

KIANKIA. Est un perroquet pailleux de Cayenne. *Voy.* PERROQUET.

KIES ou QUISSE. Nom que les Mineurs donnent à la *pyrite* & à la *marcaassite*. *Voyez* ces mots.

KINA KINA. Est le nom qu'on donne souvent au *quinquina*. *Voyez* ce mot.

KINKI. Est la poule dorée de la Chine ; elle tire son nom de la beauté de son plumage : on ne connoît point en Europe d'oiseau qui ressemble au kinki. Le mélange de rouge & de jaune qui compose sa couleur , la plume qui s'élève sur sa crête , l'ombrage de sa queue , la riche variété des couleurs de ses ailes , joint à l'élégante beauté de sa taille , lui donnent la préférence sur les autres oiseaux : sa chair passe aussi pour être plus délicate que celle des faisans.

KLIPPFISCH & STOCFISCH , ou POISSON DE ROCHER. Sont des préparations de cabelliau , espece de morue , dont on se sert dans les voyages de mer , & qui servent aussi d'aliment à certains peuples du Nord. *Voyez* MORUE.

KNAWEL. *Voyez* à l'article COCHENILLE DE POLOGNE.

KNAVER ou KNAUR. Les Mineurs donnent ce nom à une sorte de roche , composée de quartz blanc & de parties talqueuses ou schisteuses : lorsque cette roche , réfractaire au feu , est noire & semblable à de l'ardoise , sans être feuilletée ni facile à couper , on la nomme *kneifs*. Les ou-

vriers souterrains ne rencontrent jamais qu'à regret le kneifs; car outre qu'ils s'éloignent de la mine riche, ils ont encore de la difficulté à l'en détacher, mais aussi c'est un indice qu'on trouvera de très bonne mine.

KNORCOCK. Oiseau du Cap de Bonne-Espérance, qu'on nomme aussi *cocq knor*: Kolbe nomme le mâle *knorhaan*, & la femelle *knorhen* ou poule *knor*. Ces oiseaux servent de sentinelles aux autres oiseaux, en les avertissant de l'approche des hommes par un cri qui exprime le mot *crac*, & qu'ils répètent fort haut: aussi les Chasseurs tuent-ils cet oiseau, à cause de son cri qui fait fuir le gibier, quoiqu'ils fassent peu de cas de sa chair. Le knorcock est de la grandeur d'une poule: son bec est court & noir, ainsi que le plumage crêté; celui des aîles & du corps est mêlé de rouge, de blanc & de cendré: ses jambes sont jaunes. Leurs aîles sont si petites, que ces oiseaux ne peuvent pas voler bien loin: ils fréquentent les lieux solitaires, & font leurs nids dans les buissons. Leur ponte est de deux œufs.

KNOSPEN. Nom que les Minéralogistes étrangers donnent à la mine verte, striée & foyeuse de cuivre de la Chine. *Voyez* CUIVRE.

KOBBERA-GUION. Est un animal amphibie de l'Isle de Ceylan, & qui ressemble beaucoup à l'alligator. Il a six pieds de longueur: sa chair est d'un assez mauvais goût. Quoique cet animal plonge souvent dans l'eau, sa demeure ordinaire est sur la terre, où il mange les corps des oiseaux & des autres bêtes. Sa langue, qui est bleue & fourchue, s'allonge en forme d'aiguillon, & est effrayante lorsqu'il la tire pour siffler ou pour bailler; cependant, loin de piquer & de mordre les hommes, il se contente de siffler lorsqu'il les aperçoit: il n'en fait pas de même à l'égard des chiens qui s'approchent trop de lui, soit pour aboyer, soit pour mordre; car il les frappe si vivement de sa queue, qui ressemble à un long fouet, qu'il les fait fuir en criant.

KOBOLD. *Voyez* COBALT.

KODDAGA-PALLA. Est la même écorce rougeâtre que nous avons désignée sous le nom de *codaga-pale*. *Voyez* ce mot.

KOKOB. Est un serpent très dangereux, & qui ressemble beaucoup à l'aimorrhôis. On le trouve dans le Jacatan, Péninsule située entre le golfe du Mexique & celui de Honduras. Ce serpent est d'une couleur noirâtre; sa longueur est de trois pieds où environ: quand on en est mordu, on perd tout son sang dans l'espace d'une heure, & l'on meurt si l'on ne boit aussitôt une potion composée de tabac & de suc de primevere.

KORKOFEDO. Poisson de la côte d'Or en Afrique, dont les dimensions sont égales en longueur & en largeur: sa queue est faite en croissant; il a peu d'arrêtes: sa chair, qui est très blanche, devient rouge & excellente par la cuisson. C'est pendant le mois de Décembre que les Negres en font une pêche abondante: Ils prennent ce poisson avec un hameçon fort crochu, auquel on attache une piece de canne à sucre, à l'extrémité d'une ligne de huit brasses de longueur: les Negres se passent l'autre bout de la ligne autour du col; & dès qu'ils sentent une petite secousse, ils ramènent aussi-tôt le poisson & l'amorce dans leur canot.

KOUXEURY, *Asellus lacustris*. Est un poisson du lac de Cayenne, très connu dans ce pays. Les Indiens, du fond de la Guiane, se servent de l'os qui forme le palais de ce poisson, au lieu de lime, pour polir les arcs, les boutons & autres ouvrages.

KRAKEN. Quoique l'on sache que la mer produise les masses d'animaux les plus énormes, tels que les *baleines*, les *licornes*, on ne peut guere croire à l'existence des krakens. Ce sont, dit-on, des animaux qui habitent les mers du Nord, & dont le corps a jusqu'à une demi-lieue de longueur : on le prendroit pour un amas de rochers flottants ou de pierres couvertes de mousse. Tous les Pêcheurs de Norvege rapportent unanimement, à ce que l'on dit, que pendant les chaleurs & les beaux jours de l'été, quand ils avancent quelques milles en mer, au lieu de la profondeur ordinaire qui est de quatre-vingt & cent brasses, ils n'en trouvent que vingt ou quarante; ils concluent de-là qu'ils sont au-dessus des krakens, dont la présence occasionne cette diminution de profondeur. La pêche est alors très abondante pour eux; à chaque instant ils prennent des poissons à l'hameçon : mais ils observent toujours si la profondeur reste la même; car si elle diminue, ils se retirent au plutôt, de peur que l'animal par son mouvement ne les fasse périr. On pense que c'est une espece de polype, dont les bras, pour répondre à la masse du corps, sont de la grandeur des plus hauts mâts de vaisseau. On ajoute que les poissons sont attirés au-dessus de cet animal par les humeurs fangeuses qu'il rejette, & qui colorent la mer; & comme tout doit être singulier dans un semblable animal, on dit que son dos s'ouvre, & qu'il engloutit ainsi les poissons qui sont au-dessus de lui, & lui servent de nourriture. *Voyez POLYPE DE MER.*

KUPFER-HIECHEM. Nom que les Mineurs donnent à de petits grains pyriteux, couverts d'un enduit verd, qui se trouvent dans quelques especes de pierres feuilletées : cet effet est le résultat du cuivre de la pyrite, décomposé par le vitriol. *Voyez PYRITE.*

KUPFER-NIKKEL. Est une mine d'arsenic, d'un rouge cuivreux, qui contient quelquefois du *cuivre*, & accidentellement, du *cobalt*. *Voyez le II Volume de notre Minéralogie.*

KURBATOS ou **PÊCHEUR**. Oiseau dont les bords du Sénégal sont peuplés : il se nourrit de poissons; il n'est pas plus gros qu'un moineau : son plumage est fort varié. Il a le bec plus long que tout le corps; ce bec est fort & pointu, crenelé en dedans comme une scie : il se balance dans l'air & à la surface de l'eau, avec un mouvement si vif, que les yeux en sont éblouis. Il s'en trouve des millions sur les deux bords de la Gambra, surtout vers l'*Ile du Morfil* : leurs nids sont en si grand nombre sur les arbres qui bordent la riviere, que les Negres leur donnent le nom de *Villages*. L'art qui regne dans la construction de ces nids, est admirable : la figure en est oblongue & grisâtre : ils sont composés d'une terre dure, mêlée de plumes, de mousse, de paille, si bien entrelacées, que la pluie n'y peut pénétrer. Ces nids sont si solides, qu'étant agités par le vent, ils s'entre-

heurtent sans se briser : à quelque distance , il n'y a personne qui , pour la première fois , ne les prît pour les fruits de l'arbre. Ces oiseaux ne donnent à leurs nids qu'une petite ouverture , qui est tournée à l'Est , afin d'éviter la pluie : par ce moyen les kurbatos sont en sûreté dans leurs nids , contre les surprises des singes leurs ennemis , qui n'osent se risquer sur des branches aussi foibles & aussi mobiles ; d'ailleurs les feuilles de ces arbres sont épineuses , & rendent l'accès de ces nids encore plus difficile. On a cependant des exemples , que des singes veillent souvent à l'autre bout des branches ; & lorsque la nichée commence à croître , ils ont la malice de secouer la branche , de manière qu'elle fait balancer les nids , & y donne un contre-coup qui les détache & les jette sur la terre. On a encore remarqué que quand ces nids n'étoient pas suspendus à d'assez longs fils ou liens , les serpents qui montent aussi à ces arbres , gagnent le bout de la branche , s'y suspendent perpendiculairement par leur queue , & entrent dans leur nid pour y butiner. Il ne faut pas confondre ces nids avec celui du Japu. *Voyez* ce mot.

KYANG-CHU. Est le marsouin de la rivière de Yang-Tsé-Yang : on l'y trouve quelquefois à plus de soixante lieues de la mer. Ces marsouins sont plus petits que ceux de l'Océan ; mais ils nagent en troupes au long des rivières avec les mêmes évolutions : on en mange beaucoup.

KYNORHODON. *Voyez* ROSIER.

KYN-YU. Est le poisson d'or de la Chine , qui est une espèce de *dorade*. *Voyez* ce mot.



L A B

L A C

LABBERDAN. Est le nom que les Flibustiers Hollandois donnent au *cabéliau*, espece de morue qu'ils préparent sur leurs vaisseaux : ils ne font autre chose que lui couper la tête ; & après l'avoir vidée du côté du ventre , ils la rangent dans des tonneaux avec des couches de gros sel. Les Ecoissois & les Irlandois nomment ce cabéliau ainsi préparé , *aberdaine*. Ils en pêchent tous les ans en quantité sur les côtes du Nord-Ouest & de l'Est de leur Isle , dont ils font ce labberdan , qui sert de nourriture aux Matelots. Voyez à l'article MORUE.

LABDANUM ou **LADANUM.** Est la substance aromatique résineuse, quel'on retire dans le Levant , d'une espece de *ciste*. Voyez au mot CISTE.

LABIÉES, *Labiata*. Tournefort est en quelque sorte le premier qui ait nommé ainsi une famille de plantes , dans lesquelles les découpures inégales & irrégulieres de la corolle imitent communément les deux levres de la bouche d'un animal. La classe des *labiées* renferme des plantes herbacées , annuelles ou vivaces , & des arbrisseaux , dont quelques-uns sont toujours verts. Les racines des labiées sont rameuses & fibreuses ; leurs tiges sont rondes quand elles sont vieilles , quarrées étant jeunes , & les nouvelles branches opposées en croix. Les feuilles sont de même opposées deux à deux , pointillées & ornées de petites taches brillantes ; le feuillage est aussi disposé en croix. La plupart des fleurs sont hermaphrodites , & sortent toutes des aisselles opposées des feuilles. La poussiere prolifique est composée de corpuscules très petits , blancs & transparents. Ces plantes sont , 1°. ou aromatiques chaudes , & ont une vertu sudorifique , fébrifuge & corroborantes ; 2°. ou piquantes , pénétrantes , & sont estimées errhines & céphaliques ; 3°. ou âcres & légèrement corrosives ; 4°. ou le plus souvent ameres , vulnéraires , astringentes & vermifuges. En général ces plantes sont d'un usage merveilleux dans les maladies causées par l'atonie ou le relâchement des fibres. On en trouvera des exemples aux mots BUGLE , ROMARIN , STÆCHAS , ORIGAN , BASILIC , SAUGE , BÉTOINE , MARRUBE , CATAIRE , HYSSOPE , SARRIETE , MENTHE , POULIOT , THYM , LAVANDE , MELISSE , &c. qui sont de la famille des *labiées*.

LABYRINTHE, *Labyrinthus*. Est une espece de limaçon de marais ou de riviere , ou de fossés : il a la coquille d'un gris obscur , platte , en forme de nombril à la partie supérieure , & à quatre échancrures rondes. Les stries longitudinales & transversales sont menues & élevées. Voyez l'article LIMAÇON.

LAC, *Lacus*. On donne ce nom à une étendue considérable d'eau , environnée de terre , qui ne se dessèche jamais , & qui n'a communication avec la mer que par quelques rivières , ou par des conduits souterrains. Cette eau est quelquefois coulante , quelquefois stagnante. L'eau de lac

approche beaucoup de l'eau de riviere pour les propriétés générales ; même goût , même dépôt , mêmes usages : elle paroît également pure & sans couleur ; excepté dans l'été , où elle a pour l'ordinaire un œil verdâtre , qui peut-être n'est dû qu'aux feuilles des plantes aquatiques , qui végètent souvent dans le fond des lacs.

La plupart des lacs semblent dispersés en plus grand nombre près de ces especes de points de partage que l'on a observés sur les Continents. *Voyez* aux articles FONTAINE & MONTAGNE. En Suisse on en trouve jusqu'à trente-huit : il en est de même dans le point de partage de Russie & dans celui de la Tartarie Chinoise en Asie. Mais on a observé généralement que les lacs des montagnes sont tous surmontés par des terres beaucoup plus élevées , ou qu'ils sont au pied des pics & sur la cime des montagnes inférieures.

Il y a des lacs si vastes , qu'ils paroissent comme une petite mer : tel est celui d'Haarlem en Hollande , sur lequel d'assez gros vaisseaux font voile ; & le lac Aral , qui a cent lieues de longueur , sur cinquante de largeur , ou huit degrés quarrés. On peut encore compter parmi les grands lacs , ceux de Ladoga & d'Onega en Moscovie , & celui de Neagle dans le Comté de Down en Irlande. La plupart des lacs reçoivent des eaux qui s'en écoulent ensuite , & toujours avec une sorte de proportion : tel est celui de Geneve. On en voit qui dépensent plus d'eau qu'ils n'en reçoivent , & d'autres qui en reçoivent plus qu'ils n'en dépensent. Ceux de la premiere classe , qui ont un écoulement considérable , & qui forment une riviere ou un courant sans qu'on puisse appercevoir de diminution sensible , reçoivent des eaux souterraines qui les entretiennent. Ceux de la seconde classe , qui reçoivent quantité d'eau par des rivières , ruisseaux & courants , qu'on ne voit point augmenter , & à qui l'on ne reconnoît extérieurement aucun écoulement ou déperdition que par l'évaporation , ont des dégorgements ou conduits souterrains , au travers du sol de leur lit , qui est poreux & sableux. Le lac appelé *mer morte* , dans lequel le Jourdain se jette , en est un exemple. Tels sont encore la mer Caspienne , le lac de Morago en Perse , & celui de Titicaca en Amérique.

Les lacs qui se trouvent dans le cours des fleuves qui en sont voisins , ou qui versent leurs eaux au dehors , ne sont point salés ; ceux au contraire qui reçoivent les fleuves sans qu'il en sorte d'autres , sont salés : ceux qui ne reçoivent aucun fleuve & qui ne versent point leurs eaux au dehors , sont ordinairement salés s'ils sont voisins de la mer ; ils sont d'eau douce s'ils en sont éloignés.

On trouve des lacs qui présentent des phénomènes singuliers dans le changement des saisons. On a remarqué que les eaux du lac de Domletscherthal en Suisse , & plusieurs autres , mugissent comme une mer agitée , sans que le tems paroisse orageux.

On a aussi observé que si ce phénomène arrive à l'approche de la pluie , les eaux perdent leur limpidité , & paroissent sous des aspects extraordi-

naires : des personnes au dessus des préjugés, croient y appercevoir des phantômes, lesquels, en s'évanouissant insensiblement, font voir qu'ils n'étoient formés que par des vapeurs & des exhalaisons condensées. Le lac de Zirchnits en Hongrie, est un des plus singuliers que l'on connoisse : il reçoit beaucoup d'eau & ne déborde jamais ; il se perd sous des montagnes qui l'avoisinent, où les cavernes sont quelquefois seches, d'autres fois humides, chargées d'oiseaux de passage & de poissons : il y a un tems où le lac se tarit, & l'on y ramasse les roseaux dont on fait de la litiere aux bestiaux ; on y récolte aussi du foin : souvent on y laboure le terrain, on y sème du millet qui croît & mûrit rapidement : enfin l'on y fait aussi la chasse au gibier & aux bêtes fauves, qui descendent alors des montagnes. Les Hydrologistes font encore mention d'un autre phénomène, que donnerent, en 1603, les eaux du lac de Zurich ; & en 1703, celles de Délitz : elles devinrent tout-à-coup rougeâtres comme du sang. L'examen fit reconnoître que ce fut des courants d'eaux bitumineuses, chargées d'ochre rouge de fer, qui vinrent alors se mêler aux eaux de ces lacs. Peut-être y eut-il une irruption souterraine, comme il en arriva dans quantité de rivières, lors de la dernière catastrophe arrivée à Lisbonne : peut-être ces matieres colorantes étoient-elles interposées entre deux couches au fond des lacs. Il y a de ces lacs à double fond, en Suede, dans le Jemteland : leur fond supérieur s'élève en certain tems, couvre tout le lac, comme un assemblage de planches flottantes, & s'affaisse en un autre tems. On soupçonne que le lac de Zirchnits est aussi à double fond. On a beaucoup d'autres exemples d'eaux qui sont devenues colorées en très peu de tems.

LACERON. *Voyez* LAITERON.

LACERT. En Languedoc on donne ce nom à un poisson de mer, qui a beaucoup de ressemblance avec un lézard. *Voyez* LÉZARD DE MER, à l'article DRACONCULE.

LACQUE, *Lacca*. Est une résine dont nous avons parlé à l'article d'une des especes de *fourmi*. *Voyez* ce mot.

La lacque de Venise est une pâte seche & rouge, bien différente de celle que les Indiens font avec la résine-lacque, pour former des bracelets appellés *manilles*. La lacque de Venise ou lacque carminée, qu'on prépare également bien à Paris, est une pâte qu'on fait avec la cochenille, après qu'on en a tiré le premier & même le second carmin ; elle sert aux Peintres pour peindre en miniature & en huile. Ce que l'on appelle *lacque colombine* ou *lacque plate*, est fait avec les tontures de l'écarlate : bouillies dans une lessive avec de la craie & de l'alun, on en forme des tablettes qu'on fait sécher. Elle sert aux Tabletiers & aux Apothicaires. On donne aussi le nom de *lacque liquide* à une forte teinture tirée du bois de Bresil. Beaucoup de plantes donnent des lacques, especes de féculs colorantes.

Le vernis de la Chine porte aussi quelquefois le nom de *lacque*.

LACQUE EN HERBE. *Voyez* à l'article MORELLE EN GRAPPES.

LAGA. Est le nom que l'on donne à certaines fèves un peu plus grosses qu'un grain de chenevis, d'un beau rouge de corail, avec une petite tache noire, lesquelles croissent aux Indes orientales, & servent, dans quelques-uns de ces pays, pour peser l'or & l'argent. Elles se nomment *condui* ou *condoumani* au Malabar.

LAEMMER-GEYER. *Voyez* à la suite du mot AIGLE.

LAGETTO ou LAGETTE. Est un arbre très curieux, de médiocre grandeur, lequel se trouve dans les montagnes Méditerranées de la Jamaïque. Ses feuilles ressemblent à celles du laurier : l'écorce extérieure est dure & brune, à-peu-près comme celle des autres arbres. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'écorce intérieure, qui paroît d'abord blanche & solide, est composée de douze ou quatorze couches, qui peuvent être séparées assez facilement en autant de pièces, qui sont comme une espèce d'étoffe ou de toile. La première de ces couches, qui vient après la grosse écorce, forme un drap assez épais pour faire des habits : les couches intérieures ressemblent à du linge, & sont propres à faire des chemises : toutes les couches de l'écorce intérieure, dans les petites branches, paroissent comme autant de toiles de gaze ou de dentelle très fine, qui s'étend ou se resserre comme un rezeau de soie. On fit autrefois présent d'une cravate de dentelle de lagette à Charles II, Roi d'Angleterre. Ces toiles sont assez fortes pour être lavées & blanchies comme les toiles ordinaires.

LAGOPODE. *Voyez* PERDRIX BLANCHE.

LAICHE ou ACHÉE. *Voyez* VERS DE TERRE.

LAIE ou LAYE. Nom que l'on donne à la femelle du porc sauvage ou *sanglier*. *Voyez* ce mot.

LAINE, *Lana*. Espèce de poil qui naît abondamment sur le mouton. Parmi les flocons de la laine abattue, on sépare ce qui est au cœur, c'est le plus fin, & on lui donne le nom de *prime* ; ce qui en approche le plus se nomme *seconde* ; on appelle *tierce* ce qui vient ensuite : tout ce qui est jaune, déchiré & altéré, est mis au rebut, & s'emploie dans les étoffes grossières. On tire, de la laine grasse dite en latin *lana succida*, une matière grasseuse en consistance d'onguent, grisâtre ou brunâtre, d'une odeur fade & désagréable, sujette à s'empuantir & à se durcir comme du savon : c'est ce qu'on appelle *œsipe*, *suini*, *æsipus*. On en trouve beaucoup à la gorge & entre les cuisses des moutons : on le retire de la laine par l'ébullition. Les Drogistes en tiroient autrefois de la Normandie, de la Beauce & du Berry : on s'en sert pour amollir les tumeurs & appaiser les douleurs. Son usage est à présent presque aboli. *Voyez* ce que nous avons dit sur la manière de perfectionner les laines, *au mot* BELIER : *voyez* aussi l'article POIL.

LAINE D'AUTRICHE ou LAINE-PLOC. *Voyez* à l'article AUTRICHE.

LAINE DE MOSCOVIE. Nom que les Ouvriers en chapeaux donnent au

au poil ou espece de duvet très fin & très serré qui se trouve sous le ventre du castor. *Voyez* ce mot.

LAINE DE SALAMANDRE. Est un nom qu'on donne quelquefois à l'amiante.

LAIT, *Lac.* C'est une liqueur blanche & opaque, nourrissante, d'une faveur douce, que l'on tire des mamelles des femelles d'animaux vivipares. Le lait, suivant les analyses des Chymistes, est composé d'une liqueur aqueuse, d'un sel sucré & acidule, & d'une substance grasse, huileuse; ou ce qui revient au même, c'est un assemblage de trois substances très différentes les unes des autres, qui sont le *beurre*, le *fromage*, & le *petit lait*.

La crème de lait est la partie la plus huileuse & la plus grasse du lait : comme cette substance n'est pas intimement dissoute dans le lait, elle s'en sépare par le repos; & étant spécifiquement plus légère, elle vient se rassembler à la surface, d'où on l'enlève pour achever de la débarrasser des parties caséuses & séreuses qui lui sont encore mêlées, & pour la transformer en beurre.

La crème récente est très agréable : c'est elle qui rend le lait si doux, si favorable & si nourrissant; c'est elle qui, interposée dans toute la substance du lait, lui donne ce blanc mat qu'il a : il résulte aussi de-là que le lait n'est qu'une émulsion animale, & que le beurre n'est que de la crème, dont les parties huileuses ont été rapprochées, & séparées d'avec les parties hétérogenes par une percussion répétée. En vieillissant, le beurre acquiert de la rancidité, la crème devient nauséabonde, & le lait se tourne. Ce phénomène est dû à l'acide, qui par la fermentation des parties, se développe de plus en plus. Le beurre, ainsi que la graisse des animaux, ne fournit point dans sa décomposition d'alkali volatil. Le beurre frais, la crème & le lait récent, sont des aliments très sains. On se sert en Médecine du petit lait pour rafraîchir, de la crème pour appliquer sur les dartres & les érépèles, du beurre pour mûrir les plaies : on retire du petit lait évaporé, un sel essentiel blanc & sucré; on le nomme *sel* ou *sucre de lait*, & l'on en prend dans de l'eau pour se rafraîchir. Mais quelle différence de goût, d'odeur & de couleur ne remarque-t-on pas dans les différents laits tirés des animaux, tant frugivores que carnivores; il nous suffira de citer en exemple le *lait de femme*, celui de la *louve*, celui de la *cavale*, celui de l'*âne*, celui de la *chevre*, celui de la *brebis*, celui de la femelle du renne, &c. Les Russes qui confinent à la Laponie, ont l'art de tirer une sorte d'eau-de-vie du lait fermenté, dont ils font un grand usage. *Voyez* à l'article **ARACK**. Le peuple de l'Islande se nourrit aujourd'hui de lait de vache, & le petit lait de beurre lui sert de boisson ordinaire.

Voici les principales opérations de la Laitière dans nos campagnes. Pour faire le beurre, on écrème le lait refroidi & reposé, on verse cette crème dans la barate, & on la bat jusqu'à ce qu'elle soit convertie en une masse jaunâtre qui est le beurre. En Barbarie, on fait le beurre en mettant le lait

ou la crème dans une peau de bouc, suspendue d'un côté à l'autre de la tente, & en le battant des deux côtés uniformément. C'est aux Hollandois que les habitants des Indes Orientales doivent la connoissance du beurre salé & fondu. Pour faire le fromage, on se sert de présure, espece de levain; dont la principale matiere est le lait caillé qu'on trouve dans l'annette ou le premier estomac d'un veau. On jette cette présure dans le lait pour le faire prendre; ensuite on met ce lait caillé dans différentes formes, & on en laisse parfaitement égouter le petit lait; du moins c'est ainsi que se fait le fromage commun. Mais le bon fromage gras & beurré se fait de la crème & du lait caillés ensemble. Plusieurs pays ont des cantons renommés par l'excellence de leur fromage. Le Hainaut vante ceux de *Marolles*; la Normandie, ceux de *Livarot*; le Dauphiné, celui de *Sassenage*; la Suisse, celui de *Gruyeres*, qui se fait dans l'Ementhel, avec une propreté & des attentions infinies; celui de *Lavôge* en Franche-Comté porte aussi le nom de *Gruyeres*, mais il n'en est qu'une imitation: peut-être celui de *Brie* les surpasse-t-il tous, même celui à la crème si vanté à Paris: enfin le Milanès envoie par-tout le fromage de *Lodi*, que nous nommons *Parmesan*, parce qu'une Princesse de Parme l'a, dit-on, fait connoître en France, où il soutient toujours sa réputation. Tous ces fromages, ainsi que ceux de Hollande & d'Auvergne, sont uniquement de lait de vache sans aucun mélange de lait de chevre, & la crème y entre avec le lait; ceux où l'on a mêlé différents laits, ont un goût plus rance ou plus insipide. Le fromage de *Rocfort*, en Languedoc, passe pour être de lait de brebis. Au reste le fromage, à moins qu'il ne soit dégénéré par la putréfaction, est en général très nourrissant: la partie caséuse du lait est son principe vraiment alimenteux. Les gens de la campagne & ceux qui sont occupés journellement à des travaux pénibles, se trouvent très bien de l'usage de cet aliment, qui devient plus salutaire encore, comme tous les autres, par l'habitude: quant aux personnes d'un tempérament délicat, elles n'en doivent manger que vers la fin du repas & en petite quantité.

Cafeus ille bonus quem dat avara manus.

On peut encore faire cailler le lait des animaux, par le suc du *figuier*, ou par le moyen de la plante appelée *caille-lait*. Voyez ces mots.

Il y a des végétaux qui procurent une abondance de lait aux femelles des animaux: tels sont le *cerfeuil*, l'*aneth*, le *fenouil*, le *sureau*, le *polygala*, &c. D'autres qui en diminuent la quantité: tels sont la *ciguë*, le *persil*, les *bouraches*, &c. D'autres dont l'usage donne un mauvais goût au lait & même à la chair des bestiaux. On sait que le *thlaspi* des champs est nuisible aux vaches & aux brebis, puisque leur chair & leur lait en contractent un très mauvais goût qui se cominunique au beurre & au fromage. La liveche ou ache de montagne donne encore une odeur & un goût fort désagréables à la chair & au lait des vaches. L'euphorbe est de toutes les plantes étrangères, celle qui donne un plus mauvais goût au lait & à la

viande. Le laitron ou palais de lièvre, plante montagnarde dont les rennes sont fort avides, altere beaucoup le lait des vaches. Enfin M. Hagstræn, célèbre Médecin Suédois, a observé que toutes les alliâmes & la plupart des plantes ombellifères changent entièrement le goût du lait. C'est d'après ces sortes d'observations que M. Bielke, de l'Académie de Stockholm, propose de rendre le lait de vache spécifique contre le scorbut, en faisant manger à l'animal du pissenlit, du cochlearia, &c. De même pour donner au lait de chèvre une propriété contre la goutte ou la fièvre, il voudroit qu'on fit manger à ces brutes de la morelle ou du tithymale.

LAIT DE LUNE FOSSILE ou PIERRE DE LAIT, *Lac luna*. C'est une terre farineuse & calcaire, qui se trouve dans certaines sources, & dans les fentes ou creux des montagnes : elle est d'un tissu feuilleté, un peu semblable à de la raclure d'ivoire ; ses parties sont fines, légères, douces au toucher, blanchâtres & sans liaison. Scheuczer pense que le lait de lune tire son origine d'une stalactite calcaire décomposée ou réduite en poussière par le laps du tems. Il n'est pas possible de faire avec cette terre aucuns vases, dont la forme se soutienne, tant elle est aride. Des Auteurs ont encore parlé de cette terre sous le nom de *Morochtus* : c'est à proprement parler une espèce de *ghur* de craie ou d'agaric minéral : quelquefois elle est colorée.

LAITE. Voyez à l'article POISSON.

LAITRON ou LACERON, *Sonchus*. Nous ne décrivons que trois espèces de cette plante, qui sont les seules d'usage en Médecine.

Le LAITRON DOUX ou PALAIS DE LIEVRE, *Sonchus lavis*, est une plante qui croît par-tout, dans les jardins, dans les bleds, dans les vignobles, sur les levées & le long des chemins, principalement dans les champs dont le terrain est un peu gras. Sa racine est petite, fibrée & blanche : elle pousse une tige à la hauteur d'un pied & demi, creuse en dedans, tendre, cannelée, un peu purpurine ; ses feuilles sont assez longues, lisses, plus larges & plus tendres que celles du pissenlit, découpées en leurs bords, remplies d'un suc laiteux, rangées alternativement ; les unes attachées à de longues queues, les autres sans queue, embrassant la tige par leur base, qui est plus large que le reste de la feuille. Ses fleurs naissent en Mai & Juin, aux sommités de la tige & des branches, par bouquets à demi-fleurons jaunes, quelquefois blancs, semblables à celles du pissenlit. Il succède à ces fleurs des fruits de figure conique, qui contiennent de petites semences oblongues, brunes, rougeâtres, garnies chacune d'une aigrette. Toutes les parties de cette plante sont laiteuses : elle est bonne à manger en salade, avant qu'elle ait poussé sa tige.

Le LAITRON ÉPINEUX, *Sonchus asper*, ressemble assez à la précédente espèce : ses feuilles sont un peu laciniées, garnies d'épines longues & dures : elle rend un suc laiteux & amer : elle croît aux mêmes lieux que la précédente.

Le PETIT LAITRON, dit TERRE-CRÊPE, *Terra crepola*, a une racine

grêle , longue & fibreuse : ses tiges sont rameuses : ses feuilles sont moins découpées que celles de l'endive : ses fleurs sont jaunes : ses semences sont aigrettées. Elle croît naturellement sur les collines pierreuses , sur les levées , dans les décombres des édifices : elle fleurit tout l'été. Il y a des endroits où on la cultive dans les jardins potagers , pour la manger en salade.

L'usage de ces trois especes de laitron est à-peu-près le même : ces plantes ont un goût herbeux , salé , & rougissent le papier bleu : elles sont rafraîchissantes , adoucissantes. Bien de pauvres gens en mangent , pendant l'hiver , les racines fraîches assaisonnées comme les autres légumes. La décoction des feuilles est bonne pour augmenter le lait aux nourrices : les vaches , les lapins , les lièvres & les autres animaux domestiques s'en nourrissent avec plaisir.

Le laitron , chicorée jaune , est le *sonchus repens* , *multis hieracium majus* de J. Bauhin.

LAITUE, *Lactuca*. Cette plante demi-fleuronnée , connue de tout le monde , est ainsi nommée , du suc laiteux qu'elle répand quand on la rompt. On la distingue en deux especes principales ; savoir , en *laitue cultivée* & en *sauvage*.

La laitue cultivée ou domestique comprend plusieurs especes en sous-ordre , eu égard à la grosseur , à la figure & à la couleur : il y en a de blanche , de noire , de rouge , de pommée , de crêpue , de lisse , ou de découpée. De toutes ces especes de laitue cultivée , il y en a trois principales , d'un usage fréquent , soit dans les aliments , soit dans les remèdes ; savoir , la *laitue non pommée* , la *laitue pommée* , & la *laitue romaine* , nommée aussi *chicon*. Parmi les laitues sauvages , celle à *côte épineuse* est la plus en usage parmi nous.

La LAITUE NON POMMÉE , *Lactuca sativa non capitata* , est une plante potagere , qui étant blessée en quelqu'une de ses parties , donne un suc laiteux : sa racine est longue , épaisse & fibrée : ses feuilles sont larges , lissées , d'un verd-pâle , succulentes & agréables étant jeunes ; mais elles deviennent ameres quand la tige paroît : cette tige est ferme , cylindrique , feuillée , haute de deux pieds , branchue , portant en ses sommités de petites fleurs jaunes , qui sont des bouquets à demi-fleurons , auxquels succèdent de petites semences garnies d'aigrettes pointues , applaties & cendrées : c'est une des quatre petites semences froides.

La LAITUE POMMÉE , *Lactuca sativa capitata* , a les feuilles plus courtes , plus larges , plus arrondies à l'extrémité que la précédente , plattes & lissées , mais formant bientôt une tête arrondie de la même maniere que le chou : la graine en est noire.

Depuis quelques années , on sert en salade dans les grandes tables deux autres especes de laitue pommée , bien plus belles , & panachées de blanc , de pourpre & de jaune : on les appelle *laitue panachée de Silésie* , & *laitue de Batavia*.

Les Jardiniers , qui ont l'art de rendre crêpues , tendres & pommées plusieurs especes de laitues , savent aussi les faire blanchir en liant les feuilles par touffes avec de la paille , pendant qu'elles sont encore jeunes & tendres. On sème la laitue pommée pendant toute l'année dans les potagers ; on l'arrache quand elle est encore tendre , & on la transplante dans des terres bien fumées ; par ce moyen les feuilles deviennent plus nombreuses & mieux pommées.

Les laitues pommées étant séchées & brûlées à feu ouvert , furent de la même maniere que le nitre jetté sur les charbons ardents.

L'on donne le nom de *laitue crêpée* à celle dont les feuilles sont découpées , pliées & repliées comme un crêpe , & de couleur obscure.

La LAITUE ROMAINE , appelée CHICON , *Lactuca romana* , a des feuilles plus étroites & plus longues que les précédentes : elle n'est point ridée , ni bosselée , mais garnie en dessous le long de sa côte de petites pointes : sa fleur & sa tige sont semblables à celles de la laitue ordinaire : ses graines sont noires. Cette laitue est une des plus exquisés en potage ou en salade , sur-tout lorsque ses feuilles sont d'un jaune blanchâtre.

De tout tems les laitues ont tenu le premier rang parmi les autres plantes potageres : elles sont excellentes crues & cuites , & rendent le chyle bien conditionné. Elles sont rafraîchissantes , humectantes , laxatives , & conviennent aux jeunes gens ; elles augmentent le lait aux nourrices , & procurent un sommeil salutaire. Les Anciens ne mangeoient de la laitue qu'à la fin du repas , le soir , pour se procurer du sommeil ; mais dans le tems de Domitien , on changea cet ordre , & elles servoient d'entrée de table aux Romains.

Quelques-uns ont dit que l'usage des laitues rend les hommes impuissans & les femmes stériles : il est bien vrai , disent les Auteurs de la Matière Médicale , que cette sorte de plante n'excite pas les feux de l'amour , mais sans les détruire entièrement : ainsi , ajoutent-ils , quoiqu'on les conseille beaucoup pour réprimer le desir de la concupiscence à ceux qui vivent dans le célibat , néanmoins les gens mariés qui desirent d'avoir des enfans n'en doivent pas craindre l'effet.

La LAITUE SAUVAGE , *Lactuca sylvestris costâ spinosâ* , se trouve dans les haies , aux bords des chemins , dans les champs & vers les prés , même dans les vignes & les potagers : elle a une racine courte , des feuilles étroites , sinuées , très découpées , armées d'épines un peu rudes le long de la côte qui est en dessous , & très remplies de suc laiteux : d'ailleurs , elle est semblable aux autres laitues ; mais elle est plus amere , plus apéritive , & plus narcotique.

Toutes les especes de laitues ne se multiplient que de graine. Les Jardiniers nomment celle à coquille ou à feuille ronde , *laitue d'hiver*. Pour les faire lever promptement , on fait tremper la graine pendant vingt-quatre heures , & on la laisse sécher ensuite dans un lieu chaud ; puis en Février & Mars , on la sème fort dru sur une couche & dans des rayons qu'on a

faits avec un bâton : on la couvre légèrement de terreau , & on y met aussitôt des cloches. Au bout de dix à douze jours , ces laitues peuvent être mangées en salades. Si on en avoit un besoin plus pressant , on les pourroit faire croître de même en deux fois vingt-quatre heures. Il faudroit pour cela faire tremper la graine dans de l'eau-de-vie , & mêler dans le terreau un peu de fumier de pigeon avec un peu de poudre de chaux bien éteinte ; mais ces sortes de laitues ne durent que huit jours sur couche. Les *crêpes blondes* , sont des laitues de primeur ; elles se sement à la fin de Janvier : les autres especes se sement sur couche , ainsi que les précédentes , jusqu'en Avril ; & on les replante sur terre , quand elles sont assez fortes pour les faire pommer , dans des trous faits avec le plantoir & à un pied l'un de l'autre.

LAMANDA ou **ROI DES SERPENTS**. On donne ce nom à un magnifique serpent de Java , qui est long de sept à huit pieds , & d'une grosseur médiocre. Cet animal a des écailles cutanées , relevées d'une madrure si éclatante , & distribuée avec tant d'art , que la peinture n'a jamais pu en rendre toutes les beautés d'après l'original. La tête du lamanda est d'une longueur bien proportionnée ; son front est cendré , revêtu d'écailles rhomboidales , marquées d'une croix ponceau. Depuis les yeux , qui sont vifs & brillants , jusqu'au chignon du cou , on voit serpenter le long de chaque côté de la mâchoire supérieure & inférieure , une bande marbrée de bai brun : le derriere de la tête est fort joliment racheté : la gueule est toute garnie de dents aiguës & crochues. Le dessus du corps est superbe ; on y admire des especes d'armoiries & de couronnes différemment figurées & entrelacées ensemble. Ses écailles qui forment des losanges , sont tiquetées de différentes couleurs. Sa queue a une belle tache aurore : vers le trou de l'anus , on apperçoit au dedans une grosseur qui ressemble à un testicule. Les écailles transversales sont isabelles , ornées çà & là d'admirables mouchetures. On prétend que ce serpent ne vit gueres que d'oiseaux.

LAMBDA. Voyez **GAMMA DORÉ**.

LAMBIN. Quadrupede de l'Amérique , ainsi nommé à cause de la lenteur de sa marche. Voyez **PARESSEUX**.

LAMBIS. C'est , selon Labat , une espece de gros limaçon des mers de l'Amérique , dont tout le corps semble n'être qu'un boudin terminé en pointe & ouvert à l'autre bout par une bouche ronde & large , d'où il sort une membrane épaisse , qui sert à l'animal pour prendre sa nourriture , & pour se traîner , tant au fond de la mer , que sur les hauts fonds , où on le trouve ordinairement. La chair de cet animal est blanche & ferme ; plus l'animal est gros , plus elle est dure à cuire & de difficile digestion : elle ne laisse pas d'être grasse & d'avoir de la saveur.

La coquille de cet animal , qui a la forme de l'animal lui-même , & qui est parsemée d'un à deux rangs de pointes émoussées , se vend très bien dans le pays : elle sert de cor de chasse à plusieurs Nations sauvages. On en fait une chaux excellente , qui prend à la longue , étant mêlée avec du sable

de riviere , la durezza du marbre. Le défaut de cette coquille est d'être beaucoup plus dure à calciner que la plupart des autres coquilles dont on se sert aux Isles pour la même opération.

On trouve des lambis d'une grosseur énorme , il y en a qui pèsent plus de douze livres. Non-seulement les couleurs extérieures de cette coquille sont agréables , mais on ne trouve encore rien de plus beau , de plus poli , de plus lustré , que son émail intérieur.

Le lambis de plusieurs Conchyliologistes , est un *rocher* ou *murex*. Voyez ce mot.

LAMBOURDE. A Paris , les Tailleurs de pierre donnent ce nom à une pierre calcaire fort tendre , qui se trouve dans les environs de cette Capitale.

LAMBRUS. Voyez VIGNE SAUVAGE.

LAMENTIN ou LAMANTIN. Les Voyageurs & les Auteurs sont peu d'accord sur la description de cet animal. Presque tous ont confondu l'hypopotame , le phocas ou veau de mer , le lion de mer , l'ours marin , ainsi que la vache marine ou bête à la grande dent , avec le lamentin. Cet animal est le même que le *manati* : ce sont les Espagnols établis à l'Amérique qui lui ont donné ce dernier nom.

Le *lamentin* ou *manati* est un gros poisson , long de seize pieds & même plus , large de trois pieds & demi : sa tête est hideuse , l'ouverture des oreilles très petite , peu apparente ; mais il n'en a pas l'ouïe moins fine. Sa tête est couverte d'une peau dure & épaisse , garnie de poils courts , clairs , d'un cendré brun : ses yeux sont ronds , & très petits à proportion de la grandeur de l'animal. Il a deux mammelles placées à la poitrine , & deux pieds proche des épaules , qui ont la figure de vraies nageoires. Ray dit que si Diogene avoit connu le lamentin , il n'auroit pas eu besoin de plumer un coq pour avoir un bipede sans plumes , puisque le manati est un bipede sans plumes.

Le lamentin est vivipare & s'accouple à la maniere de l'homme : il a le membre génital fait comme celui du cheval , & les entrailles comme le taureau. Cet animal n'est point dangereux , il vient se nourrir d'herbes qu'il trouve sur le rivage , & entr'autres des feuilles des paletuviers.

Dans le Regne Animal , dit M. de Buffon , c'est ici que finissent les peuples de la terre , & que commencent les peuplades de la mer. Le *lamentin* , qui n'est plus quadrupede , n'est pas entierement *cétacée* : il retient des premiers deux pieds ou plutôt deux mains ; mais les jambes de derriere , qui dans les *phocas* & les *vaches marines* sont presque entierement engagées dans le corps , & raccourcies autant qu'il est possible , se trouvent absolument nulles & oblitérées dans le lamentin. Au lieu de deux pieds courts & d'une queue étroite , plus courte , que les *vaches marines* portent à leur derriere dans une direction horisontale , les lamentins n'ont pour tout cela qu'une grosse queue qui s'élargit en éventail dans cette même direction ; en sorte qu'au premier coup d'œil , il sembleroit que les premiers auroient une queue divisée en trois , & que dans les derniers ces

trois parties se feroient réunies pour n'en former qu'une seule : mais par une inspection plus attentive , & sur-tout par la dissection , l'on voit qu'il ne s'est pas fait de réunion ; qu'il n'y a nul vestige des os des cuisses & des jambes , & que ceux qui forment la queue des lamentins sont de simples vertebres , isolées & semblables à celles des cétacées qui n'ont pas de pieds : ainsi ces animaux sont cétacées par ces parties de l'arriere de leurs corps , & ne tiennent plus aux quadrupedes que par les deux pieds ou deux mains qui sont en avant à côté de leur poitrine.

M. de la Condamine , dans sa Relation de la Riviere des Amazones , dit avoir dessiné d'après nature , à Saint-Paul des Omaguas , à cinq ou six cents lieues de la mer , le plus grand des poissons d'eau douce qui soit connu ; que les Espagnols & les Portugais ont donné à ce poisson le nom de *Poisson-Bœuf* , & qu'il ne faut pas le confondre avec le phocas ou veau marin. Il ajoute , que sa chair & sa graisse ont assez de rapport avec celles d'un veau , qu'il n'a point de cornes , qu'il ne sort jamais entierement de l'eau , & que même il n'en peut sortir , parcequ'il n'a que deux nageoires assez près de la tête. Ces nageoires sont en forme d'aîlerons , elles ont seize pouces de long , & lui tiennent lieu de bras & de pieds ; il ne fait qu'avancer la tête hors de l'eau pour atteindre l'herbe sur le rivage : ceci prouve encore que le lamentin n'est point un animal amphibie , ni un quadrupede. Le sentiment du P. Labat se trouve appuyé de celui de M. de la Condamine. Cet Académicien dit que l'herbe dont ce poisson se nourrit , est longue de huit à dix pouces , étroite , pointue , tendre , d'un assez beau verd , & qu'il est aisé de voir quand ces animaux sont en pâture , parceque l'herbe qui leur échappe en marchant , ou en la coupant , vient au-dessus de l'eau.

M. de la Condamine a encore trouvé ce poisson dans l'Oyapoc , & dans plusieurs autres grandes rivières des environs de Cayenne , & de la côte de la Guyanne. On le trouve toujours éloigné de la mer : on le rencontre fréquemment dans les grandes rivières qui descendent dans celle des Amazones , comme dans le Guallaga , le Pasraça , &c. Il n'est arrêté dans l'Amazone , que par le Pongo de Borja : il ne boit que de l'eau douce.

Il y a des lamentins qui pèsent mille à douze cents livres. Ces animaux sont très timides , ils s'enfuient promptement dans l'eau dès qu'ils entendent le moindre bruit ; ce caractère est commun à tous les poissons qui sont sans défense. On les tue avec le javelot & autres instruments semblables. Les habitants des bords de l'Amazone & les François de Cayenne , trouvent sa chair d'un assez bon goût : les Flibustiers & la plûpart des Indiens de l'Isthme de Darien , n'ont souvent d'autre ressource pour vivre , que la chair du lamentin ; ils disent que la chair , prise depuis la moitié des côtes , jusques sous le ventre , ainsi que les mammelles , sont d'une grande délicatesse. Il arrive souvent à ce poisson de s'endormir ayant le muffle (qui dans quelques especes est prolongé par deux fortes dents) hors de l'eau ; c'en est assez pour le faire découvrir par les Pêcheurs , qui le harponnent ,

ponnent, & qui le tirent à terre, quand il a perdu la vie avec son sang. Les Negres sont fort adroits à cet exercice; dès qu'ils ont aperçu un lamentein, & qu'ils sont à portée de le pouvoir harponner, celui qui est sur l'avant du canot lui jette son harpon de toute sa force, & laisse filer la corde qui y est attachée: le poisson blessé s'enfuit; les Negres guidés par le bois flottant qui est au bout de la corde, le suivent; & s'il vient à portée, ils le dardent une seconde fois, afin d'accélérer la perte de son sang; souvent une heure suffit pour cela, ou deux tout au plus. Lorsque ce poisson est mort, il vient sur l'eau: les Negres le mettent dans leur canot avec une adresse singulière; ou si l'animal est trop gros pour la capacité de leur canot, ils lui passent une corde au-dessus de la queue, & l'amarrent à l'arrière du canot.

Comme on voit souvent le lamentein suivi de deux petits, il y a lieu de croire que sa portée est de deux par an. Il est rare qu'on manque de prendre les petits, lorsqu'on a pris la mere, à moins qu'ils ne soient déjà assez grands pour n'être plus allaités & pour s'enfuir. Il est certain que cet animal multiplieroit beaucoup plus qu'il ne le fait, s'il étoit plus en repos; mais il y a une quantité d'ichtyophages qui lui font une guerre continuelle, d'autant plus impunément, qu'il est peu armé.

On trouve le long de ce poisson une couche de lard de quatre ou cinq pouces d'épaisseur, ferme, & d'un aussi grand usage que celui du cochon: ce lard & la panne qui est dans le corps, étant fondus, font un très bon beurre qui ne roussit pas aisément.

La chair de cet animal est un aliment assez communément employé par une partie des habitants de la Guadeloupe, de Saint-Christophe, de la Martinique, & des autres Isles voisines, où l'on en apporte tous les ans de Terre ferme plusieurs navires chargés.

Il y a aussi des lamenteins dans le Nil, dans le Sénégal, à la Chine & en Canada. La peau de cet animal est assez épaisse pour être tannée; & lorsqu'elle est bien préparée, elle donne un cuir très fort. Quand on ne veut pas se donner cette peine, on en fait des courroies, & même des semelles de souliers très durables.

On trouve dans la tête du lamentein quatre pierres blanches, auxquelles le peuple de la Chine ou de l'Amérique attribue de grandes vertus.

LAMIE. C'est la plus grande espece de *chien de mer* ou de *requin* ou de *goulu de mer*: voyez REQUIN.

LAMINCOUARD. Arbre de la Guyane: il est de moyenne grandeur; son bois est quelquefois percé à jour. Il est très-bon pour faire des fourches ou poteaux à enfoncer dans la terre: il sert à cet usage à Cayenne faute d'autre. *Mais. Rust. de Cayenne.*

LAMPE SÉPULCHRALE. On trouve souvent en terre, à côté des anciens tombeaux, un vase funéraire fait en forme de lampe, lequel a contenu la matiere enflammée que l'on y avoit déposée comme hommage dû à la mémoire & aux mânes du défunt. On a débité bien des contes sur ces

lampes souterraines; on a prétendu qu'elles brûloient perpétuellement sans aucun secours étranger, c'est-à-dire, sans le renouvellement de la matiere inflammable, & dans des réduits inaccessibles à toute impression de l'air, &c. Ce qui a donné lieu à cette fable, est un certain tombeau que l'on voit dans la Crimée, à vingt pieds de profondeur dans un roc, où l'accès de l'air n'est pas interdit, & où de la pétrole, ou du naphte, distille continuellement dans la lampe dont la mèche enflammée est de fibres d'amiante, qui, comme l'on fait, est indestructible : voyez AMIANTE. Au reste ces lampes sépulchrales perpétuelles, tant vantées par quelques Auteurs, peu crues par quelques autres, viennent d'être remises en honneur (en 1756) à Naples par le Prince San-Severo.

LAMPROIE, *Lampetra*. Poisson de mer & de riviere mis au rang des poissons cartilagineux, qui nâge ordinairement en grande eau, qui léche & suce les pierres, les rochers & la surface intérieure des vases dans lesquels on l'enferme. La lamproie est très connue dans les poissonneries.

Ce poisson, long, gluant & cartilagineux, ressemble à l'anguille, excepté par la tête, qui est de figure ovale. Sa bouche n'est ni fendue, ni longue, ni très large; mais cavée comme celle des sangs-sues : elle est garnie de dents jaunes, très aiguës & menues, comme triangulaires & rangées sans ordre dans toute sa capacité. Son corps est rond, sa queue est menue & un peu large : la couleur du corps est d'un jaune tirant sur le verd, marqueté çà & là de taches & de points noirs. Son ventre est blanc; le dos est semé de taches bleues & blanches; la peau est lisse, ferme & dure. Cette surface du corps est visqueuse, c'est-à-dire, couverte, au lieu d'écaillés, d'une bave très gluante : on voit souvent, au travers de la peau, les vaisseaux d'où sort l'humeur qui sert à lubrifier tout le corps. De chaque côté du corps, la lamproie a sept trous ronds, qui lui servent d'ouies. Entre les yeux, au plus haut & au milieu de la tête, elle a un conduit jusqu'au palais, par lequel elle attire & rejette l'eau, comme les poissons qui ont des poumons. Elle nâge au-dessus de l'eau; & on l'étoufferoit aisément, si on la tenoit par force sous l'eau. Ses yeux sont ronds & profonds : elle n'a ni langue ni nâgeoires; les replis de son corps lui servent à nâger; & deux especes de petites aîles, l'une placée sur le bout de sa queue, l'autre un peu plus haut, lui servent à fendre l'eau. Son cœur est enveloppé dans un cartilage, auquel le foie est attaché : ce foie est bleu, peu tacheté & sans fiel. Depuis la bouche jusqu'à l'anus, ce poisson n'a qu'un conduit, long, étroit par les deux bouts, & large au milieu. Au lieu d'arrêtes, la lamproie a sur l'épine du dos un cartilage en forme de corde, dans lequel il y a de la moëlle.

La lamproie entre au printems dans les rivières pour y déposer ses œufs, & s'en retourne ensuite dans la mer : c'est le tems qu'on en pêche beaucoup, car dans la mer on en prend peu. Ce poisson vit d'eau & de bourbe. Quand il a jetté ses œufs, il devient sec & dur : il ne vit ordinairement que deux ans : sa chair est assez molle, un peu gluante & excrémenteuse.

La lamproie mâle est préférée à la femelle dans les aliments : on doit les prendre dans des eaux vives.

Les Ichthyologistes ont fait mention d'autres especes de lamproie ; savoir, 1°. la *petite lamproie d'eau douce*, qui a, outre les grandes dents ordinaires, une autre petite rangée en haut, & située dans le fond de la bouche. Cette lamproie est longue & étroite ; le dos est brun & rouge ; le ventre blanc : on la pêche dans l'Elbe vers le Carême : soit frais, soit fumé, c'est un bon manger : dans un autre tems, la chair en est plus sèche. 2°. Une très *petite lamproie d'eau douce*, qui est commune en Suède, & qui est à peine de la grosseur d'un ver : sa longueur est d'un pied & demi. 3°. La *grande lamproie*, ou la *lamproie de mer* : celle-ci change de nom, suivant son âge & sa grandeur : son foie est verd. On en trouve dans l'Elbe qui pèsent trois livres : elles rentrent dans la mer avec les saumons. On doute que le formidable ver du Gange, qui est si long, & de couleur bleue, soit une espece de *lamproie*.

M. de la Condamine dit qu'il y a dans la riviere des Amazonés, des lamproies qui ont la même propriété que la torpille : celui qui touche une de ces lamproies avec la main ou avec un bâton, ressent un engourdissement douloureux dans le bras, & quelquefois, dit-on, il en est renversé. M. de Réaumur a développé le ressort caché qui produit cet effet surprenant dans la *torpille*. Voyez ce mot & l'article ANGUILE TREMBLANTE.

La lamproie n'est point *vivipare*, comme quelques-uns l'ont cru : elle est *ovipare*. Ce poisson s'attache si fortement aux rochers & aux navires, qu'il n'est pas possible de l'en arracher ; c'est pourquoi quelques-uns l'ont nommé *sang-sue de mer* ou *faux remora*.

On donne aux petites lamproies le nom de *lamproyons* : elles ne sont pas plus grosses qu'un ver de terre ; on en vend beaucoup à Toulouse sous le nom de *chatillons*, & à Rouen sous le nom de *sept-œil*.

La lamproie est meilleure à manger dans le printems que dans aucun autre tems : sa chair nourrit beaucoup & augmente l'humeur féminale ; mais elle est pesante & pernicieuse à ceux qui ont le genre nerveux foible : les vieillards doivent en user bien sobrement. La graisse de la lamproie est émolliente & adoucissante : on en frotte le visage & les mains de ceux qui ont la petite vérole, pour empêcher qu'il n'y reste des marques.

On a aussi appelé la lamproie, *Murène de riviere*. Voyez MURÈNE.

La lamproie est sujette à une maladie singulière : ce sont des insectes qui s'attachent à ses yeux. Muralto dit que ces insectes ont deux pieds, longs & ronds, avec des nœuds, & des pointes blanches & luïfantes : leur ventre est épais, ponctué & rond, mais plat comme celui des punaises. Des deux côtés de la tête sortent deux especes de bras, qui soutiennent un œil fort transparent & convexe. Outre cet œil, Muralto a observé à la tête de ces insectes deux autres yeux noirs, une petite barbe & une gueule fort large. L'œil que les bras soutiennent (& qui n'est peut-être

qu'un fuçoir) est fortement attaché à l'œil de la lamproie ; en forte que ces insectes semblent fucer l'humeur des yeux des lamproies , & les aveuglent.

LAMPSANE ou **HERBE AUX MAMELLES**, *Lampsana*. C'est une plante qui ressemble un peu au laitron , & qui croît communément dans les jardins & les vergers, le long des champs & sur le bord des chemins : sa racine est simple, blanche & fibrée : sa tige est haute d'environ trois pieds, ronde, cannelée, rougeâtre, un peu velue & creuse : ses feuilles ressemblent assez à celles du laitron des murailles : ses fleurs naissent aux sommets des branches, formées en bouquets ronds, à demi-fleurons jaunes : il leur succede des capsules cannelées, remplies de menues graines, noirâtres, un peu courbées & sans aigrettes.

Cette plante est toute d'usage : elle est rafraîchissante, laxative & émolliente : son suc guérit la galle, & particulièrement le bout du sein quand il est fendu ou écorché ; c'est ce qui lui a fait donner le nom d'herbe aux mamelles.

LAMPYRIS. Ray donne ce nom à un insecte sans aîles, & qui est la femelle d'une espece de mouche cantharide. Il est composé d'onze anneaux ; sa tête est petite. Tant que cet animal vit, les trois derniers de ses anneaux jettent la nuit des rayons de lumière, qui facilitent à son mâle les moyens de la venir trouver. C'est une espece de ver-luisant : on le trouve sur terre l'été dans les genevriers. *Voyez* ce que nous avons dit à l'article **VER-LUISANT**.

LANCEOLE ou **LANCELÉE** : *voyez* à l'article **PLANTAIN**.

LANCERON. Nom qu'on donne au brocheton : *voyez* **BROCHET**.

LANDES. *C'est un nom qui se trouve dans la remarque sur les JONCS.* On appelle ainsi des solitudes hérissées, c'est-à-dire, des terres qui ne produisent que du genêt, du jonc marin, de la fougere, du houx, de la bruyere, des ronces & quelques genievres. En Provence, les landes sont couvertes de peu de plantes épineuses ; elles sont toujours ornées de marjolaine, de mélisse, de lavande ; de véronique, de betoine, de fauge, de thym, même de jasmin, &c. Ces landes, toutes sauvages, toutes brutes qu'elles sont, ont encore leurs usages. On brûle ces plantes vers la fin de l'été, ou dès qu'elles sont desséchées : leur cendre bonifie la terre, & le feu empêche le rejet des racines : mais on doit veiller à empêcher la communication du feu, en nétoyant les chaumes & toute l'herbe du côté de l'endroit où l'on craint que le feu ne communique, en choisissant un tems calme, & en faisant quelques tranchées. Ces plantes étant brûlées, on arrache à la pioche les racines des arbrustes ; & après les pluies d'automne on laboure ce terrain avec une charrue à versoir & à gros sillons : on donne un second labour au printemps, & on peut alors y semer de l'avoine : la seconde année on doit lui donner trois bons labours, si on veut y semer du bled, & la troisième elle produira une bonne récolte.

Combien de terrains en friche dans la Bretagne, dans la Guyennè, dans

la Provence, dans le Dauphiné, &c. pourroient être défrichés, écobués & rendus fertiles par une semblable opération ! J'avoue que les landes qui sont sablonneuses, caillouteuses & pleines de tourbieres de *mica*, arides, noirâtres, &c. ne sont pas propres à être défrichées pour les semailles : mais n'y a-t-il pas d'autres productions qu'on en pourroit tirer, & que faute de connoissances directes ou locales, on se trouve dans la nécessité d'acheter de l'Etranger ?

« Lorsque nous avons parcouru les terrains de chaque Province de ce Royaume, nous les avons examinés avec toute l'attention convenable, même par la voie de l'analyse. De retour à Paris, nous avons rendu compte verbalement aux Ministres du précis de nos observations ; nous attendons maintenant des ordres qui nous mettent en état d'exposer plus au long ces détails importants, ainsi que ceux qui ont quelque rapport aux Arts & aux Métiers, ou à la construction & entretien des grands chemins, &c.

LANERET. C'est le mâle du *Lanier* : voyez ce mot.

L'un & l'autre sont des oiseaux de proie, qui tiennent constamment la perche. Le laneret vole pour la corneille, pour le courlis, &c.

LANGOUSTE, *Locusta marina*. Des Auteurs ont donné ce nom à la sauterelle de mer, à l'hippocampe ou petit cheval marin, & à une espece d'écrevisse ou cancre. Voyez ces mots.

La langouste, proprement dite, ou sauterelle de mer, est un crustacée couvert d'une carapace peu dure : il a deux longues antennes, qui sont garnies d'aiguillons à leur base, & deux autres antennules au-dessous, plus déliées & plus courtes : son dos ou corselet est rude & plein de crêtes : c'est un cancre ou écrevisse de mer, qui n'a point de pinces comme les autres crustacées. Voyez les mots CANCRE, GRABE, ECREVISSE, HOMMAR, &c.

Les langoustes vivent dans les lieux pierreux ; elles sont communes dans la Méditerranée. Pendant l'hiver elles cherchent l'embouchure des rivières, & dans l'été elles se retirent ailleurs. Pline dit qu'elles se battent entr'elles avec leurs cornes.

LANGUE. Nous n'entendons point faire ici mention de cet organe, qui chez tous les animaux est le siège du goût (voyez ce que nous en avons dit à l'article des Sens, à la suite du mot HOMME), mais de plusieurs plantes, dans lesquelles les Anciens ont cru trouver quelque ressemblance avec la langue des animaux dont elles portent le nom françois ou grec. C'est ainsi que l'on donne à la buglose, le nom de *langue de bœuf* ; à l'hippoglose, celui de *langue de cheval* ; à la cynoglose, celui de *langue de chien* ; à l'ophioglose, celui de *langue de serpent* ; à la scolopendre, celui de *langue de cerf*. Voyez chacun de ces mots.

LANGUE DE CERF, ou SCOLOPENDRE VULGAIRE, *Lingua cervina*. Plante qui naît dans les puits & les fontaines, dans les fentes des pierres, sur les rochers humides & autres lieux ombrageux : ses racines sont capillaires, noirâtres, nombreuses, entrelacées avec les queues des

vieilles feuilles: elles poussent huit à dix feuilles, longues de dix pouces ou environ, oreillées à leur naissance, pointues à leur extrémité, d'un verd gai, lisses, & portées sur une queue très longue, terminée par une côte qui regne dans le milieu de la feuille. Il semble que cette plante n'ait point de fleurs; mais elle porte plusieurs capsules dans des sillons feuillés & rousâtres, qui se trouvent sur le dos des feuilles. Quoique ces capsules soient très petites, cependant on les découvre facilement par le moyen du microscope: elles sont munies chacune d'un anneau élastique, lequel en se contractant ou en se séchant, ouvre la capsule, de laquelle il sort beau coup de semences menues comme de la poussière.

Cette plante est d'un goût acerbe, & répand une odeur herbeuse: elle est un peu astringente, & convient pour le gonflement de la rate, le cours de ventre, le crachement de sang: on a coutume de la joindre aux autres plantes capillaires dans des bouillons béchiques & vulnéraires. Les Anglois en mêlent dans leur *posset*, pour arrêter les mouvements convulsifs.

Le *posset* des Anglois est fait ainsi: on verse douze onces de vin blanc dans deux livres de lait bouillant, édulcoré avec une demi-once de sucre en poudre.

On donne le nom de *scolopendre vraie*, au *ceterach*: voyez ce mot.

LANGUE DE CHIEN: voyez CYNOGLOSE.

LANGUE DE SERPENT, ou LAMIODONTES: voyez GLOSSOPÊTRES. On donne aussi le nom de *langue de serpent* à l'herbe sans couture: voyez OPHIOGLOSSE.

LANGUETTE, *Lingula*. C'est un poisson des Indes, qui a le corps & la tête jaunes: il est armé de six ou sept aiguillons sur le dos, à la suite desquels est une forte nageoire qui se replie vers la queue, & au-dessous du ventre: il y a un aiguillon entre ses nageoires, dont les premières sont contre ses ouies. Les Chinois mettent ce poisson au nombre des mets délicieux.

LANIER: voyez à l'article FAUCON.

LANSON. Petit poisson de mer, dont les morues sont friandes, & qui sert d'appas pour les pêcher.

LAPEREAU. C'est un petit lapin de l'année: voyez plus bas au mot LAPIN.

LAPIN, *Cuniculus*. Animal quadrupède, connu & commun dans toute l'Europe. On nomme sa femelle *lapine* ou *hase*; & ses petits, *lapereaux*. Ces animaux habitent ordinairement sur les montagnes, où ils se creusent des terriers. Ils s'appriivoient aisément; on en nourrit de domestiques, que l'on nomme vulgairement *lapins de clapiers*. Ces derniers varient pour les couleurs, comme tous les animaux domestiques; le blanc, le noir & le gris sont cependant les seules qui entrent ici dans le jeu de la Nature. Les lapins noirs sont les plus rares, mais il y en a beaucoup de tout blancs; ceux-ci ont les yeux rouges: on en voit beaucoup de tout gris, & beaucoup de mêlés; enfin, il y en a dont le poil est d'un petit gris fort

joli, où d'un gris argenté, qu'on nomme *riches*, & dont les peaux sont fort recherchées pour les fourrures. Les lapins d'Angora ne diffèrent des autres lapins domestiques, que par la qualité de leur poil, qui est beaucoup plus long, comme le poil des chevres d'Angora est beaucoup plus long que celui des chevres communes. Ce poil de lapin d'Angora est onduoyant, & même frisé comme de la laine; il a quelquefois deux ou trois pouces de longueur: dans le tems de la mue il se pelotonne & rend l'animal difforme. La couleur de ces lapins varie comme celle des autres lapins domestiques.

Le lievre & le lapin, dit M. de Buffon, quoique fort semblables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ne se mêlant point ensemble, sont deux especes distinctes & séparées. M. de Buffon a fait élever des lapins avec des baises de lievre, & des lievres avec des lapines; mais ces essais n'ont rien produit, & lui ont seulement appris que ces animaux, dont la forme est si semblable, sont cependant de nature assez différente pour ne pas même produire des especes de mulers: ces animaux, mêlés ensemble, deviennent ennemis, & il regne entr'eux une guerre continuelle. On a cependant eu des preuves, que, malgré la résistance de la femelle, le mâle s'étoir satisfait; mais il n'en a rien résulté.

La fécondité du lapin est encore plus grande que celle du lievre. On voit les lapines domestiques donner des petits tous les mois, & des portées de neuf, dix, onze, qu'elles allaitent pendant vingt-un jours, sans cesser d'être pleines. Elles ont une double matrice, comme la femelle du lievre, & peuvent par conséquent mettre bas en deux tems. Les lapins multiplient si prodigieusement dans les pays qui leur conviennent, que la terre ne peut fournir à leur subsistance; ils détruisent les herbes, les racines, les grains, les fruits, les légumes, & même les arbrisseaux & les arbres; & si l'on n'avoit pas contr'eux le secours des furets & des chiens, ils feroient désertir les habitants de ces campagnes. Il y a des gens, qui, pour écarter les lapins de leurs vignes, lorsqu'elles sont en bourgeons, & de leurs bleds pendant qu'ils sont en herbe, fichent en terre, le long des bords de la piece, à six pieds l'un de l'autre, de petits bâtons souffrés, auxquels ils mettent le feu; les lapins qui haïssent l'odeur du soufre, n'approchent point de la piece ensoufrée. Comme cette odeur dure quatre ou cinq jours, il n'y a qu'à recommencer jusqu'à ce que le bourgeon de la vigne & le bled soient hors de danger.

Non-seulement le lapin s'accouple plus souvent, & produit plus fréquemment & en plus grand nombre que le lievre; mais il a aussi plus de ressource pour échapper à ses ennemis. Les trous qu'il se creuse dans la terre, où il se retire pendant le jour, & où il fait ses petits, le mettent à l'abri du loup, du renard & de l'oiseau de proie; il y habite avec sa famille en pleine sécurité; il y élève & nourrit ses petits jusqu'à l'âge d'environ deux mois; & il ne les fait sortir de leur retraite, pour les amener au dehors, que quand ils sont tout élevés: il leur évite par-là tous les inconvé-

nients du bas âge pendant lequel, au contraire, les lievres périssent en plus grand nombre, & souffrent plus que dans tout le reste de leur vie.

Cela seul suffit aussi, dit M. de Buffon, pour prouver que le lapin est supérieur au lievre par la sagacité. Tous deux sont conformés de même; & pourroient également se creuser des retraites: tous deux sont également timides à l'excès; mais l'un, plus imbécille, se contente de se former un gîte à la surface de la terre, où il demeure continuellement exposé; tandis que l'autre, par un instinct plus réfléchi, se donne la peine de fouiller la terre & de s'y pratiquer un asyle; & il est si vrai que c'est par sentiment qu'il travaille, que l'on ne voit pas le lapin domestique faire le même ouvrage; il se dispense de se creuser une retraite, comme les oiseaux domestiques se dispensent de faire des nids; & cela, parcequ'ils sont également à l'abri des inconyénients auxquels sont exposés les lapins & les oiseaux sauvages. L'on a souvent remarqué, que quand on a voulu peupler une garenne avec des lapins clapiers, ces lapins & ceux qu'ils produisoient, restoient, comme les lievres, à la surface de la terre; & que ce n'étoit qu'après avoir éprouvé bien des inconyénients, & au bout d'un certain nombre de générations, qu'ils commençoient à creuser la terre pour se mettre en sûreté. Dans le dernier débordement de la Loire, qui a noyé une quantité de gibier étonnante, on a observé que plusieurs lapins, prêts à être submergés, avoient eu l'instinct de grimper sur les arbres, de l'écorce desquels ils ont vécu uniquement, jusqu'à ce que les eaux se fussent retirées. Au reste, cette observation n'est pas nouvelle, & elle a été faite plus d'une fois dans des inondations.

Les femelles, quelques jours avant que de mettre bas, se creusent un nouveau terrier, non pas en ligne droite, mais en zigzag, au fond duquell elles pratiquent une excavation; après quoi elles s'arrachent sous le ventre une assez grande quantité de poils, dont elles font une espece de lit, pour recevoir leurs petits. Pendant les deux premiers jours elles ne les quittent pas, elles ne sortent que lorsque le besoin les presse, & reviennent dès qu'elles ont pris de la nourriture; dans ce tems elles mangent beaucoup & fort vite: elles soignent ainsi & allaitent leurs petits pendant six semaines. Jusqu'alors le pere ne les connoît point; la mere a eu soin de lui en dérober la connoissance, parcequ'il les tue, ou leur dévore les testicules, soit par jalousie, soit pour jouir de la mere. Il n'entre point dans ce terrier séparé qu'elle a pratiqué; souvent même quand elle en sort, & qu'elle y laisse ses petits, elle en bouche l'entrée avec de la terre détrempee de son urine: mais lorsqu'ils commencent à être plus forts, & à manger l'herbe que la mere leur apporte, le pere semble les reconnoître, il les prend entre ses pattes, il leur lustre le poil, il leur léche les yeux; & tous, les uns après les autres, ont également part à ses soins: dans ce même tems la mere lui fait beaucoup de caresses, & souvent devient pleine peu de jours après.

Ces animaux vivent huit ou neuf ans: ils courent très vite, ont l'ouïe
très

très fine , & on prétend qu'ils ont la propriété de ruminer. Comme les lapins passent la plus grande partie de leur vie dans les terriers , où ils sont en repos & tranquilles , ils prennent un peu plus d'embonpoint que les lievres. On les engraisse encore beaucoup en les châtrant , opération très facile , & qui réussit à merveille. Leur chair est blanche , au lieu que celle du lievre est noire , & elle en differe beaucoup par le goût. La chair des jeunes lapereaux est très délicate ; mais celle des vieux lapins est toujours sèche & dure : on préfere le lapin sauvage au domestique , il a une saveur plus relevée & plus agréable. On chasse le lapin à l'affut , au chien & au fusil.

M. Briffon dit que le lapin d'Europe & celui d'Angora sont du genre du lievre ; mais que le lapin de Java , l'agouty , le lapin d'Amérique , le pak , le lapin de Norwege , le lapin d'Allemagne , ceux des Indes & du Bresil sont un genre particulier : il dit que le caractère de ce genre est d'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire , & point de dents canines ; d'avoir les doigts onguiculés , & la queue très courte ainsi que les oreilles.

Les peaux de lapins d'Amérique & de Tabago ont une odeur agréablement musquée ; ce qui les fait beaucoup rechercher pour les fourrures. Aujourd'hui on a trouvé le moyen de filer le poil du lapin ; on y joint un peu de soie pour en faciliter l'opération : si l'on parvenoit à multiplier dans nos climats l'espece de lapin d'Angole , on pourroit se passer d'y joindre de la soie , son poil étant long , souple & comme soyeux. Les vêtements ou especes d'étoffes de différentes couleurs , faites de poil de lapin , & que l'on commence à porter en France , font déjà espérer beaucoup de succès , l'étoffe étant belle , légère & chaude. Pour ce qui regarde le lapin de Norwege , *Voyez LEMING.*

LAPIS LAZULI. Est une pierre bleue , que quelques Lithologistes ont décrite sous les noms de *jaspe bleuâtre* , de *pierre d'azur* , d'*azul* ou d'*azur oriental*. C'est une espece de pierre de roche , composée de quartz , quelquefois d'une espece de spath fusible , mêlé de paillettes ou de mica jaune ou d'or , ou de grains pyriteux , & d'une partie métallique bleuâtre , que les expériences de M. Margraff démontrent être dues au fer. *Voyez notre Minéralogie , premiere Partie , pag. 208.*

Le lapis lazuli est très dur , presque réfractaire au feu , pesant , opaque , d'un bleu vif , plus ou moins foncé , susceptible d'un beau poli , se cassant en morceaux irréguliers , vitreux dans les fractures , & faisant souvent feu avec le briquet.

Cette pierre nous vient de l'Asie en morceaux de diverses grosseurs & informes : on la trouve en Perse & à Golconde. C'est une matiere chere dans le commerce : on choisit celle qui est la plus pesante , la moins chargée de raies blanches , d'un bleu formé , étendu & vif , afin que les bijoux que l'on en fait , présentent une surface totalement bleue : on en rencontre aussi en Suede , en Prusse , en Bohême & en Espagne ; mais qui est si tendre , qu'à peine peut-on le polir.

Comme la couleur bleue de cette pierre est de la plus grande beauté, & qu'elle ne s'altère que peu ou point du tout, ni à l'air ni au feu, des Ouvriers intelligents ont trouvé le moyen d'en extraire cette partie colorante pour l'usage de la peinture. Cette poudre précieuse est connue sous le nom d'*outre-mer*. Le procédé en est décrit dans presque toutes les Minéralogies.

LAQUE ou LAC, ou RÉSINE-LACQUE. *Voyez* à la suite de l'article FOURMI. A l'égard du lac de la Chine, *voyez* ARBRE DU VERNIS.

LAQUE. *Voyez* RAISIN D'AMÉRIQUE.

LARD. Est une espèce de graisse. *Voyez* l'article du SANGlier & le mot GRAISSE.

LARE. Nom donné aux *mouettes*. *Voyez* ce mot.

LARIX. *Voyez* MELESE.

LARME DE JOB, *Lachryma Job*. Est une plante arondinacée, que l'on cultive dans les jardins, particulièrement en Candie, en Syrie; & dans les autres pays orientaux: souvent elle y vient d'elle-même, ce qu'elle ne peut faire dans les climats froids. Ses racines sont fibreuses, noueuses & longues: ses feuilles sont semblables à celles du bled de Turquie, longues d'un pied & demi. Il sort des aisselles de ses feuilles de petits pédicules, qui soutiennent chacun un nœud qui contient l'embryon du fruit: il part de ces nœuds des épis de fleurs à étamines, renfermés dans un calice à deux balles sans barbe. Ces fleurs sont stériles; car les embryons naissent dans les nœuds, & deviennent chacun une graine unie, luisante, jaunâtre avant la maturité, rougeâtre quand elle est mûre, très dure, & de la grosseur d'un pois chiche. Cette graine est composée d'une coque dure, ligneuse, & d'une amande farineuse, enveloppée d'une membrane fine: on mange cette graine à la Chine. On voit quelquefois des chapelets faits avec les coques de ce fruit.

LARME DE VIGNE. Nom qu'on donne à la liqueur qui distille naturellement goutte à goutte dans le printems, des sommités ou sarments de la vigne en seve, après qu'elle a été taillée: on prétend que cette eau est bonne pour les maux des yeux & des reins, & qu'un verre de ces larmes rappelle les sens d'un homme ivre.

Le nom de *larmes* se donne aussi aux fucs gommeux ou résineux qui se coagulent en distillant des arbres qui les produisent. On dit larmes de sapin, larmes de mastich, larmes de lierre, &c. *Voyez* l'article GOMME & celui de RÉSINE.

LARVE, *Larva*. Les Naturalistes désignent par ce nom les insectes à métamorphoses, lorsqu'ils sont dans leur premier état au sortir de l'œuf; par exemple la chenille est en ce sens la *larve* du papillon: cependant le mot *larve*, qui signifie *masque*, convient mieux à la fausse chenille & au ver qui se métamorphose. C'est dans l'état de larve que l'insecte grossit & mange beaucoup. Le ver du hanneton est une véritable larve.

LASER, *Laserpitium*. Est une espèce de plante férulacée, qui croît en Provence aux environs de Marseille: elle est hystérique, vulnérable, car-

minative, & propre à résister au venin. On prétend que cette plante a fourni autrefois de l'*assa fœtida*, qui étoit fort estimé des Romains. Le lieu natal du *laser* est la Perse. On ne trouva sous Neron, dans toute la Province Cyrenaïque, qu'une seule plante de *laserpitium*, qu'on envoya à ce Prince sous le nom de *silphium*. Voyez ce mot.

LATANIER ou **BACHE**, ou **PALMIER EN EVENTAIL**, *Palma Dactylifera radiata major, glabra*. Est un arbre des Isles Antilles, qui s'élève fort haut; quoiqu'il ait peu de grosseur. Son bois a la dureté du fer; mais il n'a pas plus d'un doigt d'épaisseur; & tout l'intérieur n'est qu'une sorte de filasse ou de moëlle. Ses feuilles qui pendent en petit faisceaux au sommet des rameaux, sont plates & en forme d'éventail. En naissant, c'est un éventail fermé; épanouies, c'est un éventail ouvert, excepté que les bouts sont pointus & séparés. Les habitants s'en servent pour couvrir leurs cabanes; ils en font aussi des parasols & divers autres ouvrages. Les Sauvages lient deux ou quatre de ces feuilles ensemble; savoir deux dessus & deux dessous: dans le milieu ils mettent des poissons attachés par la queue, qu'ils exposent au feu pour les conserver. Les Maillés font un grand cas de cette sorte de palmier; ils en mangent le fruit qu'on appelle *pomme de bache*: ils tirent un fil des feuilles pour faire leurs hamacs: d'autres Indiens font des lances de son bois, & en arment la pointe de leurs flèches. On prétend qu'on feroit d'excellents aqueducs du tronc des lataniers: à Cayenne on est même dans l'usage de le fendre & de le vider de sa moëlle pour en faire des gouttieres.

LAVAGNE. Nom donné à une pierre fissile, qui se tire d'un lieu nommé *Lavagne* sur la côte de Gênes, & qui s'emploie pour couvrir les maisons & pour faire du pavé. La grandeur, l'épaisseur & la qualité de certains morceaux, la rendent propre à recevoir la peinture: on y peint de grands tableaux.

LAVANDE, *Lavandula*. Les parties de la fructification des *Stæchas* sont tout-à-fait semblables à celles des lavandes. Ces plantes ont les mêmes propriétés; & la seule différence ne consistant qu'en ce que les fleurs des lavandes viennent par épis, & celles des *stæchas* en forme de tête, ces plantes ont été mises, par M. Linnæus, sous le même genre; cependant nous ne parlerons du *stæchas* qu'à son article.

La lavande est une sorte d'arbruste qui pousse des tiges dures, ligneuses, quarrées, à la hauteur de deux ou trois pieds. Ses tiges sont chargées dans toute leur longueur de feuilles longues & étroites, blanchâtres, & terminées par des épis de fleurs labiées. Toutes les parties de la plante ont une odeur aromatique & agréable. La lavande porte des fleurs labiées; aux fleurs succèdent quatre semences, qui n'ont pour enveloppe que le calice, au fond duquel elles se trouvent. On distingue plusieurs espèces de lavande, dont les unes, comme la *lavande d'Espagne*, ont les feuilles blanches; d'autres, comme la *lavande femelle*, ont les feuilles étroites; d'autres les feuilles larges, telle que celle que l'on nomme la *lavande mâle*, le

spic, l'*aspic*, ou *nard commun*, la *lavande à feuilles d'olivier*; enfin les lavandes que l'on nomme *stæchas*, dont les fleurs sont ramassées en tête. Voyez STÆCHAS.

La lavande est une plante fort belle dans le mois de Juin, quand elle est chargée de ses épis de fleurs bleues ou blanches, qui répandent une odeur très agréable. Cette plante n'est point délicate; elle vient par-tout, & elle se multiplie par drageons enracinés. Elle vient d'elle-même dans le Languedoc; dans ce pays-ci on n'en cultive que dans les jardins. Il est bon de transplanter les gros pieds tous les trois ou quatre ans.

Toute cette plante passe pour résolutive, céphalique, anti-hystérique. Les fleurs & les feuilles excitent puissamment la salivation, quand on les tient dans la bouche, & qu'on les mâche; c'est pourquoi on les emploie utilement dans les maladies soporeuses, dans les catarrhes, &c. Ces fleurs rendent beaucoup d'huile essentielle, d'une bonne odeur. Pour avoir de l'esprit de lavande très agréable, il faut mêler de l'huile essentielle de cette plante, très rectifiée & nouvellement distillée, avec de bon esprit-de-vin, & y ajouter une petite quantité de stîrax ou de benjoin. On ne doit faire usage de l'esprit de lavande, ainsi que de tous les remèdes aromatiques, que d'une manière très modérée; car leur usage allume le sang, & fait que les parties solides étant trop irritées, s'échauffent & s'enflamment. L'eau de lavande ou de mélisse prise intérieurement, est spécifique pour la perte de la parole, causée par des indigestions ou des surcharges d'estomac. Ces mêmes eaux, ou l'huile essentielle de romarin, présentées au nez, relevent des foiblesses ou syncopes, & sont souveraines pour l'apoplexie séreuse.

On retire de l'espece de lavande que l'on nomme *aspic*, une huile essentielle fort inflammable, & d'une odeur pénétrante, que l'on nomme *huile d'aspic*: on la recommande comme vermifuge; les Peintres en émail en font aussi usage. Les mites, les poux, & d'autres insectes ont en aversion l'odeur de cette huile; c'est pourquoi elle est très bonne pour les chasser & pour les faire mourir. On nous apporte l'huile distillée d'aspic & de lavande, de la Provence & du Languedoc; mais elle est souvent falsifiée & mêlée avec de l'esprit-de-vin ou de l'huile de térébenthine ou de ben. On découvre aisément ces falsifications; car si l'on jette dans de l'eau commune celle qui est mêlée avec de l'esprit-de-vin, ce dernier se mêle parfaitement avec l'eau, & l'huile surnage. Pour connoître celle qui est mêlée avec l'huile de térébenthine, ou quelqu'autre huile, il faut en brûler un peu dans une cuiller de métal. Si elle est pure, elle donne une flamme subtile, une fumée d'une odeur qui n'est pas désagréable, & en petite quantité; au lieu que c'est tout le contraire lorsqu'elle est falsifiée. Voyez à l'article HUILE.

LAVANDIERE ou HOCHÉ-QUEUE. Voyez BERGERONNETTE.

LAVARET, *Lavaretus*. Poisson de riviere à nageoires molles, & qui tient un peu du saumon & de l'aloise: il est long d'environ un pied, gros comme le poing, & couvert d'écailles blanches, argentines, tendres,

sans taches , mais toujours très propres. Sa tête est oblongue : il est camus , & sans dents ; il a deux nageoires près des ouies. Sa queue est fourchue & noire au bout : il fraie en automne. Sa chair est molle , blanche , un peu glutineuse , très agréable au goût. Ce poisson est assez connu dans les poissonneries de Lyon : on en sert sur les tables , comme un mets délicieux & de bon suc. On en pêche beaucoup dans le lac du Bourget & d'Aigue Bellette en Savoie.

LAVERT. Est un insecte très incommode à la Louisiane dans les bâtimens faits de bois. Ce petit animal , dont les chats sont extrêmement friands , est large d'environ neuf lignes , long d'un pouce , & d'une ligne d'épaisseur : il passe par la plus petite fente , & se jette sur les plats , quoique couverts , sur-tout la nuit , dans les garde-mangers. Quand le terrain où l'on s'établit est un peu défriché , on n'en voit plus du tout.

LAVES. Nom que l'on donne à des matieres de volcans , telles que les différentes especes de *ponce* , la *Pierre du Vésuve* ou de *Naples* , la *porzolan* , la *Pierre obsidienne* ou de *gallinace* , les *scories de volcans* , &c. Toutes ces matieres ont été , les unes calcinées , d'autres à demi-fondues , & d'autres totalement vitrifiées ; ce qui fait qu'il y en a de compactes & d'un tissu continu ; d'autres qui sont poreuses , tendres , legeres , ou qui sont dures & susceptibles du poli : celles qui sont poreuses & legeres nagent sur l'eau ; celles qui sont pesantes & non poreuses vont au fond de l'eau. Celle dont on se sert à Naples pour paver les rues , & dans la construction des édifices , est une lave fort compacte & très solide.

La plupart des laves ont probablement été dans un certain état de fluidité pour pouvoir couler , & prendre les différentes formes tortueuses qu'on leur reconnoît. On trouve des laves courbées , & composées de plusieurs couches , plus ou moins grandes & plus ou moins pesantes , de couleur tantôt noirâtre ou rougeâtre , tantôt blanchâtre ou jaunâtre , tachetées de parties vitreuses ; il y en a même qui tombent en efflorescence , & donnent une faveur de sel alkali. Pour l'intelligence de ce qui précède , il faut lire chacun des mots que nous avons cités ; puis les articles *volcan* , *tremblement de terre* & *pyrite* ; même les mots *montagne* & *terre*.

LAVEZZE ou LAVEGE. Est une espece de pierre ollaire , qui ne se tire guere que de trois carrieres connues , l'une dans le Comté de Chiavennes , une autre dans la Valteline , & la troisième du côté de Pleurs , dans le pays des Grisons. Cette pierre sert à faire des marmites & d'autres vaisseaux de cuisine qui résistent au feu. Voy. PIERRE OLLAIRE & PIERRE DE COME.

LAVIGNON , en latin *Hiatula*. C'est le nom que l'on donne sur les côtes du Poitou & d'Aunis , à un coquillage de mer , qui est une espece de came , mais dont les deux pieces ne sont jamais exactement fermées ; ce qui lui a fait donner , par M. de Réaumur , le nom de *coquille béante* , qui est conforme au mot latin *hiatula*. Cette espece de coquillage vit enfoncé dans la boue , jusqu'à cinq à six pouces de profondeur : à l'aide de tuyaux

qu'il peut allonger & raccourcir, il tire sa nourriture de l'eau. Le lieu où ce coquillage est enfoncé, se reconnoît par de petits trous ronds d'une ligne de diametre, qui restent au dessus de l'endroit où est le lavignon. Sa coquille est polie, blanche; sur-tout intérieurement, & très fragile. Le goût des lavignons est très insipide, en quoi ils different d'une autre espece de came nommée *flammette*, & *poivrée* en Italien, parcequ'ils font sur la langue l'impression du poivre. Les habitants des environs de la mer mangent le lavignon, après l'avoir tiré du sable par le moyen d'un instrument long & pointu. Voyez CAME.

LAURÉOLE ou GAROUTTE, *Laureola*. Espece de thymelée qui naît à l'ombre, dans les forêts & dans les montagnes de la Provence & du Languedoc. Sa racine est pliante, ligneuse & fibreuse: ses tiges sont nombreuses, ligneuses, couvertes d'une écorce cendrée, & hautes de deux coudées. Ses feuilles tiennent de celles du laurier & du grand myrthe; elles sont toujours vertes, noirâtres, épaisses, luisantes & pointues. Les fleurs sont jaunâtres, & naissent de l'aisselle des feuilles: il leur succede de petites baies de la figure d'une olive, noires, & qui renferment chacune un noyau dur, un peu plus long qu'un grain de chanvre, & dont l'amande est blanche.

Les feuilles, les fruits & l'écorce, tant de la racine, que des branches de cette plante, produisent une forte érosion sur la langue & dans le gosier, quand on en mange; cette impression y dure même long-tems. Cette plante prise intérieurement, bouleverse l'estomac, excite le vomissement, enflamme les parties intérieures, & corrode les viscères.

L'on croit que les graines de la lauréole sont les grains de Cnide, dont les anciens Grecs ont fait mention: on distingue aussi une autre espece de lauréole, dont le fruit est rouge, & qui se nomme autrement *chama-daphné*: celle-ci passe pour le mâle, & l'autre pour la femelle.

LAURIER, *Laurus*. Il y a plusieurs especes de laurier qui different, soit par la forme de leurs feuilles, soit par leur odeur. On fait principalement usage du laurier franc dans la cuisine: il y a d'autres especes de lauriers ordinaires à feuilles larges, à fleurs doubles, à feuilles ondées, à feuilles étroites. Tous ces lauriers ordinaires se nomment aussi *lauriers-jambons*, & leurs feuilles entrent comme assaisonnement dans plusieurs mets. Il y en a une espece dont les feuilles ont l'odeur du benjoin; mais ce n'est point cet arbre qui donne le benjoin: il est parlé de celui-ci au mot BENJOIN.

L'espece nommée LAURIER IROQUOIS, mérite d'être connue à cause de l'odeur agréable de son bois, & de son usage. Voyez SASSAFRAS.

Le LAURIER FRANC, *Laurus vulgaris*, pousse, ainsi que le *laurier royal*, un grand nombre de tiges à la hauteur d'un arbre moyen: leur tronc est sans nœuds, garni de branches couvertes d'une écorce mince: le bois en est peu ferré, facile à rompre; les racines sont épaisses, inégales, obliques.

La fleur n'a point de calice; elle n'est proprement qu'un pétale divisé jusqu'à la base en quatre ou cinq parties. Aux fleurs succedent des baies

ovales terminées en pointe, & qui contiennent, dans leur intérieur, un noyau. Dans les lauriers ordinaires, il y a des individus mâles & des individus femelles. Les feuilles de laurier sont entières, simples, fermes, & posées alternativement sur les branches. Toutes ces especes de lauriers craignent les grands hivers; mais exposés au midi le long d'un mur, ils montent quelquefois jusqu'à vingt pieds de hauteur. Ces arbres peuvent se multiplier par les semences & par les marcotes, & l'on peut les greffer les uns sur les autres: ils réussissent mieux dans les terrains secs, que dans les terrains humides. Le laurier vient de lui-même dans les forêts des pays chauds, tels que l'Espagne & l'Italie. Comme ces especes de laurier conservent leurs feuilles pendant l'hiver, on peut les mettre dans les bosquets de cette saison, sur-tout dans les pays maritimes.

Le laurier étoit très célèbre chez les Anciens: ceux qui étoient victorieux étoient couronnés de lauriers dans leur triomphe, ou ils en tenoient une branche à la main, comme signe de la victoire: les tentes, les vaisseaux, les lances des soldats vainqueurs, les faisceaux, les javalots en étoient ornés de même; & aujourd'hui encore en quelques endroits, on couronne de laurier chargé de ses baies, les nouveaux Docteurs en Médecine: il semble même que leur nom de *Bacheliers*, *Baccalaurei*, tire son origine de *bacca lauri*. Cet arbre étoit d'un grand usage pour la Médecine chez les Anciens, & on le regardoit comme une panacée universelle: on employoit souvent les feuilles, les baies & l'écorce des racines. Aujourd'hui on ne fait usage que des baies & des feuilles.

Les feuilles de laurier sont odorantes; elles ont une saveur âcre, aromatique, un peu astringente, jointe à un peu d'amertume. On en peut retirer une huile essentielle très odorante, en les faisant macérer pendant quelque tems dans l'eau, à laquelle on fait subir ensuite la distillation. Les baies de laurier ont encore plus d'odeur & de saveur que les feuilles. On en retire aussi une huile concrète qui est très résolutive, propre à apaiser les douleurs, résoudre les tumeurs, & fortifier les parties qui ont perdu leur ton. On obtient cette huile aromatique en pilant les baies, les faisant bouillir dans de l'eau, & les exprimant à travers un linge; il surnâge à la surface de l'eau une huile verte, odorante, & qui est d'une consistance de beurre. On nous envoie cette huile toute préparée, de Languedoc, d'Italie, & des autres pays chauds où il croît beaucoup de lauriers.

On faisoit autrefois usage de baies de laurier dans la teinture; mais on les a supprimées, ainsi que l'on fera vraisemblablement par la suite à l'égard de plusieurs choses dont on ne voit pas trop la nécessité. Presque toutes les especes de laurier sont âcres, ameres, aromatiques, & d'une odeur extrêmement gracieuse, à l'exception de celle qu'on nomme camphrier, qui laisse couler une huile essentielle concrète, d'une odeur pénétrante, &c. Voyez CAMPHRE.

LAURIER ALEXANDRIN. Est une especes de *rusc*. On en distingue deux especes; l'une à larges feuilles, & l'autre à feuilles étroites.

LAURIER AROMATIQUE. Voyez au mot BOIS DE CAMPÊCHE.

LAURIER-CERISE, *Lauro-cerasus*. Petit arbre fort agréable à la vue, ainsi nommé parcequ'il porte des fleurs semblables à celles du laurier, & des fruits qui ressemblent un peu à ceux du cerisier. On en distingue plusieurs especes : savoir, le *laurier cerise ordinaire*, les *lauriers cerises à feuilles panachées de blanc ou de jaune*, & le *laurier cerise de la Louisiane*, dit *laurier amandé*.

La fleur des lauriers cerises est formée d'un calice qui est d'une seule piece, figurée en cloche ouverte, dont les bords sont divisés en cinq. Ce calice porte cinq pétales arrondis & disposés en rose : aux fleurs succedent des baies presque rondes, rouges, qui contiennent un noyau. Les feuilles de lauriers cerises sont simples, entieres, oblongues, plus épaisses & plus luisantes que celles de l'oranger, & posées alternativement sur les branches ; elles ont à leur bord de petites dentelures qui sont éloignées les unes des autres.

Ces diverses especes de lauriers cerises gardent toujours leurs feuilles, & supportent assez bien le froid de nos hivers : on peut en garnir des terrasses. Dans le mois de Mai, ces arbres se couvrent de belles fleurs en pyramide, qui, quoiqu'elles ne soient pas d'un beau blanc, peuvent servir à décorer les bosquets du printems. Dans les pays maritimes où les lauriers cerises ne gellent jamais, on peut en faire des taillis qui fourniront d'excellents cerceaux pour les barils. On peut multiplier les lauriers cerises par les semences, les marcotes, & on peut greffer ces especes panachées sur le laurier cerise commun. On a greffé avec succès le laurier cerise sur le cerisier, mais ces arbres ne durent pas : on a essayé aussi, mais sans succès, de greffer les cerisiers sur les lauriers cerises : on se proposoit d'avoir, par ce moyen, des cerisiers nains.

Les fleurs & les feuilles du laurier cerise ont une odeur d'amande amere, qui est assez agréable : on s'en sert (sur-tout des feuilles) dans les cuisines pour donner le goût d'amande au lait & aux crèmes. On en retire, par la distillation avec l'eau-de-vie, une liqueur qui est assez gracieuse, & que l'on prétend être bonne pour l'estomac : mais il est dangereux de charger trop l'eau-de-vie de cet aromate ; car en distillant plusieurs fois de l'eau sur les feuilles de laurier cerise, on en retire une liqueur qui est un violent poison pour les hommes & pour les animaux. Il cause d'abord des convulsions, la paralysie, enfin la mort.

J'ai fait sur ce poison, dit M. Duhamel, plusieurs expériences. Une cuillerée suffit pour tuer un gros chien ; la dissection anatomique ne nous fit appercevoir aucune inflammation ; mais lorsque nous ouvrimus l'estomac, il en sortit une odeur d'amande amere très exaltée, qui pensa nous suffoquer ; ainsi il y a lieu de croire que cette vapeur agit sur les nerfs. Malgré les facheux effets que produit cette eau que l'on a distillée sur les feuilles de laurier cerise, elle peut être un bon stomachique, étant prise à petite dose ; car si l'on en fait avaler tous les jours deux ou trois gouttes à

un chien, son appétit augmente, & il engraisse. On a observé que la gomme du laurier cerise ne produit aucun mauvais effet.

LAURIER DES IROQUOIS. *Voyez* SASSAFRAS.

LAURIER-NAIN. Ce sous-arbrisseau, qui est commun en Sibérie, & dont les propriétés sont fort extraordinaires, porte des feuilles très semblables à celles du laurier ordinaire, avec la différence qu'elles ne sont pas d'une huitième partie si grandes. Du reste cette plante diffère beaucoup du laurier vulgaire : ses fleurs, qui sont jaunes, & qui paroissent en Juin & Juillet, ressemblent à de petites cruches avec des ventres avancés, dont l'extrémité va en augmentant, & l'ouverture est fort étroite : ses feuilles sont d'un verd vif, & fortement attachées à la tige qui est ligneuse ; elles tombent dans le mois de Mai. Le fruit mûr est d'un beau pourpre bleu ; il est fort agréable au goût, quoique mal-sain si l'on en mange avec excès. La tige, qui a environ six pouces de haut, sort d'une racine rampante, & qui est couchée tout à plat sur terre.

A mesure que les anciens bourgeons disparoissent (dans le mois de Mai), il en paroît aussi-tôt de nouveaux ; c'est alors que les feuilles noircissent, & elles ne sont pas plutôt tombées, ainsi que les fruits qui les suivent de près, que le jeune bourgeon est déjà couvert de fleurs ; de sorte qu'on ne voit jamais cette plante sans feuilles. Quoique le *laurier nain* croisse rapidement & vigoureusement, il n'acquiert pas un pouce de hauteur en vingt ans : les endroits où croît ce sous-arbrisseau, sont les fondrières & les marais d'eau douce.

LAURIER-ROSE, *Nerion*. Cet arbrisseau pousse de longues baguettes qui se divisent en plusieurs branches, lesquelles sont garnies en toute leur longueur, de feuilles opposées deux à deux, longues, étroites, terminées en pointe, unies & sans dentelure, relevées en dessous d'une seule nervure : le verd de ses feuilles est terne & foncé. Les fleurs, qui sont en tuyau évasé par le haut en manière de soucoupe divisée en cinq parties, viennent à l'extrémité des branches, & elles y sont ramassées par bouquets. Quand les fleurs sont passées, il leur succede des siliques presque cylindriques, longues comme le doigt, & qui renferment plusieurs semences garnies d'aigrettes. Il y a des lauriers-roses à fleurs d'un beau rouge, & d'autres à fleurs blanches : le *nerion* des Indes à feuilles étroites, a les fleurs d'un rouge pâle, & odorantes. Le petit laurier-rose, *chamanerion* a les fleurs d'un rouge pourpre, ou bleues.

Comme les lauriers-roses craignent le froid de nos climats, on est obligé de les mettre en caisse pour les conserver l'hiver, & dans la belle saison ils sont l'ornement des jardins. On peut cependant les élever aisément en pleine terre dans quelques Provinces méridionales du Royaume : quant aux lauriers-roses à fleurs doubles, ils sont si délicats, qu'il faut les conserver dans les serres chaudes.

On dit que la décoction des feuilles de laurier-rose est un poison pour les animaux & pour les hommes. Les animaux qui en mangent, sont atta-

qués d'angoisses insupportables, leur ventre se gonfle, & il survient une inflammation universelle dans les viscères : les remèdes contre ce poison, sont l'huile d'olive & tous les adoucissants. Les feuilles de laurier-rose, écrasées & appliquées extérieurement, sont digestives, résolutives, & bonnes contre la morsure des bêtes venimeuses ; desséchées & pilées, elles sont un excellent sternutatoire.

LAURIER SAUVAGE D'ACADIE. Est le nom que les habitants des frontières du Canada donnent à l'arbre de *cire-nain* de la Caroline. *Voyez* ARBRE DE CIRE.

LAURIER-TIN, *Tinus*. Les diverses espèces de laurier-tin varient un peu par la forme de leurs feuilles, & par leur couleur ; les unes sont panachées en blanc, les autres en jaune. Les lauriers-tins sont de très jolis arbrisseaux ; ils sont ornés de fleurs disposées en ombelles, composées d'un seul pétale en forme de cloche, & divisé en cinq parties. Ces fleurs subsistent presque pendant toute l'année ; on doit par cette raison mettre cet arbrisseau dans les bosquets d'hiver, où il est d'autant plus agréable, qu'il est encore couvert de fleurs quand tous les autres arbres & arbustes en sont dépouillés. Ses feuilles, qui sont d'un verd foncé, & opposées sur les branches, ne tombent point pendant l'hiver. Si des gelées trop fortes font périr les branches de ces arbrisseaux, la souche repoussera bientôt de nouveaux jets. Les baies de laurier-tin sont très purgatives, mais on n'en fait aucun usage.

LAUVINES. *Voyez* à la suite du mot NEIGE.

LECHE, *Cyperoides latifolium spicâ rufâ, &c.* Cette plante, qui croît aux lieux aquatiques, a été placée entre les espèces de gramen, par les anciens Botanistes ; mais M. de Tournefort en a fait un genre séparé. Ses racines sont assez grosses, noueuses, fibreuses, & semblables à celles du fouchet long : ses feuilles sont longues d'un pied & demi, assez larges, triangulaires. Sa tige est haute de deux à trois pieds, sans nœuds, portant à sa racine des épis à écailles, entre lesquels sont attachés des fleurs à étamines rousses ; ces fleurs ne laissent rien après elles, mais les épis qui sont au dessous portent des graines, & ne fleurissent point : ces graines naissent sous les écailles qui composent les épis ; elles sont triangulaires & renfermées chacune dans une capsule membraneuse. La racine de cette plante curieuse a presque les mêmes vertus que celle du fouchet long : ses fleurs sont détersives & apéritives.

LEDON ou LEDUM. Espèce de ciste, d'où découle le *labdanum*. *Voyez* ces mots.

LEGUANA ou IGUANE, ou SENEMBI. Animal amphibie, ou espèce de lézard qui se trouve en plusieurs endroits de l'Amérique & aux Indes Orientales : on mange sa chair & ses œufs. Ce lézard ne siffle point & ne fait aucun mal : ses petits naissent assez bien ; mais dès qu'ils sont grands, ils ne le peuvent plus. Les Mexicains nomment cet animal *aquaquetz palin*, les Haïtiens l'appellent *ignona* & *inana*, les Indiens le nomment

foaager, les François *coq de joute*, & les habitants de la Martinique, *gros lézard*.

L'iguane, qui est une espece de lézard goîtreux & fouetteur, a environ cinq pieds de long, quelquefois huit & quinze pouces de circonférence; sa peau est grise, brune, & chargée d'écailles rudes, tuilées: depuis la tête jusqu'à la queue, il a sur le dos une rangée de pointes comme un peigne: ses yeux sont longs, ses dents sont petites & en faucille. Le mâle a une peau qui lui pend depuis la gorge jusqu'à la poitrine: c'est une espece de goître en partie denté & en partie édenté; il la roidit & l'étend à volonté. Le sommet de la tête est livide: les pattes de devant sont plus menues que celles de derriere; elles ont toutes cinq griffes, munies d'ongles fort pointus & crochus.

Cet animal est assez maigre de corps, mais ses pattes de derriere & sa queue sont fort charnues.

La capacité du ventre de l'iguane est grande, & toute la partie intérieure est tapissée de deux pannes de graisse jaunâtre, qui est estimée nervale: les mâles ont une posture hardie, un regard affreux & épouvantable; ils sont d'un tiers plus gros que les femelles, qui sont toutes vertes, & ont un regard plus doux. Ils s'accouplent au mois de Mars; alors il est dangereux d'en approcher. Le mâle, pour défendre sa femelle, s'élance sur les personnes qui s'en approchent: comme il n'a point de venin, sa morsure ne met dans aucun péril; mais il ne quitte point ce qu'il a mordu, à moins qu'on ne l'égorge, ou qu'on ne le frappe rudement sur le nez.

Les habitants du Bresil leur font la chasse au printemps, après qu'ils ont mangé beaucoup de fleurs de mahor & de feuilles de mapou qui croissent le long des rivières: ils vont se reposer sur des branches d'arbres qui avancent sur l'eau; & leur stupidité est telle, que, quoiqu'ils soient très subtils & vîtes à la course, ils voient approcher le danger sans le fuir. Ces animaux sont difficiles à tuer au coup de fusil; l'on en a vu en recevoir trois coups sans s'abattre; mais on peut les faire mourir promptement, en frottant un petit bâton ou un poinçon dans leurs naseaux: on les peut garder vivants pendant trois semaines, sans leur donner à manger ni à boire.

C'est vers le mois de Mai que les femelles descendent des montagnes, & viennent pondre leurs œufs au bord de la mer; à la maniere des tortues; ces œufs sont toujours en nombre impair, depuis treize jusqu'à vingt-cinq: elles les pondent tout à la fois: ils ne sont pas plus gros que ceux de pigeon, mais un peu plus longs; l'écaille en est blanche & souple comme du parchemin mouillé: le dedans des œufs est blanchâtre, & sans glaire ni blanc: ils ne durcissent point, quoiqu'on les fasse bouillir; ils donnent un très bon goût à toutes sortes de sausses, & valent mieux, dit-on, que ceux de poules.

Un de ces lézards suffit pour rassasier quatre hommes: les femelles sont toujours plus tendres, plus grasses, & de meilleur goût que les mâles;

mais la chair de ces animaux nuit singulièrement aux vérolés; elle réveille même cette maladie quand elle a été long-tems assoupie.

Séba donne la description de sept especes d'iguane, qui varient par la couleur : savoir, la premiere d'Amérique; la deuxieme de Surinam; la troisieme du Ceylan; la quatrieme est la femelle du précédent; la cinquieme se trouve dans l'Isle de Formose aux Indes Orientales; la sixieme est la petite especes du précédent; la septieme est de la Nouvelle Espagne; où on l'appelle *tamacolin*. On ne peut trop admirer la beauté singuliere de ces lézards, la forme de leur goître, la marbrure de leurs diverses écailles, &c.

LÉGUME, *Legumen*. On donne ce nom aux graines qui se trouvent renfermées dans une cosse ou toute autre especes d'étui, & à beaucoup d'autres sortes de plantes que l'on cultive dans le potager, telles que les asperges, les melons, &c. Les vrais légumes sont les petits pois, les fèves, lentilles, haricots, lupins. Le nom de légumes s'étend aussi aux racines potageres. La culture des légumes exige beaucoup de détails. Nous parlons de cet art qui fait la gloire du Jardinier, aux mots *fleurs*, *plantes potageres*, *fruits*, *racines*, & particulièrement dans les articles où nous donnons l'histoire des plantes qui sont d'usage pour la cuisine; telles que la *laitue*, les *concombres*, le *céleri*, la *chicorée*, les *cardons*, les *champignons*, &c.

En Botanique on a appelé aussi du nom de *papillonacées*, certaines plantes légumineuses, à cause de la figure irréguliere de leur corolle, qui représente en quelque sorte la figure d'un papillon qui prend son vol. A considérer tous les caractères de la famille des *légumineuses*, on y place des herbes annuelles & vivaces, des arbrisseaux, & même des arbres qui ont jusqu'à soixante & dix pieds de hauteur. Les herbes légumineuses sont ordinairement rampantes, ou s'attachent par des vrilles, & se roulent autour des arbres, comme il arrive aux vesces, aux haricots, &c. Les arbrisseaux sont tortus, la plupart épineux. En général les racines des légumineuses sont longues & fibreuses; les tiges sont cylindriques, comme celles des jeunes branches qui sont alternes; celles qui sont sarmenteuses, comme dans le haricot, se roulent de droite à gauche dans un sens opposé au mouvement du soleil. L'écorce, dans les grands arbres de cette famille, est fort épaisse, & ridée comme un réseau à mailles longues; les feuilles sont alternes, & la plupart ont un mouvement journalier, qui répond à celui de la lumière du soleil. Voyez SENSITIVE. Dans quelques genres, comme l'acacia, le cytise épineux, les branches se terminent en une épine qui est d'abord couverte de petites feuilles, ou bien cette épine sort des aisselles des feuilles. Dans la sensitive & dans le bonduc, il sort de toute la surface des branches & des pédicules même des feuilles, des piquants qui ne tiennent qu'à l'écorce, & qui tombent dès que la plante vieillit un peu; au lieu que les épines ne s'effacent que par la culture. La plupart

des fleurs sont hermaphrodites : le fruit est une gouffe tantôt longue & arrondie , tantôt courte , aplatie ou lenticulaire , quelquefois droite , d'autres fois roulée en spirale , contenant des loges souvent articulées , remplies dans quelques-unes par une chair farineuse , sèche , & dans d'autres par une pulpe : dans le plus grand nombre , cette gouffe est pendante & s'ouvre en deux battans longitudinaux. Les plantes de cette famille sont en général mucilagineuses.

LEMING ou LEMMAR, *Lemmus*. Espece de petit quadrupede qu'on trouve par troupes dans la Laponie , où on l'appelle *souris de montagne* ou *lamblar* : il est assez semblable à une souris ; mais il en differe par la couleur , étant roux & marqueté de noir : sa queue est courte & couverte de poils ferrés. Il a une barbe comme les autres rats , & cinq doigts à chaque pied ; ses oreilles sont fort courtes : il a quatre dents devant , deux en haut & deux en bas , & à chaque côté des mâchoires trois dents molaires. M. Linnæus qui , ainsi que M. Briffon , met ce petit animal dans le genre des loirs , sous le nom de *mus montanus Norwagicus* , dit qu'il s'en trouve toute l'année dans la Laponie , & que dans certaines saisons ces souris de montagnes descendent dans les Provinces voisines. M. Briffon a nommé cet animal *lapin de Norwege*.

On dit que les lémings multiplient beaucoup : ils ne paroissent pas régulièrement tous les ans en Laponie , mais tout d'un coup , dans certains tems , & en telle quantité , que se répandant par-tout , ils couvrent toute la terre. On a observé que cela arrive quand il fait des orages & qu'il pleut abondamment : c'est le moment où ces animaux grossissent beaucoup. Ces petites bêtes sont hardies & courageuses ; & loin de fuir à l'approche des passants , elles vont au devant de ceux qui les viennent attaquer , crient & jappent comme de petites chiennes ; & , sans craindre les bâtons ni les hallebardes , qu'elles mordillent ou tiraillent , elles sautent & s'élancent sur leurs ennemis en les mordant de colere : elles se tiennent toujours le long des coteaux & des broussailles , dans les trous des montagnes , mais sans entrer jamais dans les maisons ni les cabanes.

Les habitants de Norwege sont persuadés que ces animaux tombent desnues : souvent ils s'en effraient , & font des prieres publiques pour les écarter. On auroit peine à croire que pour expliquer cette prétendue origine de ces animaux , Wormius ait composé exprès un volume in-4°. imprimé en 1653. On trouve dans cet ouvrage la formule des prieres & des conjurations des Catholiques du pays.

Les lémings se font quelquefois la guerre entr'eux , & se partagent en deux armées rangées en bataille , le long des lacs & des prés ; ce que les Lapons prennent pour des présages de guerre qui doivent arriver en Suede. S'ils les voient venir du côté de l'Orient , ils concluent qu'ils auront la guerre avec les Russiens ; & s'ils remarquent qu'ils soient venus du côté de l'Occident , ils tiennent pour infaillible qu'ils seront attaqués par les Danois. Ces petites bêtes ont pour ennemis les hermines qui s'en engrais-

sent, les renards qui les attaquent & les amassent dans leurs tanières, où quelquefois ils en gardent des milliers dont ils se nourrissent. Les chiens du pays, qui sont en grand nombre (chaque Lapon ayant le sien), en font aussi leur principale nourriture; cependant ils n'en mangent guere que la tête: enfin on dit que les rhennes mangent aussi de cette espece de souris de montagnes; & particulièrement en été. Malgré ce grand nombre de différents ennemis qui en détruisent beaucoup, elles se font aussi mourir elles-mêmes, en se jettant dans l'eau, après s'être rassemblées par troupes à la maniere des hirondelles quand elles veulent partir; ce qui fait qu'on les trouve quelquefois mortes par milliers dans un même endroit, & entassées les unes sur les autres, &c.

Il y a des Naturalistes qui regardent les lémings comme une sorte singulière de rat de Norwege; mais M. de Buffon prétend que c'est une espece d'animal différente de celle de nos rats domestiques. M. Linnæus dit que les rats de Norwege sont ordinairement cinq ou six petits à la fois, mais jamais plus; aussi leurs femelles n'ont-elles que six tettes: ce même Auteur dit que ces animaux se nourrissent d'herbe ou mousse à rhennes.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces animaux, ce sont leurs é migrations; car en certains tems, ordinairement en dix ou vingt ans une fois, ils s'en vont en troupes nombreuses, & marchant par bandes de plusieurs milliers, ils creusent des sentiers de la profondeur de deux doigts, sur un demi-quart ou un quart d'aune de largeur. On voit plusieurs de ces sentiers à la fois, paralleles les uns aux autres, & divisés en droites lignes, mais toujours distantes de plusieurs aunes: chemin faisant ils mangent les herbes & les racines qui sortent de terre, & font des petits en route; ils en portent un dans leur gueule, un autre sur leur dos, & abandonnent le surplus s'il y en a: en descendant les montagnes, ils prennent le chemin du golphe de Bothnie; mais ordinairement ils sont dispersés, & périssent avant d'y arriver.

Il y a encore quelque chose de fort singulier dans la maniere dont ils font ce voyage. Rien ne peut les obliger à se détourner de leur route, qu'ils suivent toujours en droite ligne. Quand ils rencontrent, par exemple, un homme, ils tâchent de lui passer entre les jambes, plutôt que de se déranger de leur chemin, ou ils se mettent sur les pieds de derriere & mordent la canne quand on la leur oppose. S'ils rencontrent une meule de foin, ils se font un chemin au travers à force de manger & de creuser, plutôt que d'en faire le tour. S'ils trouvent du roc ou de la pierre à leur rencontre, ils font le demi-cercle, mais si exactement, qu'ils renfilent aussi-tôt la droite ligne. En arrivant à un lac, quelque grand qu'il puisse être, ils font leur possible pour le traverser dans la même direction, quand ce seroit par son plus grand diametre. Si par hasard ils rencontrent dans ce lac quelque bâtiment, au lieu de l'éviter, ils tâchent d'y monter, & se rejettent ensuite dans le lac, précisément du côté opposé: le courant de l'eau le plus rapide ne les effraie pas; ils poursuivent toujours leur route, fussent-ils périr infailliblement.

Si ces rats font quelque dommage dans les champs & dans les prairies, c'est peu de chose, & leur présence en indemnise les habitants ; car quand ils commencent à défiler dans les Provinces septentrionales de la Suede, les habitants font une ample capture d'ours, de renards, de martres, de goulus & d'hermines, parceque tous ces animaux, qui suivent les rats pour en faire leur proie, s'exposent par-là eux-mêmes à devenir celle des hommes. On feroit de la peau de ces rats des fourrures fort belles & fort douces, si ce n'est qu'elle est trop tendre & se déchire aisément. Il n'est point vrai que ces animaux aient, comme on le dit, rien de venimeux ; car je connois, dit M. Linnæus, plusieurs pauvres Lapons, habitants des forêts, qui sont obligés, par nécessité, à manger de ces sortes de rats, & qui n'en sont nullement incommodés.

LEMMA. Est une plante aquatique, dont les Anciens avoient parlé, mais qui n'a été bien connue que depuis 1740, tems auquel M. Bernard de Jussieu en fit une description très circonstanciée, & que l'on trouve imprimée parmi les Mémoires de l'Académie des Sciences de la même année. Ce célèbre Botaniste, en nous donnant premierement la connoissance des fleurs du lemma, qui avoient été jusqu'alors inconnues, & qui font cependant son caractère, a détrompé en même tems de l'idée qu'on avoit eue de faire deux plantes particulieres d'une seule. On observe cette plante dans les lieux marécageux, dans les étangs d'eau douce, & quelquefois hors de l'eau ; mais elle est alors amaigrie & comme méconnoissable. M. de Jussieu l'a décrite étant à demi-baignée, parceque c'est en cet état qu'elle produit ordinairement ses fleurs & ses fruits.

Le lemma est une plante traçante : ses rameaux rampent à droite & à gauche, & sont chargés de feuilles, qui, suivant que ces rameaux se trouvent plus ou moins approchés ou écartés, forment des touffes plus ou moins ferrées. Les racines naissent du côté inférieur de la branche ; elles ressemblent à des filets garnis de fibrilles, & sont brunâtres & pliantes : la branche qui donne naissance aux rameaux, est cylindrique, & partagée d'espace en espace, en espece de nœuds ; chaque rameau est terminé, comme la branche, par un bouton de quatre feuilles, qui, venant à se déployer, représente une croix de Malthe : cette plante porte des coques d'une substance de cuir ; elles naissent de la queue des feuilles, & contiennent les fleurs & les fruits. C'est dans le Mémoire même de ce savant Académicien, qu'il faut s'instruire de toutes les autres particularités du lemma : on y verra que cette plante differe des autres plantes aquatiques, en ce que leurs feuilles sont plus découpées lorsqu'elles restent plongées dans les eaux, & paroissent plus entieres dès qu'on les en retire ; & que celles du lemma, au contraire, sont plus entieres dans l'eau, & deviennent crenelées dès qu'elles en sortent. On ne sauroit croire en combien de lieux & sous combien de climats différents, elle vient avec le même succès. Quant aux propriétés médicinales du lemma, M. de Jussieu soupçonne que cette plante convient pour atténuer & diviser les fluides, & pour

lever les obstructions des viscères. La faveur de cette plante est mucilagineuse comme celle des fougères.

LEMMAR. Voyez LÉMING.

LEMOULEMON. Nom qu'on donne à Cayenne à une espèce de scarabée, appelé *capricorne*. Voyez ce mot.

LENDE ou LENTE, *Lens*. Est une vermine blanche très menue, qui ressemble assez à un ciron, & qui naît sur les cheveux ou poils des hommes & des bêtes : ce n'est autre chose que les œufs des poux qui éclosent dans leur tems, & qui deviennent de véritables poux. Ces lendes tiennent si fort aux cheveux, qu'il n'est pas aisé de les en détacher ; il est plus aisé de les faire mourir par la force de quelque médicament mercuriel, ou par le moyen de la poudre de *slaphisaigre*, ou de la *poudre de Capucin*, qui est la *cévadille*. Voyez ces mots. L'usage d'un peigne dont les dents sont fort ferrées, les fait aussi périr. Il n'y a guère que les enfants & les gens malpropres qui soient sujets à avoir des lendes. Voyez l'article Poux.

LENTILLAC. Nom que les Languedociens donnent à la troisième espèce de *chien de mer*. Voyez ce mot.

LENTILLADE. En Languedoc on donne ce nom à la raie à long bec. Voyez au mot RAIE.

LENTILLE, *Lens*. Est une plante dont il y a deux espèces ; la *petite lentille* & la *grande*.

La PETITE LENTILLE, *Lens minor*, a la racine menue & fibreuse ; sa tige est assez grosse, & haute de neuf pouces, velue, anguleuse, couchée sur terre, ou rampante par occasion, branchue dès la racine. Ses feuilles sont oblongues, ressemblantes à celles de la vesce, mais plus petites & velues : il sort des aisselles de ces feuilles des pédicules grêles, qui soutiennent chacun deux ou trois petites fleurs légumineuses, de couleur blanchâtre. A ces fleurs succèdent de petites gousses courtes, larges, remplies de deux ou trois graines applaties, orbiculaires, dont la couleur est jaunâtre, & dans quelques espèces rougeâtre ou noirâtre : cette plante est la lentille vulgaire.

La GRANDE LENTILLE, *Lens major*, est plus belle en toute manière, & plus grande que la lentille commune : ses fleurs sont plus blanches.

On sème beaucoup de l'une & de l'autre espèce de lentilles dans les champs en terre maigre & sèche. Cette sorte de plante est annuelle.

Leurs graines sont d'un grand usage pour la cuisine. Par les monuments des Anciens, il paroît que les Philosophes se faisoient autrefois un grand régal des lentilles ; car Athenée dit, *L. IV, Ch. 18*, que c'étoit une maxime des Stoïciens, que le *Sage faisoit tout bien*, & qu'il *assaisonnaît parfaitement des lentilles*. Par quel contraste les plus habiles Médecins de nos jours jugent-ils autrement des lentilles ? auroient-elles dégénéré, ainsi que nos estomacs ? Quoi qu'il en soit, toute l'Ecole de Médecine prononce que les lentilles ne conviennent ni comme aliment, ni comme remède : elle enseigne que la fréquence d'une telle nourriture, trouble la tête, dérange les

les esprits , amortit la vue , occasionne des terreurs nocturnes , engendre la mélancolie , obstrue les viscères , &c.

On distingue dans les lentilles deux substances ; l'une *membraneuse* , qui est la peau ; & l'autre *médullaire* , qui est la pulpe. La peau est astringente , & nourrit peu & mal ; la pulpe est infiniment meilleure. Tout le monde fait que la *purée de lentille* est assez nourrissante : les payfans s'accommodent de cette nourriture ; mais il y a des Provinces où les payfans mêmes n'en font point usage : ils les donnent aux chevaux.

LENTILLE D'EAU ou **DE MARAIS** , *Lenticula palustris*. C'est une plante que l'on trouve dans les lacs , dans les fossés des villes , & dans les eaux dormantes : elle furnâge comme une espece de mousse verte ; elle en couvre toute la superficie d'une multitude infinie de feuilles très petites , noirâtres en dessous , vertes en dessus , luisantes , orbiculaires , & de la forme des lentilles. Ces feuilles sont unies étroitement entr'elles par des filaments très menus & blancs ; & de chaque feuille part un filet ou racine , par le moyen de laquelle la plante se nourrit.

L'usage de cette plante est extérieur : elle résout , rafraîchit & calme les douleurs des érépelles , des hémorrhoides , & des hernies des intestins. Les canards mangent avec beaucoup d'avidité la lentille d'eau.

LENTILLE DE PIERRE ou **LENTICULAIRE**. Voyez **PIERRE LENTICULAIRE**.

LENTISQUE , *Lentiscus*. Le lentisque est un arbre quelquefois grand , quelquefois petit , selon la nature du sol où il est planté. Il y a plusieurs especes de lentisques , qui different les uns des autres par les pays où ils croissent , & par quelques caractères de variété. Ces arbres , dans certains pays , sont d'un très grand produit par la résine qu'on en retire , laquelle est connue sous le nom de *maslich*.

Les lentisques portent , sur différents pieds , des fleurs mâles & des fleurs femelles. Les fleurs mâles sont à étamines , attachées ensemble en maniere de grappes , rougeâtres , & elles naissent des aisselles des feuilles. Les fleurs femelles , qui viennent sur d'autres pieds , n'ont qu'un calice , point de pétales ; mais un pistil composé de trois stiles , terminés par des stigmates assez gros & velus. Les fruits sont de petites baies rondes , qui noircissent en mûrissant ; elles sont d'un goût acide , & elles renferment chacune un petit noyau. Les feuilles des lentisques sont assez semblables à celles du mirthe ; elles sont rangées par paire sur une côte creusée en gouttiere. Cette côte n'est point terminée , comme dans la plupart des feuilles conjuguées , par une foliole unique : cette circonstance peut servir à distinguer les lentisques d'avec les térébinthes.

Les lentisques ne quittent point leurs feuilles pendant l'hiver ; mais comme ils sont très sensibles au froid , on ne peut point les élever ici en pleine terre , à moins que de les mettre en espalier dans une bonne exposition , & d'en prendre grand soin pendant l'hiver. Le lentisque croît naturellement en Languedoc , en Provence , en Italie , en Espagne , aux

Indes. On le cultive dans l'Isle de Scio ou Chio , pour en recueillir le mastic , dont les Turcs font un si grand usage. Effectivement il en vient une si grande quantité dans cette partie de l'Archipel , que le Grand-Seigneur en retire tous les ans quatre-vingt à quatre-vingt-dix mille livres pesant de mastic. La culture de cet arbre ne consiste qu'à le provigner ; on a par ce moyen beaucoup de jeunes pieds vigoureux , qui fournissent plus de mastic que les vieux. Les lentisques font la plus grande richesse de cette Isle.

C'est en Janvier que les Turcs plantent les jeunes lentisques , qu'ils distribuent par intervalles & en buissons dans la campagne ; ils viennent aussi très bien de semences. Ces arbres fleurissent en Mars. On a grand soin de bien nettoyer d'herbes & de feuilles le bas des arbres , afin que le mastic qui tombe à terre , soit plus propre. On fait aux lentisques des incisions au mois de Juillet ; la résine coule ordinairement jusqu'à terre , mais il s'en congele en larmes sur les branches : celle-ci est plus estimée que l'autre. On commence à ramasser la résine vers le seizième d'Août ; cette récolte dure huit jours. On fait ensuite d'autres incisions au même arbre : la seconde récolte commence vers le 14 de Septembre ; & quoiqu'on ne fasse plus ensuite de nouvelles incisions , le mastic continue de couler jusqu'au 8 de Novembre : on le ramasse tous les huit jours , & après ce tems la récolte n'est plus permise. Pour que la récolte soit belle , il faut que le tems soit sec & ferein. Il ne paroît pas bien certain que les lentisques qui croissent en Italie & en Provence , donnent du mastic ; ou s'ils en donnent , c'est en très petite quantité , car celui du commerce vient du Levant.

On nous apporte des pays chauds , le bois de lentisque ; il est gris en dehors , blanc en dedans , & d'un goût astringent. Comme on lui attribue la propriété de fortifier les gencives , on en fait des cures dents , & on use de sa décoction pour les gargarismes astringents. En Italie on tire du fruit de cet arbre , une huile , par la même méthode que l'on tire celle du laurier en Languedoc. Au Levant , l'huile qu'on en exprime est préférée par les Turcs , à l'huile d'olive , pour brûler & pour employer dans les médicaments. L'huile de lentisque possède une vertu astringente , qui la rend propre lorsqu'on veut resserrer , comme dans la chute de l'anüs & de la matrice.

Le mastic est une résine d'un goût légèrement aromatique , résineux & astringent. Le plus beau doit être en larmes ou petits grains , clairs , transparents , d'un blanc jaunâtre , & d'une odeur agréable ; il se casse net sous la dent , s'amollit à la chaleur comme de la cire , & s'enflamme sur les charbons. Les habitants de l'Isle de Chio mettent presque tous du mastic dans leur bouche , pour fortifier les dents & les gencives , & pour corriger l'haleine. Ils ont aussi coutume d'en mêler & d'en faire cuire avec le pain pour le rendre plus délicat au goût.

Comme il y a plusieurs especes d'arbres qui donnent du mastic , certaines especes en donnent de plus beau , mais en moins grande abondance ;

c'est ce mastic de meilleur qualité, que les Marchands nomment *mastic mâle*, soit qu'il découle d'un arbre mâle ou d'un arbre femelle; & ils désignent sous le nom de *mastic femelle*, celui qui est de qualité inférieure. Les meilleurs lentisques se trouvent dans la partie de l'Isle de Chio, qui est du côté du Sud. C'est sans doute de ce mastic mâle que les Dames du Sérail & les Concubines bourgeoises de Turquie mâchent presque continuellement, pour rendre leur haleine d'une odeur de baume, fortifier leurs gencives & blanchir leurs dents.

On emploie intérieurement le mastic pour fortifier l'estomac, arrêter les diarrhées & les vomissements; il entre dans plusieurs baumes & emplâtres. On l'étend sur un morceau de taffetas, & on l'applique sur la temple, pour calmer les douleurs des dents. Enfin, le mastic se dissout aisément, & il peut entrer dans la composition de plusieurs vernis.

Toutes les parties du lentisque, ses bourgeons, ses feuilles & ses fruits, l'écorce des branches & des racines sont astringentes. Dans les Ephémérides d'Allemagne, on vante la décoction de bois de lentisque, sous le titre d'*or potable végétal*, comme une panacée singulière contre la goutte & les catharres; en un mot, pour aider toutes les fonctions du corps, en rétablissant le ton des fibres, & en adoucissant l'acrimonie des humeurs.

LEOCROCOTTE, *Leocrocotta*. Est un animal d'Ethiopie, de la grosseur d'un âne sauvage: il a la croupe du cerf, l'encolure, la queue & le poitrail du lion, & la tête comme un taïsson; ses pieds sont fourchus, sa gueule est fendue jusqu'aux oreilles: il a, au lieu de dents, un os entier, qui lui prend toute la mâchoire.

On dit que cet animal est fort léger, & surpasse tous les quadrupèdes à la course. On dit encore qu'il naît de l'accouplement d'une lionne & d'une crocotte, ou d'une hyenne mâle: les crocottes sont des métis que font les lionnes étant mâtinées. Gesner pense que le léocrocotte est un tigre. Voyez ce mot.

LÉOPARD. Espèce d'animal quadrupède de l'ancien Continent, que nous décrirons, ainsi que l'once, à la suite du mot PANTHERE.

LEPAS. Nom donné par les Grecs à un genre de coquillage univalve, & qu'on a rendu en latin par celui de *patella*, parceque sa coquille ressemble à une petite jatte ou à un petit plat. On le connoît, sur les côtes de la Normandie, sous le nom de *berlin* ou *berdin*; en Provence, sous celui d'*arapede*; sur les côtes de Poitou & d'Aunis, sous celui d'*œil de bouc* & de *jambe*. Le lepas rampe sur les rochers. On a calculé sa marche la montre à la main: un de ces animaux a avancé pendant une minute, huit pouces de long; & si l'animal ne se reposoit pas si souvent, il pourroit avancer d'un pied. La base qui est à l'ouverture de la coquille, est occupée par un gros muscle, qui a presque autant de chair que tout le reste du corps de l'animal: ce muscle n'est point couvert par la coquille. Le lepas s'en sert pour marcher, ou pour se fixer fortement sur la surface d'une pierre: les Pêcheurs ont bien de la peine à l'en détacher; en insinuant la lame d'un

couteau entre la pierre & la coquille. L'animal s'en détache à sa volonté pour aller à la pâture ; mais il meurt s'il cesse d'être entouré d'eau. On le mange crud ou cuit.

La coquille de cet animal est d'une seule piece , assez dure : sa couleur ordinaire est grisâtre ; on en voit cependant de diverses autres couleurs : elle est nacrée en dedans , convexe , & a la figure d'un cône. Cette coquille est , ou entiere & simple , ou percée en dessus , ou chambrée , ou écailleuse. On prétend que le lepas , dont la coquille est perforée en dessus , déjecte par cet endroit ses excréments.

Parmi ces coquilles conoïdes , on distingue encore celles dont le sommet est pointu , ou obtus , ou applati , ou recourbé : celles enfin dont la robbe est cannelée ou striée , épaisse ou papyracée. Celles que les Conchyliologistes appellent le *lepas bouclier* , le *concho-lepas* , le *bonnet de dragon* ou *chinois* , l'*œil de bouc* , la *nacelle* , le *cabochon* , l'*astrolepas* , &c. suffisent pour donner une idée des caracteres les plus variés de ce genre d'animaux.

On trouve aussi quelques lepas fluviatiles , & beaucoup de fossiles.

LEPIDOPTERE. Voyez à l'article INSECTE.

LEPTURE , *Leptura*. Insecte coléoptere , dont les antennes vont en diminuant de la base à la pointe , & dont l'œil entoure la base. On peut regarder les leptures comme des especes de *cérambix* ou capricornes : elles habitent les mêmes lieux , leurs larves & leurs nymphes sont les mêmes , & elles n'en different que par leur corselet , qui n'est point armé de pointes comme celui des *capricornes*. Voyez ce mot.

LERÉ. Espece de chauve-souris du Bresil , & qui est la même que celle de Cayenne. Voyez CHAUVE-SOURIS.

LERNE , *Lernea*. Espece de zoophyte , qui se trouve sur une sorte de brème , & qui se nourrit de son sang. Voyez ZOOPHYTE.

LEROT. Voyez à la suite du mot LOIR.

LETCHI ou LI-CHI. C'est un des plus beaux & des plus délicieux fruits qui croissent à la Chine , & particulièrement dans la province de Canton. Il égale le volume d'une grosse noix : son écorce est chagrinée , mince , d'abord verdâtre , ensuite de couleur de ponceau éclatante. Quand le fruit est mûr & récemment cueilli , cette écorce se termine en pointe : elle enveloppe une espece de pulpe molette , & un petit noyau très dur , de la figure d'un girofle , & de la couleur du jais : il n'y a que le mangoustan & peut-être l'*ata* qui surpassent ce fruit en bonté : il est d'une nature si chaude ; que , si l'on n'en use point avec modération , il fait naître des pustules par-tout le corps. Les Chinois le font secher comme nous sechons en Europe les pruneaux , & en mangent toute l'année ; ils s'en servent particulièrement dans le thé , auquel il donne un petit goût rude ou aigrelet , qui leur paroît plus agréable que celui du sucre. Voyez АТА.

LETRE. C'est le bois de fer : voyez ce mot.

LEVESCHE : voyez LIVÊCHE.

LEVIATHAN. Animal dont il est parlé dans le *livre de JOB*, *ch. 40 & 41*. Le docte Bochart, qui a lu tout ce que l'Ecriture-Sainte dit à ce sujet, prétend que le léviathan est le crocodile, cet animal si difficile à prendre, si indomptable, si farouche, & dont la peau est si dure. Pour le prouver, il tire ses raisons d'un endroit du *Talmud*, au *Traité du Sabbath*, où il est dit que le cabith ou chien-marin, est la terreur du léviathan : il soutient que ce cabith est l'ichneumon, & que l'animal, dont il est la terreur, est le crocodile ; parcequ'en effet l'ichneumon se jette dans la gueule du crocodile, s'insinue dans son corps, lui ronge ses entrailles, & lui perce le ventre : d'où il s'ensuit que le crocodile est le léviathan des Hébreux. Voyez CROCODILE & ICHNEUMON.

Mais M. Jault, Professeur en Syriaque, prétend que le léviathan est le dragon-marin ; & il s'appuie sur un passage d'ISAÏE, *ch. 27*, où il est dit : *le Seigneur visitera, avec son épée dure, grande & forte, le léviathan, ce serpent prodigieux, ce serpent tortueux, & il tuera le dragon qui est dans la mer.* Voyez DRAGON MARIN.

Les nouveaux Hébreux donnent encore le nom de *léviathan* à la baleine.

LEVRAUT. C'est le jeune lievre : sa chair est fort saine. On donne le nom de *levreteaux* aux petits levrauts qui sont encore nourris par le pere & la mere. Voyez LIEVRE.

LEVRETTE. C'est la femelle du lévrier ; les petits s'appellent *levrons*.

LEVRIER. C'est une des especes de chien. Le lévrier est haut monté sur ses jambes, il a la tête longue & menue, le corps fort délié ; on s'en sert pour courir le lievre. On distingue quatre sortes de lévriers : 1°. celui dont les Ecoffois, les Irlandois, les Scythes, les Tartares & autres Peuples du Nord sont fort curieux, s'emploie à courir le loup, le sanglier, & autres grandes bêtes, comme le taureau sauvage & le buffle : on l'appelle *lévrier d'attache*. Dans la Scythie il y en a d'assez forts pour attrapper les tigres & les lions ; les gens du pays s'en servent pour garder le bétail, qui n'est jamais enfermé.

2°. Le *lévrier de plaine* : c'est le plus agile de tous les animaux. Les meilleurs sont en Champagne, en Picardie & en Thrace, à cause des grandes plaines de ces trois Provinces, ce qui oblige à les choisir de grande race, de grande haleine, & d'une extrême vitesse. Les Portugais choisissent, parmi ceux-ci, les mieux rablés, gigotés & courts, pour bien courir le lievre sur les côteaux & les montagnes.

3°. Le *lévrier franc* & le *lévrier métis* : ils se trouvent en Espagne & en Portugal : on les croit mêlés de quelque race de chiens coureurs, ou de ceux qui rident naturellement. Ces sortes de chiens, qui ne deviennent jamais gras ni gros, conviennent en ce pays-là, qui est inculte & rempli de broussailles ; ce qui fait qu'ils ne vont qu'en bondissant après le gibier, qui y est fort commun : ils ont l'art de l'investir, de maniere qu'ils ne man-

quent pas de le prendre & de le rapporter : on les appelle ordinairement *charnaigres*. Les métis de cette race ont la queue velue & les oreilles pendantes.

4°. Le petit *lévrier d'Angleterre* : on choisit les plus hauts pour courir le lapin dans une garenne ou dans quelque lieu clos ; on les y tient en leſſe proche des épinieres faites exprès , & qui ſont éloignées des trous où les lapins ſe retirent , étant hors de terre. Si on veut faire courir le petit lévrier , on bat les épinieres , d'où il ſort un lapin , qui , voulant regagner ſon trou , ſe trouve barré & ſouvent pris par le lévrier.

Les lévriers qui ont le palais imprimé de grandes ondes noires , ſont les plus vigoureux : on choiſit ceux qui ſont tiſonnés , à gueule noire , & qui ont le corps marqueté de très grandes taches , le pied ſec , une encolure longue , la tête petite & longue , le poil longuet , & plus de chair à la partie poſtérieure qu'à l'antérieure. *Voyez l'article CHIEN.*

LEZARD , *Lacertus*. Sous ce nom générique , on comprend toutes les eſpeces d'animaux amphibies , qui ont une reſſemblance commune avec le crocodile , tels que l'alligator , le cordyle , le caméleon , la ſalamandre , le lézard ou dragon volant , le ſeps , le ſcinc , &c. On diſtingue les lézards ſelon la figure de leur tête & de leur queue , ainſi qu'on le peut voir dans la comparaifon des lézards vulgaires avec les ſalamandres. Les uns ont le dos uni , d'autres l'ont dentelé comme un peigne. Il y en a de terreſtres , & d'autres qui ſont aquatiques ; c'eſt-à-dire , qui ne vivent pas indifféremment ſur la terre ou dans l'eau. Tous ont les pieds digités , & leurs femelles conſervent dans leur ventre les œufs qu'elles ont conçus. Nous ne ferons que donner ici la liſte des lézards les plus connus , nous étant réſervé d'en parler à l'article particulier de chacun d'eux.

Le très grand lézard d'Amérique , nommé des Latins *caudiverbera* , parcequ'il remue continuellement la queue , eſt couvert d'écailles minces , &c. C'eſt une eſpece de *lézard fouetteur* : voyez CORDYLE. Il y a un autre grand lézard d'Amérique que les François appellent *ſauvegarde* : voyez ce mot.

Dans cette même diviſion de lézards à écailles minces , des Auteurs placent le tilcuetz-pallin de la Nouvelle Eſpagne , le tecuixim , le lézard argus , le lézard tigré d'Amérique , & celui de Ceylan , dont la queue eſt fourchue , voyez ASCALABOS ; le lézard étoilé de la Mauritanie , le lézard verd & bleu de l'Île de Saint-Euſtache , l'ameira de Surinam , le tamapara des Amazones , le lézard roux de Rio de Janeiro , le taraguira & le tecunhana de Bayak au Breſil , le lézard bleu de Guinée , le lézard noirâtre d'Amboine , le ramacolin de la Nouvelle Eſpagne. Les autres lézards les plus connus , ſont le quelzpales du Breſil , dont la queue eſt par anneaux & épineuſe ; le cutezpallin du Mexique ; le taraguico-aicuraba du Breſil , dont la queue eſt couverte de fines écailles quarrées ; le talatec de Virginie ; le tupinambis d'Amérique , voyez SAUVEGARDE & TEJUGUACU ; le

Ieguana d'Amérique ; le sola-ager de Ceylan ; le galeotes d'Arabie ; le dragon ophiomachus du Bresil , qui a une hupe crêtée ; le tecoixin du Mexique ; le senembi des Indes ; l'heliaca ou soleil d'Amérique , &c.

Les lézards qui ressemblent aux salamandres par la figure de leur tête , & par leur langue épaisse & charnue , ont le tronc du corps , ainsi que la queue & les pieds comme les lézards vulgaires : ils sont ovipares , c'est-à-dire , qu'ils déposent de vrais œufs ; tels sont , l'ameira de la Nouvelle Espagne , la salamandre caméléon d'Amboine , le rapayakin de Bonne-Espérance.

Description des Lézards vulgaires.

Le LÉZARD GRIS, ORDINAIRE OU COMMUN, *Lacertus terrestris*, a communément cinq à six pouces de long , & un demi-pouce de large : sa tête est triangulaire , aplatie , couverte d'amples écailles : il a le museau mouffe & ovale ; les yeux vifs , recouverts de leurs paupieres ; les oreilles situées au derriere de la tête , rondes & bien ouvertes ; la gueule grande , formée de deux mâchoires armées de dents fines , un peu arquées ; quatre pattes qui représentent des mains à cinq doigts , munis de petits ongles crochus : tout le dessus du corps est d'un gris cendré , agréablement varié sur les côtés , revêtu d'une peau ornée de belles écailles : le dessous de la gorge est fait en maniere de coqueluchon , d'une couleur dorée , luisante ; le ventre est d'un verd bleuâtre & garni d'écailles quarrées , plus grandes que celles qui couvrent le dessus du corps : l'anüs est assez grand , & situé un peu au-dessous des pieds de derriere : la queue est ronde , de la longueur du corps , & se termine en pointe : la langue est rougeâtre , assez longue & plate , fendue en deux par le bout.

Redi dit que tout lézard mâle a le membre génital double comme les serpents , quelquefois même fourchu. Il y en a qui ont double & triple queue. Quelques Indiens regardent la rencontre des lézards comme un signe certain d'une fortune prochaine.

On a éprouvé que cet animal ne mange que peu ou point durant l'hiver , & qu'il peut vivre huit mois sans prendre de nourriture , ce qui lui est commun avec la vipere , qui vit ainsi jusqu'à dix mois , & avec la tortue qui vit jusqu'à dix-huit mois. Le caméléon & le limaçon vivent aussi très long-tems sans prendre de nourriture.

Le lézard est un animal commun & utile dans les pays chauds , où il détruit un très grand nombre de mouches , & d'autres insectes incommodes , qui se multiplieroient excessivement. Cet animal dépose ses œufs dans les vieilles mazures , où il se retire lui-même pendant l'hiver , & la chaleur de l'air suffit seule pour les faire éclore. La cause de la bifurcation de la queue du lézard , paroît avoir une forte d'analogie avec la vertu reproductrice du polype ; cependant cette bifurcation peut être dûe à des pierres , qui en tombant sur la queue de ces animaux , la coupent en deux ou en trois : la queue vertebrée est la véritable & ancienne queue ; celle

qui n'a point de vertebres osseuses ni cartilagineuses , mais une espece de tendon , est la nouvelle queue , qui est beaucoup plus molasse & moins fragile.

M. Needham , dans ses *nouvelles observations microscopiques* , a fait un chapitre exprès sur la langue du lézard , dont nous croyons utile de rapporter l'extrait. La langue de cet animal est fourchue , il la lance avec vitesse : vue au microscope , elle paroît dentelée comme une scie : cela lui sert pour mieux retenir sa proie , qui étant ailée lui échapperait facilement. On en a donné une figure qui a été tirée d'après une langue qu'on avoit pressée & sechée entre deux glaces , pour la rendre plus transparente , & pour obliger les dents à se montrer ; car on ne les voit point quand l'animal est mort , elles restent appliquées contre les bords de sa langue , & il y a apparence qu'il peut les faire sortir & rentrer à volonté.

Les lézards gris changent de peau deux fois l'année : savoir , au printemps & en automne , à la maniere des serpents. Ils aiment beaucoup à se chauffer aux rayons du soleil ; c'est peut-être la raison pourquoi ils sont plus communs dans les pays chauds que dans les pays froids. L'hiver ils sont comme engourdis : au commencement du printemps ils se réveillent , & s'accouplent au commencement d'Avril ; dans l'accouplement ils s'entortillent l'un à l'autre de maniere à ne représenter qu'un seul corps à deux têtes , comme font en pareille occasion les serpents ; ensuite ils vont pondre leurs œufs dans la terre au pied des murs exposés au midi , & où la chaleur suffit , comme nous l'avons déjà dit , pour les faire éclore au bout d'un certain tems. Ils se nourrissent de mouches , de fourmis , de grillons , de fauterelles , & sur-tout de vers de terre. Plus il fait chaud , plus ils sont alertes : ils courent très rapidement , & semblent aimer la présence de l'homme ; de-là vient que les Anciens avoient nommé les lézards *l'ami de l'homme & l'ennemi du serpent*. Ces lézards sucent avidement la salive des enfants , & deviennent quelquefois familiers : on peut les manier impunément & sans aucun risque.

Le LÉZARD VERD , *Lacertus viridis* , est semblable au *lézard gris* , mais deux ou trois fois plus grand & même davantage ; tout le dessus de son corps est d'un vert luisant , agréable à la vue : il habite ordinairement dans les brossailles , les buissons & les bruyeres ; souvent il fait peur aux passants par le bruit qu'il excite en courant rapidement à travers les feuilles seches , puis il s'arrête tout-à-coup , & paroît regarder l'homme avec complaisance : les plus gros se trouvent dans les pays chauds. Le lézard verd est extrêmement colere , & quand il peut saisir un chien par le nez , il se laisse entraîner jusqu'à ce que le chien l'ait tué ; mais on n'a pas de preuve certaine que sa morsure ait jamais causé d'accident fâcheux. Les Chasseurs disent que dans la saison des nids des oiseaux , il gobe leurs œufs aussi fréquemment pour le moins que le coucou , & c'est pour cette raison principalement qu'il grimpe aux arbres. Si on lui coupe la queue , elle lui repousse. M. Perrault ayant arraché à un petit crocodile des dents qui branloient ,

branloient , a trouvé dans les alvéoles d'autres dents très petites , mais très bien formées , qui devoient succéder & croître à la place des premières : c'est ce qui a fait croire à cet Observateur , qu'il en est de même de la queue du lézard , & que la Nature lui en a donné en réserve des germes qui se développent , lorsque la première queue lui a été enlevée.

Le célèbre M. Duverney a fait voir que la peau qui couvre la partie interne de la cuisse du lézard verd , est percée de dix à douze trous qui répondent à autant de glandes.

Le lézard se bat quelquefois contre les serpents , dont il devient communément la proie. Les Africains mangent volontiers ces lézards verts.

En Médecine , on regarde les lézards comme fortifiants & résolutifs : on en prépare une huile par infusion ou par coction , qui est bonne pour les taches de la peau , & pour faire croître les cheveux.

LEZARD D'EAU. Il n'est pas rare de rencontrer dans les bassins & les fossés les lézards verts & gris dont nous venons de parler. M. Long a observé que les lézards de terre sont moins dangereux que ceux qui naissent dans l'eau , de même que les crapauds qui ne sont pas venimeux dans le froid , le deviennent dans la chaleur : de-là vient qu'ils sont si nuisibles en Italie.

On donne aussi le nom de *lézard d'eau* à un poisson que l'on trouve dans les mers des Indes , & qui est assez semblable aux poissons allongés , tels que les merlans & les harengs. Sa tête ressemble à celle d'une fauterelle ; les yeux sont placés au-dessus , ce qui lui donne une extrême facilité d'apercevoir ce qu'il veut prendre ou éviter. Il a précisément au-dessous des ouies , une partie charnue qu'il pose sur le sable , & sur laquelle il se balance & se tourne comme sur un pivot , prenant toute l'attitude d'un lézard qui guette sa proie , ce qui lui a fait donner le nom de *lézard d'eau*. Dès qu'il aperçoit ce qu'il guette ou qu'on s'approche de lui , il s'élance & saute à plusieurs reprises avec une très-grande vivacité. Il a sur le dos une espèce de nageoire garnie d'épines , qu'il plie ou redresse à volonté , comme la perche , & qui lui sert comme de défense.

L'aliment le plus ordinaire du lézard d'eau , est une espèce de crabe. Celui-ci est armé d'un seul côté d'une pince , presque aussi grosse que son corps : dès qu'il voit son ennemi , il lui présente cette pince , dont la vue seule apparemment le tient en respect ; car le crabe continue de manger , comme s'il n'avoit rien à craindre : mais comme il faut pour entrer dans son trou , qu'il replie cette pince le long de son corps , c'est ce moment que le poisson saisit pour l'enlever. *Voyez Hist. de l'Académie , année 1751.*

LEZARD ECAILLEUX ou DIABLE DE JAVA. Nom sous lequel les François établis aux Indes Orientales désignent une espèce d'animal , qui n'est point réellement du genre ni même de la classe des lézards. Il y en a même deux espèces , qui toutes les deux sont des quadrupèdes vivipares , & non des ovipares , comme le sont les lézards. Ces animaux sont nommés par les Indiens de l'Asie méridionale , l'un *pangolin* , & l'autre

phatagin. Voyez leur description , leur histoire , leurs mœurs sous ces mots
PANGOLIN & PHATAGIN.

LEZARD FOUETTEUR : voyez CORDYLE.

LEZARD GOITREUX : voyez GOITREUX.

LEZARD DE MER : voyez DRACONCULE.

LEZARD GRIS : voyez à la suite de l'article LÉZARD.

LEZARD VERT : voyez à la suite de l'article LEZARD.

LEZARD VOLANT. On en trouve en Amérique dans une des Îles du Canada. Ces animaux volent d'arbre en arbre, & l'on prétend qu'ils font leurs nids & pondent comme des oiseaux, dans des creux d'arbres : leurs œufs sont bleus, mouchetés de rouge, & de la grosseur d'un pois.

LHAMA ou LNAMA. Les Indiens du Chily donnent ce nom aux *petits chameaux Péruviens* : voyez l'article GLAMA.

LIAIS. On donne ce nom à une pierre calcaire blanche, & qui est assez dure pour recevoir un poli mat & une belle sculpture. On en distingue de plusieurs fortes : il y a le *liais-rose* qui est le plus beau ; le *franc-liais* ou le *liais-feraut*, qui se calcine difficilement au feu, & qui sert, par cette raison, à faire les jambages de cheminée : toutes ces pierres se trouvent aux environs de Paris, & portent depuis six pouces jusqu'à huit de hauteur ou plutôt d'épaisseur.

LIANE. C'est un genre de plantes très singulières qui croissent en Amérique, où l'on s'en sert au lieu de cordes : ces plantes y sont fort communes ; on y distingue sur-tout, 1°. la *liane à ail*, ainsi appelée, parcequ'étant fraîchement coupée, elle répand une odeur forte & désagréable, comme celle de l'ail : 2°. la *liane blanche* : 3°. la *liane crape* : 4°. la *liane franche* : 5°. la *liane à panier* : 6°. la *liane punaise* : 7°. la *liane quarrée* : 8°. la *liane rouge* ou *liane à eau* : 9°. la *liane séguine* : 10°. la *liane tocoyenne* : 11°. la *liane à glace* ou *liane à serpent*.

Les lianes montent en serpentant autour des arbres qu'elles rencontrent, & après être parvenues jusqu'aux branches les plus hautes, elles jettent des filets qui retombent perpendiculairement, s'enfoncent dans la terre, y reprennent racine & s'élèvent de nouveau, montant & descendant alternativement. D'autres filaments portés obliquement par le vent ou par quelque hazard, s'attachent souvent aux arbres voisins, & forment une confusion de cordages pendants en tous sens, qui offrent aux yeux le même aspect que les manœuvres d'un vaisseau. Il n'y a presque aucune de ces lianes à laquelle on n'attribue quelque propriété particulière, dont quelques-unes sont bien confirmées : telles sont celles de l'*ipecacuana*.

Il y a des lianes aussi grosses que le bras, quelques-unes étouffent l'arbre qu'elles embrassent, à force de le ferrer. Il arrive quelquefois que l'arbre sèche sur pied, se pourrit & se consume, & qu'il ne reste que les spires de la liane, qui forment une espèce de colonne torse isolée & à jour, que l'art auroit bien de la peine à imiter. Les Sauvages qui habitent le long de la rivière des Amazones, trempent leurs flèches pour les empoisonner dans

des fucs extraits de diverses plantes , particulièrement de certaines lianes. Ces flèches empoisonnées ont la singulière propriété de conserver leur effet , presque aussi actif , au bout d'un an. *Voyez le Voyage de M. de la Condamine.*

Dans la Guyane , on se sert de la liane blanche pour les mêmes usages que les lianes franches & punaïses , excepté que les Tonneliers ne s'en servent pas pour attacher leurs cercles : on en fait d'assez bons paniers , ainsi qu'avec la liane à panier , dont le nom désigne l'emploi qu'on en fait particulièrement : celle-ci ressemble à la liane blanche par la couleur ; mais elle en diffère par les nœuds. La liane crape n'est pas plus grosse qu'une ficelle : elle sert au besoin , ainsi que la liane seguine , à amarrer des barrières , à coudre les panneaux faits de feuilles de baroulou ou balisier , & à faire des instruments de pêche. La liane franche est la meilleure du pays , elle dure plus que le clou qui l'attache , mais elle n'est pas commune dans les lieux habités : on la vend vingt sols le paquet de deux cents brins marchands , c'est-à-dire , sans nœuds & de deux brasses de longueur. On la trempe pour l'employer , elle se fend aisément : on en garnit les bouteilles appelées *dames-jeannes* ; les Tonneliers s'en servent pour attacher leurs cercles. La liane punaise est fort rampante , son brin est de quarante pieds sans nœuds , elle sert aux mêmes usages que la précédente. La liane quarée a les mêmes usages que la liane rouge , & se prépare de même ; mais elle n'a pas la même propriété de fournir de l'eau à ceux qui auroient soif. La liane rouge ou liane à eau , étant tordue , sert à faire des barrières , des amarrages , des palissades : elle est fort commune & croît fort vite ; mais elle ne dure guères qu'un an , étant employée & exposée à l'air : il y en a d'aussi grosses que le poignet. Étant coupée , elle rend une eau claire & pure , dont les Voyageurs & les Chasseurs altérés font un grand usage ; mais il faut observer après l'avoir coupée par le bas , d'en couper promptement la longueur de trois à quatre pieds dans le haut pour obliger l'eau à descendre , sans quoi l'eau , au lieu de s'écouler , remonte dans l'instant vers le haut de la tige. La liane seguine est très bonne en ptisane ; elle a d'ailleurs les mêmes usages que la liane crape. Enfin la liane tocoyenne sert à faire des paniers propres au ménage ; son écorce qui est double , la rend plus difficile à gratter & à préparer : elle naît abondamment dans les pays habités par la Nation appelée *Tocoyenne*. A l'égard de la *liane à glacer* , voyez CAA-PEBA.

LIBER : voyez aux articles ARBRE & ÉCORCE.

LICHEN. Nom donné à une famille de plantes , que l'on dit être du genre des *champignons* : voyez ce mot. Les *mousses terrestres* sont aussi des espèces de *lichens* , ainsi que la *pulmonaire de chêne* & l'*hépatique commune* : voyez ces mots. Le peuple se sert quelquefois de toutes sortes de mousses ou de lichens pour teindre , sans considérer s'ils sont tous propres à cette opération & à donner une même couleur. Les lichens les plus connus des Teinturiers sont l'*orseille* & la *perelle* : voyez ces mots. M. Westbeck fait

encore mention , dans les *Mémoires de l'Académie de Suede* , de la couleur violette & d'un beau rouge constant que l'on peut obtenir du *lichen foliaceus umbilicatus* , *subtus lacunofus* , *Linn.* Ce lichen paroît au coup d'œil comme s'il avoit été brûlé ; il est aussi mince que du papier , se réduit en poudre pour peu qu'on le touche quand il est sec. Il n'est attaché à la pierre que par une seule petite racine qui se trouve au milieu du lichen , il est rempli de tubercules qui sont creux par-dessous. On recueille ce lichen comme les autres , par un tems humide , afin qu'il se détache plus facilement de la pierre. A ce défaut on arrose la pierre avec de l'eau : ensuite on le lave , on le fait sécher , & on en tire la couleur par le moyen de l'urine , comme on fait pour l'*orseille*.

LICHENÉE DU CHÊNE. Nom que l'on donne à une très belle chenille qui se trouve sur une espece de lichen gris-blanc dont elle a les couleurs , & le long duquel elle rampe sur le tronc du chêne , auquel elle s'attache vers la fin de Mai. Cette chenille courbe & plie avec art trois feuilles du chêne , elle en fait une boule , qu'elle enduit intérieurement d'une matiere visqueuse , d'une espece de soie , & cette bourre devient le surtout de sa coque. Cette chenille chrysalide produit au commencement de Juillet un beau papillon , dont les aîles , brodées en point de Hongrie , sont parmi les jeux de la Nature un vrai chef-d'œuvre.

LICORNE DE MER. C'est une espece de baleine du Groënland , dont nous avons parlé sous le nom de *narwhal* , à l'article de la **BALEINE**. On appelle du nom seul de *licorne* l'espece de dent ou défense de ce poisson cétacée : on la voit aussi communément dans les Cabinets des Naturalistes , qu'on la fait passer pour rare & précieuse dans le Trésor de S. Denis en France. Le Vulgaire l'appelle *corne* ou *dent marine* , en latin *ceratodon* : c'est une défense qui n'est pas située obliquement , ni perpendiculairement , mais sur le même plan du corps de l'animal , ainsi que le dit Mr. Brisson dans son *Regne animal* , p. 367. Cet Auteur qui appelle aussi cette partie de la licorne *dent* , dit que le narwhal a à la mâchoire supérieure deux dents (il faut cependant observer qu'il n'en a communément qu'une) longues de six pieds , droites , tortillées en spirale , qui percent la levre supérieure & avancent en avant.

Des Lithologistes appellent *licorne fossile* , *monoceros* , des portions osseuses fossiles de grands animaux , & qu'on trouve , ou endurcies ou altérées , à différentes profondeurs de la terre. Les Allemands en emploient beaucoup en Médecine , sous le nom d'*unicorne fossile* ou d'*ivoire fossile* , *unicornu fossile* : voyez **IVOIRE FOSSILE**.

LIEGE , *Suber*. C'est un arbre de moyenne hauteur , qui croît en Italie , en Provence , en Gascogne , vers les Pyrénées , en Roussillon , en Espagne , & dans les autres lieux méridionaux. Cet arbre , qui ressemble beaucoup au chêne verd , a une racine grosse , longue & dure : elle pousse un tronc qui jette beaucoup de rameaux , & son écorce est épaisse , fort légère , très spongieuse , de couleur grisâtre , tirant sur le jaune : elle se fend d'elle-

même & se sépare de l'arbre, si l'on n'a pas soin de l'en détacher, parce-qu'elle est poussée par une autre écorce qui se forme dessous, & qui est si rouge qu'on la voit de fort loin. Ses feuilles ressemblent aussi à celles du chêne verd, mais elles sont plus grandes, plus molles, & plus vertes en dessus; ses chatons & ses glands sont pareillement semblables à ceux du chêne verd; mais son gland est plus long, plus obtus, & d'un goût plus désagréable que celui de l'yeuse.

Quand les habitants des lieux où croît le liege, veulent faire la récolte de son écorce, ils attendent pour cela un tems chaud & serein; car s'il arrivoit une pluie immédiatement après la récolte, c'est-à-dire, quand il n'y a plus que la jeune écorce, elle se gâteroit bientôt, & l'arbre seroit en danger de périr. Le tems étant favorable, ils fendent le tronc de l'arbre tout de son long pour tirer l'écorce plus commodément, ils la trempent aussitôt dans l'eau pour l'amollir, & la mettent ensuite sur des charbons embrasés; puis ils la chargent de pierres, afin de la redresser & de la rendre plate; après cela ils la nettoient & la transportent. Tel est le liege qu'on transporte en balots dans tout le monde, dont on se sert pour faire des bouchons, & qui s'emploie pour la pêche & dans la marine à différents usages: on en couvre les maisons en certains cantons d'Espagne; on choisit pour cela le liege en belles tables, uni, peu noueux, n'étant point crevassé, d'une épaisseur moyenne, léger, mais le moins poreux, & qui se coupe net facilement.

L'écorce de liege est astringente, propre pour arrêter les hémorrhagies & le cours de ventre, soit qu'on la prenne à la dose d'un demi-gros en substance, ou d'un gros réduit en poudre, soit qu'on la prenne en décoction depuis une demi-once jusqu'à une once dans une pinte d'eau. Le liege brûlé & réduit en cendre impalpable, puis incorporé dans de l'huile d'œufs, est un bon remède pour adoucir & réduire les hémorrhoides.

Ce que les ouvriers appellent *noir d'Espagne*, n'est que l'écorce du liege, que les Espagnols calcinent dans des pots couverts, pour la réduire en une cendre noire, extrêmement légère. Les Cordonniers mettent du liege sous les souliers pour les rendre plus secs, & pour relever la taille de ceux qui les portent.

LIEGE FOSSILE ou **LIEGE DE MONTAGNE**, *Suber montanum*. C'est une espèce d'asbeste en tables plus ou moins épaisses & extérieurement semblables à du liege, qu'on trouve dans les Pyrénées, du côté de Campan, & en Languedoc vers le pays d'Alais. Le liege fossile est très léger; il est composé de fibres assez flexibles, d'un tissu lâche & qui se croisent irrégulièrement. Les morceaux de cette espèce d'asbeste sont poreux, comme fongueux, jaunes, brunâtres en dehors, blanchâtres en dedans, & contiennent des matières hétérogènes qui les font entrer en une sorte de vitrification. *Voyez à l'article ASBESTE.*

LIERRE, *Hedera*. On donne le nom de *lierre* à deux plantes différentes, qui sont le *lierre en arbre* & le *lierre terrestre*.

Le LIERRE TERRESTRE, TERRETE, HERBE DE S. JEAN, RONDETTE, *Hedera terrestris*, croît dans les lieux humides; il pousse des tiges quadrangulaires, rampantes, sur lesquelles naissent des feuilles opposées deux à deux, arrondies & crenelées. Ses fleurs sont disposées par anneaux à chaque aisselle des feuilles; elles sont bleues & d'une seule piece en gueule: aux fleurs succèdent quatre graines, oblongues, arrondies & lisses, contenues dans un calice. Toute la plante a l'odeur forte & la saveur amere. Elle est toute d'usage; cette plante est un des meilleurs vulnéraires. Sa décoction, mêlée avec des yeux d'écrevisse, est très propre pour les chûtes, sur-tout pour résoudre le sang grumelé, & guérir la difficulté de respirer qui en est la suite. Cette décoction prise en lavement est très propre pour appaiser les douleurs de la colique & pour guérir la dyssenterie. On prétend que le suc de cette plante tiré par les narines, non-seulement adoucit, mais même guérit entierement le mal de tête le plus violent.

Le LIERRE EN ARBRE, *Hedera arborea*, plante si célébrée par les Poëtes, prend différentes formes, selon le lieu où elle croît, & selon son âge; c'est ce qui fait que les Auteurs anciens parlent de tant de diverses sortes de lierre. Nous voyons ici très souvent cette plante rampante le long des arbres ou des murailles, dans les jardins, dans les champs & dans les forêts; mais en Italie, en Provence, en Languedoc, elle devient un arbre. Il y a des lierres à feuilles panachées.

Les fleurs de lierre en arbre naissent, en maniere de parasol, en grand nombre à l'extrémité des sarments: elles sont en rose, composées chacune de six pétales, de couleur herbacée. Aux fleurs succèdent des baies presque rondes, égales à celles du genievre, qui contiennent les graines. Les feuilles de lierre qui sont à l'extrémité des branches sont à-peu-près ovales; les autres sont presque triangulaires, & en général la forme des feuilles varie beaucoup; mais elles sont toujours fermes, luisantes, posées alternativement sur les branches. Ce qui prouve que le lierre ne tire pas sa nourriture des griffes par lesquelles il adhère à l'arbre, c'est que la plante périt lorsqu'on coupe la tige par le pied. Les lierres se greffent naturellement, par approche, les uns sur les autres, & forment une espece de réseau qui enveloppe le tronc des arbres auxquels ils sont attachés.

Les lierres peuvent être mis dans les bosquets d'hiver; car on peut les tondre en buisson comme les chevrefeuilles, ils sont très propres à couvrir les murs auxquels ils s'attachent d'eux-mêmes, & on en peut faire des portiques qui font un bel effet, sur-tout l'hiver, ainsi qu'on peut le voir à Paris dans le cloître des Peres Capucins du Marais. Quoique les Anciens n'employassent guere qu'à l'extérieur le lierre en arbre, Palmarius & Boile rapportent que ses baies mûres & pulvérisées en petite dose, ont été employées avec succès dans une peste qui regnoit à Londres: on les pulvérisoit dans du vinaigre, ou on les prenoit dans du vin blanc pour exciter la sueur. Ses feuilles passent pour être vulnéraires & détersives; on emploie

leur décoction contre la teigne & contre la galle , & l'on prétend qu'elle noircit les cheveux. Dans les pays chauds , tels que la Perse & autres pays orientaux , on retire par incision du tronc des plus gros lierres (*hedera arborea*) une résine en larmes , nommée improprement *gomme de lierre*. Cette résine doit être d'un brun-rougeâtre , à peine demi-transparente , d'un goût âcre & aromatique : elle est sans odeur , si ce n'est lorsqu'on l'approche de la flamme , car alors elle répand une odeur agréable , qui ressemble assez à celle de l'encens oliban. Elle entre dans quelques onguents , comme résolutive. On a prétendu mal-à-propos qu'elle étoit un bon dépilatoire. Les Persans en font entrer dans la composition des astringents externes & de quelques vernis. En Europe on fait de petites boules avec le bois du lierre en arbre , & on les met dans les cautères avec succès , car ce bois attire très bien , & on ne renouvelle ces globules qu'une fois le mois.

On lit dans l'Encyclopédie , qu'il se fait à la Chine une espece de toile d'ortie , d'une plante appelée *Co* , qui ne se trouve gueres que dans la Province de Fokien : cette plante est une espece de lierre , dont la tige donne un chanvre qui sert à la fabrique de cette toile d'ortie , appelée *Coupon* : on la fait rouir , on la tille , on rejette la premiere peau , mais on garde la seconde , qu'on divise à la main , & dont , sans la battre ni la filer , on fait une toile très fine & très fraîche. N'aurions-nous point dans nos contrées , dit M. Diderot , des plantes qu'on pût dépouiller de leur premiere peau , & sous laquelle il y en eût une autre propre à l'ourdisage ? Cette recherche ne seroit point indigne d'un Botaniste.

LIEVRE, *Lepus*. Animal quadrupede granivore. On donne assez communément à la femelle le nom de *hase* , & on nomme ses petits *levrauts*. Ces animaux sont trop connus de tout le monde , pour avoir besoin d'autre description que celle que nous en donnerons , en parlant de leurs mœurs & de leur maniere de vivre.

Les especes d'animaux les plus nombreuses ne sont pas les plus utiles , dit M. de Buffon ; rien n'est même plus nuisible que cette multitude de rats , de mulots , de fauterelles , de chenilles , & de tant d'autres insectes dont il semble que la Nature permette , & souffre plutôt qu'elle ne l'ordonne , la trop nombreuse multiplication : mais l'espece du lievre & celle du lapin ont pour nous le double avantage du nombre & de l'utilité. Les lievres sont universellement & très abondamment répandus dans tous les climats de la terre , si on en excepte les pays du Nord. Les lapins se multiplient par-tout d'une maniere prodigieuse. *Voyez LAPIN*.

Dans les cantons conservés pour le plaisir de la chasse , on tue quelquefois quatre ou cinq cents lievres dans une seule battue. Ces animaux sont en état d'engendrer en tout tems & dès la premiere année de leur vie : les femelles ne portent que trente ou trente-un jours , elles produisent trois ou quatre petits ; & dès qu'elles ont mis bas , elles reçoivent le mâle ; elles le reçoivent aussi lorsqu'elles sont pleines. Ces femelles ont deux sortes de matrices distinctes & séparées , & qui peuvent agir indépendamment l'une

de l'autre , ce qui fait qu'elles peuvent concevoir & accoucher en différents tems par chacune de ces matrices , & c'est aussi ce qui est cause que les superfétations , dans ces animaux , sont aussi fréquentes qu'elles sont rares dans ceux qui n'ont pas ce double organe.

Il est quelquefois assez difficile de distinguer le lievre d'avec sa femelle , sur-tout dans leur jeunesse , parcequ'alors les mâles n'ont au-dehors ni bourses ni testicules , & que les femelles ont le gland du clitoris proéminent , presque aussi gros que le gland de la verge , & que la vulve n'est presque pas apparente ; de plus les femelles sont plus ardentes que les mâles , & les couvrent avant d'en être couvertes ; c'est ce qui a fait dire que dans les lievres il y avoit beaucoup d'hermaphrodites.

Jacques Dufouilloux , dans son *Traité de la Vénérerie* , dit qu'on peut distinguer le mâle en le voyant partir du gîte , parcequ'il a le derriere blanchâtre , comme s'il avoit été épilé ; ou bien par les épaules , qui sont communément rouges & parsemées de quelques poils longs : de plus le mâle a la tête plus courte , plus ronde ; le poil des barbes long ; les oreilles courtes , larges & blanchâtres : au contraire la femelle a la tête longue & étroite ; les oreilles grandes , & le poil de dessus l'échine d'un gris tirant sur le noir. Les crottes du mâle sont plus petites & plus seches que celles de la femelle. Ces observations sont utiles aux Chasseurs qui ne veulent point tirer une hase , afin de ne point dépeupler le canton.

Les levrauts ont les yeux ouverts en naissant : la mere les allaite pendant vingt jours ; après quoi ils s'en séparent d'eux-mêmes , & vont chercher leur nourriture. Ils ne s'écartent pas beaucoup les uns des autres , ni du lieu où ils sont nés ; cependant ils vivent solitairement & se forment chacun un gîte à une petite distance , comme de soixante ou quatre-vingts pas : ainsi lorsqu'on trouve un levraut dans un endroit , on est sûr d'en trouver encore un ou deux autres aux environs. C'est pendant la nuit que les lievres mangent , s'accouplent , se promènent : on les voit au clair de la lune jouer ensemble , sauter , courir les uns après les autres ; mais le moindre mouvement , le bruit d'une feuille suffit pour les troubler ; ils fuient chacun d'un côté différent. Il n'y a point lieu de penser que le lievre rumine , comme quelques Auteurs l'ont avancé ; car il n'a qu'un estomac , & de plus son intestin *mæcum* est très grand , ainsi que dans le cheval & l'âne , qui ne peuvent ruminer n'ayant qu'un estomac.

Pendant le jour les lievres restent à leur gîte , qui est un sillon ou quelqueendroit un peu creux : ils dorment beaucoup , & dorment les yeux ouverts , parceque leurs paupieres sont trop courtes pour pouvoir couvrir commodément leurs yeux. Ils voient mieux de côté que devant eux : ils paroissent avoir les yeux mauvais ; mais ils ont , comme par dédommagement l'ouïe très fine , & l'oreille d'une grandeur démesurée relativement à celle de leur corps ; ils remuent ces longues oreilles avec la plus grande facilité ; ils s'en servent comme de gouvernail pour se diriger dans leur course , qui est si rapide qu'ils devancent aisément tous les autres animaux.

Comme

Comme ils ont les jambes de devant beaucoup plus courtes que celles de derriere , il leur est plus commode de courir en montant qu'en descendant ; aussi , quand ils sont poursuivis , commencent-ils toujours à gagner les hauteurs : ils marchent sans faire aucun bruit , parcequ'ils ont les pieds couverts & garnis de poils , même par-dessous ; ce sont aussi peut-être les seuls animaux qui aient des poils au dedans de la bouche.

Les lievres prennent presque tout leur accroissement en un an , & vivent environ sept ans. Ils passent leur vie dans la solitude & dans le silence , & l'on n'entend leur voix que quand on les saisit avec force , qu'on les tourmente ou qu'on les blesse. Ils ne sont pas aussi sauvages que leurs mœurs & leurs habitudes paroissent l'indiquer ; on les apprivoise aisément , ils deviennent même caressants , mais ils ne s'attachent jamais assez pour pouvoir devenir animaux domestiques ; ils tâchent de se mettre en liberté , & s'enfuient à la campagne. Comme ils ont l'oreille bonne , qu'ils s'asseyent volontiers sur leurs pattes de derriere , & qu'ils se servent de celles de devant comme de bras , on en a vu qu'on avoit dressé à battre du tambour , à gesticuler en cadence , &c.

Paullini nous apprend qu'un Chirurgien , en Prusse , avoit un lievre qui s'accoupla avec une chatte ; & que ce Chirurgien voyant que la chatte ne pouvoit accoucher , lui fit l'opération Césarienne ; moyennant quoi il lui tira du ventre deux petits chats & un levraut. Mais on est très porté à douter d'un pareil fait , lorsqu'on fait que la femelle du lievre ne peut même rien produire avec le lapin ; animal qui paroît avoir tant de ressemblance avec le lievre.

Le lievre ne manque pas d'instinct pour sa propre conservation , ni de sagacité pour échapper à ses ennemis : il se forme un gîte ; il choisit en hiver les lieux exposés au midi , & en été il se loge au nord : il se cache , pour n'être pas vu , entre des mottes qui sont de la couleur de son poil. On en a vu qui avoient recours à différentes ruses : l'un partoît du gîte dès qu'il entendoit le cor-de-chasse , alloit se jeter dans un étang , & se cachoit au milieu des joncs ; un autre , après avoir été couru des chiens , faisoit un saut , & alloit se cacher dans le tronc d'un arbre. Ce sont-là sans doute les plus grands efforts de leur instinct. Pour l'ordinaire , lorsqu'ils sont lancés & poursuivis , ils se contentent de courir rapidement , & ensuite de tourner & retourner sur leurs pas : ils ne dirigent pas leur course contre le vent , mais du côté opposé. Les Chasseurs prétendent que le lievre a l'odorat très bon ; aussi lorsqu'on fait une battue , est-il nécessaire de prendre le bon vent.

En général , presque tous les animaux paroissent être d'habitude. Tous les lievres qui sont nés dans un même lieu où on les chasse , ne s'en écartent guere ; ils reviennent au gîte : si on les chasse deux jours de suite , ils font le lendemain les mêmes tours & détours qu'ils ont faits la veille. Lorsqu'un lievre , relancé par les lévriers , va droit & s'éloigne beaucoup du lieu où il a été lancé , c'est une preuve qu'il est étranger , & qu'il n'étoit

dans ce lieu qu'en passant. Il arrive en effet , sur-tout dans le tems le plus marqué du rut , qui est aux mois de Janvier , de Février & de Mars , que des lievres mâles manquant de femelles en leurs pays , font plusieurs lieues pour en trouver , & s'arrêtent auprès d'elles ; mais ils regagnent leur canton pour ne plus revenir lorsqu'ils sont lancés par les chiens. Les femelles qui n'ont pas autant de force & d'agilité que les mâles , ont plus de ruses & de détours : elles craignent l'eau & la rosée ; au lieu que parmi les mâles , il s'en trouve plusieurs que l'on nomme *lievres ladres* , qui cherchent les eaux , & se font chasser dans les étangs , les marais & les autres lieux fangeux. Ces lievres ladres ont la chair de fort mauvais goût ; & en général tous les lievres qui habitent les plaines basses ou les vallées , ont la chair insipide & blanchâtre ; au lieu que dans les pays de montagnes , où il y a du serpolet & des herbes odoriférantes , ils sont bien meilleurs. Les femelles ont toujours la chair plus délicate que les mâles. Suivant certains Chasseurs , il y a une sorte de lievres qui sentent si fort le musc , qu'ils font entrer en fureur les chiens qui les suivent à la piste.

La nature du terroir influe sur les lievres comme sur tous les autres animaux. Les lievres de montagnes sont plus grands & plus gros que les lievres de plaine , & ils varient aussi un peu pour la couleur. Dans les hautes montagnes en Suisse & dans les pays du Nord , ils deviennent blancs pendant l'hiver , & reprennent pendant l'été leur couleur ordinaire ; il n'y en a que quelques-uns , & ce sont peut-être les plus vieux , qui restent toujours blancs , car tous le deviennent plus ou moins en vieillissant. En Laponie , les lievres deviennent blancs pendant dix mois de l'année , & ne reprennent leur couleur fauve que pendant les deux mois les plus chauds de l'été. Cette blancheur est occasionnée par le froid ; mais on observe que la partie inférieure des poils la moins exposée à l'air , ne devient point blanche : cette blancheur procure à ces animaux une sorte de fureté contre les oiseaux de proie , qui ne les voient pas facilement passer sur la neige. Quoique ces lievres soient beaucoup plus communs dans les pays froids que dans nos climats tempérés , on en trouve pourtant quelquefois de semblables en France ; par exemple , dans la Province de Sologne , & notamment sur la Paroisse de Vienne , à cinq lieues d'Orléans.

Il paroît que tous les climats sont égaux au lièvre ; cependant on en trouve moins en Orient qu'en Europe , & peu ou point dans l'Amérique méridionale. Les lievres de l'Amérique septentrionale sont peut-être d'une espèce différente de celle des nôtres ; car les Voyageurs disent que non-seulement ils sont plus gros , mais que leur chair est blanche , & d'un goût tout différent de celui de la chair de nos lievres ; qu'ils sont tous noirs ; que leur poil ne tombe jamais , & qu'on en fait d'excellentes fourrures. Dans les pays excessivement chauds , sous la zone torride , en Afrique & en Amérique , on trouve aussi des animaux que les Voyageurs ont pris pour des lievres , mais qui sont plutôt des espèces de lapins ; car le lapin est originaire des pays chauds , & ne se trouve pas dans les climats septen-

trionaux ; au lieu que le lievre est d'autant plus fort , qu'il habite un climat plus froid.

Plusieurs Auteurs célèbres rapportent qu'on a vu des lievres cornus , dont les crânes étoient conservés dans les Cabinets des Curieux. Le Docteur Salomon Réiseliuss fait mention d'un lievre monstrueux , qui avoit deux corps , huit pattes & quatre oreilles : on rapporte , ce qui paroît bien difficile à croire , que cet animal à double face , comme un *Janus* , étant fatigué d'une part , se retournoit de l'autre , & couroit toujours d'une force nouvelle. On lit dans les *Mémoires de l'Académie* , année 1700 , que M. Léméri apporta à l'Assemblée un petit lievre monstrueux , ou plutôt deux lievres joints ensemble , depuis la tête jusqu'à la poitrine : ils n'avoient qu'une tête & qu'une face , quoiqu'ils eussent quatre oreilles. Ils n'avoient , à la place de la gueule , qu'une petite cavité pour recevoir les aliments ; cependant ils vécurent quelque tems , & furent pris à la main par un Chasseur. L'animal double marchoit dans un bois ; mais l'un tiroit d'un côté , l'autre de l'autre , & ils n'avançoient guere. On a dit à M. Léméri , qu'en les ouvrant , on leur avoit trouvé à chacun un cœur , un poumon , un estomac , le tout bien sain. On voit , dans le *Cabinet du Roi* , un de ces levrauts monstrueux , à deux corps. On a vu aussi plus d'une fois des lievres à deux têtes , à plusieurs pattes , &c.

La chasse du lievre se fait pendant le jour : lorsqu'il fait bien chaud , le lievre ne part pas si-tôt , & se laisse plus approcher ; on le rencontre souvent au gîte , c'est-à-dire , couché par terre sur le ventre. Lorsqu'il y a de la fraîcheur dans l'air par un soleil brillant , & que le lievre vient de se gîter après avoir couru , la vapeur de son corps forme une petite fumée , que les Chasseurs apperçoivent de fort loin , sur-tout si leurs yeux sont exercés à cette observation. J'en ai vu , dit M. de Buffon , qui , conduits par cet indice , partoient d'une demi-lieue pour aller tuer le lievre au gîte : il se laisse ordinairement approcher de fort près , sur-tout si l'on ne fait pas semblant de le regarder , & si , au lieu d'aller directement à lui , on tourne obliquement pour l'approcher. Lorsque les bleds sont grands , il y établit son gîte ; & du lieu où il s'est fixé , il pratique à l'entour plusieurs petites avenues , par lesquelles il peut fuir librement , parcequ'il en coupe & en abbat les épis. Il craint les chiens plus que les hommes ; & lorsqu'il sent , ou qu'il entend un chien , il part de plus loin. On va à la chasse du lievre avec des chiens d'arrêt , ou on le force à la course avec des lévriers & des chiens courants. On peut aussi le faire prendre par des oiseaux de proie. Les ducs , les buses , les aigles , les renards , les loups , les hommes lui font également la guerre. Il a tant d'ennemis , qu'il ne leur échappe que par hasard ; & il est bien rare qu'ils le laissent jouir du petit nombre de jours que la Nature lui a compris.

Le lievre , si recherché pour la table en Europe , n'est pas du goût des Orientaux ; il est vrai que la loi de Mahomet , & plus anciennement la loi des Juifs , a interdit l'usage de la chair du lievre , comme celle du cochon.

Sa chair est excellente ; son sang même est très bon à manger , & est le plus doux de tous les sangs : il dissipe les taches de rousseur & les boutons du visage. La graisse n'a aucune part à la délicatesse de sa chair ; car le lievre ne devient jamais gras tant qu'il est à la campagne en liberté , mais il meurt souvent de trop de graisse lorsqu'on le nourrit à la maison. Les cendres du lievre brûlé en entier , ou celles de sa peau , sont recommandées dans la pierre , dans l'alopecie , & dans les engelures : on prétend que si l'on frotte les gencives des enfants avec la cervelle du lievre , elle facilitera la dentition ; on ordonne aussi la fiente de lievre pour la dysenterie ; enfin ses poils arrêtent les hémorrhagies.

LIEVRE MARIN. Nom que quelques Naturalistes donnent à deux poissons de mer , mols.

Le LIEVRE MARIN VULGAIRE , appelé en Languedoc *lebre de mar* , est un poisson de rivage , dont la peau est lisse : il a le museau fait comme le lievre de terre , avec deux petites oreilles. Rondelet dit qu'il a la tête semblable à celle du scorpeno , & deux protubérances au dessus des yeux. Ses dents se ferment les unes contre les autres ; elles sont menues & épaisses : à la mâchoire de dessus , il en a deux qui sortent du rang des autres. La nâgeoire du dos est grande , & marquée de taches noires : il habite communément dans la bourbe.

L'autre LIEVRE MARIN est une espece de poisson rond , très commun dans l'Océan Britannique , & dans la mer de Bosnie : il est épais & d'une figure informe. Sa peau est rude , & couverte de tubercules pointus & noirs : il a à chaque côté trois rangs de nâgeoires recourbées , & autant sur le dos. Celles du ventre se tiennent par les extrémités , & forment comme une seule nâgeoire circulaire , dont ce poisson se sert pour s'attacher au fond de la mer & contre les rochers , & pour résister à la violence des flots : on en voit beaucoup au marché à Londres , & en plusieurs endroits d'Angleterre. C'est un assez bon manger.

On donne encore le nom de *lievre marin* à un insecte qu'on trouve dans la mer & dans les étangs fangeux. Nous en parlons sous le nom de *limace de mer*. Voyez ce mot.

LIGAS. Nom donné à une espece d'*anacarde* oriental. Voyez ce mot.

LIGANS , est une espece de crocodile de l'Afrique. Sa longueur est ordinairement de quatre pieds : il a le corps tacheté de blanc , l'œil fort rond , & la peau assez tendre : il ne fait la guerre qu'aux poules. Les Negres d'Afrique estiment sa chair plus que celle de la meilleure volaille.

LILAS ou QUEUE DE RENARD DE JARDIN , *Lilac*. Plante originaire des Indes Orientales , & dont on distingue plusieurs especes qui different par la couleur de leurs fleurs , & qui s'élevent assez haut ; d'autres ne sont que des arbustes beaucoup plus petits , tels que les lilas de Perse. Leur écorce est grise , verdâtre ; leur tronc est rempli d'une moëlle blanche & fongueuse : les feuilles sont opposées , lisses , vertes & luisantes. Les lilas se chargent , dans le mois de Mai , de grappes de fleurs , qui font un

effet admirable dans les bosquets , tant par leur beauté que par leur odeur ; tels sont les lilas à fleurs bleues , à fleurs blanches , à fleurs pourpres , dont quelques-uns ont les feuilles panachées. Ces especes de lilas conservent leur verdure jusqu'aux gelées ; mais leurs feuilles sont sujettes à être mangées par les cantharides.

Les petits lilas de Perse à feuilles de troène & à fleurs blanches , & les autres à feuilles découpées & à fleurs bleues , font un effet charmant dans les plattes-bandes , & ont encore une odeur plus suave que les premiers dont nous avons parlé. A ces fleurs succedent de petits fruits aplatis , & semblables à un fer de pique.

Les lilas se multiplient aisément par des drageons enracinés , que l'on arrache des gros pieds. On peut aussi coucher les branches , pour leur faire prendre racine. Ces arbrisseaux viennent assez bien dans les terrains les plus arides ; mais les lilas de Perse demandent une terre plus substantielle.

La poudre & la décoction des semences du lilas sont astringentes. Quelques-uns donnent aussi le nom de *fyringa* au lilas ordinaire , parceque ses grosses branches étant vidées de leur moëlle font des tuyaux : aussi les Turcs en font-ils des pipes. Voyez SERINGAT.

LILAS DES INDES. Voyez AZÉDARACH.

LILIACÉES , *Liliacea*. Nom donné à une famille de plantes herbacées & vivaces , & qui ont depuis un pouce jusqu'à quinze pieds de hauteur ; d'une figure peu rameuse & ordinairement ramassée vers la terre. Leurs racines sont fibreuses , communément simples. La plupart n'ont point de tiges , ce sont seulement les bases des feuilles qui , s'enveloppant les unes les autres , forment une bulbe arrondie. Parmi les *liliacées* qui ont une tige , on observe qu'elle est peu rameuse , feuillue ou sans feuilles. Ces feuilles sont dans quelques-unes de ces plantes , simples , alternes & entieres ; dans d'autres , elles sont opposées & même verticillées , comme dans le *lys* , le *fritillaire* , quelques asperges , &c. elles forment la plupart à leur insertion , une gaine plus ou moins entiere. Les fleurs sont hermaphrodites dans le plus grand nombre : tantôt elles terminent les tiges , tantôt elles sortent des aisselles des feuilles solitairement ou en ombelle ; tantôt elles sont disposées en épi ou en panicule. Les unes sont nues sans écailles , d'autres sont accompagnées d'écailles , ou sortent d'une enveloppe commune qu'on appelle du nom de *spath* , à cause de sa ressemblance avec celle des palmiers ; tels sont les oignons & les narcisses. On remarque quelques fleurs doubles dans les liliacées ; telles sont celles de l'iris , du narcisse , de la tubereuse & du muguet. Leur poussiere prolifique est composée de molécules arrondies , d'un blanc jaunâtre , comme transparentes ; leur fruit est un capside ou baie à trois loges & trois battants , qui s'ouvrent du haut en bas. Leurs graines sont plattes ou rondes , attachées horizontalement au centre du fruit sur un rang. On range parmi les liliacées , les *joncs* , les *iris* , les *lys* , les *narcisses* , les *scilles* , les *oignons* , les *asperges*. Voyez ces mots.

LILIUM LAPIDEUM. C'est le *pentacrinus* ou l'*encrinus*, ou *encrinie* des Litographes, dont nous parlerons au mot *palmier marin*. C'est le lilienstein (*pierre de lys*) des Allemands.

Le *lilium lapideum* est une pétrification communément spatheuse & très rare ; on diroit des branches de trochites, qui partent d'une tige ou racine commune, assez semblable à la base d'un artichaut, & qui imitent assez bien un lys à cinq ou six pétales, dont les feuilles ne sont point encore épanouies. L'on prétend que c'est une espèce de *tête de méduse*, devenue fossile à l'instant où ses membres étoient en contraction. Voyez ces différents mots, & l'article ZOOPHYTE. Agricola, *Lib. V. de Natur. fossil.* dit qu'il s'en trouve dans les fossés qui regnent autour des murs de la ville d'Hidelshein en Westphalie.

LIMACE ou **LIMAS**, *Limas nudus*. Est un reptile terrestre, qui vit sans coquille, tout nud, & qui ne diffère des limaçons que parcequ'il est plus allongé, & qu'il n'a point de robbe.

Les Naturalistes comprennent plusieurs espèces de limaces ; les unes noires, les autres grises, tachetées ou non tachetées ; d'autres jaunes, semées de taches blanches ; d'autres brunes ou toutes rouges : cette dernière espèce est la plus commune.

La **LIMACE ROUGE**, *Limax ruber*, est de la grosseur & longueur de l'index, pesant une once & demie ou environ : sa peau est double ; l'extérieur est sillonné, & d'une substance de cuir ; l'intérieur est fibreux, & criblé d'une infinité de traces : son manteau ou coqueluchon lui tient lieu de coquille. C'est dans cette partie que l'animal cache sa tête, son col & son ventre, toutes parties qui n'ont point de forme fixe. Cet insecte a quatre cornes qui lui servent à se conduire à tâtons, sans yeux, mais qui sont terminées par un petit globule noir. On remarque de plus, que l'animal fait sortir & rentrer ses cornes de la même manière que les doigts d'un gant : il a encore à la tête une dent faite en croissant, armée de quinze pointes, située à la mâchoire d'en haut. Deux petites pierres sableuses & perlées se tirent aussi de la limace ; l'une de sa tête, & l'autre de son dos. Ces osselets portent le nom de *pierre de limace* : ils sont fort vantés des Charlatans, sans avoir d'autres vertus que la pierre à chaux. La tête de cet insecte est distinguée de la poitrine par une raie noire, comme la poitrine l'est du ventre. Cet animal vit encore long-tems étant coupé par morceaux ; c'est peut-être la raison pour laquelle M. Linnæus met la limace dans la classe des vers, & du genre ou de l'ordre des zoophytes.

Les limaces sont hermaphrodites comme les escargots, enforte que chacune d'elles donne la fécondité à une autre, de qui elle la reçoit en même tems. Dans l'accouplement, la partie masculine qui est d'un bleu pâle, se gonfle considérablement, & sort par une large ouverture, située au côté droit du col, près des cornes : cet organe, qui est de même forme & de même grandeur dans les deux sexes, est une espèce de cordon, que les deux individus, quand ils veulent s'accoupler, poussent au dehors par un

mécanisme semblable à celui qui fait sortir leurs cornes. On trouve quelquefois les limaces, en cet état, dans une attitude singulière, c'est-à-dire, suspendues en l'air, la tête en bas, & accrochées à un tronc ou à une branche d'arbre, queue à queue, par une assez grosse corde filée de leur propre bave. Redi dit en avoir vu passer trois heures en cet état, & que pendant tout ce tems, les cordons qui sortent hors du corps, s'entrelacent, s'agitent, se contractent, & se couvrent enfin d'une écume savonneuse, blanchâtre, qui est leur liqueur spermatique.

Leurs œufs sont sphériques, blanchâtres, à-peu-près comme des grains de poivre blanc; mais quand ils sont prêts à éclore, ils jaunissent un peu.

Les limas ou limaces, autrement dites licoches, se nourrissent, ainsi que les limaçons, d'herbes, de champignons, de papier mouillé; ils se plaisent dans les bas prés, dans les lieux souterrains & limoneux, où le soleil ne donne que peu ou point; quelquefois sur des montagnes, dans des forêts ombrageuses; en un mot dans des endroits frais, couverts & humides, même dans des jardins, parmi les plantes potageres : la trace de leur marche est marquée, par une couche de glu luisante, sur la terre, sur les murs & sur les arbres, par où ils ont passé; cette marche est fort lente.

Si l'on saupoudre bien une limace avec du sel commun, du nître ou du sucre, elle jette aussi-tôt au dehors une grande quantité de matière visqueuse, fort tenace, & pour l'ordinaire de deux couleurs, c'est-à-dire jaune & blanche. Cette matière devient épaisse comme de la colle; & en moins de quatre minutes, la limace enfle, se roidit & meurt : si l'on considère alors la peau de cet animal, séparée des parties internes, au lieu de la trouver épaisse & dure comme elle est ordinairement, on la trouve flexible, très mince & sèche, parcequ'elle a perdu toute son humeur visqueuse.

Les limaces sont rafraichissantes, humectantes & pectorales; on s'en sert intérieurement contre la toux & le crachement de sang : nous nous étendrons plus au long sur les vertus de cet animal, en parlant de celles des limaçons en général. On nomme quelquefois la limace, *limaçon rouge*.

LIMACE DE MER. Elle a une grande ressemblance extérieure avec la limace terrestre, ou à un limaçon hors de sa coquille; elle a le ventre plus gros & moins visqueux; & au lieu du capuce que porte la limace de terre, elle a deux expansions membraneuses qui lui servent de nageoires. On en trouve dans la mer des Indes qui sont plus grandes que les nôtres : elles sont de couleur rousse, noirâtres sur le dos.

Redi, qui a donné la Description anatomique des limaces terrestres & de mer, dit qu'il ne sait pas pourquoi l'on a donné à ces dernières, le nom de *lievres marins*; à moins que ce ne soit, dit-il, parceque, quand elles étendent leurs cornes postérieures, & retirent les cornes antérieures, elles paroissent au premier coup d'œil, avoir quelque ressemblance imparfaite

avec le lievre , dont les longues oreilles peuvent être représentées par ces cornes antérieures retirées. On regarde cette limace comme venimeuse au toucher ; elle cause un vomissement & un dévoiement d'estomac , même l'alopecie ou la chute des poils : broyée avec de l'huile , c'est un excellent dépilatoire.

LIMAÇON, *Cochlea*. Est un coquillage univalve ou un ver testacée , & qu'on fait être androgyne ou hermaphrodite comme le précédent ; & conséquemment il a , par rapport à la génération , un plus grand appareil d'organes que la plupart des autres animaux. Chaque individu réunit en lui les deux sexes , il peut en faire usage en même tems ; mais il ne peut se passer d'un autre individu pour opérer la fécondation. Les organes de la génération sont difficiles à trouver dans cet insecte : M. Adanson dit qu'il faut les chercher entre les deux cornes qui sont sur la tête de l'animal. Nous ne rapporterons point ici tout ce que Lister , Rondelet , Aldrovande & plusieurs autres ont écrit sur les limaçons ; nous nous bornerons à en faire connoître les observations les plus curieuses , & nous y ajouterons la division de deux Conchyliologues modernes. Nous parlerons d'abord du limaçon des jardins ou escargot commun , puis des limaçons de mer.

Le **LIMAÇON DE TERRE**, *Cochlea terrestris*, qui est le *colimaçon* des jardins , ou l'escargot commun , ou limas à coquille , est un ver oblong , sans pieds ni os , composé d'une tête , d'un col , d'un dos , d'un ventre , & d'une sorte de queue , enfermé dans une coquille d'une seule piece , qui est plus où moins grande , d'où il sort en grande partie , & où il rentre à son gré. Sa peau est un tissu tendineux , plus lisse & plus luisante sous le ventre ; plus terne , sillonnée & grainée sur le dos ; capable d'une grande extension & contraction ; plissée & fraisée sur les bords , formant de chaque côté comme des ailes , par le moyen desquelles il rampe sur la terre d'un mouvement vermiculaire ou d'ondulation , qui lui tient lieu de pieds. Toute sa tête sort de la coquille , comme une bourse qu'on retourneroit : on y remarque quatre cornes , deux grandes & deux petites ; les premières sont les supérieures ; elles sont de figure conique , un peu transparentes , longues de huit lignes , & garnie à leur extrémité d'une liqueur jaunâtre , qui contient un petit point noirâtre. On est encore fort indécis sur l'usage de ces cornes : les grandes font-elles la fonction d'yeux ou de lunettes d'approche , & les deux petites lui tiennent-elles lieu d'antennes ou de bâtons (*tentacula*) pour tâter le terrain qui l'environne , afin de diriger sa route ? Ces cornes sont d'un sentiment exquis ; le moindre obstacle les lui fait retirer avec une extrême promptitude. Sa bouche est assez grande , béante , forte , armée de dents rouges , & formée de deux mâchoires.

Le Docteur Muralto a donné l'anatomie de cet animal , mais les détails en sont trop longs pour le suivre ici ; nous dirons seulement qu'il a vu le cœur de cet animal palpiter , & faire son mouvement naturel de dilatation & de contraction. On trouve dans le bas-ventre une substance grasse , visqueuse , gluante , qui s'attache fortement aux doigts ; elle est jaunâtre
&

& collée aux intestins ; on en fait la pommade de limaçon , qui est bonne pour les boutons du visage : c'est cette même mucosité qui , venant à se sécher dans les lieux par où le limaçon a rampé , luit comme des feuilles d'argent. Le limaçon rend , de tous les endroits de son corps , & particulièrement de ses parties inférieures , une si grande quantité d'humeur , qu'il semble plutôt nager que ramper. La tenacité de cette humeur visqueuse & grasse l'empêche de tomber , & d'être pénétré , soit par l'air , soit par l'eau. Pour ménager une liqueur si précieuse , il a grand soin d'éviter les ardeurs du soleil qui la dessécheroient ; il habite communément les lieux frais. Quand le limaçon veut se mettre en quête , il étend ses deux appendices musculieuses ou ailes rampantes qui , en resserrant leurs plis de devant , se font suivre de ceux de derrière & de tout le bâtiment qui pose dessus. Ce bâtiment est sa coquille ; il la porte par-tout avec lui. Cette coquille est formée par juxtaposition , comme toutes les autres demeures de testacées. *Voyez* ce que nous en avons dit au mot COQUILLE.

Le limaçon terrestre réunit dans sa coquille deux avantages aussi singuliers que difficiles à concilier , la légèreté & la solidité. On voit sur quelques coquilles terrestres , deux ou trois raies ou bandes , tracées de largeur inégale & de couleurs différentes , coupées par un grand nombre de lignes transversales ou en zigzag ; telles sont les coquilles des limaçons de jardin : il y en a d'une seule couleur , jaune ou rose , avec un liseré noir.

Aux approches de l'hiver , le limaçon s'enfonce dans la terre , ou se retire dans quelque trou , quelquefois seul , mais ordinairement en compagnie. Il forme alors avec sa bave , à l'ouverture de sa coquille , un petit couvercle blanchâtre , & il se renferme entièrement. *Voyez* le mot OPERCULE , à l'article COQUILLAGE.

Ce couvercle met l'animal à l'abri des injures de l'air & de la rigueur du froid : il demeure ainsi fixe à sept mois sans mouvement & sans prendre aucune nourriture , jusqu'à ce que le printemps ramène les beaux jours. Avec l'appétit tous ses besoins renaissent : il ouvre sa porte , & va chercher de quoi réparer des forces un peu épuisées par le jeûne de l'hiver. Sa nourriture consiste en feuilles de plantes , &c. Les Jardiniers savent mieux que personne , que ces animaux font un grand dégât dans les jardins potagers & fruitiers , sur-tout pendant la nuit & dans les tems pluvieux ; ils attaquent aussi la vigne , les pois , les fèves , les vesces & les lentilles. Une tortue dans un jardin , est le meilleur destructeur des limaçons qu'on ait pu trouver jusqu'ici.

M. de Réaumur a donné l'histoire d'un insecte , qu'il appelle *insecte des limaçons* . parcequ'il habite tantôt la surface extérieure d'une des parties du corps du limaçon , & tantôt va se cacher dans les intestins de cet animal. Le poux dont il est question est facile à observer , lorsque le limaçon est entièrement renfermé dans sa coquille : on peut aussi le remarquer dans diverses autres circonstances. Cet insecte marche presque continuellement avec une vitesse extrême. Si la coquille est fermée , il attend pour voyager.

que le limaçon ouvre son anus , lequel est placé dans l'épaisseur du collier. L'insecte saisit le moment favorable , qui lui donne une vaste entrée dans les intestins du limaçon. Il paroît que les intestins de ce coquillage sont le séjour que ces sortes de poux aiment le mieux , & que le limaçon les pousse sur son collier toutes les fois qu'il fait sortir ses excréments. La sécheresse contribue fort à leur formation ; c'est aussi le tems de chercher à les voir. M. de Réaumur dit en avoir alors compté plus de vingt sur le même limaçon , dont le corps seul est un terrain convenable à ces insectes ; car on ne les voit guere sur la coquille , à moins qu'on ne les force d'y aller : leur couleur est blanchâtre , mêlée d'une nuance rose.

Nous avons omis de dire que le limaçon a au côté droit du col , un trou assez grand , qui est en même tems le conduit de la respiration , la vulve & l'anüs ; c'est par-là que sortent au besoin les parties masculine & féminine , toutes prêtes à faire leurs fonctions. Cela n'arrive pleinement qu'après qu'un limaçon en a rencontré un autre ; & que par plusieurs mouvements préliminaires plus vifs , & , pour ainsi dire , plus passionnés qu'on ne l'imagineroit d'une espece aussi froide , ils se sont mis l'un & l'autre dans une même disposition , ou se sont assurés d'une parfaite intelligence. Ils ont une autre agacerie fort singuliere. Outre les parties mâle & femelle , il leur sort , par la même ouverture du col , un aiguillon fait en fer de lance à quatre appendices , qui se termine en une pointe très aiguë & assez dure , quoique friable : comme les deux limaçons tournent l'un vers l'autre la fente de leur cou , il arrive que quand ils se touchent par cet endroit , l'aiguillon de l'un pique l'autre ; & la mécanique qui fait agir cette sorte de flèche ou de petit dard , est telle qu'il abandonne en même tems la partie à laquelle il étoit attaché , de maniere qu'il tombe par terre , ou que le limaçon piqué l'importe. Ce limaçon se retire aussi-tôt ; mais peu de tems après , il rejoint l'autre , & le pique à son tour. Après quoi l'accouplement ne manque jamais de s'accomplir.

Les limaçons ont coutume de s'accoupler jusqu'à trois fois de quinze en quinze jours : à chaque accouplement on voit un nouvel aiguillon ; ensuite ils se joignent , & leur accouplement dure dix à douze heures ; ils paroissent alors comme engourdis : leur matiere féminale est d'une consistance de cire. Léméri dit qu'on peut voir facilement la mécanique de cet accouplement , en faisant mourir dans le vinaigre ces animaux accouplés.

Environ dix-huit jours après l'accouplement , les limaçons pondent par l'ouverture de leur col , une grande quantité d'œufs qu'ils cachent en terre avec beaucoup de soin & d'industrie. Ces œufs sont blancs , revêtus d'une coque molle & membraneuse , collés ensemble par une glu imperceptible en maniere de grappe , & gros comme des graines de vesce.

On distingue , aux environs de Paris , plusieurs sortes de limaçons terrestres à coquilles ; savoir , le *limaçon des vignes* , celui *des jardins* , ceux qui sont appelés la *luisante* , la *livrée* , la *firiée* , la *lampe antique* , le *cornet de S. Hubert* , le *grain d'orge* , le *grain d'avoine* , la *nompareille* , le *ba-*

rillet, &c. Le pays d'Aunis, l'Angleterre, l'Italie, la Chine & l'Amérique en fournissent dont les couleurs sont admirables. M. Linnæus en cite douze especes qui se trouvent en Suede. Les Transactions Philosophiques font aussi mention de deux especes de limaçons, de la grosseur d'un gros grain d'avoine, dont les volutes sont contournées de droite à gauche ; ce qui fait appeller ces sortes de coquilles, *uniques*.

Le LIMAÇON DE MARAIS OU D'EAU DOUCE, *Cochlea fluviatilis*, se trouve dans les fleuves, les lacs, les grands marais, les fossés & les étangs. Le même Naturaliste Suédois en cite seize especes, parmi lesquelles il y a des *buccins*. Voyez ce mot.

Le LIMAÇON DE MER OU NOMBRIL, ou OMBILIC MARIN, ou FÈVE DE MER, *Cochlea marina umbilicata*, se trouve assez communément dans la Méditerranée. Les Espagnols appellent ce coquillage univalve, *caragolo* & *scanagolo*. La coquille est striée & gravée en dehors, lisse & polie en dedans ; elle n'a jamais moins de deux spirales ou contours, & jamais plus de dix. Sa bouche dans la mer est garnie d'une opercule calcaire, qui a la figure d'un nombril, rougeâtre en dessus, & blanchâtre en dessous ; ce qui fait appeller ce coquillage *limacon ombiliqué*. Quand l'insecte veut prendre de la nourriture, il pousse & ouvre ce couvercle ; & lorsqu'il en a pris suffisamment, il le retire à lui, & referme si exactement sa coquille, que l'eau de la mer n'y peut pénétrer. Cet opercule étoit autrefois d'un grand usage en Médecine.

Division des Limaçons de mer.

M. d'Argenville en fait trois genres qui naissent de la différence de leur bouche.

1°. Les *limaçons à bouche ronde*, tels que le *burgau*, dont les ouvriers tirent une belle nacre ; le *dauphin*, l'*œil de bouc*, la *bouche d'or*, la *bouche d'argent*, le *ruban*, le *maron rôti*, l'*émeraude*, & plusieurs autres, dont les uns sont, ou unis, ou rayés, ou raboteux.

2°. Les *limaçons à bouche demi-ronde* : ces coquilles ont peu de contour, & l'extrémité de la volute est très peu saillante. Cette famille renferme plusieurs caracteres spécifiques qui forment des especes assez considérables, dit M. d'Argenville, comme les *nérites*, qui dans leur bouche demi-ronde, ont des gencives, d'autres sont ombiliquées, &c.

3°. Les *limaçons à bouche aplatie* : ils diffèrent des autres par leur bouche aplatie en ovale, & par leur figure conique. Cette famille renferme encore des especes aussi singulieres que les précédentes : il y en a dont la tête s'élevant en pyramide, forme plusieurs spirales, & ce sont là les vrais *sabots* : d'autres s'élèvent la moitié moins, & conservent mieux la forme de vrais limaçons : d'autres enfin sont entièrement aplaties, tels que la *lampe antique* & l'*escalier*. Ces remarques, dit notre Auteur, font connoître que l'élévation de la figure ne détermine pas le vrai caractère

d'un coquillage. De ce dernier genre de fabots, sont les coquilles appelées le *toit Chinois* ou la *pagode* & le *cul de lampe*, le *bouton de la Chine*, le *cornet de S. Hubert*, l'*éperon*, le *cadran*, la *forcie*.

Telle est la distribution des limaçons de mer par M. d'Argenville, qui dit par expérience, que l'avantage que le limaçon à bouche plate a sur les deux autres, c'est de n'être point sujet par la configuration & la juste proportion du poids de son corps avec la plaque charnue sur laquelle il rampe, à se renverser en passant dans les endroits escarpés; au lieu que les autres allant par les mêmes endroits, sont entraînés par le poids de leur coquille, peu proportionnée pour la grosseur à la force de l'animal, & sont renversés, froissés & blessés avant qu'ils aient pu s'en garantir, en retirant leurs cornes & rentrant promptement dans leur coquille.

Cette même division des limaçons de mer convient aux limaçons terrestres & fluviatiles. Les coquilles de ces derniers sont très fragiles : on les appelle *limaçons de marais*.

M. Adanson, dont nous avons aussi exposé la méthode pour la division des coquilles à l'article COQUILLES, dit que les coquillages dont la coquille consiste dans une seule pièce, de quelque figure qu'elle soit, ou en deux pièces dont l'une est tournée en spirale, s'appellent du nom commun & général de *limaçons*. Il divise les limaçons en univalves & en operculés. Sa méthode exige qu'on fasse attention dans la coquille des limaçons, à six parties principales, qui sont les *spires*, le *sommet*, l'*ouverture*, l'*opercule*, la *nacre* & le *péριοστε*. Il considère aussi cinq parties essentielles dans ces animaux; savoir, les *cornes*, les *yeux*, la *bouche*, la *trachée* & le *pied*. On trouvera la signification & le détail de ces termes au mot COQUILLE. A l'égard des limaçons de mer operculés, M. Adanson dit que cet opercule diffère de celui des limaçons univalves & terrestres, en ce que l'animal le prend dès sa naissance; au lieu que celui des limaçons terrestres, se forme tous les ans une ou plusieurs fois, & cela dans les tems où ces animaux veulent se mettre à l'abri de la sécheresse, occasionnée par les chaleurs ou par les froids excessifs : il consiste, comme nous l'avons dit, en une bave visqueuse sortie du corps de l'animal, & durcie en une croute blanche, assez épaisse, mais peu solide, plutôt coriace que cartilagineuse. Ceux de ces animaux qui sont dépourvus de mâchoires, ont à leur place une espèce de trompe qui leur sert de barrière pour percer les coquilles des autres coquillages, dont ils sucent la chair : il n'y a qu'un petit nombre de limaçons qui soient vivipares.

Nous avons dit au mot COQUILLAGE, que le *limacon de mer*, quoique réunissant communément en lui les deux espèces de parties sexuelles, ne peut se suffire à lui-même; & que cette sorte d'hermaphrodite a besoin du concours de deux individus pour se féconder réciproquement & en même tems, l'un servant de mâle à l'autre pendant qu'il fait à son égard les fonctions de femelle. M. Adanson, dans sa Conchyliologie, a fait figurer deux coquilles, *pl. 2*, auxquelles il donne le nom de *bulin* & *coret* : la première

est celle d'un petit limaçon fluviatile , nommé la *membraneuse* ; il se trouve aux environs de Paris , ainsi que l'autre qui est un petit buccin fluviatile. Il dit que leur hermaphrodisme , quoique possédant les deux especes de parties génitales , a besoin de la jonction de deux individus , mais qui ne peuvent se féconder en même tems , à cause de l'éloignement de leurs organes. *Voyez la page 660 du premier volume de ce Dictionnaire.*

Limaçons étrangers.

On remarque une variété extrême dans les limaçons du Cap de Bonne-Espérance ; il y a entr'autres le *limaçon quille* , que la mer jette sur ses bords en grande quantité , & qui est de toute beauté. On en fait présent aux étrangers curieux : les Européens du Cap en font de la chaux. Par la description que Kolbe donne de plusieurs autres especes de limaçons , on y reconnoît le *nautil* , l'*huître épineuse* , &c. Les côtes de l'Afrique , & l'Isle Tabago fournissent aussi de beaux limaçons , &c. Le lambis d'Amérique est aussi une sorte de limaçon. *Voyez LAMBIS.*

Propriétés des Limaçons.

Toutes les especes de limaçons testacées ou sans coquilles , sont d'une substance visqueuse & gluante : leur chair , quoique bien assaisonnée , produit toujours dans le corps humain des humeurs grossieres , capables d'embarrasser le cours du sang : tel est le sentiment des Auteurs de la *Suite de la Matière Médicale*. Cependant les Grecs & les Romains , qui étoient aussi délicats que nous dans leurs repas , en faisoient beaucoup d'usage comme aliment. Ces derniers même avoient des garennes & des viviers où ils les engraissoient pour les délices de la table : ils estimoient ceux qui venoient des Isles de Sardaigne & de Chio , de la Sicile , des Alpes , de la Ligurie & de l'Afrique. On dit que les habitants de la Silésie nourrissent des escargots avec de certaines plantes , pour les manger ensuite ; & que dans les jardins de Brunswick , on garde les limaçons qu'on a ramassés pendant l'été , dans des especes de fosses quarrées , dont les côtés sont boisés , & l'ouverture couverte d'un fil de fer , pour les manger en hiver. Nous avons vu en 1762 , aux environs de la Rochelle , des paysans occupés à ramasser dans les campagnes une très grande quantité de petits limaçons bigarrés de jaune & de noir , que l'on mettoit dans des barriques remplies de branches de bois croisées çà & là , afin que les limaçons pussent s'y disperser sur les surfaces multipliées. Cette récolte de limaçons étoit destinée pour l'Amérique ; & il y a des années où des Négociants du pays font un commerce de ces animaux vivants. Ces limaçons se collent contre les branches ou les parois de la futaille , & de cette maniere ils peuvent faire le trajet sans périr de faim , parcequ'ils ne dissipent que peu de leur humeur visqueuse. Quand on veut les manger , on les assaisonne , avant de les faire

cuire , avec le poivre , le sel , le vin , l'huile ou le beurre , & les aromates.

Dans notre pays , les limaçons les moins mal-faisants , sont ceux qui se trouvent dans les haies , les vignes & les jardins , parcequ'ils vivent de serpolet , de pouliot , d'origan , & d'autres herbes qui leur donnent un meilleur goût : le peuple en fait une assez bonne consommation en Franche-Comté , sur-tout au printems & dans le carême. Les Médecins n'en conseillent cependant l'usage qu'aux Pthysiques , pour calmer la toux ; on en fait des bouillons pectoraux & adoucissants , immédiatement après les avoir fait dégorger dans de l'eau chaude : on estime leur coquille apéritive ; peut-être n'est-elle qu'absorbante. Dans quelques Provinces de France , on emploie la poudre de limacès rouges séchées au four , contre la dyssenté-rie ; la dose en est de trente-six à quarante-huit grains dans un verre de vin , ou de tisane , ou de bouillon ; ce remède calme les épreintes & les déjections sanglantes. On se sert aussi des limaçons écrasés pour guérir les dartres ; ou bien on se contente de faire ramper & de laisser baver le limaçon sur la dartre. Les limaçons entrent dans l'eau pectorale de la Pharmacopée de Paris , & dans quelques collyres. *Voyez le Dictionnaire de Médecine.*

LIMAÇONNE. Nom que Goëdard donne à une chenille fort belle : elle a sur la tête comme cinq paquets de poils ; au devant de la tête deux cornes comme les limaçons , & une queue à l'extrémité du corps. Cette chenille est encore ornée de poils sur le dos : c'est avec son poil & sa salive qu'elle fait sa coque , pour se métamorphoser en chrysalide.

LIMAÇON ROUGE. *Voyez LIMACE.*

LIMANDE. Est un poisson de mer plat , peu large , & dont les nageoires sont molles : il est du même genre que la sole , le carrelet & la plie. *Voyez ces mots.* Ce genre de poisson nage à plat sur un côté. Rondelet dit que la limande ne diffère du carrelet que par l'âpreté de ses écailles , qui sont fortement attachées à sa peau ; elle a des taches jaunes aux nageoires qui environnent le corps , & une ligne tortue au milieu du corps : sa chair est blanche , molle & humide , & un peu gluante. Ce poisson est très connu dans les poissonneries : il est meilleur que le flez & le fletelet , qui sont aussi des espèces de limandes.

LIMON , *Lutum aut Limus.* Est une terre noirâtre ou brunâtre , détrempée , divisée & déposée çà & là par l'eau , chariée dans les marais : elle paroît principalement produite par un mélange de terre & de végétaux pourris ou détruits. Si l'on y appercevoit encore des filaments de plante , ce limon prendroit le nom de *tourbe limoneuse* ou de *tourbe*. *Voyez ce mot.* Quoique le limon ne donne pas toujours l'apparence de plantes , il ne laisse pas d'être quelquefois inflammable : il s'en trouve de tel en Brabant & dans le pays de Nantes en Bretagne. Le limon de la mer , quoique vaseux , ainsi que celui des fleuves , étant plutôt formé de la destruction des animaux que des plantes , pérille dans le feu , & y exhale une odeur très fétide. Ces deux phénomènes sont dus , l'un aux parties de sel marin , &

l'autre aux parties d'animaux , non totalement détruits. *Voy.* ADAMIQUE.

La couleur noirâtre du limon végétal , nous paroît communément due au fer. Toutes les especes de limon sont bonnes pour engraisser les terrains.

LIMONIER ou ARBRE DU LIMON, *Limon vulgaris*. Le limonier approche beaucoup du citronnier : même hauteur , même feuillage ; mais il est un peu plus court & moins branchu , & souvent garni de plusieurs épines. Ses fleurs ont une odeur plus foible : ses fruits sont moins longs & plus petits que les citrons ; leur substance est également vésiculeuse ou divisée en cellules , mais ils sont d'une couleur & d'une odeur moins fortes : ils viennent plusieurs ensemble ; leur écorce est aussi plus mince que celle des citrons , mais ils sont plus remplis de pulpe & d'un suc trop acide , pour pouvoir les manger : on les appelle *limons aigres*. Il y en a aussi de doux.

On fait usage des limons comme des citrons ; on les appelle même à Paris *citrons*. Mais ce nom mériterait d'être réformé , quoiqu'autorisé par un assez long usage. *Voy.* CITRONIER. Les limons sont plus rafraichissants , moins utiles contre les poisons , mais plus efficaces pour tempérer l'ardeur de la fièvre dans les maladies aiguës : on fait un syrop avec leur suc. Les lettres que l'on écrit avec ce suc sur du papier , paroissent lorsqu'on les approche du feu ; & les Teinturiers se servent aussi de ce suc pour certaines couleurs. *Voyez le Dictionnaire des Arts & Métiers*. Les semences du limon sont un peu ameres , & propres pour les vers.

LIN, *Linum*. Plante très utile , dont on distingue deux sortes principales , & qui sont d'usage en Médecine & dans les Arts.

Le LIN ORDINAIRE , *Linum sativum vulgare* , est une plante qui vient à l'aide de la culture dans les champs & les jardins. Sa racine est assez menue , peu fibreuse. Sa tige est ordinairement simple , haute d'environ deux pieds & demi , creuse , grêle , branchue vers le sommet ; laquelle étant rouie , battue , & préparée , donne beaucoup de fil. Ses feuilles sont pointues , étroites , placées alternativement le long de la tige. Ses fleurs naissent en ses sommités : elles sont d'un beau bleu , composées chacune de cinq feuilles disposées en œillet. A cette fleur succede un fruit presque sphérique , de la grosseur d'un pois chiche , renfermant en dix capsules membraneuses , dix semences oblongues ou presque ovales , applaties , pointues d'un côté , obtuses de l'autre , luisantes , d'une couleur fauve purpurine.

Le lin est au nombre de ces plantes qui , sur pied , ne paroissent avoir aucun rapport , aucune ressemblance avec les choses qu'on en fabrique. Combien de tems l'homme a-t-il foulé au pied ce végétal précieux , sans en connoître l'utilité ? Que la découverte en soit due au hasard ou à la sagacité de ces Observateurs qui épient pas à pas les productions de la Nature , toujours est-il constant que le lin a deux objets d'utilité ; la graine dont on retire de l'huile , & la tige dont on prépare le fil. En un mot , cette plante préparée sert à une infinité d'usages mécaniques , & particuliere-

ment pour la fabrication de la toile, dont l'usage est très salutaire au corps, & fait un objet de commerce considérable.

Culture du Lin.

La culture du lin est la plus intéressante après celle des grains. On en sème la graine par un beau tems sec & doux, & dès le mois de Mars, en terre grasse, & qui ne soit point trop humide. La plante fleurit en Juin. Le lin épuise beaucoup les terres; aussi n'en doit-on ressemer dans la même, qu'après deux ans de repos. On doit le semer plus clair que le chanvre, après avoir bien netoyé la terre de toutes racines & herbes; ensuite herfer la terre, & y passer le rouleau pour l'affaïffer; la sarcler au commencement de Mai, & arracher, s'il se peut, la mauvaise herbe (*la goutte de lin*, espèce de plante parasite), qui s'entortille autour de sa tige. Au reste, on sarcle le lin quand il a deux pouces de hauteur, & on continue jusqu'à ce qu'il en ait cinq. Le lin a besoin de petites pluies chaudes: il y a des pays où l'on rame le lin, tant il devient haut. On l'attache quand il est près de sa maturité.

Les Hollandois, qui ont un terrain gras & un peu humide & compact, sur-tout en Zélande, s'adonnent beaucoup à la culture du lin: ils préparent la terre avant d'ensemencer, 1^o. par des engrais, tels que du fumier très pourri, la marne, la chaux, les curures de mares, les rognures de cornes, le *goëmon* (espèce d'algue marine), & un peu de sable marin; 2^o. par trois ou quatre labours, après lesquels ils laissent la terre en jachère pendant tout l'été: on fait de même en Flandres. En Zélande, où la garance fait une branche de commerce, dès que l'on a défriché & labouré la terre, on y plante de la garance, qui y reste deux ans: tout cela emmeublit la terre; on la laisse reposer, & on y sème alors du lin. Dans notre pays, on y sème du trèfle qui fait beaucoup de bien à la terre, en la garantissant de l'ardeur du soleil, & en lui conservant la rosée & la pluie. 3^o. Par la division de leur terrain qu'ils font en planches, de cinquante à soixante pieds de large, & séparées par de petits fossés de deux ou trois pieds de profondeur, sur un pied & demi de largeur. Le sol étant ainsi préparé, on fait choix de la graine qu'on veut semer. La meilleure est courte, rondelette, ferme, huileuse, pesante, d'un brun clair; mise dans un verre d'eau, elle va au fond en peu de tems; jettée dans le feu, elle doit s'enflammer & pétiller sur les charbons: telle est la graine de lin de Dantzic ou de Riga. Pour avoir toujours de bonne graine, il faut semer dans une terre forte, de la graine recueillie dans une terre plus forte, & en jeter dans le champ une quantité moindre que celle qu'il est en état de bien nourrir; par ce moyen toutes les graines profitent, & l'on a de belles tiges.

Suivant un Mémoire de la Société de Dublin, les terres les meilleures pour la culture du lin, sont les terres glaises, profondes, fermes, un peu humides, labourées comme il convient: les terres graveleuses ou légères donnent,

donnent , à la vérité , du lin plus fin , mais en plus petite quantité , moins grand , & la graine dégénere dès la deuxième année. Les Hollandois , dont le commerce de toile florissant prouve leurs connoissances supérieures dans cette partie , ne sement presque point de lin dans la Province de Hollande , à cause que le terroir en est léger & sablonneux ; mais ils recueillent d'aussi beau lin & d'aussi bonne graine qu'il y en ait en Europe , dans les terres glaises , lourdes , fermes & humides de la Province de Zélande. Ces terres sont propres pour le lin , à raison de la glaise qui entre dans leur composition.

Le lin semé comme ci-dessus , est ordinairement mûr à la fin de Juin ; & après la récolte on peut semer des *turneps* ou de gros navets de bétail dans le même terrain , où ils viendront fort bien.

Il y a des Laboureurs qui distinguent deux sortes de lin cultivé , 1°. le *têlard* , qui est bas & a beaucoup de têtes : on le sème à la fin de Mars , on le cueille dès le mois de Juin. 2°. Le grand lin , qui est plus haut , & a moins de branches : on cueille celui-ci quand il jaunit.

Le semeur de lin doit suivre le sillon en ligne directe , & jeter la graine avec la main droite , & semer de la main gauche lorsqu'il revient sur ses pas , afin que le grain soit répandu également : on recouvre , peu de tems après la semence avec la herse. Dans quelques pays , on y passe alors le cylindre ; dans d'autres , on y jette par dessus de la fiente de pigeon & du fumier nouveau.

Le lin étant mûr , on l'arrache par un tems sec , & on le couche à terre sur le champ par grosses poignées , l'une à côté de l'autre , afin qu'il sèche. Lorsque la saison est favorable , il est suffisamment sec en douze ou quatorze jours ; autrement on l'y laisse par petits tas pendant vingt jours , ou en gros tas pendant un mois , plus ou moins , suivant la saison & le pays. C'est une mauvaise méthode que d'arracher le lin trop verd ; car , outre que le fil est plus gros , la filasse tombe presque toute en étoupe. Les Manufacturiers expérimentés ont grand soin de laisser plus long-tems sur pied le lin qu'ils destinent aux ouvrages les plus fins ; ils risquent même de perdre la graine , pour avoir la tige aussi mûre qu'il est possible , lorsqu'ils doivent l'employer à la meilleure espece de baptiste & à leurs dentelles , &c.

En Hollande , on égraine le lin aussi-tôt qu'il revient du champ , & on livre la plante à l'ouvrier dès qu'on a cueilli la graine. Pour séparer la graine d'avec la tige , on se sert d'un peigne de fer appelé *drege* : on peut aussi retirer la graine de la coque du lin , en la frappant avec un petit battoir. Il est avantageux de ne point différer le roui du lin , afin que la filasse se détache plus facilement de la chenevotte. Il en est de la manière de rouir & préparer le lin , comme de celle du *chanvre*. Voyez ce mot.

On vend le lin tout roui & façonné à la botte. Lorsqu'il a reçu tous ses apprêts , on le met en cordons , s'il est fin & destiné pour le filage & pour le Tisserand. Le meilleur lin est luisant , doux , liant & fort : le lin court est celui qui fait le plus beau fil.

Le lin fournit à une consommation intérieure, qui seroit immense, même en la réduisant à la fabrication du linge : il procure une infinité de chose de nécessité ou de commodité, outre qu'il entre dans quantité de petites étoffes. Après que le linge est usé, les chiffons servent encore à faire le papier ; matière dont l'usage n'est ignoré de personne, & que l'on ne fauroit assez admirer.

La graine du lin fournit, par expression, beaucoup d'huile, qui sert à brûler & en peinture : on en prend aussi intérieurement pour procurer l'expectoration, & pour appaiser le crachement de sang. La pâte de cette graine exprimée, sert pour engraisser des bestiaux.

La semence de lin, macérée dans l'eau, donne une grande quantité de suc mucilagineux, d'où dépend sa vertu adoucissante & émolliente : sa farine est résolutive.

Les payfans d'Asie se sont nourris souvent de graine de lin : ils la pilloient, la mêloient avec du miel, & la faisoient frire ; cependant, disent les Auteurs de la Matière Médicale, de quelque manière qu'on la prépare, ce ne sera jamais un mets bien agréable & salutaire ; car elle est contraire à l'estomac, flatueuse, difficile à digérer, & produit un mauvais suc ; c'est ce que l'on a pu remarquer, dit Fragus, il y a quelques années à Middelbourg, Capitale de la Zélande, lorsque la plupart des habitants, à cause de la disette du bled & des provisions, mangerent du pain & d'autres nourritures faites avec de la graine de lin : ils devinrent enflés, bouffis, & il y en eut beaucoup qui moururent.

L'usage interne de la graine de lin convient dans les ardeurs d'urine : en lavement, elle adoucit les tranchées, la dysenterie, & l'inflammation des viscères. En général le lin est amer, légèrement purgatif, aphrodisiaque, & convient dans les inflammations.

Le LIN SAUVAGE PURGATIF, *Linum catharticum*, est une plante qui vient d'elle-même dans les champs, parmi les avoines & dans les prés. Sa racine est grêle & blanche. Ses tiges rougeâtres & branchues sont d'abord petites & couchées sur terre ; mais elles s'élèvent bientôt à la hauteur de deux pieds & plus. Ses fleurs sont portées sur de longs pédicules, elles sont blanches & à œilllets : il leur succede des capsules féminales, cannelées ; leur graine est semblable à celle du lin, mais la tige est plus menue & moins filandreuse.

Toute cette plante a une saveur amère, & qui cause des nausées. Les Anglois font un plus grand usage de cette plante que nous. Jean Rai dit que l'infusion d'une poignée de lin sauvage avec les tiges & les sommets, faite dans du vin blanc pendant la nuit sur des cendres chaudes, purge assez fortement les humeurs féreuses, & excite quelquefois le vomissement.

L'on trouve aussi dans les forêts, un grand nombre d'espèces sauvages de lin.

LINAIRE COMMUNE ou LIN SAUVAGE, *Linaria vulgaris*. Est

une plante qui croît également sur le bord des champs & dans les pâturages stériles. Ses racines sont blanches, ligneuses, rampantes & fort traçantes. Une seule racine pousse plusieurs tiges, hautes d'un pied & demi, rondes, verdâtres, branchues, garnies de feuilles placées sans ordre, mais fort semblables à celles de l'ésule, excepté qu'elles ne donnent point de lait; ce qui a donné lieu au proverbe latin : *Esula lactescit, sine lacte linaria crescit*.

Les fleurs de la liniaire sont jaunes : elles naissent aux sommités des tiges & des rameaux, rangées en épi; il leur succede un fruit arrondi, divisé en deux capsules par une cloison mitoyenne, & percé de deux trous à son extrémité quand il est mûr : il est rempli de graines plates, rondes, noires, & comme bordées d'un feuillet.

La saveur de cette plante est un peu amère & un peu âcre : en la froissant entre les doigts, elle a l'odeur de sureau; le suc de ses feuilles n'altère point la couleur du papier bleu, mais celui des fleurs le change en rouge. La liniaire est résolutive, & adoucit singulièrement les douleurs des hémorrhoides : on en fait un onguent qui s'applique avec succès sur les varices de l'anus. Quelques Botanistes lui ont donné le nom d'*urinalis*, parce qu'elle est fort diurétique. Il y a des personnes qui mettent cette plante dans les souliers, sous la plante des pieds, pour chasser la fièvre quarte.

On distingue encore la PETITE LINAIRE, *Linaria capillaceo folio, odora*. Elle est aussi apéritive.

LIN FOSSILE ou INCOMBUSTIBLE. Voyez AMIANTHE.

LIN ORIENTAL. Les Siamois donnent ce nom à un animal que les Portugais nomment *bicho vergonhoso*, c'est-à-dire, *insecte honteux*, parce que quand il a peur, il se resserre en lui-même, & dresse ses écailles comme nos hérissons.

Le lin oriental a les écailles de la queue si dures, qu'on ne peut les couper. Il vit dans les bois, où il se retire dans des trous; il monte quelquefois sur les arbres. Il ne vit que de graines fort dures : il a la gueule fort petite, la langue longue & étroite; il la lance à-peu-près comme font les serpents.

LIN SAUVAGE. Voyez LINAIRE.

LIN DE SIBÉRIE. Le lin ordinaire dont nous avons parlé, est une plante annuelle qu'il faut semer de nouveau tous les ans, & qui demande beaucoup de soins, de peines & de dépenses : le lin de Sibérie au contraire est une plante vivace qui a l'avantage de croître encore plus haut que le lin ordinaire, ses feuilles sont plus larges, sa tige est plus noirâtre, caractères par lesquels on estime même le plus le lin ordinaire. Le lin de Sibérie fleurit aussi-tôt que l'autre, & sa fleur a une petite odeur : lorsqu'il est arrivé à sa maturité, on ne fait que le couper, & il repousse l'année suivante de nouvelles tiges de sa racine. Les tiges de cette sorte de lin, donnent du fil aussi blanc, aussi ferme, & en plus grande quantité que notre lin ordinaire; la finesse est peut-être la qualité qui lui manqueroit, mais cette

espece de lin serviroit à un grand nombre d'usages très importants, où l'on n'emploie point de toiles si fines : cette plante transportée d'un climat froid, dans un climat plus chaud, s'y amélioreroit, ainsi que le prouve l'expérience. De plus, les soins que l'on apporteroit à sa culture, & les effais que l'on feroit sur cette plante, l'ameneroient insensiblement à un plus grand degré de perfection.

LINGOADA. Nom que les Portugais donnent à un poisson de mer du Bresil, nommé *aramaca* par Marcgrave, & *cabricóncha* aux Indes. Ce poisson a deux yeux d'un même côté, & n'en a point de l'autre : il a la figure d'une sole ; ses dents sont fort aiguës.

LINOT ou LINOTE, *Linaria avis*. Petit oiseau mis par M. Linnæus dans le rang des *moineaux* : on en distingue plusieurs especes.

La LINOTE VULGAIRE, *Linaria vulgaris*, est un petit oiseau gros comme un moineau, dont la tête est couverte d'un plumage cendré noir, le dos mêlé de noir & de roux, la poitrine blanche ; le bas ventre proche du croupion, tire sur le blanc jaunâtre ; le haut de la gorge est d'un beau rouge, & le bord des aîles roux ; les grandes plumes des aîles sont noirâtres & blanchâtres par les côtés & à leurs extrémités, ainsi que la queue ; la couleur de ses pieds est un brun obscur. Sa nourriture est de la graine de lin, d'où lui est venu le nom de *linote* : on la nourrit en cage avec du pain, du millet, de la navette, de la graine de lin & du chenevis : son chant est fort agréable, & elle apprend volontiers les airs qu'on lui joue sur un flageolet.

La GRANDE LINOTE DE VIGNE, *Linaria rubra major*, est un peu moins grande que la précédente. Le plumage de la poitrine & du dessus de la tête est rougeâtre ; c'est pourquoi on l'appelle aussi *linote rouge*.

Il y a aussi une *petite linote de vigne*, qui a le bec moins gros & plus aigu : la femelle, ainsi que le mâle, est rouge au dessus de la tête ; ses pieds sont plus noirs. Cette dernière espece de linote vole en troupe, ce que ne font pas les autres. Albin dit que la région de leur crâne & la base du gozier, sont d'un rouge charmant : il y en a dont les bords des plumes sont jaunâtres.

La *linote de montagne* est plus grande du double que la précédente : son croupion est rouge, & sa queue est longue.

Ce genre d'oiseaux a le bec court, fait en cône : les bords en sont coupants, & le bout est très pointu. Leurs pieds sont très courts ; sa queue est un peu fourchue. Ces oiseaux font leur nid dans les montagnes, & choisissent les lieux bas & frais, dans des buissons d'épine noire & d'aubepine, ou dans ceux du genêt. Ils font d'ordinaire quatre ou cinq petits par nichée, & deux nichées par an. Si on détruit leur nid, ils le rétablissent jusqu'à trois fois.

Les linotes muent sur la fin du printems. On prétend que ces oiseaux sont sujets à une sorte de maladie qui leur roidit les plumes, & pendant laquelle ils demeurent tristes & sans siffler. Cette maladie s'appelle *jubtile* :

souvent leur ventre devient dur alors ; leurs veines sont grosses & rouges ; leur poitrine est tuméfiée ; leurs pieds sont enflés , calleux , & ne peuvent qu'à peine les supporter. Quoique ces oiseaux soient communs dans plusieurs Provinces de ce Royaume & d'Angleterre , on ignore encore quel est leur pays natal.

Les linotes passent pour être bonnes contre l'épilepsie , étant prises en bouillon ou mangées.

LION, *Leo*. Le lion, dit M. de Buffon, a la figure imposante , le regard assuré , la démarche fiere , la voix terrible : sa taille est bien prise , & si bien proportionnée , que son corps paroît être le modele de la force , jointe à l'agilité : aussi solide que nerveux , n'étant chargé ni de chair , ni de graisse , & ne contenant rien de surabondant , il est tout nerf & tout muscle. Cette grande force musculaire se marque au dehors par les sauts & les bonds prodigieux qu'il fait aisément ; par le mouvement brusque de sa queue , qui est assez fort pour terrasser un homme ; par la facilité avec laquelle il fait mouvoir la peau de sa face , & sur-tout celle de son front , qui est traversée de rides profondes , ce qui ajoute beaucoup à la physionomie , ou plutôt à l'expression de la fureur ; & enfin , par la faculté qu'il a de remuer sa criniere , laquelle non-seulement se hérissé , mais se meut & s'agite en tous sens , lorsqu'il est en colere. Le front de cet animal est quarré ; le nez est grand , large , évasé ; sa gueule est fort grande & fendue ; les mâchoires sont composées de grands os extrêmement forts , & garnies chacune de quatorze dents , dont quatre sont incisives , quatre canines & six molaires. Sa langue est grande , rude , très âpre , & parsemée de quantité de petites pointes aussi dures que la corne , longues environ d'un quart de pouce , & recourbées vers le gosier : c'est cette disposition des parties de la langue qui rend le léchement du lion extrêmement dangereux ; car il a bientôt endormi la chair & excoïé l'épiderme. Au reste , l'on doit être en garde contre les léchements de cet animal , même le plus apprivoisé ; car dès qu'il a senti le sang , son naturel sanguinaire s'irrite & l'excite à mordre & à faire de cruels ravages , comme nous le dirons ci-après.

Les lions de la plus grande taille ont environ huit ou neuf pieds de longueur , depuis le musle jusqu'à l'origine de la queue , qui est elle-même longue d'environ quatre pieds ; ces grands lions ont quatre ou cinq pieds de hauteur. Les lions de petite taille ont environ cinq pieds & demi de longueur , sur trois pieds & demi de hauteur , & la queue longue d'environ trois pieds ; elle est terminée par une espece de houppe.

La lionne est , dans toutes les dimensions , d'environ un quart plus petite que le lion. Presque tous les Voyageurs paroissent s'accorder à dire que la couleur du lion est fauve sur le dos , & blanchâtre sur les côtés & sous le ventre.

Le lion porte une criniere , ou plutôt un long poil , qui couvre toutes les parties antérieurs de son corps , & qui devient toujours plus long à mesure qu'il avance en âge. La lionne n'a jamais ces longs poils , quelque

vieille qu'elle soit. L'animal d'Amérique, que les Européens ont appelé *lion*, & que les Naturels du Pérou appelle *puma*, n'a point de crinière : il est aussi beaucoup plus petit, plus foible, & plus poltron que le vrai lion. Il ne seroit pas impossible, dit M. de Buffon, que la douceur du climat de cette partie de l'Amérique Méridionale, eût assez influé sur la nature du lion, pour le dépouiller de sa crinière, lui ôter son courage, & réduire sa taille. Mais ce qui paroît impossible, c'est que cet animal, qui n'habite que les climats situés entre les Tropiques, & auquel la Nature paroît avoir fermé tous les chemins du Nord, puisqu'il est si sensible au froid, ait passé, des parties Méridionales de l'Asie ou de l'Afrique, en Amérique : ces Continents étant séparés vers le Midi par des mers immenses. C'est ce qui nous porte à croire, continue M. de Buffon, que le *puma* n'est point un lion tirant son origine des lions de l'ancien Continent, & qui auroit ensuite dégénéré dans le climat du Nouveau Monde ; mais que c'est un animal particulier à l'Amérique, comme le sont aussi la plupart des animaux de ce nouveau Continent : ce sentiment paroît confirmé par plusieurs Relations. Frésier dit que le *puma* ou *lion du Pérou* diffère beaucoup de celui d'Afrique ; que sa tête tient de celle du loup & de celle du tigre, & qu'il a la queue plus petite que l'un & l'autre. Ces prétendus lions n'ont ni la grandeur, ni la fierté, ni la couleur de ceux d'Afrique : ils sont gris, n'ont point de crinières, ont l'habitude de monter sur les arbres. Enfin ces animaux diffèrent du lion par les habitudes naturelles. Toutes ces considérations paroissent suffisantes pour faire cesser l'équivoque du nom, & pour empêcher que l'on ne confonde le *puma* d'Amérique avec le vrai lion d'Afrique ou d'Asie.

Lorsque les Européens firent la découverte du Nouveau Monde, ils trouverent en effet que tout y étoit nouveau ; les animaux quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, les insectes & les plantes, tout parut inconnu, tout se trouva différent de ce qu'on avoit vu jusqu'alors. Il fallut cependant dénommer les principaux objets de cette nouvelle nature : un petit rapport dans la forme extérieure, une légère ressemblance de taille & de figure, suffirent pour attribuer à ces objets inconnus les noms des choses connues ; delà les incertitudes, l'équivoque, la confusion, qui s'est encore augmentés, parcequ'en même tems qu'on donnoit aux productions du Nouveau Monde les dénominations de celles de l'ancien Continent, on y transportoit continuellement, & dans le même tems, les especes d'animaux & de plantes qu'on n'y avoit pas trouvées. C'est dans les Ouvrages de l'illustre M. de Buffon, qu'il faut voir les discours, dans lesquels il a démontré, avec son génie & sa sagacité ordinaires, quels sont les animaux propres à l'ancien Continent & au Nouveau Monde, & ceux qui sont communs aux deux Continents.

Les lions n'habitent que les climats brûlants de l'Asie & de l'Afrique ; & ce qui prouve évidemment que l'excès de leur férocité vient de l'excès de la chaleur, c'est que dans le même pays, ceux qui habitent les hautes

montagnes où l'air est plus tempéré; sont moins forts, & d'un naturel moins féroce, que ceux qui demeurent dans les sables brûlants du Biledulgerid ou du Zaara. De l'aven de ceux qui ont parcouru cette partie de l'Afrique, il ne s'y trouve pas actuellement autant de lions, à beaucoup près, qu'il y en avoit autrefois. Les Romains tiroient de la Lybie; pour l'usage de leurs spectacles, cinquante fois plus de lions qu'on ne pourroit y en trouver aujourd'hui. On a remarqué de même, qu'en Turquie, en Perse & dans l'Inde, les lions sont maintenant beaucoup moins communs qu'ils ne l'étoient anciennement; & comme ce puissant & courageux animal fait sa proie de tous les autres animaux, & n'est lui-même la proie d'aucun, on ne peut attribuer la diminution de nombre dans son espece, qu'à l'augmentation du nombre dans celle de l'homme; car il faut avouer que la force de ce roi des animaux brutes, ne tient pas contre l'adresse d'un Hottentot ou d'un Negre, qui souvent osent l'attaquer tête à tête avec des armes assez légères.

Cette supériorité de nombre & d'industrie dans l'espece humaine, qui brise la force du lion, en énerve aussi le courage. Cette qualité, quoique naturelle, s'exalte ou se tempere dans l'animal, suivant l'usage heureux ou malheureux qu'il a fait de sa force. Dans les vastes déserts du Zaara, & en général dans toutes les parties méridionales de l'Afrique & de l'Asie, où l'homme a dédaigné d'habiter, les lions sont encore en assez grand nombre, & tels que la Nature les produit. Accoutumés à mesurer leurs forces avec tous les animaux qu'ils rencontrent, l'habitude de vaincre les rend intrépides & terribles; ne connoissant pas la puissance de l'homme, ils n'en ont nulle crainte; n'ayant pas éprouvé la force de ses armes, ils semblent les braver; les blessures les irritent même sans les effrayer: un seul de ces lions du désert attaque souvent une caravane entiere; & lorsqu'après un combat opiniâtre & violent, il se sent affoibli, au lieu de fuir, il continue de se battre en retraite, sans jamais tourner le dos. Au contraire, les lions qui habitent aux environs des villes & des bourgades de l'Inde & de la Barbarie, ayant connu l'homme & la force de ses armes, ont perdu leur courage au point d'obéir à sa voix menaçante, de n'oser l'attaquer, de ne se jeter que sur le menu bétail; & enfin de s'enfuir, en se laissant poursuivre par des femmes ou par des enfants qui leur font, à coups de bâton, quitter prise & lâcher indignement leur proie.

Ce changement, cet adoucissement dans le naturel du lion, prouve qu'il est susceptible d'être apprivoisé jusqu'à un certain point; aussi l'Histoire nous parle-t-elle de lions attelés à des chars de triomphe, de lions conduits à la guerre, ou menés à la chasse; & qui, fideles à leur maître, ne déployoient leur force & leur courage que contre ses ennemis. Ce qu'il y a de très sûr, c'est que le lion, pris jeune & élevé parmi les animaux domestiques, s'accoutume aisément à vivre & jouer innocemment avec eux; qu'il est doux pour ses maîtres, & même caressant, sur-tout dans le premier âge; & que si sa féroce naturelle reparoit quelquefois, il la tourne

rarement contre ceux qui lui ont fait du bien. Comme ses mouvements sont très impétueux, & ses appétits très véhéments, on ne doit pas présumer que les impressions de l'éducation puissent toujours les balancer; aussi y auroit-il du danger à lui laisser trop long-tems souffrir la faim, ou le contrarier en le tourmentant hors de propos; non-seulement il s'irrite contre les mauvais traitements, mais il en garde le souvenir, & paroît en méditer la vengeance, comme il conserve aussi la mémoire & la reconnoissance des bienfaits. On peut conclure de différents faits, que sa colere est noble, son courage magnanime, son naturel sensible. On l'a vu souvent pardonner à de petits ennemis des libertés offensantes, donner quelquefois la vie à ceux qu'on avoit dévoués à la mort en les lui jettant pour proie, & , comme s'il se fût attaché par cet acte généreux, leur continuer ensuite la même protection, vivre tranquillement avec eux, leur faire part de sa subsistance, se la laisser même quelquefois enlever toute entiere, & souffrir plutôt la faim, que de perdre le fruit de son premier bienfait.

On pourroit dire aussi que le lion n'est pas cruel, puisqu'il ne l'est que par nécessité, qu'il ne détruit qu'autant qu'il consomme, & que dès qu'il est repu, il est en pleine paix; tandis que le tigre, le loup, & tant d'autres animaux d'espece inférieure, tels que le *renard*, la *fouine*, le *putois*, le *furet*, &c. donnent la mort pour le seul plaisir de la donner; & que dans leurs massacres nombreux, ils semblent plutôt vouloir assouvir leur rage que leur faim.

Quoique le lion ne se trouve que dans les climats les plus chauds, il peut cependant subsister & vivre assez long-tems dans les pays tempérés; peut-être même avec beaucoup de soin pourroit-il y multiplier: on en a vu naître dans la Ménagerie de Florence & à Naples, mais ces faits sont très rares. Les Anciens & les Modernes conviennent que les lions nouveaux nés sont fort petits, de la grandeur à-peu-près d'une belette, c'est-à-dire, de six ou sept pouces de longueur: ils disent aussi que les lionceaux ne sont en état de marcher que deux mois après leur naissance. Sans donner une entiere confiance au rapport de ces faits, dit M. de Buffon, on peut présumer, avec assez de vraisemblance, que le lion, attendu la grandeur de sa taille, est au moins trois ou quatre ans à croître, & qu'il doit vivre environ sept fois trois ou quatre ans, c'est-à-dire, à-peu-près vingt-cinq ans. On en a gardé quelques-uns au Combat du Taureau pendant seize ou dix-sept ans.

L'inspection des parties du lion mâle & leur direction prouvent qu'il s'accouple, comme les autres quadrupedes, & non pas à reculons, comme l'avoient répété plusieurs Naturalistes d'après Aristote. C'est aussi mal-à-propos que ce Philosophe a prétendu que le col de cet animal ne contient qu'un seul os inflexible, & sans division de vertebres; ce fait a été démenti par l'expérience, qui même nous a donné sur cela, dit M. de Buffon, un fait très général, c'est que dans tous les quadrupedes, sans en excepter aucun, & même dans l'homme, le col est composé de sept vertebres ni plus

plus ni moins ; & ces mêmes sept vertebres se trouvent dans le col du lion, comme dans celui de tous les autres quadrupedes. Un autre fait général, c'est que les animaux carnassiers ont le col beaucoup plus court que les animaux frugivores , & sur-tout que les animaux ruminants. Mais cette différence de longueur dans le col des quadrupedes , ne dépend que de la grandeur de chaque vertebre , & non pas de leur nombre qui est toujours le même. A l'égard de la solidité des os du lion , qu'Aristote dit être sans moëlle & sans cavité , de leur dureté qu'il compare à celle du caillou , de leur propriété de faire feu par le frottement , c'est une erreur.

Les lions sont très ardents en amour : lorsque la femelle est en chaleur , elle est quelquefois suivie de huit ou dix mâles , qui ne cessent de rugir autour d'elle , & de se livrer des combats furieux , jusqu'à ce que l'un d'entr'eux , vainqueur de tous les autres , en demeure paisible possesseur , & s'éloigne avec elle. La lionne met bas au printems , & ne produit qu'une fois tous les ans ; & quoiqu'elle n'ait que deux mamelles , elle ne laisse pas d'avoir quelquefois quatre petits & même six.

Dans ces animaux , toutes les passions , même les plus douces , sont excessives , & l'amour maternel est extrême. La lionne , naturellement moins forte , moins courageuse , & plus tranquille que le lion , devient terrible dès qu'elle a des petits : elle ne connoît point le danger ; elle se jette indifféremment sur les hommes & sur les animaux qu'elle rencontre ; elle les met à mort ; elle se charge ensuite de sa proie , la porte & la partage à ses lionceaux , auxquels elle apprend de bonne heure à fucer le sang & à déchirer la chair. D'ordinaire elle met bas dans des lieux très écartés & de difficile accès ; & lorsqu'elle craint d'être découverte , elle cache ses traces , en retournant plusieurs fois sur ses pas , ou bien elle les efface avec sa queue ; quelquefois même , lorsque l'inquiétude est grande , elle transporte ailleurs ses petits ; & quand on veut les lui enlever , elle devient furieuse , & les défend jusqu'à la dernière extrémité.

On croit que le lion n'a pas l'odorat aussi parfait , ni les yeux aussi bons que la plupart des animaux de proie. On a remarqué que la grande lumière du soleil paroît l'incommoder , qu'il marche rarement dans le milieu du jour ; que c'est pendant la nuit qu'il fait toutes ses courses ; que quand il voit des feux allumés autour des troupeaux , il n'en approche guères , &c. On a observé qu'il n'évite pas de loin les autres animaux , qu'il ne les chasse qu'à vue , & non pas en les suivant à la piste comme font les chiens & les loups dont l'odorat est plus fin.

Comme tous les animaux fuient à la présence du lion , il est souvent obligé de se cacher & de les attendre au passage ; il se tapit sur le ventre dans un endroit fourré , d'où il s'élance avec tant de force , qu'il les saisit souvent du premier bond. Dans les déserts & les forêts , il fait sa nourriture la plus ordinaire des gazelles & des singes , quoiqu'il ne prenne ceux-ci que lorsqu'ils sont à terre , car il ne grimpe pas sur les arbres. Il mange beaucoup à la fois & se remplit pour deux ou trois jours ; il a les dents dis-

posées comme celles du chien ; mais elles sont si fortes qu'il brise aisément les os , & il les avale avec la chair. On prétend qu'il supporte long-tems la faim. Comme son tempérament est excessivement chaud , il supporte moins patiemment la soif , & boit toutes les fois qu'il peut trouver de l'eau ; il prend l'eau en lappant comme un chien ; mais au lieu que la langue du chien se courbe en dessus pour lapper , celle du lion se courbe en dessous. Il lui faut environ quinze livres de chair crue par jour ; quoique cet animal ne se nourrisse que de chair fraîche , car il ne retourne guères chercher les restes de sa premiere proie , son haleine est très forte , & son urine insupportable.

Le rugissement du lion est si fort , que quand il se fait entendre , par échos , la nuit dans les déserts , il ressemble au bruit du tonnerre ; ce rugissement est sa voix ordinaire ; car quand il est en colere il a un autre cri , qui est court & réitéré subitement ; au lieu que le rugissement est un cri prolongé , une espece de grondement d'un ton grave , mêlé d'un frémissement plus aigu : il rugit cinq ou six fois par jour , & plus souvent , lorsqu'il doit tomber de la pluie. Le cri qu'il fait lorsqu'il est en colere , est encore plus terrible que le rugissement ; alors il se bat les flancs de sa queue , il en bat la terre , il agite sa criniere , fait mouvoir la peau de sa face , montre des dents menaçantes , & tire sa langue , qui , comme nous l'avons dit , est armée de pointes très dures. Il est beaucoup plus fort par la tête , les mâchoires & les jambes de devant , que par les parties postérieures du corps : il voit la nuit comme les chats : il ne dort pas long-tems & s'éveille aisément ; mais c'est mal-à-propos qu'on a prétendu qu'il dormoit les yeux ouverts.

La démarche du lion est fiere , grave , lente , quoique toujours oblique : sa course ne se fait pas par des mouvements égaux , mais par sauts & par bonds , & ses mouvements sont si brusques qu'il ne peut s'arrêter à l'instant , & qu'il passe presque toujours son but. Lorsqu'il saute sur sa proie , il fait un bond de douze ou quinze pieds , tombe dessus , la saisit avec ses pattes de devant qui sont larges , grandes , divisées en cinq doigts , & garnies de fortes griffes aiguës & tranchantes ; les pieds de derriere n'ont que quatre doigts : il déchire sa proie avec les ongles de devant , & ensuite il la dévore avec les dents. On prétend que sa salive , introduite dans la chair par sa morsure , produit presque les mêmes symptômes que la morsure du chien enragé : elle cause des convulsions , & le plus souvent fait mourir. Tant qu'il est jeune , & qu'il a de la légereté , il vit du produit de sa chasse & quitte rarement les déserts & les forêts ; mais lorsqu'il devient vieux & pesant , il s'approche des lieux fréquentés & devient plus dangereux pour l'homme & pour les animaux domestiques ; seulement on a remarqué que lorsqu'il voit des hommes & des animaux ensemble , c'est toujours sur les animaux qu'il se jette , & jamais sur les hommes , à moins qu'ils ne le frappent ; car alors il reconnoît à merveille celui qui vient de l'offenser , & il quitte sa proie pour se venger. On prétend qu'il préfere la chair du cha-

meau à celle de tous les autres animaux : il aime aussi celle des jeunes éléphants ; ils ne peuvent lui résister lorsque leurs défenses n'ont pas encore poussé, & il en vient aisément à bout, à moins que la mere n'arrive à leur secours. L'éléphant, le rhinocéros, le tigre & l'hyppopotame, sont les seuls animaux qui puissent résister au lion. On s'est fausement imaginé, sur-tout en France, que le chant du coq épouvante le lion : l'on a plus d'une expérience que cet animal a ravagé des poulaillers sans que le chant des coqs, ni les cris des poules aient fait la moindre impression sur lui. Il n'en fait pas de même à l'égard des serpents ; l'on est convaincu par des expériences réitérées qu'il les craint extrêmement ; & c'est pour cela que quand les Maures rencontrent quelque lion, & qu'ils sont hors d'état de se sauver de ses griffes, ils défont promptement la bande de toile qui compose leur turban, & l'agitent devant eux de manière qu'elle imite les mouvements d'un serpent : le lion ne l'a pas plutôt apperçue, que sans examiner la vérité ou la fausseté de cette représentation, il quitte la partie, se retire, & les laisse aller en paix.

Quelque terrible que soit cet animal, on ne laisse pas de lui donner la chasse avec des chiens de taille & bien appuyés par des hommes à cheval ; on le déloge, on le fait retirer : mais il faut que les chiens & même que les chevaux soient aguerris auparavant ; car presque tous les animaux frémissent & s'enfuient à la seule odeur du lion. On ne le tue presque jamais d'un seul coup : on le prend souvent par adresse dans une fosse, comme les loups : le lion devient doux dès qu'il est pris, & si l'on profite des premiers moments de sa surprise ou de sa honte, on peut l'attacher, le museler & le conduire où l'on veut.

La chair du lion est d'un goût désagréable & fort ; cependant les Negres & les Indiens ne la trouvent pas mauvaise.

On dit que le cœur du lion, mis en poudre, est propre pour guérir l'épilepsie ; son sang est sudorifique & alexitere ; sa graisse émolliente & nerveale & propre contre la goutte.

La peau du lion, qui faisoit autrefois la tunique des Héros, sert maintenant de lit & de manteau aux Maures : nous l'employons aussi à faire des housses pour les chevaux de carrosses & de main.

LION MARIN, *Leo marinus*, est un animal amphibie & vivipare, ou une espèce de grand poisson de mer assez rare, qui se trouve quelquefois vers le Cap de Bonne-Espérance, dans l'Isle de Juan Fernandez, & dans le Détroit de Magellan : cet animal ressemble un peu au veau marin, mais il en diffère essentiellement. Quand il a pris tout son accroissement, il peut avoir depuis quinze jusqu'à vingt pieds de long, & depuis dix jusqu'à quinze de circonférence. Sa peau n'est point écailleuse, elle est couverte d'un poil court, de couleur tannée claire ou jaune : mais la queue & les quatre nageoires, qui lui servent de pieds quand il est à terre, sont noires ; les extrémités des nageoires ne ressemblent pas mal à des doigts palmés jusqu'à la moitié, & sont garnis d'ongles : sa tête a une ressemblance

grossière avec celle du lion terrestre : ses yeux sont gros & affreux ; ses oreilles courtes ; sa barbe fort épaisse , hérissée ; les dents canines sortent d'un demi-pied hors de la gueule : la langue , qui ne paroît être qu'une espece de masse de graisse , pese jusqu'à cinquante livres. On prétend que les mâles ont une espece de grosse trompe longue d'un demi-pied qui leur pend du bout de la mâchoire supérieure ; ce dernier caractere suffit seul pour distinguer le lion marin mâle d'avec sa femelle , qui est d'ailleurs beaucoup plus petite.

Le lion marin , qui est peut-être de la même espece que l'*ours marin* , voyez ce mot , est si gras , qu'après avoir fait une incision à la peau , qui a environ un pouce d'épaisseur , on trouve au moins un pied de graisse avant que de parvenir à la chair ou aux os , & l'on a fait plus d'une fois l'expérience que la graisse des plus gros lions marins fournissoit jusqu'à cinq cents pintes d'huile , mesure de Paris. Cette graisse n'est point huileuse comme celle des phocas & des baleines , mais semblable à celle des ours marins , en couleur , en odeur & en faveur. Cet animal est très sanguin ; si on lui fait de profondes blessures , dans plusieurs endroits , on voit jaillir à l'instant , avec beaucoup de force , autant de fontaines de sang , qui peuvent aisément emplir plusieurs barriques. Le lion marin passe tout l'été dans la mer , & tout l'hiver sur la terre.

Anson (*Voy. Tom. II, p. 3.*) rapporte que ses Matelots virent un lion marin à qui ils donnerent le nom de *bacha* , parcequ'il étoit toujours accompagné d'un nombreux ferrail , dont il favoit singulièrement écarter les mâles. C'est dans l'hiver , que ces animaux travaillent à la génération , & que les femelles mettent bas : leur portée est de deux petits à la fois ; ces animaux tettent & sont dès leur naissance de la grandeur d'un veau marin qui auroit toute sa taille. Pendant tout le tems que ces lions marins restent sur terre , ils se nourrissent de l'herbe qui croît sur le bord des eaux courantes : dans l'intervalle de leur repas , ils dorment dans la fange , & sont assez difficiles à réveiller : il y a toujours dans le nombre quelque mâle qui fait sentinelle , & qui par un cri fort dissonant & bruyant réveille ses camarades , & même effraie ceux qui s'en approchent. Tantôt ces animaux grognent comme des pourceaux , tantôt ils hennissent comme des chevaux. On voit souvent les mâles se battre ensemble & se disputer les femelles : ils se mettent tout en sang à coups de dents ; le bacha lion marin n'acquiert son ferrail nombreux que par sa supériorité sur les autres mâles , & que par des victoires multipliées , dont on voit la preuve sur son dos rempli de cicatrices.

Il est très facile de tuer les lions marins , car ils sont presque également incapables de se défendre & de s'enfuir : il n'y a rien de plus lourd que ces animaux. Au moindre mouvement qu'ils font , on voit leur graisse molasse flotter sous leur peau : cependant il faut se donner de garde de leurs dents , qui sont très redoutables. Anson dit que ses Matelots en tuerent beaucoup pour en manger la chair , & particulièrement le cœur & la langue , qu'ils

trouvoient préférables aux mêmes parties tirées du bœuf. Les aîlerons des pieds font, dit-on, d'une consistance de gelée & mis au rang des mets les plus délicieux : on dit cependant que dans le Détroit de Magellan où croissent des *manceliniers*, voyez ce mot, la chair du lion marin est venimeuse pour les hommes; que ceux qui en mangent sont attaqués de fâcheux symptômes, & qu'ils perdent toute leur peau après de cruelles douleurs : un an après la guérison on ressent de nouvelles douleurs; & ce symptôme périodique reparoît plusieurs années de suite. Le remède est l'usage de l'écorce de *Winter*. Voyez ce mot.

Les lions marins, quoique très forts & très vigoureux redoutent les hommes, & aussi-tôt qu'ils en apperçoivent, ils courent avec précipitation du côté de la mer pour y chercher un asyle. J'ai cependant remarqué, dit M. Steller, de l'Académie des Sciences de Petersbourg, que ces animaux sont capables d'être apprivoisés & qu'ils s'accoutument insensiblement à la présence de l'homme lorsqu'on ne leur fait aucun mal, particulièrement dans la saison où leurs petits n'ont pas appris à nager. Il m'est arrivé une fois de séjourner une semaine entière au milieu d'eux sur un endroit élevé, dans une tente où j'observois leur façon & leurs manières de vivre. Quelquefois ils étoient couchés autour de moi de tous côtés, occupés à regarder le feu que j'avois allumé, & à observer, pour ainsi dire, mes mouvements; ils ne s'éloignoient point, quoi qu'en passant au milieu d'eux j'enlevasse leurs petits & que je les égorgeasse à leurs yeux; ils se mêloient même entr'eux mâles & femelles; ceux-là se battoient à outrance, soit pour celles-ci, soit pour les places qu'ils occupoient, avec la même chaleur & les mêmes mouvements que les *ours marins*. L'un d'eux entr'autres auquel on avoit enlevé sa femelle, reçut plus de cent blessures dans un combat qu'il soutint trois jours entiers contre plusieurs autres.

Les *ours marins* proprement dits, ne se mêlent jamais dans leurs différends, ils fuient au contraire dès qu'ils voient naître des querelles entr'eux; ils cedent même la place & abandonnent leurs femelles & leurs petits.

Au printems, en été & dans l'hiver on voit beaucoup de lions marins entre les précipices & les rochers de l'Isle d'Alair; on en voit aussi en grand nombre sur les bords de l'Amérique dans les terres des Kamschadales; mais ils ne vont point au-delà du cinquante-sixième degré de latitude : on en prend encore beaucoup autour du Promontoire de Kronozki, aux environs de l'Isle d'Ostrownaz, de la Baie Awatschi, & depuis ces endroits jusqu'au Promontoire de Lapatka dans les Isles des Kourilles & jusqu'à l'Isle Matmey. Le Capitaine Spanberg a donné dans sa Carte le nom de *Palais de Siwutjchi* à une certaine Isle, à cause de ces animaux qui s'y rendent en foule, & de la ressemblance qu'ont ces rochers avec les murs d'une ville. Ces animaux passent dans ces lieux en Juillet & Août pour s'y reposer, peupler, mettre bas leurs petits & les élever.

LION MARIN, *Leo cancer*. On donne ce nom à un poisson ou insecte crustacée, jaunâtre, velu, ayant le dos fort épineux & ondé, ressemblant

d'ailleurs aux langoustes : sa chair est bonne à manger, très restaurante & très propre à purifier la masse du sang.

LION DES PUCERONS. Voyez son article au mot DEMOISELLE.

LIU-LIU, est la cigale à la tête verte de l'Isle de Cayenne.

LIPARIS ou HARENG DE LIPARE. Les Anciens faisoient beaucoup de cas de ce poisson, qui se pêche dans un lac en Macédoine. Le liparis, dit Rondelet, a la tête faite comme le coucou; la bouche petite & sans dents, les mâchoires âpres, les écailles petites, une ligne large depuis la tête jusqu'à la queue, deux nageoires près des ouies, deux au-dessous, une autre au dos qui ne finit que près de la queue, & qui est sans aiguillons; sa queue est fourchue : ce poisson ressemble un peu au muge, & il a la même façon de vivre.

On trouve aussi dans le même lac une espèce de sardine à qui l'on donne le nom de *liparis*.

Ces poissons sont très gras, sur-tout dans le printems que l'on en fait la pêche; si on les approche du feu, ils se fondent aussi-tôt en huile : on en mange beaucoup dans le pays.

LIQUIDAMBAR ou COPALME, *Liquidambari arbor*, est un arbre de la Louisiane, fort ample, grand, branchu, touffu & très beau. On croit que c'est le platane de la Virginie : les Indiens l'appellent *ococol* ou *ocofolt*, & les Européens *storax* ou *styrax d'Amérique*. Ses racines sont fort rampantes : son tronc est droit; son écorce est en partie rousâtre, en partie verte & odorante; ses feuilles sont partagées en trois pointes & davantage, comme celles de l'érable; les fleurs mâles & les fleurs femelles sont rassemblées sur le même pied : les fleurs femelles forment des boules à la base des épis mâles; les fruits sont sphériques, épineux comme ceux du plane, composés de plusieurs capsules jaunâtres, saillantes, & terminées en pointe, dans lesquelles sont renfermées des graines ovales.

Il découle, avec ou sans incision, de l'écorce de cet arbre un baume odorant & très pénétrant, qui s'appelle aussi LIQUIDAMBAR, *Liquidambarum*. Ce suc résineux est d'une consistance de vernis gras, d'un jaune rougeâtre, clair; d'un goût âcre aromatique, d'une odeur qui approche du styrax ou de l'ambre gris. Autant on apportoit autrefois de ce baume de la Nouvelle Espagne, de la Virginie & d'autres Provinces méridionales de l'Amérique, dont on se servoit pour donner une bonne odeur aux peaux & aux gants, autant le liquidambar est rare aujourd'hui, soit parce que ces sortes d'aromates portoient trop à la tête, soit qu'on ait substitué les parfums des fleurs de notre pays aux parfums étrangers; de sorte qu'on ne trouve plus le baume dont il est question, que chez les Curieux.

Il se sépare quelquefois du liquidambar nouvellement récolté une matière balsamique comme oléagineuse, rousâtre, très limpide & fort fluide; c'est ce qu'on nomme *huile de liquidambar*. Elle est beaucoup plus odoriférante & nage sur le baume.

On dit que les habitants de la Virginie, après avoir coupé par petits

morceaux les rameaux & l'écorce de cet arbre, les font bouillir dans de l'eau, sur laquelle on voit furnager une liqueur huileuse qu'ils vendent pour le vrai liquidambar. On mêle aussi l'écorce de cet arbre, coupée par petits morceaux, avec le vrai liquidambar pour lui conserver son odeur douce. Les Missionnaires mettent du bois de cet arbre dans leurs encensoirs en place d'encens; son odeur modérée est très gracieuse. Le liquidambar est émollient, maturatif, & détersif. On l'estime excellent pour les fistules à l'anus.

LIRON. C'est une espèce de loir qui dort, dit-on, tout l'hiver dans le creux des Alpes où il fait sa demeure : son museau est aigu, son ventre gros, & sa queue grande. Quelques Naturalistes pensent que cet animal est le même que la *marmotte* : voyez ce mot & celui de LOIR.

LISERON, *Convolvulus*. Il y a plusieurs plantes qui portent ce nom : nous en allons décrire trois espèces.

Le LISERON RUDE, ou LISET ÉPINEUX, *Smilax aspera*, est une plante qui croît aux lieux rudes, incultes, proche des haies, aux bords des chemins, sur les montagnes & dans les vallées des pays chauds. Sa racine est longue, serpentante, grosse comme le petit doigt, articulée, blanchâtre, dure & vivace : elle pousse plusieurs tiges longues, cannelées, farmenteuses, rameuses, flexibles, épineuses, & garnies de vrilles, par le moyen desquelles elle s'entortille autour des arbrisseaux voisins. Ses feuilles naissent seules par intervalles : elles sont grandes, larges comme celles du lierre, dures, nerveuses, épineuses & tachetées de blanc. Ses fleurs, qui naissent au printemps par grappes aux sommités des rameaux, sont petites, blanchâtres, odorantes, composées chacune de six feuilles disposées en étoile. A ces fleurs succèdent au mois d'Août des fruits ronds, qui deviennent mollets & rouges, lorsqu'ils sont mûrs, & qui renferment deux ou trois semences sphériques, brunes en dehors, blanchâtres en dedans, d'un goût fade & désagréable.

Toutes les parties de cette plante sont d'usage en Médecine : sa racine est dessicative & sudorifique ; elle convient dans toutes les maladies de la peau : on peut même la substituer dans toutes les maladies vénériennes à la *salsepareille*, qui est une espèce de *smilax* : voyez SALSEPAREILLE.

Le *liseron épineux* convient en topique pour la goutte & les dartres.

Le GRAND LISERON ou LISET, *Convolvulus major*, croît presque partout dans les haies & parmi les brossailles aux lieux un peu humides & cultivés. Cette plante rend du lait quand on la coupe. Sa racine est longue, menue, vivace & fibreuse : elle pousse, comme la précédente, des tiges farmenteuses. Ses feuilles sont en cœur. Ses fleurs ont la figure d'une cloche, & sont très blanches ; elles paroissent en été : il leur succède des fruits gros comme des cerises, arrondis, membraneux, & qui contiennent chacun deux semences anguleuses, de couleur rannée : elles sont mûres en automne.

Les pourceaux aiment assez la racine du grand liseron : toute cette plante est vulnérable & purgative.

Le PETIT LISERON ou PETIT LISET, *Convolvulus minor*, qu'on nomme aussi *campanette* ou *clochette*, ou *vrillée commune*, diffère peu du grand liseron, excepté par ses fleurs qui sont de couleur de rose, ou panachées. Il croît abondamment par-tout dans les terres cultivées & dans les jardins, où il étouffe & abbat les autres plantes qu'il peut saisir : on le trouve aussi dans les bleds, & même aux lieux incultes, principalement dans les années pluvieuses. Il fleurit en été, comme le précédent.

M. de Tournefort regarde cette plante comme un des meilleurs vulnéraires que nous ayons. Les gens de la campagne s'en servent communément pour guérir leurs blessures, en appliquant dessus la plante pilée entre deux cailloux.

Dans l'Amérique méridionale il croît une espèce de gros & grand liseron, dont la racine porte le nom de *mechoacan* : voyez ce mot.

LISSETTE, voyez FIATOLE. On donne aussi le nom de *lisette* ou *coupe-bourgeon* ou *beche* à un petit insecte grisâtre, fort nuisible aux jets des arbres fruitiers dans les mois de Mai & de Juin : il broute les boutons de la vigne, & fait périr les greffes des pêchers & des abricotiers. Quelques Jardiniers, pour garantir de ces insectes les jeunes greffes ou les jets, les enveloppent dans de petits sacs de papier, liés avec un fil ; mais souvent la précaution est inutile.

LITHARGE FOSSILE, *Lithargyrium fossile*. Plusieurs Etrangers voyageurs & instruits ont exposé, dans une de nos Conférences sur l'Histoire Naturelle, &c., des morceaux de litharge rougeâtre, qu'ils nous ont assuré avoir ramassés dans des fentes poreuses de mines de plomb.

De l'examen que nous avons fait de cette sorte de litharge, & de nos questions sur les environs & la nature du sol où elle avoit été recueillie, il résulte que cette litharge fossile a pu être produite par cette espèce de feu souterrain, qui sort quelquefois en manière de *mouffette enflammée* par l'orifice des filons, & va se perdre dans l'air ambiant, en léchant une superficie des parois du puits de la mine de plomb. Cette litharge fossile avoit été ramassée dans les montagnes de Goslar. Nous en conservons un échantillon dans notre Cabinet.

Toute la litharge du commerce est une chaux de plomb comme à demi-vitrifiée ; elle provient des affinages en grand de l'argent : voyez l'article *PLOMB* dans cet *Ouvrage*, & particulièrement ce même mot dans notre *Minéralogie*. & dans le *Dictionnaire de Chymie*.

LITHI. Arbre qui croît naturellement dans le Chili. Son tronc est de la grosseur d'un homme, & revêtu d'une écorce verdâtre, qui donne, en le coupant, une eau de la même couleur : ses branches sont chargées de feuilles alternes, lisses, d'un verd gai, & semblables à celles de notre lauréole. On lit dans l'Histoire des Incas, que les fleurs & les fruits du *lithi* sont moins connus que ses mauvaises qualités. On prétend que son ombre fait enfler prodigieusement tout le corps de ceux qui y séjournent, & que le suc qui découle de cet arbre quand on le coupe, produit le même effet

effet sur les endroits de la peau où il tombe. Pour se guérir de cette maladie, on prend du lierre terrestre que l'on pile avec du sel ; l'on s'en frotte, & l'enflure passe en deux ou trois jours. Le P. Feuillée dit qu'on peut aussi se frotter avec la décoction de feuilles de *maiten*. Le bois du *lithi* est blanc, & tendre quand on le coupe verd ; mais en séchant il devient rouge, & si dur qu'il est difficile de le mettre en œuvre : on s'en sert cependant pour la construction ; & quand il a trempé dans l'eau, il devient comme incorruptible.

LITHOGLYPHITES. Nom que l'on donne aux substances fossiles, organisées ou non, & qui représentent en massif des matériaux moulés ou travaillés par un Sculpteur.

LITHOPHAGE ou **MANGEUR DE PIERRE.** On donne ce nom à un petit ver noirâtre, qui se trouve dans l'ardoise. Cet insecte curieux est couvert d'une petite coquille, percée par les deux bouts, fort tendre & fragile, & dont la couleur est cendrée & verdâtre : le ver rend ses excréments par un de ces trous, & il passe ses pieds & sa tête par l'autre : cet insecte a le corps composé d'anneaux avec six pieds.

On apperçoit dans les couches de l'ardoise, les traces de ce ver : ces traces sont les chemins qu'il se creuse, lorsque la pierre est encore molle : c'est avec sa tête qu'il marche ; car la traînant & la faisant sortir par le petit trou qui est au-devant de sa coquille, c'est un point fixe qui lui sert pour avancer, tandis que le reste de son corps s'appuie sur ses pieds. Il a quatre mâchoires qui lui servent de dents. M. Desbois dit que cet animal fait sortir de sa bouche un petit filet, dont il bâtit sa coquille : il a dix petits yeux noirâtres, cinq de chaque côté, rangés les uns à côté des autres en forme de croissant. On ne fait pas, dit le même Auteur, quelle nouvelle forme cet insecte prend dans la suite ; mais il est constant qu'il se métamorphose, & que c'est dans la coquille que se fait ce changement. Un Observateur ayant rencontré la nymphe de ce petit ver, en vit sortir plus de quarante vers tous vivants : ils avoient la tête noire, leurs pieds étoient fort visibles, leur corps étoit jaune & mêlé de rouge.

LITOPHYTE. Ce mot, qui, comme son anagramme *phytolite*, ne devoit exprimer que des pétrifications, tant végétales qu'animales, n'est employé que pour désigner certaines productions à polypier, plus ou moins flexibles, en forme d'arbres & de la nature d'une corne ramollie. M. de Jussieu en 1741 a fait rentrer dans le Regne animal toutes les productions marines & en forme d'arbre, rangées jusqu'alors parmi les plantes. Ces productions connues sous les noms de litophytes, cératophytes, madrepores, coraux, corallines, & plusieurs zoophytes, font partie des êtres animés que ce Naturaliste appella *polypes*, dont le corps se ramifie & porte à chaque extrémité ou à sa surface de petits animaux analogues aux bourgeons ou aux fleurs des plantes, parcequ'ils ont la faculté de se reproduire de boutures & d'œufs semblables à des graines. L'idée de l'animalité de ces corps avoit cependant été effleurée par Imperati en 1599,

renouvelée en 1727 par Peyssonel ; mais sans preuves assez convaincantes, & sans détails aussi décisifs que ceux de M. de Jussieu : voyez l'article LITOPHYTE à la suite du mot CORALLINE : voyez aussi les mots CORAIL & POLYPE.

On nomme *hématophytes fossiles*, les litophytes qui ressemblent à des buissons, & qui se trouvent en différents états enfouis dans la terre : on en parle aussi dans l'article CORALLINE.

LITORNE ou OISEAU DE NERTE, ou CHACHA. C'est la grive de génévrier : voyez au mot GRIVE.

La litorne se prend, ainsi que les grives & le merle, avec la rejettoire ou avec le trébuchet.

LITS ou LIBAGES, *Telluris Strata*. Nom qu'on donne aux différentes couches du globe de la Terre : nous en parlerons au mot TERRE.

LITUITES. Les Lithologistes donnent ce nom à des espèces de tuyaux de mer pétrifiés, dont nous parlerons sous le nom d'*Orthoceratites*. Voyez ce mot.

LIVECHE ou LEVESCHE, ou ACHE DE MONTAGNE, ou SESELI DE MONTAGNE, ou SERMONTAINE, *Levisticum*. Plante qui croît aux lieux ombrageux, & qu'on cultive dans les jardins. Sa racine est épaisse, charnue, noirâtre en dehors, blanche en dedans & odorante : elle pousse des tiges hautes de cinq à six pieds, grosses, cannelées, nouées & rameuses ; ses feuilles sont faites comme celles de l'ache des marais, mais plus amples, vertes, brunâtres & d'une odeur forte. Les sommités des tiges sont chargées de grandes ombelles ou parasols, garnies de fleurs jaunes, auxquelles succèdent des semences assez grandes, oblongues, aromatiques, âcres & de couleur obscure.

Toute cette plante répand une odeur forte, aromatique, & particulièrement la graine, qui a, ainsi que la racine, une saveur âcre, qui n'est pas désagréable. Cette plante est diurétique, & noircit un peu les urines : elle dissipe les vents & est un bon vulnéraire. On fait confire sa racine dans le vinaigre ; & dans cet état on la mâche pour se préserver de la contagion de l'air : l'usage des feuilles de livèche est très spécifique pour procurer les règles supprimées par une peur.

On donne aussi le nom de livèche au *seseli commun*.

LIVRÉE. Nom que l'on donne à une espèce de limaçon, dont la coquille ou robbe est entourée de cercles & de bandelettes de diverses couleurs brunâtres, sur un fond jaune.

LIVRÉE. On donne encore ce nom à une espèce de chenille, d'où sort un phalène (papillon nocturne) qui entoure de ses œufs un jet de poirier ou de pommier, ou de prunier. Plusieurs raies, semblables aux rubans que l'on porte à la campagne pour livrées de noces, se voient sur cette chenille, que par allusion les Jardiniers nomment la *livrée*. Voyez CHENILLE sur-nommée la LIVRÉE.

Il y a dans le tissu de la coque de cette chenille & de beaucoup d'autres,

une grande quantité de poudre jaune-citron , qui a fourni à M. de Réaumur un trait de morale & de galanterie. Les Dames, dit-il, qui cherchent, avec des soins pour lesquels nous manquons souvent de reconnoissance , à ajouter aux agréments qu'elles tiennent de la Nature , ont imaginé dans ces derniers tems de se servir d'une poudre couleur de rose. Si la poudre des coques de nos *livrées* pouvoit heureusement leur paroître propre à donner une agréable couleur à leurs cheveux , ces coques feroient bientôt tirées de l'obscurité où elles sont.

LIVRÉE D'ANCRE : voyez MARQUIS D'ANCRE.

LOCHE. Petit poisson , dont on distingue plusieurs especes : savoir , la *loche d'étang* , la *loche de riviere* , & la *loche de mer* : nous avons parlé de celle-ci à l'article APHIS.

La LOCHE D'ÉTANG , *Aphia cobitis* , a la figure & la couleur du goujon , mais elle est plus petite : elle differe de la loche de riviere en ce qu'elle est plus courte & plus grosse.

La LOCHE DE RIVIERE , *Cobitis fluviatilis* , varie beaucoup : celle qu'on appelle la *loche franche* a la peau lisse , sans aiguillons ; & sa chair , quoique gluante , est plus tendre & plus saine que celle des autres : sa couleur est jaunâtre , tiquetée de noir. On en trouve en grande quantité dans la riviere de Mare en Languedoc , & dans toutes les rivieres à eaux vives , qui fournissent des truites. Une autre sorte de loche a , proche des ouies , un aiguillon de chaque côté ; sa chair est pleine d'arrêtes. Il y a encore une autre espece de loche , qui a des barbillons qui lui pendent du bout des mâchoires. On mange beaucoup de ces poissons dans les pays étrangers.

LODDER. C'est le nom que les Norvégiens donnent à une petite espece de hareng , qui ressemble beaucoup à nos éperlans , & dont les Groënlandois prennent tous les ans des quantités prodigieuses ; ils les font sécher sur les rochers pour l'hiver : cette pêche se fait en Mai & en Juin.

LOIR , *Glis*. C'est un petit animal quadrupede , dont le caractère , dit M. Brisson , est d'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire , point de dents canines , les doigts onguiculés , point de piquants sur le corps , la queue longue , & couverte de poils rangés de maniere qu'elle paroît ronde. Nous connoissons , dit M. de Buffon , trois especes de loirs , qui , comme la marmotte , dorment pendant l'hiver : savoir , le *loir* , le *lerot* & le *muscardin*. Nous allons réunir , sous ce même article , la description & l'histoire de ces animaux , afin qu'on puisse mieux juger de leurs rapports & de leurs différences , en les voyant les uns à côté des autres.

Le loir est le plus gros des trois , le muscardin est le plus petit , & ces trois especes sont très distinctes. Le loir est à-peu-près de la grandeur de l'écureuil : il a , comme lui , la queue couverte de longs poils. Le lerot n'est pas si gros que le rat : il a la queue couverte de poils très courts , avec un bouquet de poils à l'extrémité. Le muscardin n'est pas plus gros que la souris : il a la queue couverte de poils plus longs que le lerot , mais plus courts que le loir , avec un gros bouquet de longs poils à l'extrémité. Le

erot differe des deux autres , par les marques noires qu'il a près des yeux ; & le muscardin , par la couleur blonde de son poil sur le dos. Tous trois sont blancs ou blanchâtres sous la gorge & le ventre ; mais le lerot est d'un assez beau blanc ; le loir n'est que blanchâtre , & le muscardin est plutôt jaunâtre que blanc dans toutes les parties inférieures.

Voici une observation des plus curieuses & des plus piquantes , faite par M. de Buffon , sur les animaux dont on vient de parler. C'est improprement que l'on dit que ces animaux dorment pendant l'hiver : leur état n'est point naturel , c'est une torpeur , un engourdissement des membres & des sens , & cet engourdissement est produit par le refroidissement du sang. Ces animaux ont si peu de chaleur , qu'elle n'excede gueres celle de la température de l'air. Nous avons plongé , dit M. de Buffon , la boule d'un petit thermometre dans le corps de plusieurs lerots vivants ; si la chaleur de l'air étoit de dix degrés au thermometre , celle de ces animaux étoit la même : quelquefois même le thermometre plongé & appliqué sur le cœur , a baissé d'un demi-degré ou d'un degré , la température de l'air étant à onze. Or l'on fait que la chaleur de l'homme , & de la plupart des animaux qui ont de la chair & du sang , excède en tout tems trente degrés : il n'est donc pas étonnant que ces animaux , qui ont si peu de chaleur en comparaison des autres , tombent dans l'engourdissement , dès que cette petite quantité de chaleur intérieure cesse d'être aidée par la chaleur extérieure de l'air , & cela arrive lorsque le thermometre n'est plus qu'à dix ou onze degrés au-dessus de la congélation. C'est-là , continue M. de Buffon , la vraie cause de l'engourdissement de ces animaux , cause que l'on ignoroit & qui s'étend sur tous les animaux qui dorment pendant l'hiver. M. de Buffon l'a reconnu dans les loirs , dans les hérissons , dans les chauve-souris ; & quoiqu'il n'ait pas eu occasion de l'éprouver sur la marmotte , il y a lieu de penser qu'elle a le sang froid comme les autres , puisqu'elle est , comme eux , sujette à l'engourdissement pendant l'hiver.

Cet engourdissement dure autant que la cause qui le produit , & il cesse avec le froid : quelques degrés de chaleur au-dessus de dix ou onze , suffisent pour ranimer les animaux ; & même si on les tient pendant l'hiver dans un lieu bien chaud , ils ne s'engourdissent pas du tout ; ils vont & viennent , ils mangent & ne dorment que de tems en tems , comme tous les autres animaux. Lorsqu'ils sentent le froid , ils se ferment & se mettent en double , pour offrir moins de surface à l'air , & se conserver un peu de chaleur : c'est ainsi qu'on les trouve pendant l'hiver dans les arbres creux , dans les trous des murs , exposés au midi , sans aucun mouvement , sur de la mousse & des feuilles. On les prend , on les tient , on les roule , sans qu'ils remuent , sans qu'ils s'étendent ; rien ne peut les faire sortir de leur engourdissement , qu'une chaleur douce & graduée ; ils meurent lorsqu'on les met tout-à-coup près du feu : il faut pour les dégourdir , les en approcher par degrés. Quoique dans cet état ils soient sans aucun mouvement , qu'ils aient les yeux fermés , & qu'ils paroissent privés de tout usage des

sens, ils sentent cependant la douleur lorsqu'elle est très vive ; une blessure, une brûlure leur fait faire un mouvement de contraction, & un petit cri sourd qu'ils répètent même plusieurs fois. La sensibilité intérieure subsiste donc ainsi, aussi-bien que l'action du cœur & des poumons. Cependant il est à présumer que ces mouvements vitaux ne s'exercent pas, dans cet état de torpeur, avec la même force, & n'agissent pas avec la même puissance que dans l'état ordinaire. La circulation ne se fait probablement que dans les plus gros vaisseaux, la respiration est foible & lente, les sécrétions sont très peu abondantes, les déjections nulles, & il n'y a presque point de transpiration. En automne ils sont excessivement gras, & ils le sont encore lorsqu'ils se raniment au printemps ; cette abondance de graisse est une nourriture intérieure, qui suffit pour les entretenir & pour suppléer au peu qu'ils perdent par la transpiration. C'est peut-être moins la durée du froid que la rigueur, qui les fait périr.

Comme ce froid est la seule cause de leur engourdissement, & qu'ils ne tombent dans cet état que lorsque la température de l'air est au-dessous de dix ou onze degrés, il arrive souvent qu'ils se raniment, même pendant l'hiver ; car il y a des heures, des jours, & même des suites de jours, dans cette saison, où la liqueur du thermomètre se soutient à douze, treize ou quatorze degrés ; & pendant ce tems doux, les loirs sortent de leurs trous pour chercher à vivre, ou plutôt ils mangent les provisions qu'ils ont ramassées pendant l'automne, & qu'ils y ont transportées.

Les loirs sont gras en tout tems, & plus gras en automne qu'en été : leur chair est assez semblable à celle du cochon d'Inde, & n'est gueres meilleure que celle du rat d'eau. Ces animaux faisoient partie de la bonne chère chez les Romains ; ils en élevoient en quantité. Varron donne la manière de faire des garennes de loirs. Ce goût n'a pas été suivi, au rapport de Pline ; les Censeurs défendirent à Rome qu'on en servît sur les tables, parceque leur chair est de trop difficile digestion. Au reste, il n'y a que le loir qui soit mangeable ; le lerot a la chair mauvaise & d'une odeur désagréable.

Le loir ressemble assez à l'écureuil, par ses habitudes naturelles ; il habite, comme lui, les forêts, il grimpe sur les arbres, saute de branche en branche : la faine, les noisettes, la châtaigne & les autres fruits sauvages sont sa nourriture ordinaire ; il mange aussi de petits oiseaux qu'il prend dans le nid : il fait son lit, de mousse, dans le tronc d'un arbre creux ; il craint l'humidité, boit peu & descend rarement à terre. Il diffère encore de l'écureuil, en ce que celui-ci s'apprivoise, & que l'autre demeure toujours sauvage.

Les loirs s'accouplent vers la fin du printemps ; ils font leurs petits en été, les portées sont ordinairement de quatre ou de cinq, & l'on assure qu'ils ne vivent que six ans. Quelques Auteurs disent que les jeunes loirs nourrissent leur pere & mere, lorsqu'étant vieux ils ne peuvent plus sortir de leur trou.

En Italie, où l'on est encore dans l'usage de manger des loirs, on fait dans les bois des fosses que l'on tapisse de mousse, qu'on recouvre de paille, & où l'on jette de la faine. On choisit pour cela un lieu sec, à l'abri d'un rocher, & exposé au midi. Les loirs s'y rendent en nombre, & on les y trouve engourdis vers la fin de l'automne; c'est le tems où ils sont les meilleurs à manger. Ces petits animaux sont courageux, & défendent leur vie jusqu'à la dernière extrémité: ils ont les dents de devant très longues & très fortes: aussi mordent-ils très violemment: ils ne craignent ni la belette, ni les petits oiseaux de proie: ils échappent au renard, qui ne peut les suivre à la sommité des arbres: leurs grands ennemis sont les *chats sauvages* & les *martres*. Voyez ces mots.

L'espèce des loirs n'est pas extrêmement répandue: elle ne se trouve gueres que dans les climats tempérés, & dans les pays couverts de bois. Le loir du Nord, dont parlent les Naturalistes, est le *muscardin*, qui, comme nous l'avons dit, est la plus petite espèce des trois. Le loir volant de l'Isle de Ternate pourroit bien n'être que la *chauve-souris de Ternate*. Voyez ce mot.

À l'égard du loir sauvage de l'Amérique, c'est peut-être le *rat des bois* de Mademoiselle Merian, ou une espèce de *philandre* des Indes. Voyez au mot DIDELPHE & RAT DES BOIS.

Le léro est plus petit que le loir, & de forme différente; mais la marque distinctive de ces deux animaux est dans la forme de la queue. Celle du loir est revêtue de longs poils d'un bout à l'autre; au contraire, la queue du léro n'a que des poils très courts sur la plus grande partie de sa longueur: elle est seulement terminée à son extrémité par un bouquet de poils longs. Le léro a le corps & la tête plus courts; les oreilles plus longues, & le museau un peu plus pointu que le loir. Comme le léro est plus commun que le loir, & que le nom de *loir* est aussi plus connu que celui de *léro*, on donne souvent celui de *loir* au *léro*; nous en avons vu les différences extérieures, nous allons connoître la diversité de leurs mœurs.

Le loir, dit M. de Buffon, demeure dans les forêts, & semble fuir nos habitations; le léro, au contraire, habite nos jardins, & se trouve quelquefois dans nos maisons. L'espèce en est aussi plus nombreuse, plus généralement répandue, & il y a peu de jardins qui n'en soient infestés. Ils se nichent dans les trous des murailles: ils courent sur les arbres en espaliers, grimpent sur les arbres des vergers, choisissent les meilleurs fruits, & les entament tous dans le tems qu'ils commencent à mûrir. Si l'on veut conserver des fruits, on doit s'attacher à les détruire. Lorsque les fruits doux leur manquent, ils mangent des amandes, des noisettes, des noix, & même des graines légumineuses: ils en transportent en grande quantité dans leurs retraites, qu'ils pratiquent en terre ou dans des arbres creux, où ils se font un lit d'herbe & de mousse. Le froid les engourdit & la chaleur les ranime; on en trouve quelquefois huit ou dix dans le même lieu,

tous engourdis , tous resserrés en boule au milieu de leurs provisions de noix & de noisettes.

Le printems est la saison où ils s'accouplent : ils produisent en été , & font cinq ou six petits qui croissent promptement , mais qui cependant ne produisent eux-mêmes que dans l'année suivante : ils ont la mauvaise odeur du rat domestique ; au lieu que le loir ne sent rien. On trouve les lérots dans tous les climats tempérés , mais il ne paroît pas qu'il y en ait dans les pays Septentrionaux.

Le *muscardin*, dit M. de Buffon, est le moins laid de tous les rats : il a les yeux brillants , la queue touffue , le poil d'une couleur distinguée ; il est plus blond que roux. Il n'habite jamais dans les maisons , rarement dans les jardins , & se trouve , comme le loir , plus souvent dans les bois , où il se retire dans les vieux arbres creux. L'espece n'en est pas , à beaucoup près , aussi nombreuse que celle du léroty. On trouve le muscardin presque toujours seul dans son trou. Ce petit animal est assez commun en Italie , où l'on dit qu'il y en a deux especes ; l'une rare , qui a l'odeur du musc ; & l'autre qui est celle dont nous parlons , & qui n'a point d'odeur. On trouve ce petit animal en Suede.

Le muscardin s'engourdit par le froid , & se met en boule comme le loir & le léroty : il se ranime , comme eux , dans les tems doux , & fait aussi provision de noisettes & d'autres fruits secs. Il fait son nid sur les arbres comme l'écureuil ; mais il le place ordinairement plus bas , entre les branches d'un noisetier ou dans un buisson. Son nid est fait d'herbes entrelacées : il a environ six pouces de diametre , & n'est ouvert que par le haut ; il est entouré de feuilles & de mousse : on y trouve trois ou quatre petits. Dès qu'ils sont grands , ils quittent le nid , & se gâtent dans les creux des vieux arbres ; & c'est là qu'ils reposent , qu'ils font leur provision , & qu'ils s'engourdissent.

LOIR VOLANT. Nom sous lequel on désigne quelquefois l'animal connu aussi sous le nom d'*écureuil volant*. Voyez ce mot.

LOMBO. Voyez TITRI.

LOMBRICS. Voyez VERS DE TERRE.

LONKITE , *Lonchitis*. C'est une plante qui ne differe de la fougere mâle , qu'en ce que ses feuilles ont une oreillette à la base de leur découpure. Voyez l'article FOUGERE.

LORIOT , *Galgulus* , aut *Lurida*. C'est un oiseau de passage que l'on ne voit gueres que l'été en France , à moins qu'il ne soit gardé & nourri en cage. Le nom de *loriot* lui a été donné , parcequ'il semble prononcer ce mot ou celui de *colios*. Sa voix est haute : il est grand comme un merle , mais beaucoup plus long : ses pieds sont forts & garnis de bons ongles : ses jambes sont de couleur plombée : son bec est long & rond , légèrement courbé , très fendu & de couleur de rose. Cet oiseau est d'un verdâtre pâle tirant sur le jaune sous le ventre , toute la partie supérieure est jaune : ses aîles sont noires sur les deux côtés , & un peu tachetées de jaune : sa queue est plus longue que les aîles ; le mâle est beaucoup plus jaune que

la femelle. Cet oiseau convient pour la grandeur & pour la maniere de vivre avec la Grive.

Le loriot aime les fruits rouges : il se nourrit aussi de la vermine qu'il trouve dans les bois , le long des eaux & des fleuves. Son nid est suspendu à une branche : il fait depuis trois jusqu'à cinq petits , qu'il n'abandonne que quand ils sont assez forts pour se passer des soins de pere & de mere.

Le loriot d'Inde est aussi d'un beau jaune : il a une couronne sur la tête ; sur les aîles & sur la queue quelques taches bleues : le bas & les pieds sont d'un rouge éclatant.

L'oiseau qu'Albin nomme *Loriot verdore* , fait son nid par terre contre les haies , & est une espece de *Verdier*. Voyez ce mot.

LORIS. Espece de petit animal de Ceylan , qui a quelque ressemblance extérieure pour les mains , pour les pieds , pour la qualité du poil avec le *makis* ; mais il en differe parcequ'il n'a point de queue. C'est peut-être de tous les animaux celui qui a le corps le plus long relativement à sa grosseur : il est sur-tout reconnoissable par une tête ronde dont le museau est presque perpendiculaire , & parceque ses oreilles sont garnies intérieurement de trois oreillons en forme de petites conques. La femelle de ces animaux présente une singularité très remarquable & presque unique , c'est que son clitoris est percé comme la verge du mâle , & que c'est par cette partie que se fait l'écoulement des urines.

LOTE ou EELPOUT , *Lota*. Poisson à nageoires molles & épineuses , qui se trouve dans les lacs & les rivières , particulièrement dans l'Isere & dans la Saône. Ce poisson a le corps long de neuf pouces , rond , épais , & glissant comme la lamproie : il est couvert de petites écailles de différentes couleurs , tirant sur le roux & sur le brun : les côtés sont demi-cerclés : sa queue est faite en forme d'épée : sa langue est rude par le bout : il a les boyaux entortillés , le foie grand pour la petitesse de son corps : ses œufs sont mauvais , & purgent violemment , comme ceux du barbeau : il a onze dents petites & menues , droites & inégales en grandeur , & on ne les apperçoit que quand le poisson est cuit. Ses mâchoires sont d'égale grandeur , couvertes de grandes levres enflées. Ses yeux sont ronds , l'iris en est argentin & la paupiere bleue : il a quatre ouies de chaque côté , dont le haut & le bas sont assez ouverts : on y remarque sur la membrane six osselets ou arrêtes assez distinctes. L'anus est plus proche de la tête que de la queue : la nageoire de l'anus & celle du dos n'en font qu'une , & elle est presque continue jusqu'à la tête ; celles de la poitrine sont flexibles & d'un rouge jaune , celles du ventre sont blanches. On remarque au milieu du corps une ligne qui va depuis la tête jusqu'à la queue.

La chair de la lote est bonne & délicate ; mais on ne mange point les œufs de ce poisson , non plus que ceux du *brochet* & du *barbeau* , parcequ'ils purgent avec violence.

L'eelpout vit de squilles : on en trouve quelquefois des parties dans son ventricule.

LOTIER ODORANT, ou **TREFLE MUSQUÉ**, ou **FAUX BAUME DU PÉROU**, *Lotus hortensis odora*. C'est une plante annuelle qui croît dans les prés, sur les collines, & que l'on cultive dans les jardins. Sa racine est menue, simple, blanchâtre, ligneuse & un peu fibrée : elle pousse plusieurs tiges, longues de deux pieds, grêles, cannelées, un peu anguleuses, creuses, branchues dès le bas & inclinées. Ses feuilles naissent alternativement, portées trois ensemble sur une longue queue : elles sont verdâtres, lisses & dentelées. Des aisselles des feuilles supérieures, il sort des pédicules longs qui portent des bouquets de petites fleurs légumineuses, d'un bleu clair, quelquefois jaunâtre, & d'une odeur aromatique qui se conserve long-tems, même après que la fleur est séchée : à ces fleurs succèdent des gousses qui renferment chacune deux ou trois graines jaunes, odorantes & arrondies.

Les feuilles & les fleurs du lotier sont d'usage en Médecine ; elles sont deterfives & consolidantes, vulnéraires & sudorifiques ; étant prises dans du vin, on prétend qu'elles empêchent le poison d'agir : on en fait des cataplasmes qui sont propres à réunir les plaies, à les amollir & à dissiper l'inflammation des tumeurs. Bien des personnes mettent cette plante desséchée dans leurs habits pour les garantir de l'attaque des vers : mais ce moyen n'est pas toujours sûr. Les Egyptiens ont en grande vénération la plante du *lotus*, ils en font une sorte de pain & de galette. On donne aussi le nom de *lotier* au trefle sauvage jaune. *Voyez* TREFLE.

LOUP, *Lupus*. C'est un animal des bois, farouche & carnassier, mis par les Naturalistes dans le genre du chien, dont il diffère cependant beaucoup ; il a à-peu-près deux pieds de longueur, à prendre depuis la tête, jusqu'à la naissance de la queue, & autant de hauteur. Son museau est allongé & obtus ; ses oreilles sont courtes & droites ; sa queue est grosse & couverte de longs poils grisâtres, tirant sur le jaune & un peu noirâtres ; ses yeux sont bleus & étincelants ; ses dents sont rondes, inégales, aiguës & ferrées ; l'ouverture de sa gueule est grande ; il a le col si court, qu'il ne peut le remuer, ce qui l'oblige à tourner tout son corps quand il veut regarder de côté ; il a l'odorat fin : c'est le plus goulé & le plus carnassier de tous les animaux. Le loup, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ressemble si fort au chien, qu'il paroît être modelé sur la même forme. Mais si la forme est semblable, le naturel est si différent, que non-seulement ils sont incompatibles, mais antipathiques par nature, & ennemis par instinct. Un jeune chien frissonne au premier aspect du loup ; il fuit à l'odeur seule, qui, quoique nouvelle & inconnue, lui répugne si fort, qu'il vient en tremblant se ranger entre les jambes de son maître. Un mâtin qui connoît ses forces, s'indigne, l'attaque avec courage, & tâche de le mettre en fuite : jamais ils ne se rencontrent sans se fuir, ou sans se combattre à toute outrance, jusqu'à ce que la mort suive. Si le loup est le plus fort, il déchire, il dévore sa proie ; le chien au contraire, plus généreux, se contente de la victoire.

On prétend que le chien & la louve ne peuvent ni s'accoupler, ni produire ensemble ; il n'y a point de races intermédiaires entr'eux : ils sont d'un naturel tout opposé, d'un tempérament absolument différent. Le loup vit plus long-tems que le chien : les louves ne portent qu'une fois par an ; les chiennes portent deux ou trois fois. Ces différences si marquées démontrent que ces animaux sont d'espèces assez éloignées. D'ailleurs, en regardant de près, on reconnoît que même à l'extérieur, le loup diffère du chien, par des caractères essentiels & constants. L'aspect de la tête est différent, le loup a la cavité de l'œil obliquement posée, l'orbite inclinée, les yeux étincelants, brillants pendant la nuit : il a le hurlement au lieu de l'aboiement, les mouvements différents, la démarche plus égale, plus uniforme, quoique plus prompte & plus précipitée : le corps beaucoup plus fort, mais bien moins souple : les membres plus fermes, les mâchoires & les dents plus grosses, le poil plus rude & plus fourré. Sa couleur ordinaire dans ces pays-ci, est d'un fauve grisonnant, mêlé de brun dans certains endroits : le proverbe dit, *jeune loup gris, & vieux loup blanc*.

Le loup, dit M. de Buffon, est l'un de ces animaux dont l'appétit pour la chair est le plus véhément ; & quoiqu'avec ce goût, il ait reçu de la Nature les moyens de le satisfaire, qu'elle lui ait donné des armes, de la ruse, de l'agilité, de la force, tout ce qui est nécessaire, en un mot, pour trouver, attaquer, vaincre, saisir & dévorer sa proie ; cependant il meurt souvent de faim, parceque l'homme lui ayant déclaré la guerre, l'ayant même pros crit en mettant sa tête à prix, le force à fuir & à demeurer dans les bois, où il ne trouve que quelques animaux sauvages qui lui échappent par la vitesse de leur course, & qu'il ne peut surprendre que par hazard ou par patience, en les attendant long-tems, & souvent en vain, dans les endroits où ils doivent passer. Il est naturellement grossier & poltron, mais il devient ingénieux par besoin, & hardi par nécessité : pressé par la famine, il brave le danger, vient attaquer les animaux qui sont sous la garde de l'homme, ceux sur-tout qu'il peut emporter aisément, comme les agneaux, chevreaux, & lorsque cette maraude lui réussit, il revient souvent à la charge, jusqu'à ce qu'ayant été blessé ou chassé & maltraité par les hommes & les chiens, il se recèle pendant le jour dans son fort, n'en sort que la nuit, parcourt toutes les campagnes, rode autour des habitations, ravit les animaux abandonnés, vient attaquer les bergeries, gratter & creuser la terre sous les portes, entre furieux, met tout à mort avant de choisir & d'emporter sa proie. Lorsque ces courses ne lui produisent rien, il retourne au fond des bois, se met en quête, cherche, fuit à la piste, chasse, poursuit les animaux sauvages, dans l'espérance qu'un autre loup pourra les arrêter, les saisir dans leur fuite, & qu'ils en partageront la dépouille. Enfin lorsque le besoin est extrême, il s'expose à tout, attaque les femmes & les enfants, se jette même sur les hommes, devient furieux par ces excès, qui finissent ordinairement par la rage & par la mort. Il ne faut qu'un loup enragé pour causer des désordres affreux dans tout un

pays , tant parmi les bestiaux , que parmi les hommes ; les blessures que fait cet animal , sont presque toujours mortelles , ou suivies de la rage. Le loup craint , dit-on , le feu & tous les sons aigus , que l'on prétend faire sur lui une impression qu'il ne peut supporter , & qui le contraint de fuir. Il est difficile de croire , comme on le dit , qu'un homme poursuivi de nuit par un loup affamé , le fasse fuir , soit en tirant du feu d'un caillou , soit en sonnant du cor , soit en agitant un troussseau de clefs.

Il n'est pas vrai , comme le disent plusieurs Chasseurs , que le loup pressé de la faim mange de la terre : cette idée paroît être provenue de ce qu'on a vu quelquefois des loups déterrer la proie qu'ils avoient enfouie & mise en réserve après s'être faoulés , pour s'en servir dans le cas de besoin ; précaution que prennent aussi les chiens & plusieurs autres animaux.

Le loup est ennemi de toute société : lorsqu'on les voit plusieurs ensemble , ce n'est point une société de paix ; c'est un attroupement de guerre qui se fait à grand bruit avec des hurlements affreux , & qui dénote un projet d'attaquer quelque gros animal , comme un cerf , un bœuf , une renne , ou de se défaire de quelque mâtin redoutable. Nous venons de dire que le tems de leur chasse est le soir , c'est sur tout dans le tems des brouillards ; & s'ils ont quelque riviere à passer , ils la traversent à la file , se prenant par la queue avec les dents , de peur que la force du courant ne les entraîne : s'ils ont reçu quelque blessure qui les fasse saigner , ils se veautrent dans la boue , jusqu'à ce que le sang soit arrêté. Le plus fort d'entr'eux frappe à la porte des Payfans , pour faire sortir les chiens , & prend la fuite aussi-tôt , pendant que le loup lévrier est au guet pour les attrapper dans le tems qu'ils sortent. Dès que leur expédition militaire ou plutôt carnassiere est consommée , ils se séparent & retournent en silence à leur solitude. Il n'y a pas même une grande habitude entre le mâle & la femelle , ils ne se cherchent qu'une fois par an , & ne demeurent que peu de tems ensemble. C'est en hiver que les louves viennent en chaleur : plusieurs mâles suivent la même femelle , & cet attroupement est encore plus sanguinaire que le premier ; car ils se la disputent cruellement , ils grondent , ils frémissent , ils se battent , ils se déchirent , & il arrive souvent qu'ils mettent en pieces celui d'entr'eux qu'elle a préféré. Ordinairement elle fuit long-tems , lasse tous les aspirants , & se dérobe , pendant qu'ils dorment , avec le plus alerte ou le plus aimé.

La chaleur ne dure que douze ou quinze jours ; les mâles n'ont point de rut marqué , ils pourroient s'accoupler en tout tems , ils passent successivement de femelles en femelles à mesure qu'elles deviennent en état de les recevoir. Les loups s'accouplent comme les chiens ; ils ont , comme eux , la verge osseuse & environnée d'un bourlet , qui se gonfle & les empêche de se séparer. Le tems de la gestation est d'environ trois mois & demi , & l'on trouve des louveteaux nouveaux nés , depuis la fin d'Avril , jusqu'au mois de Juillet. C'est toujours au fond d'un bois , dans un endroit bien fourré que la louve met bas ses petits , qui sont ordinairement au

nombre de six , sept , huit , & même neuf , & jamais moins de trois. La mere les allaite pendant quelques semaines ; quelque tems après elle leur apporte des mulots , des levrauts , des perdrix , des volailles vivantes. Les louveteaux commencent par jouer avec elles , & finissent par les étrangler ; la louve ensuite les déchire & en donne un morceau à chacun. Ils ne sortent du fort où ils ont pris naissance , qu'au bout de six semaines ou deux mois ; ils suivent la mere qui les mene boire quelque part : elle les ramene au gîte , ou les oblige de se receler ailleurs , lorsqu'elle craint quelque danger : ils la suivent ainsi pendant plusieurs mois. Quand on les attaque , elle les défend de toutes ses forces & avec fureur , quoique dans un autre tems , elle soit , comme toutes les femelles , plus timide que le mâle. Ce n'est ordinairement qu'à dix mois ou un an que les petits la quittent , lorsqu'ils se sentent assez forts pour n'avoir plus besoin de secours. Dans ce tems ils ont refait leurs premières dents , qui tombent à six mois , & ils ont acquis de la force , des armes & des talents pour la rapine.

Les mâles & les femelles sont en état d'engendrer à l'âge d'environ deux ans. Les Chasseurs assurent que dans toutes les portées , il y a plus de mâles que de femelles : cela confirme cette observation , qui paroît générale , du moins dans ces climats , que dans toutes les especes , à commencer par celle de l'homme , la Nature produit plus de mâles que de femelles. Ces animaux sont deux ou trois ans à croître , & vivent quinze ou vingt ans. Les loups blanchissent dans la vieillesse ; ils ont alors toutes les dents usées ; on en voit cependant en Laponie qui sont blancs , sans être absolument vieux : ce phénomène leur est commun avec toutes les especes d'animaux à poil qui habitent ces climats glacés. Ils dorment lorsqu'ils sont rassasiés ou fatigués , mais plus le jour que la nuit , & toujours d'un sommeil léger : ils boivent fréquemment , comme tous les animaux carnassiers ; quoique très voraces , ils peuvent passer trois ou quatre jours sans manger , pourvu qu'ils ne manquent pas d'eau.

Le loup a beaucoup de force dans les muscles du col & de la mâchoire ; il porte avec sa gueule un mouton , sans le laisser toucher à terre , & court en même-tems plus vite que les Bergers ; en sorte qu'il n'y a que les chiens qui puissent l'atteindre & lui faire lâcher prise. Il marche , court , rode des jours entiers & des nuits ; il est infatigable , & c'est peut-être , de tous les animaux , le plus difficile à forcer à la course. Lorsqu'il tombe dans un piège ; il est tellement & si long-tems épouvanté , qu'on peut lui mettre un collier , l'enchaîner , le museler , le conduire ensuite par-tout où l'on veut , sans qu'il ose donner le moindre signe de colere ou de mécontentement. Gesner raconte qu'une femme , un renard & un loup , étant tombés de nuit dans la même fosse , ils restèrent chacun dans leur place , sans oser se remuer jusqu'au lendemain matin , que ces trois prisonniers furent trouvés ensemble : on commença par tuer le loup & le renard , puis on retira de la fosse la femme , qui étoit plus morte que vive , quoiqu'elle n'eût éprouvé d'autre mal que la frayeur.

Le loup a les sens très bons , l'œil , l'oreille , & sur-tout l'odorat : l'odeur du carnage l'attire de plus d'une lieue. Lorsqu'il veut sortir du bois , jamais il ne manque de prendre le vent ; il s'arrête sur la lisière , évente de tous côtés , & reçoit ainsi les émanations des corps morts ou vivants que le vent lui apporte. Il préfère la chair vivante à la chair morte , & cependant il dévore les voiries les plus infectes : il aime la chair humaine , & peut-être , s'il étoit le plus fort , n'en mangeroit-il pas d'autre. On a vu des loups suivre les armées , arriver en nombre à des champs de bataille , où l'on avoit enterré négligemment les corps , les découvrir , les dévorer avec une insatiable avidité ; & ces mêmes loups accoutumés ainsi à la chair humaine , attaquer le Berger plutôt que le troupeau , dévorer des femmes , emporter des enfants.

Les loups nous viennent de fort loin , comme des Ardennes , de la Forêt Noire , & d'autres vastes forêts : on tient même presque pour certain , & c'est l'opinion de nos plus habiles Chasseurs , qu'il en sort une année des cerfs , une année des sangliers & une autre des loups. L'on a appelé les loups les plus voraces , *loups garoux* , c'est-à-dire , loups dont il faut se garer. Aussi les Lapons , instruits par l'expérience , que les loups de leur pays recherchent les femmes prêtes d'accoucher , qu'ils reconnoissent à l'odeur , font toujours escorter leurs femmes enceintes par des hommes armés. On nomme *loup matin* , celui qui ne vit que de charogne ; & l'on appelle *loup lévrier* , celui qui est le plus dispos à la course.

On est donc obligé quelquefois d'armer tout un pays pour se débarrasser des loups , ainsi qu'il est arrivé tout récemment dans la Province du Gévaudan , où l'on a fait diverses chasses composées de plusieurs milliers d'hommes armés , sans pouvoir détruire le loup féroce qui a causé tant de terreurs & de désordres dans ce pays forestier & montueux , & qui enfin a été tué par le sieur Antoine , Porte-arquebuse du Roi. Les Princes ont des équipages pour cette chasse , qui n'est pas désagréable , qui est utile & même nécessaire. On a besoin d'un bon limier pour la quête du loup ; il faut même l'animer , l'encourager , lorsqu'il tombe sur la voie , car tous les chiens ont de la répugnance pour le loup. Quand le loup est ramené , on amène les lévriers que l'on divise en deux ou trois lesses , & que l'on distribue dans les endroits où doit passer le loup , afin que ces chiens puissent le joindre. On peut aussi le chasser avec des chiens courants ; mais comme il perce toujours droit en avant , & qu'il court tout un jour sans être rendu , cette chasse est ennuyeuse , à moins que les chiens courants ne soient soutenus par les lévriers , qui le saisissent , le harcelent & leur donnent le tems de l'approcher.

Dans les campagnes , on fait des battues à force d'hommes & de mârins ; on tend des pièges , on présente des appas , on fait des fosses , on répand des boulettes empoisonnées ; tout cela n'empêche pas qu'on n'y trouve toujours quelques-uns de ces animaux. Les Anglois prétendent en avoir purgé leur Isle ; cependant , dit M. de Buffon , on m'a assuré qu'il y

en avoit en Ecoſſe. Comme il y a peu de bois dans la partie méridionale de la Grande Bretagne , on a eu plus de facilité pour les détruire.

La couleur du poil de ces animaux varie dans les différens climats , & même quelquefois dans le même pays. Dans les pays du Nord , on en trouve de tout blancs & de tout noirs ; ces différences ne ſont que des variétés très peu conſidérables. La différence la plus ſenſible , eſt celle de la grandeur ; mais on a obſervé en général , que des animaux communs aux deux Continents , ceux de l'Amérique ſont plus petits que ceux d'Europe. Nos loups ordinaires ſont auſſi plus petits & moins communs en Canada qu'en Europe , & les Sauvages en eſtiment fort la peau. L'eſpece commune eſt très généralement répandue : on la trouve en Aſie , en Afrique & en Amérique , comme en Europe. En Orient , & ſur-tout en Perſe , on fait ſervir les loups à des ſpectacles pour le peuple : on les exerce de jeuneſſe à la danſe , ou plutôt à une eſpece de lutte contre un grand nombre d'hommes : on achete juſqu'à cinq cents écus , dit Chardin , un loup bien dreſſé à la danſe. Ce fait prouve au moins qu'à force de tems & de contrainte , ces animaux ſont ſuſceptibles de quelque eſpece d'éducation. M. de Buffon en a fait élever & nourrir quelques-uns chez lui. Tant qu'ils ſont jeunes , c'eſt-à-dire , dans la première & ſeconde année , ils ſont aſſez dociles , ils ſont même careſſants ; & ſ'ils ſont bien nourris , ils ne ſe jettent ni ſur la volaille , ni ſur les autres animaux : mais à dix-huit mois ou deux ans , ils reviennent à leur naturel ; on eſt forcé de les enchaîner pour les empêcher de ſ'enfuir & de faire du mal. Voici un fait qui peut en quelque ſorte ſervir de preuve à ce que dit M. de Buffon. Il y a deux ans que dans le bois de Monthoron près de Poitiers , je trouvai ſix petits loups qui étoient au gîte ; ils n'avoient pas plus de huit jours : j'en pris un & le mis dans un petit lit convenable , que je lui fis faire dans ma chaiſe ; je le nourris d'abord de lait , enſuite de pain & de lait , puis de ſoupe. Il prenoit des forces comme ſ'il eût été nourri par ſa mere ; ni la fatigue du voyage , ni le changement de nourriture ne l'altérèrent pas ſenſiblement ; je le careſſois beaucoup & le mettois coucher avec moi ; il me léchoit , venoit quand je l'appellois , & commençoit déjà à rapporter ce que je jettois à une certaine diſtance. J'eſſayai de lui faire manger les entrailles d'un poulet qu'on venoit de vuidér ; jamais il n'eut ſi bon appétit ; ſes careſſes redoublèrent : mais je manquai d'être la victime de ma tentative , qui probablement lui inſpira le goût naturel de ſon eſpece , qui eſt carnivore , & même antropophage dans certains cas ; car la nuit ſuivante rêvant que j'étois en proie à des loups , je me réveillai par l'effet de la peur ou de la douleur : mon loupveteau étoit parvenu à me mordre les jambes , & ſuçoit le ſang qui en ſortoit. Je ne tardai pas à m'en défaire ; & j'ai appris depuis qu'on avoit été obligé de le tuer , tant il étoit diſpoſé à mordre les enfans dans la maiſon où je l'avois laiffé.

On fait avec la peau du loup des fourrures groſſieres qui ſont chaudes & durables , même des manchons ; on en double la chaudière des gour-

teux , & de ceux qui craignent le froid des extrémités : on assure même que les puces craignent l'odeur de cette peau , & qu'elles s'en éloignent. Nous avons mis dans notre Cabinet un loup empaillé parmi plusieurs autres quadrupedes , & depuis neuf ans qu'il y est , les scarabées disséqueurs qui ont mangé entièrement la peau des autres , n'ont nullement touché à celle du loup. Les dents de loup servent à faire des hochets d'enfants , & à polir les ouvrages des Relieurs & Doreurs.

Les Naturalistes font mention de plusieurs autres sortes de loups , que ceux dont nous avons parlé : tels que le *loup doré* (voyez ADIL & CHACAL) , le *loup tigre* , le *loup cervier* , &c. Nous donnerons l'histoire abrégée de ce dernier au mot LYNX.

LOUP. M. Cestoni donne ce nom à une forte de fausse chenille , qui est l'ennemie des petites brebis. Cet insecte se métamorphose en moucheron.

Les payfans appellent aussi du nom de *loup* d'autres petites especes de chenilles qui rongent les boutons d'arbres , particulièrement des poiriers , cerisiers & pommiers. Ces mêmes chenilles causent de très grands dommages aux rejettons : elles n'en peuvent être chassées que par une longue pluie , car elles endurent sans peine le froid & le chaud. Pour conserver la bonté du fuc aux boutons qu'elles rongent , elles les enveloppent d'une matiere foyeuse , & les renforcent de feuilles : c'est le soir & le matin qu'elles prennent leur nourriture. Elles doivent leur origine à des papillons gris qui vont déposer leurs œufs sur les feuilles des arbres fruitiers. Le matin ils en sucent l'humidité & la rosée. Dans l'hiver ils se tiennent dans les étables & dans les granges. Voyez CHENILLE & PAPILLON.

LOUP DES EAUX. On donne ce nom au *brochet* & à la *loutre* , parcequ'ils détruisent beaucoup de poissons : voyez BROCHET & LOUTRE.

LOUP MARIN. Tous les Voyageurs disent que c'est un animal amphibie , qui ne se nourrit , pour ainsi dire , que de poisson. Les uns lui donnent quatre pattes onglées ; les autres deux , avec deux mains palmées placées proche la queue. Dans leurs occupations , on reconnoît des caractères qui conviennent fort au phocas ou veau marin , & quelquefois aussi à l'ours marin : ils sont également velus , même maniere de marcher , de ronfler & de gronder ; ils sont également susceptibles de mourir avec une effusion de sang , dès qu'on les touche sur le nez : leur chair est de même d'un mauvais goût , & se fond presque toute en huile.

Quoique plusieurs Naturalistes modernes tendent à croire que le loup marin est différent du phocas , nous croyons cependant que l'un & l'autre sont de la même espece ; mais que selon leur âge , leur sexe , ou la mer qu'ils habitent , ils sont sujets à varier. Telles sont les réflexions qui nous sont venues d'après la comparaison faite de quantité de ces animaux empaillés , & qui avoient été pris , les uns dans la mer du Sud , les autres dans la mer du Nord.

Les Indiens de Chiloë en font sécher la chair pour se nourrir : les vaisseaux François en tirent de l'huile pour leurs besoins. La pêche en est assez

facile. Ceux du Nord sont grands comme de bons mâtins ; ceux du Pérou ont à-peu-près deux pieds de long : leur peau sert à faire des ballons pleins d'air , dont les Américains se servent au lieu de bateaux.

Les Groënlandois donnoient autrefois le nom de *loup marin* ou de *hay-fisch* au *tiburon* : les Hollandois appellent *lion marin*, l'animal que nous & les Espagnols appellons *loup marin* ; d'autres l'ont appelé *chien marin*, à cause de la figure de sa tête. Voyez chacun de ces mots , & les articles PHOCAS & OURS MARIN.

Outre ces loups marins amphibies, les Voyageurs & les Naturalistes font mention de deux especes différentes de poissons, connues aussi sous le nom de *loup de mer* : le premier s'appelle simplement *loup marin*, & l'autre *loup de mer vulgaire*. Voyez leur description ci-après.

LOUP MARIN, *Lupus marinus piscis*. Poisson à nageoires molles, sans écailles, qui est très vorace. Sa peau est unie & presque semblable à celle des anguilles ; elle est bleuâtre & ombrée de noir : sa tête est grande, serrée, comme en forme de poignard ; ses joues sont enflées ; ses dents sont redoutables, elles sont grandes & fortes, comme celles d'un chat de six mois. Il a une nageoire garnie d'aiguillons mols, qui s'étend depuis la tête jusqu'à la queue. Il a, proche des ouies, deux grandes nageoires rondes. On pêche de ces poissons en Angleterre dans le Duché d'Yorck, & dans le Northumberland. On donne aussi le nom de *loup marin* au grand *chien de mer* ou *lamie*. Voyez ces mots.

LOUP DE MER VULGAIRE ou **LUBIN**, *Labrax*. Est un excellent poisson de nos mers, à nageoires épineuses, qui a toujours la gueule ouverte, & qui dévore très promptement sa proie ; ce qui est cause qu'on le prend facilement. On distingue deux especes de lubins : l'un a le dos entre blanc & bleu ; l'autre est sans taches. On trouve le premier dans la mer & dans les étangs salés, & l'autre aux embouchures des rivières ; celui-ci a des petits deux fois l'an.

Le *loup de mer vulgaire* est un poisson grand, épais, & couvert d'écailles moyennes : il a la tête grande, ainsi que l'ouverture de la bouche : il a de très petites dents aux mâchoires, ce qui fait qu'il ne peut dévorer beaucoup de petits poissons ; mais il a dans le palais des os rudes & âpres. Ses yeux sont grands. Cet animal ressemble assez par le corps au saumon : il a sous l'épine du dos un lieu vuide plein d'air ; il a quatre ouies de chaque côté. Près des ouies, & au-dessous sont quatre nageoires ; au dos sont des aiguillons pointus & inégaux, qui tiennent à une peau mince. La nageoire qui est proche la queue, n'a qu'un aiguillon ; celle de l'anüs en a trois : il a huit nageoires en tout. La nourriture de ce poisson consiste en poissons & petits crustacés ; il mange même de l'algue. Quoique goulü, il a grand soin de ne point prendre la chevrette qui porte une petite corne sur la tête, parcequ'elle lui piqueroit le palais.

On trouve deux pierres dans la tête de ce poisson. Les Pêcheurs ont remarqué que les lubins vieux nagent au dessus de l'eau, y périssent souvent de

de froid ; aussi les jeunes n'habitent-ils que le fond des eaux. Ce poisson se prend facilement à l'hameçon , à cause de sa voracité ; mais aussi a-t-il la ruse d'enfoncer sa queue dans le gravier , pour que les rets des Pêcheurs coulent par-dessus son corps.

La chair de ce poisson nourrit peu , & ne vaut rien dans le tems du frai. Le meilleur loup , est celui qui vit en haute mer : on en sale , & on seche les œufs comme ceux des muges.

M. Barrere dit qu'il se trouve aussi deux sortes de lubin ou lubine dans l'Isle de Cayenne : l'un de riviere , qui est excellent ; & l'autre de mer & à écailles , qui est encore plus délicat.

LOUP-TIGRE. C'est , à ce qu'il paroît , le même animal que celui que les Fourreurs nomment *guépard*. Sa robe est belle , elle ressemble à celle du *lynx* ou *loup cervier* par la longueur du poil ; elle est d'un fauve très pâle , parsemée comme celle du léopard , de taches noires , mais plus voisines les unes des autres , & plus petites ; car elles n'ont que deux à trois lignes de diamètre. Cet animal est très remarquable par une espece de criniere , de quatre à cinq pouces de longueur , qui lui pend sur le col & entre les deux épaules.

On voit le loup-tigre dans les terres voisines du Cap de Bonne-Espérance. Pendant le jour il reste caché dans quelques creux de rochers , & ne va chasser sa proie que pendant la nuit. L'ardeur avec laquelle il la cherche est apparemment cause qu'il hurle pendant la nuit ; mais son cri fait fuir souvent les animaux , & donne lieu au Chasseur de l'attendre pour le tuer à quelque passage.

LOUTRE, *Lutra*. La loutre est à-peu-près de la grosseur du blaireau ; mais ses jambes sont plus courtes. Cet animal a la tête plate , le museau fort large , & de chaque côté il y a des moustaches composées de gros crins blancs & bruns. Son col est court , & si gros , qu'il semble faire partie du corps ; sa queue est grosse à l'origine , & pointue à l'extrémité , couverte de poils. Son corps est recouvert de deux sortes de poils ; les uns plus longs & plus fermes , les autres plus fins , qui sont une sorte de duvet soyeux , de couleur grise blanchâtre. Les poils les plus longs font paroître en général l'animal de couleur brune.

La loutre , dit M. de Buffon , est un animal vorace , plus avide de poisson que de chair , qui ne quitte guere le bord des rivières ou des lacs , & qui dépeuple quelquefois les étangs. Elle a plus de facilité qu'un autre pour nager , plus même que le castor , qui n'a des membranes qu'aux pieds de derriere , & dont les doigts sont séparés dans les pieds de devant ; tandis que la loutre a des membranes à tous les pieds , qui sont composés de cinq doigts onguiculés. Elle nage presque aussi vite qu'elle marche : elle ne va point à la mer comme le castor , mais elle parcourt les eaux douces , & remonte ou descend les rivières à des distances considérables. Souvent elle nage entre deux eaux , & y demeure assez long-tems ; elle vient ensuite à la surface de l'eau , afin de respirer.

A parler exactement, elle n'est point animal amphibie, c'est-à-dire, animal qui peut vivre également sur la terre & dans l'eau : elle n'est pas conformée pour demeurer dans ce dernier élément ; & elle a besoin de respirer, à-peu-près comme tous les animaux terrestres. Si même il arrive qu'elle s'engage dans une nasse à la poursuite d'un poisson, on la trouve noyée, & l'on voit qu'elle n'a pas eu le tems d'en couper tous les osiers pour en sortir. Après l'examen anatomique que MM. de l'Académie ont fait d'une loutre, ils n'ont pu découvrir aucune apparence qu'il y eût jamais eu un trou qui pût donner passage au sang pour aller d'un ventricule à l'autre, sans passer par les poumons ; au lieu qu'il paroît que cette ouverture (le trou ovale) subsiste dans le castor, ce qui le rend vraiment amphibie, & lui donne une bien plus grande facilité de se passer long-tems de respiration. La loutre a des poumons spacieux ; par une grande inspiration, elle absorbe une grande quantité d'air, qui lui donne seulement la facilité de rester long-tems sous l'eau. La femelle de la loutre a la matrice faite de même que celle des femmes, & a des nymphes & un clitoris comme elles : elle a dix petits reins, séparés les uns des autres, ayant chacun leur parenchyme, leurs veines, & leur artère émulgente à part.

La loutre a six dents incisives à chaque mâchoire ; les dents sont comme celles de la fouine, mais plus grosses & plus fortes relativement à son volume. Une tête mal faite, les oreilles placées bas, des yeux trop petits & couverts, l'air obscur, les mouvements gauches, toute la figure ignoble, informe, un cri qui paroît machinal, & qu'elle répète à tout moment, sembleroient annoncer un animal stupide : cependant la loutre devient industrieuse avec l'âge, au moins assez pour faire la guerre avec avantage aux poissons qui, pour l'instinct & le sentiment, sont très inférieurs aux autres animaux. On dit que la loutre, lorsqu'elle veut prendre du poisson, commence à agiter les eaux pour faire fuir cette proie sur les bords de l'étang, &c. entre les pierres & les cailloux, où elle les prend alors facilement. Au défaut de poisson, même d'écrevisses, de grenouilles, de rats d'eau ou d'autre nourriture, elle coupe les jeunes rameaux, & mange l'écorce des arbres aquatiques ; elle mange aussi de l'herbe nouvelle au printemps. Elle ne craint pas plus le froid que l'humidité : elle devient en chaleur en hiver, & met bas au mois de Mars ; les portées sont de trois ou quatre.

Il seroit sans doute très avantageux de pouvoir tirer parti de ces animaux voraces, & qui sont de si excellents pêcheurs ; c'est ce qui est indiqué dans le Journal Etranger du mois de Juin 1755, où l'on trouve un *Mémoire sur la manière de prendre les loutres en vie, & de les dresser pour apporter du poisson ; par M. Jean Lots, de l'Université de Lund en Scanie, & Membre de l'Académie de Stockholm.*

Chaque animal a des habitudes qui lui sont particulières, & dont tout bon Chasseur peut tirer avantage. Par exemple, on prétend avoir observé qu'une loutre ne passe pas une seule grande pierre qui se rencontre sur le

bord des rivages qu'elle habite , fans y monter & fans y déposer quelque fiente , que l'on reconnoît aisément être celle de l'animal , parcequ'elle est entremêlée d'arrêtes. Cette marque , qu'on rencontre sur les pierres , fait aisément connoître la demeure de ces animaux , & ne donne pas moins de facilité à leur dresser des embuches pour les prendre. Lorsqu'on veut en avoir une vivante , on dresse sur ces pierres des tenailles construites de maniere que la loutre se prend sans se blesser , lorsqu'elle va pour saisir le poisson qu'on lui a mis pour appas.

A-t-on une jeune loutre vivante , car les jeunes se dressent mieux que les vieilles , on l'attache d'abord avec soin , & on la nourrit pendant quelques jours avec du poisson & de l'eau ; ensuite on mêle de plus en plus dans cette eau , du lait , de la soupe , des choux & des herbes ; & dès qu'on s'apperçoit que cet animal s'habitue à cette espece d'aliment , on lui retranche presque entièrement les poissons ; & en leur place , on substitue du pain , dont il se nourrit très bien. Enfin il ne faut plus lui donner ni poissons entiers , ni intestins , mais seulement des têtes ; on dresse ensuite l'animal à rapporter , comme l'on dresse un chien. Lorsqu'il rapporte tout ce qu'on veut , on le mene sur le bord d'un ruisseau clair ; on lui jette du poisson qu'il a bientôt joint , & qu'on lui fait rapporter , & on lui donne la tête pour récompense. Un homme de la Scanie , par le secours d'une loutre ainsi dressée , prenoit journellement autant de poisson qu'il lui en falloit pour nourrir toute sa famille. Au reste , cette maniere de chasser n'est pas nouvelle en Suede , & doit avoir été beaucoup plus commune autrefois qu'aujourd'hui ; puisque Jonston , dans son *Histoire des Animaux* , rapporte que les Cuisiniers en Suede , avoient l'usage d'envoyer des loutres dans les viviers , pour leur apporter du poisson.

Quoi qu'il en soit , il paroît que ce n'est pas une loi commune , que toutes les loutres soient ainsi susceptibles d'éducation ; sans cela on en verroit certainement davantage , & elles nous serviroient pour la pêche , comme nos chiens nous servent pour la chasse. Toutes les jeunes loutres , que M. de Buffon a voulu priver , cherchoient à mordre , même en prenant du lait , & avant que d'être assez fortes pour mâcher du poisson : au bout de quelques jours , elles devenoient plus douces ; mais ce n'étoit peut-être que parcequ'elles étoient malades & foibles : loin de s'accoutumer à la vie domestique , toutes celles qu'il a voulu faire élever sont mortes dans le premier âge. La loutre en général est , de son naturel , sauvage & cruelle : quand elle peut entrer dans une riviere , elle y fait ce que le putois fait dans un poulailler ; elle tue beaucoup plus de poisson qu'elle ne peut en manger , & ensuite elle en emporte un dans sa gueule.

Les loutres se gâtent dans les premiers trous qui se présentent , sous les racines des peupliers , des saules , dans les fentes des rochers , & même dans les piles de bois à flotter ; elles y font aussi leurs petits sur un lit de buchettes & d'herbes. Leur retraite est infectée de la mauvaise odeur du débris des poissons qu'elles y laissent pourrir.

La loutre ne mue guere ; sa peau d'hiver est cependant plus brune , & se vend plus cher que celle d'été : elle fait une bonne fourrure ; on en fait pour l'hiver des manteaux que l'eau ne peut traverser. Les Sauvages du Canada se servent de peaux de loutre d'une grandeur extraordinaire pour en faire des robes , lesquelles étant portées & engraisées de leur sueur & des graisses qu'ils manient , sont propres à faire de meilleurs chapeaux que ceux que l'on fait du seul poil de castor trop sec & fort difficile à mettre en œuvre sans aucun mélange.

La chair de la loutre se mange en maigre , & a en effet un mauvais goût de poisson , ou plutôt de marais. Les chiens chassent la loutre volontiers , & l'atteignent aisément lorsqu'elle est éloignée de son gîte & de l'eau ; mais quand ils la saisissent , elle se défend , les mord cruellement , & quelquefois avec tant de force & d'acharnement , qu'elle leur brise les os des jambes , & qu'il faut la tuer pour lui faire lâcher prise.

La loutre est une espèce d'animal qui , sans être en très grand nombre , est généralement répandu en Europe , depuis la Suede jusqu'à Naples ; elle se trouve dans l'Amérique septentrionale , où elle ressemble tout-à-fait à celle d'Europe , si ce n'est que sa fourrure est encore plus noire & plus belle que celle de la loutre de Suede ou de Moscovie. Elle se rencontre vraisemblablement dans tous les climats tempérés , sur-tout dans les lieux où il y a beaucoup d'eau ; car elle ne peut habiter ni les sables brûlants , ni les déserts arides ; elle fuit également les rivières stériles & les fleuves trop fréquentés.

La graisse de la loutre , de même que celle des poissons , ne se coagule point par le froid , & reste toujours fluide : elle est résolutive , digestive ; on l'emploie pour la douleur des jointures , & pour fortifier les nerfs.

LOUVE, femelle du loup : elle porte deux mois , & fait cinq , six , & même jusqu'à sept louveteaux à la fois. *Voyez* LOUP.

LOWA ou OISEAU PÊCHEUR. Est une espèce de cormoran , que les Chinois accoutument à la chasse ou pêche du poisson. Ces oiseaux partent au signal donné par un coup de rame sur l'eau , ils plongent & saisissent le poisson par le milieu du corps , puis retournent à la barque avec leur proie. On leur met un anneau au bas du col , qui les empêche d'avaler leur prise : on dit que si le poisson est trop gros , plusieurs se joignent ensemble & s'aident mutuellement ; l'un s'attache à la queue , l'autre à la tête , & ils l'apportent aussi légèrement que fidèlement au bateau du pêcheur. *Voyez* CORMORAN.

LOXIA. *Voyez* BEC CROISÉ.

LUAMBONGOS. Les Negres de Congo donnent ce nom aux loups de leur pays. *Voyez* LOUP.

LUBIN. *Voyez* LOUP DE MER VULGAIRE.

LUCET. *Voyez* MYRTILLE.

LUCHARAN. Est le nom qu'Albin a donné à la *chouette blanche*. *Voy.* CHOUETTE.

LUCHEZ. Est le *brochet* des Bordelois. Voyez BROCHET.

LUCUMA ou RUEMA. Voyez à l'article JAUNE D'ŒUF.

LUMIERE. Comme le soleil est la source de cette matière précieuse ; voyez le mot PLANETE , où l'on a présenté ; d'après M. de Maupertuis , le beau spectacle du système planétaire.

LUMIERE SEPTENTRIONALE. C'est un phénomène naturel que l'on ne doit pas confondre avec la *lumière zodiacale* ou l'*aurore boréale* : ce dernier ne paroît que de tems en tems. Voyez AURORE BORÉALE. La lumière septentrionale au contraire est un phénomène journalier. On lit en effet dans une relation du Groënland , que dans ces contrées il se leve pendant tout l'hiver une lumière avec la nuit ; qui éclaire tout le pays, comme si la lune étoit dans son plein. Plus la nuit est obscure ; plus cette lumière luit ; elle fait son cours du côté du Nord. Elle ressemble à un feu volant , & elle s'étend en l'air comme une haute & longue palissade ; elle passe d'un lieu à un autre avec une promptitude inconcevable. Elle dure toute la nuit , & elle s'évanouit avec le soleil levant. M. de Mairan prétend que l'air grossier que l'on respire dans les pays situés près du pôle arctique , & les glaces qui se trouvent dans ces contrées , sont très propres à réfléchir les rayons de lumière & à causer cette clarté que les habitants du pays nomment *lumière septentrionale*.

LUMIERE ZODIACALE ou AURORE BORÉALE. Voy. AURORE BORÉALE.

LUMME, *Colymbi species*. M. Anderson (*Hist. Nat. d'Islande*, p. 93), dit que c'est un très bel oiseau aquatique d'Islande & du Groënland. Il est de la grosseur d'une oie ; il ressemble en cela & par son chant à l'imbrin des Isles de Feroë : il a le bec étroit & noir ; ses ailes sont petites ; & dès qu'il augmente en graisse & en pesanteur , il vole difficilement ; ses pattes sont très reculées , & ne lui permettent pas de marcher ni vite ni long-tems ; aussi dès qu'il apperçoit quelqu'un , sa seule ressource est de se coucher à terre & de se tapir , à moins que le vent ne souffle beaucoup ; alors il s'aide un peu de ses ailes pour mieux courir. Cet oiseau , pour couvrir ses deux œufs en sûreté , choisit des endroits écartés & déserts , où il bâtit son nid sur l'eau douce , ou sur de petites éminences qui se trouvent tout proche du rivage , afin de pouvoir boire étant assis sur ses œufs , de ne sortir que pour ses besoins , & de rentrer sans beaucoup se fatiguer.

Le même Auteur prétend que quand les petits sont en état de voler , les vieux les conduisent à l'eau , & leur apprennent à trouver leur sûreté & leur nourriture en plongeant à propos ; mais leur façon de les y conduire est tout-à-fait singulière : l'un des vieux lummes vole toujours au-dessous du petit , afin que si celui-ci venoit à manquer dans son vol , il tombât sur son dos au lieu de s'écraser en tombant à terre , ou de devenir la proie des renards , qui ne manquent jamais de guetter ces occasions ; un autre vieux se tient toujours au-dessus du petit pendant la route , pour faire face , en cas de besoin , aux oiseaux de proie. Si malheureusement un petit tombe

à terre, soit du nid, ou en voyageant, les vieux s'y précipitent aussi-tôt, & le défendent si vigoureusement, qu'ils se laissent manger eux-mêmes par les renards ou prendre par les hommes, plutôt que de l'abandonner. Une fois arrivés à la mer, chaque vieux lumme se charge d'un jeune, l'instruit comme nous l'avons dit, & lui fait quitter bientôt après la côte pour le faire hiverner vers l'Amérique, d'où ils reviennent tous ensemble en Groënland à l'approche de l'été. Les vieux lummes, qui par hasard ont perdu leurs petits, ou qui ne sont plus en état de couvrir, ne viennent jamais à terre, ils nagent toujours par troupe de soixante ou de cent, mais ils s'en vont avec les autres en Août. Dès qu'on jette un petit lumme dans la mer, ils viennent sur le champ l'entourer, & chacun s'empresse de l'accompagner, au point de se battre autour de lui, jusqu'à ce que le plus fort l'emmene; mais si par hasard la mère survient, toute la querelle cesse aussi-tôt, & on lui cède son enfant.

LUNAIRE. Voyez BULBONACH.

LUNE. Voyez à l'article PLANETE.

LUNE DE MER ou ROND DE MER, *Orbis marinus*. Est un poisson plat d'Afrique, qu'on appelle ainsi à la côte d'Or, à cause de sa ressemblance avec un poisson qui se nomme de même en Amérique, & dont la forme est presque orbiculaire. Le poisson lune a dix-huit ou vingt pouces depuis la tête jusqu'à la queue, douze pouces de large & deux ou trois d'épaisseur : ce poisson seroit presque ovale sans sa queue. Sa peau est blanche, argentée, & reluit la nuit; sa gueule est petite & armée de deux rangées de dents : il a le front large & ridé, les yeux ronds, grands & fort rouges; il a deux grandes nageoires qui commencent à côté des ouies : sa chair est blanche, ferme, grasse, nourrissante & de bon goût.

Ce poisson ne mord point à l'hameçon dans les mers de l'Amérique, & au contraire il ne se prend qu'à l'hameçon sur la côte d'Or en Afrique.

Le poisson lune d'Amérique a également la peau blanchâtre & un petit moignon de queue : il a depuis six jusqu'à huit pouces de diamètre, & un pouce ou environ d'épaisseur.

De quelque manière qu'on accommode ces poissons, ou bouillis, ou frits, ou rôtis, ils sont toujours, dit Labat, très bons & très faciles à digérer.

Les poissons lunes diffèrent des *poissons assiettes* en ce qu'ils ont sur le dos & sous le ventre deux grandes moustaches, qui semblent représenter une lune en croissant.

Redi fait aussi mention d'une autre espèce de poisson de mer appelé également *lune*, & dont Jonston, Aldrovande, Rondelet & Silvien ont parlé. La lune dont Redi a donné la description, pesoit cent livres; elle lui avoit été donnée en 1674, par le Grand Duc Cosme III. Ce poisson étoit tout couvert d'une peau inégale & rude comme celle des poissons cartilagineux : il n'avoit que quatre nageoires, mais revêtues de cette même peau rude; la bouche étoit d'une petitesse extrême à proportion de la gran-

deur énorme du corps. Les trous des ouïes étoient au nombre de deux : au fond de chacun de ces trous étoient quatre grandes ouïes & une plus petite. On remarquoit sur le devant de la mâchoire supérieure, un os tranchant fait en demi-cercle, auquel répondoit un os semblable dans la mâchoire inférieure : ces deux os lui tenoient lieu de dents : l'entrée de la gorge étoit tapissée d'un grand nombre de piquants longs, aigus, recourbés & très durs. Redi ajoute qu'il trouva tout l'estomac & les intestins remplis d'une espece de bouillie blanche, qui contenoit des vers brunâtres & à queue fourchue. *Voyez Collect. Acad. Tom. IV, part. Etrang. p. 527.*

On appelle ce poisson *mole* : on dit qu'il gronde comme un cochon quand on le prend. Sa chair est blanche, nerveuse & grasse.

LUPERE, *Luperus*. Insecte coléoptère dont les antennes filiformes ont les articles allongés, & d'une égale grosseur tant à leur base qu'à leur extrémité. Son corselet est un peu applati, & garni de rebord ; sa démarche est lourde & lente : sa larve qui mange les feuilles de l'orme, est assez grosse & ovale.

LUPIN, *Lupinus*. Est une plante que l'on cultive dans les pays méridionaux de la France : sa racine est ordinairement unique, ligneuse & fibreuse ; elle pousse une tige haute de deux pieds, ronde, droite, velue, rameuse, de couleur verte, jaunâtre, & moëlleuse : après que les fleurs placées au sommet de cette tige, sont séchées, il s'élève trois rameaux au dessous : ses feuilles sont en éventail, ou en main ouverte, verdâtres & velues en dessous : les segments de la feuille s'approchent & se resserrent au coucher du soleil, & de plus ils s'inclinent vers la queue & se réfléchissent vers la terre. Les fleurs sont légumineuses & rangées en épi au sommet des tiges ; il leur succede des gousses épaisses, larges, applaties, longues de trois pouces environ, jointes plusieurs ensemble, renfermant cinq ou six graines assez grandes, orbiculaires, un peu anguleuses & applaties, lesquelles renferment une plantule fort apparente, & sont un peu creusées en nombril du côté qu'elles tiennent à la gousse, blanchâtres en dehors, jaunâtres en dedans & fort ameres.

Du tems de Galien, la graine de lupins étoit une nourriture quotidienne sur les tables : on leur faisoit perdre leur saveur amere dans de l'eau bouillante, on les mangeoit au sel & au vinaigre ; mais les Médecins modernes depuis Hoffman, regardent l'usage interne des lupins comme dangereux, parcequ'ils sont une nourriture d'un suc grossier, très difficile à digérer, &c. cependant s'il y a tant de danger à user des lupins, comment se peut-il faire que les Grecs en mangeassent si souvent ? Protogène, qui, dans son tems fut un Peintre très habile, ne mangeoit que des lupins, lorsqu'il vouloit être maître de son imagination, & donner de la vivacité à ses ouvrages. Ainsi les lupins sont, au jugement de la Médecine actuelle, dans le même cas que les *lentilles*. Voyez cet article.

Quoi qu'il en soit, les lupins sont du nombre des excellents remèdes emplastiques : leur décoction convient pour fomentier la peau lorsqu'elle

est attaquée de dartres, teigne, galle, gratelle, &c. elle est une des quatre farines résolutives, qui sont celles d'orge, de fèves, d'orobe & de lupins, auxquelles cependant on substitue, selon la volonté, celles de froment, de seigle, de fenugrec & de lin. Voyez ces mots.

Les lupins servent aussi pour la nourriture des bestiaux; mais auparavant on les fait tremper dans de l'eau pour leur ôter leur amertume.

LURUS. Est un magnifique serpent de l'Amérique, que les Insulaires ont nommé ainsi parcequ'il est tout couvert de bandelettes de diverses couleurs artistement tissues: sa tête est joliment peinte & entourée d'un collier rouge; les bandes les plus belles sont d'un rouge corallin, tiqueté de nœuds couleur de ponceau: il y a des écailles paillées en forme de réseau, tiquetées d'un bleu mourant: le ventre est marqueté de points rouges. Voyez Seba, *Thef. II. Tab. 54, n. 2.*

LUZERNE, Medica. Il y a plusieurs especes de luzerne, mais nous allons parler préféablement de celle que l'on cultive pour le bétail, & que l'on appelle quelquefois *trèfle* ou *foin de Bourgogne*. Cette espece produit de grosses & vigoureuses racines qui pivotent profondément en terre, & qui sont très vivaces. Ces racines donnent naissance à une tête, d'où partent plusieurs tiges hautes de deux pieds & demi, ou trois pieds, & qui deviennent plus ou moins grosses & nombreuses suivant la nature du terrain. Les rameaux soutiennent plusieurs feuilles composées de trois folioles disposées en trèfle. Vers le sommet des épis paroissent des fleurs légumineuses violettes ou purpurines, auxquelles succedent des filiques qui contiennent des semences qui ont la figure d'un rein; toute la plante a un léger goût de cresson.

La luzerne est une de ces plantes avec lesquelles on peut former des prairies artificielles; d'une grande utilité par l'abondance de la nourriture qu'elles fournissent aux bestiaux.

On doit la semer dans une terre bien préparée par les labours, & bien hersée pour la débarrasser de toutes les herbes étrangères qui pourroient lui nuire. Les lieux dans lesquelles elle se plaît davantage, sont les terrains gras, légers, & qui ont beaucoup de fonds: elle ne réussit pas dans les terres seches & arides. Dans les Provinces méridionales du Royaume, on peut semer la luzerne en automne, parceque, comme on n'y a point à craindre de grandes gelées d'hiver, cette plante profite de l'humidité de cette saison pour étendre ses racines; mais dans nos Provinces il vaut mieux ne la semer que dans le mois de Mars. On répand une livre de graine de luzerne par perche quarrée, la perche étant de vingt-deux pieds de longueur. On mêle la semence de luzerne avec moitié de semence d'avoine. Lorsque l'avoine qu'on a semée avec la luzerne est parvenue à maturité, on la fauche tout près de terre: les pieds de luzerne que l'on coupe en même tems ne manquent pas de repousser. Si néanmoins la saison avoit été assez favorable pour que l'avoine eût prodigieusement tallé, comme elle pourroit étouffer la luzerne, il faudroit la faire couper encore verte,

& la faire consommer tout de suite par le bétail ; car il est plus à propos de sacrifier la récolte de ce grain , que de risquer de perdre la luzerne nouvellement semée. Ce n'est qu'à la seconde & même à la troisième année , qu'on peut avoir une ample moisson de luzerne ; c'est alors qu'elle a toute sa hauteur : on peut la faucher dans nos Provinces trois ou quatre fois l'année , & dans les Provinces méridionales , jusqu'à six fois. La première année , on ne doit la faucher qu'une fois , & deux fois dans la seconde.

Comme le suc de cette herbe est visqueux , elle se dessèche difficilement. Lorsqu'il fait très chaud , il ne faut pas attendre que l'herbe soit tout à fait sèche pour l'enlever , parceque la plus grande partie des feuilles se détacheroit & resteroit sur le champ. Une excellente méthode , est de mettre la luzerne , avant qu'elle soit entièrement sèche , dans le grenier par couches alternatives avec la paille ; celle ci empêche la luzerne de s'échauffer , & contracte un parfum si suave , que les chevaux sont fort friands de ce mélange de paille & de luzerne. Lorsqu'on veut recueillir la graine , on coupe légèrement , avec des faucilles , les sommets des tiges , lorsqu'ils sont mûrs & chargés de graines ; on les étend sur un drap pour sécher , & on fauche ensuite l'herbe dont on a coupé les tiges. Un champ de luzerne dure jusqu'à huit à neuf ans.

La luzerne engraisse en fort peu de tems les bestiaux ; mais on doit y mêler moitié de paille. Ce fourage , encore verd , & coupé avant la fleur , a rétabli de jeunes chevaux qui maigrissoient , sans qu'on en sût la cause ; les vaches qui en sont nourries , donnent quantité d'excellent lait. Quelques personnes sont parvenues à supprimer l'avoine à leurs chevaux , en leur donnant de la luzerne hachée en place de la ration d'avoine.

Dans certaines années , on voit se multiplier dans les luzernes , des chenilles noires , qui en font périr l'herbe. Aussi-tôt qu'on s'en apperçoit , il faut couper les luzernes ; par ce moyen , on fait périr les chenilles , & l'herbe qui repousse ensuite ne se trouve pas endommagée.

LYCION ou LYCIUM. *Voyez* CATÉ INDIEN.

LYNX ou LOUP-CERVIER , *Lupus cervarius*. Le lynx , dit M. de Buffon , dont les Anciens ont dit que la vue étoit assez perçante pour pénétrer les corps opaques , & dont l'urine , suivant leur opinion , avoit la merveilleuse propriété de devenir un corps solide , une pierre précieuse appelée *lapis lyncurius* , est un animal fabuleux , aussi-bien que toutes les propriétés qu'on lui attribue. Ce lynx imaginaire n'a d'autre rapport avec le vrai lynx que celui du nom ; il ne faut donc pas , comme l'ont fait plusieurs Naturalistes , attribuer à celui-ci , qui est un être réel , les propriétés de cet animal imaginaire.

Notre lynx , continue M. de Buffon , ne voit pas à travers les murailles ; mais il est vrai qu'il a les yeux brillants , le regard doux , l'air agréable & gai : son urine ne fait pas des pierres précieuses , mais seulement il la recouvre de terre , comme font les chats , auxquels il ressemble beaucoup , & dont il a les mœurs & même la propreté. Il n'a rien du loup qu'une espèce

de hurlement , qui , se faisant entendre de loin , a dû tromper les Chasseurs , & leur faire croire qu'ils entendoient un loup. Cela seul a peut être suffi pour lui faire donner le nom de *loup* , auquel , pour le distinguer du vrai loup , les Chasseurs auront ajouté l'épithete de *cervier* , parcequ'il attaque les cerfs , ou plutôt parceque sa peau est variée de taches , à-peu-près comme celle des jeunes cerfs , lorsqu'ils ont la livrée.

Le lynx est communément de la grandeur d'un *renard*. Il differe de la *panthere* & de l'*once* par les caracteres suivans : il a le poil plus long , les taches moins vives & mal terminées ; les oreilles bien plus grandes & surmontées à leur extrémité d'un pinceau de poils noirs ; la queue beaucoup plus courte & noire à l'extrémité ; le tour des yeux blancs , & l'air de la face plus agréable & moins féroce. La robe du mâle est mieux marquée que celle de la femelle : il a les pieds divisés comme les lions , & la langue couverte de pointes. Il ne court pas de suite , comme le loup : il marche & saute comme le chat : il vit de chasse , & poursuit son gibier jusques sur la cime des arbres. Les chats sauvages , les martres , les hermines , les écureuils ne peuvent lui échapper : il saisit les oiseaux ; il attend les cerfs , les chevreuils , les lievres au passage , & s'élance dessus ; il les prend à la gorge ; & lorsqu'il s'est rendu maître de sa victime , il en suce le sang , & lui ouvre la tête pour manger la cervelle ; après quoi , souvent il l'abandonne pour en chercher une autre.

Les lynx ou loups cerviers à peau tachée , se trouvent dans le Nord de l'Allemagne , en Moscovie , en Sibérie , au Canada , & dans les autres parties Septentrionales de l'un & de l'autre Continent. On fait avec les peaux de loups cerviers de très belles fourrures , qui sont beaucoup d'usage dans le commerce. Les plus belles peaux de lynx viennent de Sibérie , sous le nom de *loup cervier* ; & de Canada , sous celui de *chat cervier* , parceque ces animaux étant , comme les autres , plus petits dans le nouveau que dans l'ancien Continent , on les a comparés au loup , pour la grandeur en Europe , & au chat sauvage en Amérique. Cet animal , qui , comme l'on voit , habite les climats froids plus volontiers que les pays tempérés , est du nombre de ceux qui ont pu passer d'un Continent à l'autre par les terres du Nord ; aussi l'a-t-on trouvé dans l'Amérique Septentrionale : c'est la même figure , le même naturel , il ne differe que pour la grandeur & la couleur. Le poil des loups cerviers change de couleur , suivant les climats & la saison ; les fourrures d'hiver sont plus belles , meilleures & mieux fournies que celles de l'été ; leur chair , comme celle de tous les animaux de proie , n'est pas bonne à manger.

Par cette description du loup cervier , autrement lynx , on voit que cet animal n'est point le *chaos* , ni le *thos* dont les Anciens ont parlé , & qui sont des animaux foibles , timides & de la classe des petites bêtes.

M. Perrault a donné la description anatomique du loup cervier. *Voyez le Tom. III. des Mém. de l'Académie des Sciences , Part. I.*

LYRE DE DAVID , *lyra Davidis* , est un coquillage univalve de la

famille des *tonnes* : c'est une espece de *harpe*. Voyez ces mots.

LYS, *Lilium*. C'est une plante qui ne differe des joncs, qu'en ce que leur racine n'est point traçante, & que les feuilles de leur calice, qui est fermé en forme de cloche, ont communément à leur origine intérieure un sillon. Tous les lys ont trois stygmates.

Le lys blanc est une de ces plantes que l'on cultive dans nos jardins, & qui en font, dans le mois de Juin, un des plus beaux ornements par leur beauté & par leur odeur exquise. On dit que cette fleur est originaire de Syrie. Il s'éleve de sa racine, qui est bulbeuse, une tige cylindrique, qui croît assez haut, & qui soutient plusieurs fleurs d'une blancheur admirable, odorantes, composées de six pétales. Aux fleurs succèdent des fruits oblongs, à trois angles, remplis de semence : on emploie ses fleurs & ses oignons pour l'usage de la Médecine.

Il y a encore plusieurs autres especes de lys ; savoir, les *lys blancs à fleurs doubles*, qui sont, en quelque sorte, inférieurs aux lys simples, dont la fleur est toujours parfaite ; au lieu que celles des lys à fleurs doubles ne sont qu'à demi-formées. Le *lys blanc panaché* est des plus beaux par ses feuilles joliment bordées de cramoisi : il fleurit en hiver, & il n'y a guères de fleurs qui le surpassent pour la beauté. Les *lys orangiers*, mêlés avec les blancs, font un bel effet dans les jardins. Le *lys rouge*, surnommé de *Saint-Jean*, est admirable par sa belle couleur de feu.

Les fleurs des lys ont une vertu anodine : on ne les emploie qu'à l'extérieur, & très rarement à l'intérieur : on s'en sert dans les décoctions émollientes. On prépare une huile de lys, en faisant infuser des fleurs de lys, que l'on n'y laisse que deux ou trois jours ; & ensuite on en substitue d'autres, parcequ'elles se pourriroient, si on les y laissoit plus long-tems. Cette huile, ainsi préparée au soleil, a une odeur très agréable, & est d'usage dans les douleurs & les tumeurs : elle est bonne dans les cas où il faut faire digérer ou mûrir, & peut être ajoutée aux cataplasmes émollients & maturatifs. Les fleurs de lys conservées dans l'eau-de-vie, & appliquées sur les plaies enflammées, produisent aussi de très bons effets.

L'eau odorante que l'on retire des fleurs de lys à la chaleur du bain-marie, est d'usage pour relever le teint des jeunes filles, & leur enlever les taches du visage, sur-tout si on y mêle un peu de sel de tartre.

L'oignon de lys, appliqué à l'extérieur, est un des principaux remedes pour amollir, conduire à maturité, & faire suppurer.

LYS ASPHODELE, *Liliasphodelus*. Plante dont les fleurs sont jaunes, mais semblables pour la figure & l'odeur à celles du lys. Ses racines sont glanduleuses, ou en petits navets, comme celles de l'*asphodele*. Voyez ce mot. Ce lys est émollient.

LYS DÉTANG. Voyez NÉNUPHAR.

LYS JACINTE, *Lilio hyacinthus vulgaris*. Sa fleur est bleue ou violette, & approche de celle de la jacinthe : on cultive cette plante dans les jardins.

LYS NARCISSE ou COLCHIQUE JAUNE, ou NARCYSSE D'AUTOMNE, *Colchicum luteum majus*. Ses feuilles sont répandues à terre, vertes & lisses : ses fleurs sont jaunes ; sa racine est bulbeuse & noirâtre. Cette plante, qui tient du lys & du narcisse, croît aux pays chauds, sur les montagnes & dans les prés.

LYS SAINT-BRUNO, *Liliastrum alpinum*. Ses feuilles sont longues, étroites & creuses : ses fleurs sont assez blanches & odorantes, semblables à celles du lys ordinaire ; ses racines sont glanduleuses & fibreuses. Cette plante croît sur les Alpes & à la grande Chartreuse, près la Chapelle de Saint-Bruno. Ce lys est carminatif & diurétique.

LYS DES VALLÉES. Voyez MUGUET.

Fin du second Volume.



D.E-8-9-10





